

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO.
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 312, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.

Portaria publicada no D.O.U do dia 23 de outubro de 2020, seção 1.

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 10.253, de 20 de fevereiro de 2020, e observado, no que couber, o contido no Decreto nº 9.841 de 18 de junho de 2019 e nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008, da Secretaria de Política Agrícola, e nº 16, de 9 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de sorgo granífero no Estado do Acre, ano-safra 2020/2021, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor na data de sua publicação.

CÉSAR HANNA HALUM

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

O sorgo (*Sorghum bicolor* L. Moench) é uma planta de origem tropical, de dias curtos e com altas taxas fotossintéticas, exigindo, por isso, um clima quente para poder expressar seu potencial de produção. A temperatura do ar ótima para o desenvolvimento da cultura varia com a cultivar. A grande maioria dos materiais genéticos de sorgo requer temperaturas superiores a 21°C para um bom crescimento e desenvolvimento, não suportando, normalmente, temperaturas abaixo de 16°C, sendo que temperaturas superiores a 38°C também reduzem a produtividade.

O sorgo apresenta metabolismo do tipo C4, com alta capacidade fotossintética e características que contribuem para a resistência à seca, como o sistema radicular profundo, a alta concentração de pelos absorventes, presença de sílica na endoderme e lignificação no periciclo.

Apesar de resistente à seca, a ocorrência de déficits hídricos, principalmente na fase de florescimento e de enchimento de grãos, pode provocar redução acentuada na produção.

A produtividade da cultura depende de sua qualidade genética, do uso de técnicas adequadas de manejo e de condições edáficas e climáticas. Desse modo, as indicações do Zarc dependem da escolha de material genético adequado, práticas corretas de plantio, controle de pragas e doenças e de cultivo em solos aptos para a prática agrícola.

Nas semeaduras tardias e nos cultivos após uma safra de verão a produtividade do sorgo é bastante afetada pelo regime de chuvas, pelas limitações de radiação solar e pelas temperaturas baixas durante o final do ciclo.

Objetivou-se, com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, identificar os municípios aptos e o período de semeadura, para o cultivo em sistema de sequeiro do sorgo granífero em três níveis de risco: 20%, 30%, 40%.

Essa identificação foi realizada com a aplicação de um modelo de balanço hídrico da cultura. Neste modelo são consideradas as exigências hídrica e térmica, duração do ciclo, das fases fenológicas e da reserva útil de água dos solos para cultivo desta espécie, bem como dados de precipitação pluviométrica e evapotranspiração de referência de séries com, no mínimo, 15 anos de dados diários registrados em 3.750 estações pluviométricas selecionadas no país.

Por se tratar de um modelo agroclimático, parte-se do pressuposto que não ocorrerão limitações quanto à fertilidade dos solos e danos às plantas devido à ocorrência de pragas e doenças.

Para delimitação das áreas aptas ao cultivo do sorgo granífero em condições de baixo risco, foram adotados os seguintes parâmetros e variáveis:

I. Temperatura: Foram restringidos os decêndios com temperaturas mínimas médias abaixo de 12 °C e temperaturas máximas acima de 38 °C.

Considerou-se o risco de ocorrência de geadas por meio da probabilidade de ocorrência de valores de temperaturas mínimas menores a 2 °C observadas no abrigo meteorológico.

II. Ciclo e Fases fenológicas: O ciclo do sorgo foi dividido em 4 fases, sendo elas: Fase I – Germinação e Emergência; Fase II – Crescimento e Desenvolvimento; Fase III – Florescimento e Enchimento de Grãos e Fase IV - Maturação. As cultivares de sorgo foram classificadas em três grupos de características homogêneas: Grupo I (90 - 110 dias); Grupo II (111 dias ≤ n ≤ 130 dias); e Grupo III (n > 130 dias), onde *n* expressa o número de dias da emergência à maturação fisiológica.

Obs: A colheita de grãos deve ser realizada tão logo o grão atinja o ponto de colheita com umidade adequada para essa operação.

III. Capacidade de Água Disponível (CAD): Foi estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da reserva útil de água dos solos. Foram considerados os solos Tipo 1 (textura arenosa), Tipo 2 (textura média), Tipo 3

(textura argilosa), com capacidade de armazenamento de 35 mm, 55 mm e 75 mm, respectivamente, e uma profundidade efetiva média do sistema radicular de 50 cm.

IV. Índice de Satisfação das Necessidades de Água (ISNA): Foi considerado um ISNA $\geq 0,6$ na Fase I - germinação e estabelecimento da cultura e ISNA $\geq 0,45$ na Fase III - florescimento e enchimento de grão.

Considerou-se apto para o cultivo do sorgo granífero os municípios que apresentaram, em no mínimo 20% de sua área, com condições climáticas dentro dos critérios considerados.

Por se tratar de um modelo agroclimático, mesmo em se tratando de um estudo técnico científico de eficácia comprovada, é necessário que o agricultor faça uma consulta aos órgãos de pesquisa/extensão rural de seu Estado, assim como o acompanhamento de um técnico agrícola ou agrônomo na implantação da lavoura, para se certificar de estar seguindo as práticas agronômicas mais adequadas ao cultivo do sorgo granífero.

Nota: O ZARC está direcionado ao plantio de sequeiro, entretanto, as lavouras irrigadas não estão restritas aos períodos de plantio indicados na Portaria, cabendo observar as indicações de instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) oficial para as condições específicas de cada agroecossistema.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de sorgo granífero no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matações ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1º	11	21	1º	11	21	1º	11	21	1º	11	21
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30
Meses	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		

Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1º	11	21	1º	11	21	1º	11	21	1º	11	21
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31
Meses	Maio			Junho			Julho			Agosto		

Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1º	11	21	1º	11	21	1º	11	21	1º	11	21
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
Meses	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		

4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores /mantenedores para o Estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

GRUPO I

SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA: Ranchero, Jade, XB 6022, A 9904 e A 6304.

GRUPO II

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.: 1G233, 50A40, 50A60 e 84G05;

TROPIGENE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA ME: AGRI G1.

Com base nas informações prestadas pelos obtentores/mantenedores, nenhuma das cultivares indicadas para o Estado obteve enquadramento no Grupo III.

Notas:

1. Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2. Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Acrelândia	28 a 9		10 + 26 a 27	28 a 10	26 a 27		28 a 10	27 + 11	26 + 12
Assis Brasil	28 a 8		9 + 27	27 a 10		11 + 26	27 a 11		26
Brasiléia	28 a 7	8	9 + 27	28 a 9	27 + 10	26	28 a 10	27 + 11	26
Bujari	28 a 9	10	26 a 27	28 a 10	26 a 27	11	28 a 11	27 + 12	25 a 26
Capixaba	28 a 8	9	26 a 27	28 a 10	27	26	28 a 10	27 + 11	26
Cruzeiro Do Sul	26 a 13	25 + 14 + 20 a 21	22 a 24 + 15	21 + 25 a 14	19 a 20 + 22 a 24	15 a 18	20 a 15	16 a 19	
Epitaciolândia	28 a 7	8	9 + 27	28 a 9	27 + 10	26	28 a 10	27 + 11	26
Feijó	28 + 33 a 10	27 + 29 a 32 + 11	25 a 26 + 12	28 + 33 a 11	25 a 27 + 29 a 32 + 12 a 13 + 21		26 a 28 + 33 a 13	25 + 29 a 32 + 14 + 21	22 a 24 + 15 + 20
Mâncio Lima	25 a 13	14 + 20 a 21	15 + 19 + 22 a 24	21 a 14	19 a 20 + 15	16 a 18	19 a 15	16 a 18	
Manoel Urbano	28 + 33 a 10	27 + 29 a 32	26 + 11	28 + 33 a 11	26 a 27 + 29 a 32	25 + 12 + 21	28 + 33 a 12	26 a 27 + 29 a 32 + 13	25 + 20 a 21
Marechal Thaumaturgo	28 a 10	26 a 27 + 11	25 + 12 + 20 a 21	27 a 11	25 a 26 + 12 a 13 + 21	22 a 24 + 20	27 a 13	21 a 26 + 14	19 a 20
Plácido De Castro	28 a 9		26 a 27	28 a 10	27	26	28 a 10	27 + 11	26
Porto Acre	28 a 9	10	26 a 27	28 a 10	26 a 27	11	28 a 11	27	25 a 26 + 12
Porto Walter	26 a 11	25 + 12 a 13	20 a 24	21 + 26 a 13	20 + 22 a 25 + 14	19	21 + 26 a 14	20 + 22 a 25 + 15	16 a 19
Rio Branco	28 a 9		10 + 26 a 27	28 a 10	27	26 + 11	28 a 11	27	26 + 12
Rodrigues Alves	25 a 13	14 + 20 a 21	15 + 22 a 24	21 + 25 a 14	19 a 20 + 22 a 24	15 a 18	20 a 15	16 a 19	

Santa Rosa Do Purus	28 + 33 a 10	27 + 29 a 32	26 + 11	27 a 28 + 33 a 11	29 a 32	12 + 21 + 25 a 26	27 a 28 + 33 a 12	26 + 29 a 32 + 13	25 + 21
Sena Madureira	28 a 10		26 a 27	27 a 10	26 + 11		27 a 12	26	25 + 13
Senador Guimard	28 a 9		10 + 26 a 27	28 a 10	26 a 27		28 a 10	27 + 11	26 + 12
Tarauacá	27 a 28 + 33 a 11	26 + 29 a 32	25 + 12 a 13 + 20 a 21	27 a 28 + 33 a 12	25 a 26 + 29 a 32 + 13 + 21	22 a 24 + 14 + 20	21 + 26 a 28 + 33 a 14	20 + 22 a 25 + 29 a 32 + 15	19
Xapuri	28 a 8	9	27	28 a 9	27 + 10	26	28 a 10	27 + 11	26

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Acrelândia	28 a 8	27	26	28 a 9	26 a 27	10	28 a 10	26 a 27	11
Assis Brasil	28 a 7	8	27	27 a 9		26	27 a 9	10	26
Brasiléia	28 a 7	27 + 8		28 a 9	27	26	28 a 9	27 + 10	26
Bujari	28 a 8		9 + 26 a 27	28 a 9	27 + 10	25 a 26	28 a 10	27 + 11	25 a 26 + 20
Capixaba	28 a 7	8	27	28 a 9	27	26	28 a 9	27 + 10	26
Cruzeiro Do Sul	20 + 26 a 12	19 + 21 + 25 + 13	18 + 22 a 24	19 a 13	18 + 14	15 a 17	19 a 14	15 a 18	
Epitaciolândia	28 a 7	27	8	28 a 9	27	26	28 a 9	27 + 10	26
Feijó	31 a 9	27 a 30 + 10	25 a 26 + 11 + 19 a 21	26 + 31 a 11	25 + 27 a 30 + 20 a 21	22 a 24 + 12 + 19	26 + 31 a 12	25 + 27 a 30 + 20 a 21	22 a 24 + 19
Mâncio Lima	20 + 25 a 12	18 a 19 + 21 a 24 + 13		19 a 13	18 + 14	15 a 17	1 a 36		
Manoel Urbano	31 a 9	27 a 30	26 + 10	31 a 10	26 a 30 + 11 + 20	25 + 21	31 a 11	26 a 30 + 20	25 + 12 + 21
Marechal Thaumaturgo	27 a 9	26 + 10	25 + 11 + 20 a 21	21 + 26 a 11	20 + 22 a 25	19 + 12	26 a 12	20 a 25	19 + 13 a 14
Plácido De Castro	28 a 8		26 a 27	28 a 9	27	26	28 a 9	27 + 10	26

Porto Acre	28 a 8	27	26 + 9	28 a 9	26 a 27 + 10	25	28 a 10	26 a 27 + 11	25
Porto Walter	26 a 11	25 + 20 a 21	22 a 24 + 12 + 19	20 a 21 + 26 a 11	19 + 22 a 25 + 12 a 13	18 + 14	21 + 26 a 13	19 a 20 + 22 a 25 + 14	15 a 18
Rio Branco	28 a 8		26 a 27	28 a 9	27	26 + 10	28 a 10	27	26 + 11
Rodrigues Alves	20 + 26 a 12	19 + 21 + 25 + 13	18 + 22 a 24	19 a 13	18 + 14	15 a 17	19 a 14	15 a 18	
Santa Rosa Do Purus	31 a 9	27 a 30	26 + 10	31 a 10	27 a 30 + 20	25 a 26 + 11 + 21	31 a 11	26 a 30 + 20	25 + 12 + 21
Sena Madureira	28 a 8	9	27	27 a 9	10	20 + 25 a 26	27 a 11	26	25 + 20
Senador Guimard	28 a 8	27	26	28 a 9	27	26 + 10	28 a 10	26 a 27	11
Tarauacá	31 a 10	26 a 30 + 11 + 20	25 + 19 + 21	20 a 21 + 26 + 31 a 11	22 a 25 + 27 a 30	12 a 13 + 19	26 + 31 a 12	20 a 25 + 27 a 30	13 a 19
Xapuri	28 a 7	8	27	28 a 9	27	26	28 a 9	27 + 10	26

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO III								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Acrelândia	28 a 6	27 + 7	26	28 a 7	26 a 27	8 + 18 a 19	19 + 28 a 8	26 a 27	9 + 18 + 20
Assis Brasil	28 a 6		27	27 a 6	7	8 + 19 + 26	27 a 8		9 + 19 + 26
Brasiléia	28 a 5	27 + 6		28 a 6	27 + 7	26 + 19	28 a 7	27 + 8 + 19	26 + 9
Bujari	28 a 7		26 a 27	28 a 7	27 + 8 + 19	26	19 + 28 a 8	27 + 9	25 a 26 + 18 + 20
Capixaba	28 a 6		7 + 26 a 27	28 a 7	27	26 + 8 + 19	28 a 7	27 + 8 + 19	26 + 9 + 18
Cruzeiro Do Sul	18 a 19 + 25 a 10	17 + 20 a 24 + 11	12	18 a 11	16 a 17 + 12	13 a 15	18 a 12	13 a 17	
Epitaciolândia	28 a 5	27 + 6		28 a 6	27 + 7	26 + 19	28 a 7	27 + 8 + 19	26
Feijó	29 a 8	27 a 28 + 9 + 19	25 a 26 + 10 + 18 + 20	20 + 29 a 9	19 + 21 + 25 a 28 + 10	18 + 22 a 24	19 + 29 a 10	18 + 20 a 21 + 25 a 28	22 a 24 + 11
Mâncio Lima	18 a 19 +	17 + 20 a	12 a 16	17 a 11	16 + 12	13 a 15	1 a 36		

	25 a 10	24 + 11							
Manoel Urbano	29 a 7	27 a 28 + 8	26 + 18 a 19	29 a 8	27 a 28 + 9 + 19 a 20	25 a 26 + 18 + 21	29 a 9	26 a 28 + 10 + 19	25 + 18 + 20 a 21
Marechal Thaumaturgo	28 a 8	26 a 27 + 9 + 19	25 + 18 + 20 a 21	20 + 25 a 9	18 a 19 + 10	21 a 24 + 11	19 a 21 + 26 a 10	18 + 22 a 25 + 11	17 + 12
Plácido De Castro	28 a 6		7 + 26 a 27	28 a 7	27	26 + 8 + 19	28 a 8	27 + 19	26 + 9 + 18
Porto Acre	29 a 7	28	26 a 27	29 a 7	26 a 28 + 8	25 + 18 a 19	19 + 29 a 8	26 a 28 + 9	25 + 18 + 20
Porto Walter	19 + 26 a 9	18 + 20 a 21 + 25 + 10	17 + 22 a 24 + 11	18 a 20 + 25 a 10	21 a 24 + 11	12 + 16 a 17	18 a 21 + 26 a 11	22 a 25 + 12	13 a 17
Rio Branco	28 a 6	7	26 a 27	28 a 7	27	26 + 8 + 19	28 a 8	27 + 19	26 + 9 + 18
Rodrigues Alves	18 a 19 + 25 a 10	17 + 20 a 24 + 11	12	17 a 11	16 + 12	13 a 15	18 a 22 + 26 a 12	13 a 17 + 23 a 25	
Santa Rosa Do Purus	29 a 7	27 a 28 + 8	26 + 19	29 a 8	27 a 28 + 9 + 19 a 20	25 a 26 + 21	29 a 9	26 a 28 + 19	25 + 10 + 18 + 20 a 21
Sena Madureira	28 a 7		8 + 19 + 26 a 27	28 a 8	27 + 19	25 a 26 + 9 + 20	19 + 27 a 9		18 + 20 + 25 a 26
Senador Guimard	28 a 6	27 + 7	26	28 a 7	26 a 27	8 + 18 a 19	28 a 8	26 a 27 + 19	9 + 18 + 20
Tarauacá	29 a 9	27 a 28 + 19	25 a 26 + 10 + 18 + 20 a 21	19 a 20 + 29 a 10	18 + 21 + 25 a 28	22 a 24 + 11	19 a 20 + 29 a 10	18 + 21 a 28 + 11	12 a 17
Xapuri	28 a 6		27	28 a 7	27	26 + 19	28 a 7	27 + 8 + 19	26