

PORTARIA SPA/MAPA Nº 380, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022.

Portaria publicada no D.O.U do dia 08 de dezembro de 2022, seção 1.

Aprova o Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC para a cultura do trigo de sequeiro no estado de Mato Grosso do Sul, ano-safra 2022/2023.

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 11.231, de 10 de outubro de 2022, e observado, no que couber, o contido no Decreto nº 9.841 de 18 de junho de 2019, na Portaria nº 412 de 30 de dezembro de 2020, na Instrução Normativa nº 3, de 14 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 15 de outubro de 2008, na Instrução Normativa nº 2, de 9 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 11 de novembro de 2021, da Secretaria de Política Agrícola, e na Instrução Normativa nº 16, de 9 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura do trigo de sequeiro no estado de Mato Grosso do Sul, ano-safra 2022/2023, conforme anexo.

Art. 2º Fica revogada a Portaria SPA/MAPA nº 604 de 16 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 20 de dezembro de 2021, seção 1, que aprovou o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura do trigo de sequeiro no estado de Mato Grosso do Sul, ano-safra 2021/2022.

Art. 3º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor em 2 de janeiro de 2023.

JOSÉ ANGELO MAZILLO JÚNIOR

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

O trigo (*Triticum aestivum* L.) é cultivado no Brasil desde o extremo sul até o norte do País. Nesta ampla região estão contempladas zonas climáticas temperadas, subtropicais e tropicais, ocupando solos com e sem alumínio trocável, de classes texturais e com aptidão para usos agrícolas distintos, fazendo com que seja fundamental o entendimento das relações entre as necessidades da cultura e a disponibilidade de recursos do ambiente para a produção desse cereal em bases competitivas e sustentáveis no País.

Temperatura (incluindo efeitos vernalizantes) e fotoperíodo são as principais variáveis do ambiente que afetam o desenvolvimento do trigo. A vernalização, em princípio, afeta apenas a fase vegetativa. A temperatura afeta a taxa de desenvolvimento do cultivo desde a emergência até a maturação fisiológica. Temperaturas mais elevadas aceleram o desenvolvimento, com efeitos, por exemplo, na antecipação na data de floração. Há ainda, a questão das respostas ao fotoperíodo (tipo quantitativa) e à vernalização (na etapa vegetativa); além de aspectos relacionados com características de precocidade intrínseca do genótipo.

Na zona tradicional de cultivo, Região Sul, que não possui estação seca definida, o excesso de umidade, cria um ambiente favorável à ocorrência de doenças. Geadas tardias (na primavera, coincidido com o espigamento do trigo) e precipitações de granizo (localizadas), e chuvas excessivas no período de colheita, são os principais entraves de natureza climática. Vendavais, especialmente na primavera, causam acamamento da cultura, dependendo do estádio de desenvolvimento, podem causar grandes perdas no rendimento da cultura. As principais doenças que atacam a cultura, nessa zona, são ódio, viroses, ferrugem da folha, manchas foliares, e giberela (doença de espiga de difícil controle).

Na região tropical, deficiência hídrica e excesso de calor (temperaturas elevadas, causando esterilidade na espiga) são os principais limitantes. Em termos de sanidade vegetal, pela dificuldade de controle, a brusone, tanto no sistema de cultivo de sequeiro quanto irrigado, é a doença mais problemática para a produção de trigo no centro do País.

Objetivou-se, com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, identificar os municípios aptos e o período de semeadura, para o cultivo do trigo de sequeiro, em três níveis de risco: 20% (80% dos anos atendidos), 30% (70% dos anos atendidos), 40% (60% dos anos atendidos).

Essa identificação foi realizada com a aplicação de um modelo de balanço hídrico da cultura. Neste modelo são consideradas as exigências hídrica e térmica, duração do ciclo, fases fenológicas e reserva útil de água dos solos para o cultivo desta espécie, bem como dados de precipitação pluvial e evapotranspiração de referência de séries, preferencialmente, com 30 anos de dados. Somente em algumas regiões com escassez dessas séries de longa duração, foram usadas séries com um mínimo de 15 anos de dados diários, chegando a uma totalização de 3.500 séries pluviométricas aproveitáveis para o trabalho.

Ressalta-se que por se tratar de um modelo agroclimático, parte-se do pressuposto de que não ocorrerão limitações quanto à fertilidade dos solos ou danos às plantas devido à ocorrência de plantas daninhas, pragas e doenças.

Para delimitação das áreas aptas ao cultivo do trigo de sequeiro, em condições de baixo risco, foram adotados os seguintes parâmetros e variáveis:

I. Temperatura:

Foi considerado o risco de geada foi estimado pela análise da frequência de ocorrência de temperaturas do ar igual ou menor a 1,0 °C, com base na temperatura do ar em abrigo meteorológico. O diagnóstico de risco de geada foi considerado em dois decêndios (20 dias) ao redor do espigamento, incluindo o decêndio imediatamente anterior (n-1) e no decêndio do espigamento (n).

II. Ciclo e Fases fenológicas: Fase I: Estabelecimento da cultura (semeadura/emergência); Fase II: Crescimento Vegetativo; Fase III: Espigamento/floração/enchimento de grãos; Fase IV: Maturação. As cultivares de trigo foram classificadas em três grupos conforme a região homogênea de adaptação de cultivares:

Região 3 e 4: Grupo I ($n \leq 110$ dias); Grupo II ($111 \text{ dias} \leq n \leq 130$ dias); e Grupo III ($n > 130$ dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação ponto de colheita.

III. Capacidade de Água Disponível (CAD): Foi estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da reserva útil de água dos solos. Foram considerados os solos Tipo 1 (textura arenosa), Tipo 2 (textura média), Tipo 3 (textura argilosa), com capacidade de armazenamento de 35 mm, 55 mm e 75 mm, respectivamente, e uma profundidade efetiva média do sistema radicular de 50 cm.

IV. Índice de Satisfação das Necessidades de Água (ISNA): Foi considerado um ISNA $\geq 0,6$ na Fase I - Estabelecimento da cultura, ISNA $\geq 0,45$ na Fase III – Espigamento/floração/enchimento de grãos.

V. Precipitação: O risco de excesso hídrico no final do ciclo na Fase IV (20 dias final do ciclo) foi calculado pelo total de chuva maior ou igual a 185 mm.

VI. Critérios Auxiliares:

Adicionalmente, como estratégia para melhor posicionamento da cultura, adotou-se o início e término dos períodos de semeadura dos sistemas de produção de grãos consolidados em cada zona de produção para definir as delimitações regionais, utilizando resultados de experimentação conduzida em 144 locais no País, entre 2000 e 2020.

Considerou-se apto para o cultivo do trigo os municípios que apresentaram, em no mínimo 20% de sua área, com condições climáticas dentro dos critérios considerados.

Notas:

Os resultados do Zarc são gerados considerando um manejo agronômico adequado para o bom desenvolvimento, crescimento e produtividade da cultura, compatível com as condições de cada localidade. Falhas ou deficiências de manejo de diversos tipos, desde a fertilidade do solo até o manejo de pragas e doenças; ou escolha de cultivares inadequados para o ambiente edafoclimático, podem resultar em perdas graves de produtividade ou agravar perdas geradas por eventos meteorológicos adversos. Portanto, é indispensável: utilizar tecnologia de produção adequada para a condição edafoclimática; controlar efetivamente as plantas daninhas, pragas e doenças durante o cultivo; adotar práticas de manejo e conservação de solos.

A gestão de riscos de natureza climática na cultura de trigo pode ser melhorada pela assistência técnica local, via a diluição de riscos, quando são associadas, ao calendário de semeadura preconizado nas Portarias de ZARC, práticas de manejo de cultivos que contemplam a rotação de culturas, o escalonamento de épocas de semeadura e a diversificação de cultivares (com ciclos diferentes) em uma mesma propriedade rural.

As lavouras irrigadas não estão restritas aos períodos de plantio indicados nas Portarias para sequeiro, cabendo ao interessado observar as indicações: do ZARC específico para a cultura irrigada (quando houver); ou da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) oficial para as condições locais de cada agroecossistema.

Informações detalhadas para a condução de uma lavoura de trigo de sequeiro, da semeadura à colheita, podem ser encontradas nas Informações Técnicas anuais da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale, disponíveis em (escolher a versão mais atual, conforme safra alvo):

<https://www.reuniaodetrigo.com.br/>

<https://www.conferencebr.com/conteudo/arquivo/informacoes-tecnicas-para-trigo-e-triticale--safra-2022-1649081250.pdf>

Para trigo de sequeiro no Cerrado do Brasil Central usar como fonte adicional:

<https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1133483/tecnologia-de-producao-de-trigo-sequeiro-no-cerrado-do-brasil-central>

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de trigo no estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de novembro de 2021.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

- áreas que não atendam às determinações da Legislação Ambiental vigente, do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) dos estados.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 28	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30
Meses	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		

Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Maio			Junho			Julho			Agosto		

Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		

4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores /mantenedores para o estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

Alteração no 4. CULTIVARES INDICADAS, através do ato de Retificação publicado no Diário Oficial da União de 14 de dezembro de 2022, Seção 1, pág. 19 e 20.

Alteração no 4. CULTIVARES INDICADAS, através do ato de Retificação publicado no Diário Oficial da União de 17 de fevereiro de 2023, Seção 1, pág. 7.

Região 3

GRUPO I

BIOTRIGO GENÉTICA LTDA: TBIO Motriz, INOVA, TBIO Tibagi, BAR 10, Roos90, TBIO Sagaz, FPS Xerife, TBIO Iguaçu, TBIO Sintonia, TBIO Noble, Celebra, FPS Virtude, FPS Certeiro, FPS Amplitude, TBIO Sonic, TBIO Duque, TBIO Aton, FPS Regente, TBIO Trunfo, TBIO Calibre, TBIO Audaz e TBIO Energia II;

CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA: CD 1104.

EMBRAPA TRIGO - CNPT: BR 18 (Terena), BRS GRAÚNA e BRS Pardela;

IDR - PARANÁ: IPR 85 e IPR Catuara TM;

OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA: ORS GUARDIÃO, ORSFEROZ, ORSSENNA, ORSABSOLUTO, ORS AGILE e ORS 2102.

GRUPO II

BIOTRIGO GENÉTICA LTDA: BAR 20, TBIO Blanc, TBIO Mestre, TBIO Sinuelo, TBIO Toruk, TBIO Sossego, TBIO Ponteiro, TBIO Energia I e TBIO Motriz.

CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA: CD 1440 e CD 150;

EMBRAPA TRIGO - CNPT: BRS Sabiá, BRS Sanhaço, BRS Atobá, BRS Guamirim, BRS Tangará, BRS 327 e BRS Gralha Azul;

IDR - PARANÁ: IPR 144, IPR Panaty e IPR Potyoporã;

OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA: ORS DESTAK, ORS Madrepérola, ORS 1403, ORS 2101 e ORS SOBERANO;

GRUPO III

BIOTRIGO GENÉTICA LTDA: TBIO Astro.

Região 4

GRUPO I

BIOTRIGO GENÉTICA LTDA: TBIO Calibre, TBIO Sagaz, BAR 10, BAR 20, TBIO Sonic, TBIO Energia II, TBIO Energia 30, TBIO Aton e TBIO Duque;

CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA: CD 108;

EMBRAPA TRIGO - CNPT: BR 18 (Terena) e BRS 404;

OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA: ORS GUARDIÃO, ORSFEROZ, ORSSENNA, ORSABSOLUTO, ORS DESTAK, ORS AGILE, ORS Madrepérola, ORS 1403, ORS 1401, ORS Citrino, ORS 2101, ORS SOBERANO e ORS 2102;

GRUPO II

BIOTRIGO GENÉTICA LTDA: TBIO Convicto, Roos90, TBIO Blanc, TBIO Noble, TBIO Sossego e TBIO Energia I.

CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA: CD 1104, CD 1252, CD 1440, CD 151 e CD 1550;

NOTAS:

1. Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.
2. Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020).
3. As regiões homogêneas de adaptação de cultivares de trigo estão especificadas na Instrução Normativa nº 3, de 14 de outubro de 2008, da Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada no Diário Oficial da União de 15 de outubro de 2008; e alterada através da retificação publicada no Diário Oficial da União de 07 de maio de 2021.
4. Consoante ao disposto no inciso XXIX do art. 3º do Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020, ficam indicadas as misturas de cultivares no Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura do Trigo, desde que as cultivares que compõe a mistura estejam indicadas individualmente, no mesmo grupo de classificação de cultivares e região de adaptação.

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DE GRUPO I								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Água Clara			9		9 a 10	11	9 a 10	11	12
Alcinópolis		7		7 a 8	9		7 a 9	10	11
Amambai	10 a 11	12	13 a 14	10 a 13	14 a 15		10 a 15		16
Anaurilândia		9 a 11	12 a 13	9 a 12	13 a 14	15	9 a 15		
Angélica	10	11	12	10 a 11	12	13 a 14	10 a 13	14	15
Antônio João	10	11	12	10 a 12		13 a 14	10 a 13	14	15
Aral Moreira	10 a 11	12	13	10 a 12	13 a 14	15	10 a 14	15	
Bandeirantes			9 a 10	9	10	11	9 a 10	11	12
Bataguassu		9 a 10	11	9 a 11	12	13	9 a 13	14	15
Batayporã	9 a 11	12	13 a 14	9 a 13	14 a 15		9 a 15		
Bonito		9 a 10	11	9 a 11	12	13	9 a 12	13	14
Brasilândia			9 a 10	9 a 10	11	12	9 a 12	13	
Caarapó	10	11	12 a 13	10 a 12	13 a 14		10 a 14	15	
Camapuã			9		9 a 10	11	9 a 10	11	12
Campo Grande		9 a 10	11	9 a 11	12	13	9 a 12	13	14
Cassilândia		7		7 a 8	9	10	7 a 9	10	11
Chapadão Do Sul		7		7 a 8	9	10	7 a 9	10	11
Corguinho			9 a 10		9 a 10	11	9 a 10	11	12
Coronel Sapucaia	10 a 11	12	13 a 14	10 a 13	14 a 15		10 a 14	15	16
Costa Rica		7		7 a 8	9	10	7 a 9	10	11
Coxim					7 a 9	10	7 a 9	10	11
Deodápolis	10	11	12	10 a 11	12	13 a 14	10 a 13	14 a 15	
Dois Irmãos Do Buriti		9 a 10	11	9 a 10	11	12	9 a 12		13
Douradina	10		11 a 12	10 a 11	12	13	10 a 13	14	15
Dourados	10	11	12	10 a 11	12	13 a 14	10 a 13	14	15
Eldorado	10 a 12	13 a 14	15	10 a 15		16	10 a 15	16	
Fátima Do Sul	10	11	12	10 a 11	12	13 a 14	10 a 13	14 a 15	
Figueirão			7	7	8 a 9	10	7 a 9	10	11
Glória De Dourados	10	11	12	10 a 12	13 a 14		10 a 14	15	
Guia Lopes Da Laguna	9 a 10	11	12	9 a 12		13	9 a 13	14	15
Iguatemi	10 a 11	12 a 13	14	10 a 14	15		10 a 15	16	
Itaporã	10	11	12	10 a 11	12	13	10 a 13	14	15
Itaquiráí	10 a 11	12 a 13	14	10 a 14	15		10 a 15	16	
Ivinhema	10	11	12	10 a 11	12 a 14		10 a 14	15	
Japorã	10 a 12	13 a 14	15	10 a 14	15	16	10 a 15	16	
Jaraguari		9	10	9	10 a 11		9 a 11	12	13
Jardim	9 a 10	11	12	9 a 12	13		9 a 13	14	15
Jateí	10	11 a 12	13	10 a 12	13 a 14	15	10 a 15		16
Juti	10	11	12 a 13	10 a 12	13 a 14	15	10 a 14	15	
Laguna Carapã	10	11	12 a 13	10 a 12	13 a 14		10 a 14	15	
Maracaju		10	11	10 a 11	12	13	10 a 12	13	14
Mundo Novo	10 a 12	13 a 15		10 a 15		16	10 a 16		
Naviraí	10 a 11	12	13 a 14	10 a 14	15		10 a 15		16
Nioaque		9 a 10	11	9 a 11	12	13	9 a 12	13	14
Nova Alvorada Do Sul		9 a 11		9 a 11	12	13	9 a 13	14	15
Nova Andradina	10	9 + 11	12	9 a 12	13	14 a 15	9 a 14	15	
Novo Horizonte Do Sul	10	11	12 a 13	10 a 12	13 a 14	15	10 a 14	15	

Praia Das Águas					9	10	9	10	11
Paranhos	10 a 11	12 a 13	14	10 a 14	15		10 a 15	16	
Pedro Gomes			7	7	8	9	7 a 9		10
Ponta Porã	10	11	12	10 a 12	13	14	10 a 14	15	
Ribas Do Rio Pardo		9 a 10		9 a 10	11	12	9 a 12	13	
Rio Brilhante	10	9 + 11	12	9 a 12	13	14	9 a 13	14 a 15	
Rio Negro			9		9 a 10	11	9 a 10	11	12
Rio Verde De Mato Grosso					7 a 9	10	7 a 9	10	11
Rocchedo		9	10	9	10 a 11		9 a 10	11 a 12	
Santa Rita Do Pardo		9 a 10	11	9 a 11	12	13	9 a 12	13	14
São Gabriel Do Oeste			9		9 a 10	11	9 a 10	11	12
Selvíria					9	10	9 a 10	11	12
Sete Quedas	10 a 12	13 a 14	15	10 a 14	15		10 a 15	16	
Sidrolândia		9 a 10	11	9 a 11	12	13	9 a 12	13	14
Sonora		7		7 a 8			7 a 9		10
Tacuru	10 a 11	12 a 14	15	10 a 14	15		10 a 15	16	
Taquarussu	9 a 11	12 a 13	14	9 a 14	15		9 a 15		
Terenos		9 a 10		9 a 10	11	12	9 a 11	12	13
Três Lagoas			9 a 10		9 a 10	11	9 a 11	12	
Vicentina	10	11	12	10 a 12	13 a 14		10 a 14	15	

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DE GRUPO II									
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3			
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	
Água Clara					9	10	9	10	11	
Alcinópolis			7	7	8		7 a 8	9	10	
Amambai	10	11	12 a 13	10 a 12	13 a 14		10 a 14		15	
Anaurilândia	9 a 10	11	12	9 a 11	12	13 a 14	9 a 13	14 a 15		
Angélica	10	11	10	11	12	12 a 13	10 a 12	13	14	
Antônio João	10	11	10 a 11	12	13	10 a 12	13 a 14			
Aral Moreira	10	11	12	10 a 11	12 a 13	14	10 a 13	14	15	
Bandeirantes			9		9	10	9	10	11	
Bataguassu		9 a 10	11	9 a 10	11	12	9 a 12	13	14	
Batayporã	9 a 10	11	12 a 13	9 a 12	13 a 14	15	9 a 14	15		
Bonito	9 a 10	11	9 a 10	11	12	9 a 11	12	13		
Brasilândia		9		9 a 10	11	9 a 11			12	
Caarapó	10	11	12	10 a 11	12 a 13	14	10 a 13	14		
Camapuã					9	10	9	10	11	
Campo Grande		9	10	9 a 10	11	12	9 a 11	12	13	
Cassilândia			7	7	8	9	7 a 8	9	10	
Chapadão Do Sul			7	7	8	9	7 a 8	9	10	
Corguinho		9		9 a 10			9	10	11	
Coronel Sapucaia	10 a 11	12	13	10 a 12	13 a 14		10 a 14	15		
Costa Rica			7	7	8	9	7 a 8	9	10	
Coxim					7	8 a 9	7	8 a 9	10	
Deodápolis		10	11	10	11	12 a 13	10 a 12	13 a 14		
Dois Irmãos Do Buriti		9	10	9	10	11	9 a 10	11 a 12		
Douradina		10	11	10	11	12 a 13	10 a 12	13	14	
Dourados		10	11	10 a 11	12	13	10 a 12	13	14	
Eldorado	10 a 11	12 a 13	14	10 a 14	15		10 a 15		16	
Fátima Do Sul		10	11	10 a 11	12	13	10 a 13	14		
Figueirão					7 a 8	9	7 a 8	9	10	
Glória De Dourados		10	11 a 12	10 a 11	12 a 13		10 a 13	14		
Guia Lopes Da Laguna	9	10	11	9 a 11	12		9 a 12	13	14	
Iguatemi	10 a 11	12	13 a 14	10 a 13	14	15	10 a 14	15		
Itaporã		10	11	10	11	12 a 13	10 a 12	13	14	
Itaquiraí	10	11 a 12	13 a 14	10 a 13	14	15	10 a 14	15		
Ivinhema		10	11 a 12	10 a 11	12 a 13	14	10 a 13	14		
Japorã	10 a 11	12 a 13	14	10 a 14		15	10 a 15		16	
Jaraguari			9		9 a 10	11	9 a 10	11	12	
Jardim	9	10	11	9 a 11	12	13	9 a 12	13	14	
Jateí	10	11	12 a 13	10 a 11	12 a 13	14	10 a 14		15	
Juti	10	11	12	10 a 11	12 a 13	14	10 a 13	14	15	
Laguna Carapã	10	11	12	10 a 11	12 a 13	14	10 a 13	14	15	
Maracaju		10	11	10	11	12	10 a 11	12	13 a 14	
Mundo Novo	10 a 12	13 a 14		10 a 14	15		10 a 15	16		
Naviraí	10	11 a 12	13	10 a 13	14		10 a 14	15		
Nioaque		9 a 10	11	9 a 10	11	12	9 a 11	12	13	
Nova Alvorada Do Sul		9 a 10	11	9 a 11		12	9 a 12	13	14	
Nova Andradina	9 a 10	11	12	9 a 11	12	13 a 14	9 a 13	14	15	
Novo Horizonte Do Sul	10	11	12	10 a 11	12 a 13	14	10 a 13	14	15	

Praia Das Águas					9		9	10
Paranhos	10 a 11	12	13 a 14	10 a 13	14	15	10 a 14	15
Pedro Gomes					7	8	7 a 8	9
Ponta Porã		10	11	10 a 11	12	13	10 a 13	14
Ribas Do Rio Pardo			9 a 10	9	10	11	9 a 11	12
Rio Brilhante	9	10	11	9 a 11	12	13	9 a 12	13
Rio Negro					9	10		9 a 10
Rio Verde De Mato Grosso						7 a 9		7 a 9
Rocchedo			9		9 a 10		9	10 a 11
Santa Rita Do Pardo				9 a 10	9	10 a 11	12	13
São Gabriel Do Oeste					9	10		9 a 10
Selvíria						9 a 10		9 a 10
Sete Quedas	10 a 11	12 a 13	14	10 a 13	14	15	10 a 14	15
Sidrolândia				9 a 10	9 a 10	11	9 a 11	12
Sonora					7		8	7 a 8
Tacuru	10 a 11	12	13 a 14	10 a 13	14	15	10 a 14	15
Taquarussu	9 a 10	11 a 12	13 a 14	9 a 12	13 a 14	15	9 a 15	
Terenos					9	10	9 a 10	11
Três Lagoas						9	10	11
Vicentina			10	11 a 12	10 a 11	12 a 13		10 a 13
							14	

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURA PARA CULTIVARES DE GRUPO III								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Água Clara						9		9	10
Alcinópolis					7	8	7	8	9
Amambai	10	11	12	10 a 11	12 a 13		10 a 13	14	
Anaurilândia	9	10	11	9 a 10	11	12 a 13	9 a 12	13	14
Angélica			10	10	11	12	10 a 11	12 a 13	
Antônio João				10	11	12	10 a 11	12 a 13	
Aral Moreira	10		11 a 12	10 a 11	12	13	10 a 12	13	14
Bandeirantes						9		9	10
Bataguassu		9	10	9 a 10		11	9 a 11	12	13
Batayporã	9	10 a 11	12	9 a 11	12 a 13	14	9 a 13	14	15
Bonito		9	10	9	10	11	9 a 10	11	12
Brasilândia			9		9	10	9 a 10		11
Caarapó		10	11	10	11 a 12	13	10 a 12	13	14
Camapuã						9		9	10
Campo Grande		9		9	10	11	9 a 10	11	12
Cassilândia					7	8	7	8	9
Chapadão Do Sul					7	8	7	8	9
Corguinho					9	10		9	10
Coronel Sapucaia	10	11	12	10 a 11	12 a 13	14	10 a 13	14	
Costa Rica				7		8	7	8	9
Coxim					7	8		7 a 8	9
Deodápolis			10	10	11	12	10 a 11	12 a 13	
Dois Irmãos Do Buriti			9	9	10	11	9	10 a 11	
Douradina				10	10	11	12	10 a 11	12
Dourados				10	10	11	12	10 a 11	12 a 13
Eldorado	10 a 11	12	13	10 a 13	14		10 a 14	15	16
Fátima Do Sul		10	11	10	11	12	10 a 12	13	
Figueirão					7	8	7	8	9
Glória De Dourados		10	11	10	11 a 12	13	10 a 12	13	
Guia Lopes Da Laguna		9 a 10		9 a 10	11	12	9 a 11	12	13
Iguatemi	10	11	12 a 13	10 a 12	13	14	10 a 13	14	15 a 16
Itaporã				10	10	11	12	10 a 11	12
Itaquiráí	10	11	12 a 13	10 a 13		14	10 a 13	14	15 a 16
Ivinhema		10	11	10	11 a 12	13	10 a 12	13	14
Japorã	10	11 a 12	13	10 a 13	14		10 a 14		15 a 16
Jaraguari				9		9	10	9	11
Jardim		9 a 10		9 a 10	11	12	9 a 11	12	13
Jateí		10	11 a 12	10 a 11	12 a 13		10 a 13		14
Juti		10	11 a 12	10 a 11	12	13	10 a 13		14
Laguna Carapã		10	11	10 a 11	12	13	10 a 12	13	14
Maracaju				10		10	11	10 a 11	12
Mundo Novo	10 a 11	12 a 13		10 a 13	14	15 a 16	10 a 14	15	16
Naviraí	10	11	12	10 a 12	13	14	10 a 13	14	15
Nioaque		9	10	9	10	11	9 a 10	11	12
Nova Alvorada Do Sul			9	10	9 a 10	11		9 a 11	12
Nova Andradina	9	10	11	9 a 10	11	12 a 13	9 a 12	13	14
Novo Horizonte Do Sul		10	11	10	11 a 12	13	10 a 13		14

Paraíso Das Águas					9			9
Paranhos	10	11	12 a 13	10 a 12	13	14	10 a 13	14
Pedro Gomes					7		7	8
Ponta Porã		10	11	10	11	12 a 13	10 a 12	13
Ribas Do Rio Pardo			9		9 a 10		9	10 a 11
Rio Brilhante		9	10 a 11	9 a 10	11	12	9 a 11	12
Rio Negro						9		9
Rio Verde De Mato Grosso						7 a 8		9
Rocchedo					9	10		9 a 10
Santa Rita Do Pardo			9		9 a 10	11	9 a 10	11
São Gabriel Do Oeste						9		9
Selvíria						9		9
Sete Quedas	10	11 a 12	13	10 a 12	13 a 14		10 a 14	
Sidrolândia		9	10	9	10	11	9 a 10	11
Sonora						7	7	8
Tacuru	10	11	12 a 13	10 a 12	13	14	10 a 13	14
Taquarussu	9 a 10	11	12 a 13	9 a 12	13 a 14		9 a 14	
Terenos			9		9	10	9	10
Três Lagoas					9			9
Vicentina		10	11	10	11 a 12	13	10 a 12	13