

Portaria publicada no D.O.U do dia 28 de dezembro de 2023, seção 1.

Aprova o Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC para a cultura do trigo, em sistema de cultivo de sequeiro, no estado do Paraná, ano-safra 2023/2024.

O SECRETÁRIO ADJUNTO SUBSTITUTO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 11.332, de 1º de janeiro de 2023, e observado, no que couber, o contido no Decreto nº 9.841 de 18 de junho de 2019, na Portaria MAPA nº 412 de 30 de dezembro de 2020, na Instrução Normativa nº 3, de 14 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 15 de outubro de 2008, na Instrução Normativa nº 16, de 9 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2018, e na Instrução Normativa SPA/MAPA nº 2, de 9 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 11 de novembro de 2021, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura do trigo, em sistema de cultivo de sequeiro, no estado do Paraná, ano-safra 2023/2024, conforme anexo.

Art. 2º Ficam revogadas:

I – a Portaria SPA/MAPA nº 384 de 6 de dezembro de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 8 de dezembro de 2022, seção 1, que aprovou o Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC para a cultura do trigo de sequeiro no estado do Paraná, ano-safra 2022/2023.

II – a retificação publicada no Diário Oficial da União, seção 1, de 16 de dezembro de 2022, página 57, que alterou o Anexo da Portaria SPA/MAPA nº 384, de 6 de dezembro de 2022, publicadas no Diário Oficial da União de 8 de dezembro de 2022, seção 1, que aprovou o Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC para a cultura do trigo de sequeiro para o estado do Paraná, ano-safra 2022/2023.

III – a retificação publicada no Diário Oficial da União, seção 1, de 17 de fevereiro de 2023, página 7, que alterou o Anexo da Portaria SPA/MAPA nº 384, de 6 de dezembro de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 8 de dezembro de 2022, seção 1, que aprovou o Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC para a cultura do trigo de sequeiro para o estado do Paraná, ano-safra 2022/2023.

Art. 3º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor em 1º de fevereiro de 2024.

**SILVIO FARNESE**

ANEXO

### 1. NOTA TÉCNICA

Alteração no item 1. **NOTA TÉCNICA**, através do ato de Retificação publicado no Diário Oficial da União de 18 de janeiro de 2024, Seção 1, pág. 3.

O trigo (*Triticum aestivum* L.) é cultivado no Brasil desde o extremo sul até o norte do País. Nesta ampla região estão contempladas zonas climáticas temperadas, subtropicais e tropicais, ocupando solos com e sem alumínio trocável, de classes texturais e com aptidão para usos agrícolas distintos, fazendo com que seja fundamental o entendimento das relações entre as necessidades da cultura e a disponibilidade de recursos do ambiente para a produção desse cereal em bases competitivas e sustentáveis no País.

Majoritariamente o trigo no Brasil é produzido em sistema sequeiro, concentrado no Sul do Brasil. No centro do País, regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, produz-se trigo tanto no sistema sequeiro quanto no sistema irrigado. E, em sistemas integrados com pecuária (forragem + grãos), exclusivamente na Região Sul.

Indubitavelmente, há oportunidade para a expansão do cultivo de trigo no Brasil e o novo Zarc Trigo sinaliza de forma clara, e com riscos conhecidos, onde isso pode acontecer.

O ambiente, locais e anos, influencia o desenvolvimento e a geração dos componentes de rendimento na cultura de trigo. A temperatura afeta a taxa de desenvolvimento do cultivo desde a emergência até a maturação fisiológica. Temperaturas mais elevadas aceleram o desenvolvimento, com efeitos, por exemplo, na data de floração. Há ainda, a questão das respostas ao fotoperíodo (tipo quantitativa) e à vernalização (na etapa vegetativa); além de aspectos relacionados com características de precocidade intrínseca do genótipo.

Problemas de deficiência hídrica em trigo no Brasil começam a ser importantes a partir do norte do Paraná em direção ao centro do País. Mesmo que no norte do PR o trigo seja cultivado sob regime de sequeiro, em alguns anos a falta de água pode dificultar a emergência e o estabelecimento da cultura, por ocasião da semeadura, realizado entre março e abril. Também a falta de água, especialmente a partir do emborrachamento pode prejudicar o rendimento final, devido à elevação da esterilidade de flores (falhas de granação) e enchimento incompleto dos grãos. Na região tropical, o trigo cultivado sob irrigação, na época seca do ano (maio a setembro), se destaca por rendimentos elevados e pela excelente qualidade tecnológica (classificação comercial) dos grãos.

Geadas, indubitavelmente, está entre os principais riscos climáticos para o trigo, expelente no sul do Brasil. A sensibilidade do trigo à geada começa a aumentar depois do início do emborrachamento. Atinge o seu máximo na floração e diminui após os estádios de grão em massa mole e dura. Também não se pode afirmar que geadas não causam danos em trigo, quando ocorrem antes do emborrachamento. Conforme a intensidade da geada e a sensibilidade da cultivar (nessa fase existe diferença genética bem acentuada) os prejuízos podem ser grandes (queima de folhas, estrangulamento de colmos e morte de plantas).

O excesso de umidade pode ser limitante para o cultivo de trigo. Ambientes úmidos predispõem a cultura ao ataque severo de doenças, particularmente fúngicas. E doenças têm sido um dos principais entraves de natureza biótica para a região de clima úmido do sul do Brasil. Nessa região, problemas mais severos são observados em anos de El Niño, quando as chuvas de primavera, em geral, superam os valores normais. Para o cultivo de trigo no sul do País, os anos de La Niña são os mais favoráveis.

Na zona tradicional de cultivo, Região Sul, que não possui estação seca definida, o excesso de umidade, cria um ambiente favorável à ocorrência de doenças. Geadas tardias (na primavera, coincidido com o espigamento do trigo) e precipitações de granizo (localizadas), e chuvas excessivas no período de colheita, são os principais entraves de natureza climática. Vendavais, especialmente na primavera, causam acamamento da cultura, dependendo do estágio de desenvolvimento, podem causar grandes perdas no rendimento da cultura. As principais doenças que atacam a cultura, nessa zona, são oídio, viroses, ferrugem da folha, manchas foliares, e giberela (doença de espiga de difícil controle).

Na região tropical, deficiência hídrica e excesso de calor (temperaturas elevadas, causando esterilidade na espiga) são os principais limitantes. Em termos de sanidade vegetal, pela dificuldade de controle, a brusone, tanto no sistema de cultivo de sequeiro quanto irrigado, é a doença mais problemática para a produção de trigo no centro do País.

Objetivou-se, com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, identificar os municípios aptos e o período de semeadura, para o cultivo, em sistema de sequeiro, do trigo, com probabilidades de perdas de rendimento de grãos inferiores a 20%, 30% e 40% devido à ocorrência de eventos meteorológicos adversos. Assim, contribuindo, como ferramenta de gestão de riscos, para a expansão das áreas agrícolas, redução das perdas de produtividade e estabilidade da produção desse cereal no País.

Essa identificação foi realizada com a aplicação de um modelo de balanço hídrico da cultura. Neste modelo são consideradas as exigências hídrica e térmica, duração do ciclo, fases fenológicas e reserva útil de água dos solos para o cultivo desta espécie, bem como dados de precipitação pluvial e evapotranspiração de referência de séries, preferencialmente, com 30 anos de dados. Somente em algumas regiões com escassez dessas séries de longa duração, foram usadas séries com um mínimo de 15 anos de dados diários, chegando a uma totalização de 3.500 séries pluviométricas aproveitáveis para o trabalho.

O modelo para cálculo do balanço hídrico utilizado no ZARC foi o SARRA (Systeme d'Analyse Regionale des Risques Agroclimatiques). Este modelo foi usado para se obter as necessidades hídricas e o Índice de Satisfação da Necessidade de Água para a cultura (ISNA), que foi definido como a razão entre a evapotranspiração real da cultura (ETr) e evapotranspiração máxima ou potencial da cultura (Etc.).

Ressalta-se que por se tratar de um modelo agroclimático, parte-se do pressuposto de que não ocorrerão limitações quanto à fertilidade dos solos ou danos às plantas devido à ocorrência de plantas daninhas, pragas e doenças.

Para delimitação das áreas aptas ao cultivo do trigo de sequeiro, em condições de baixo risco, foram adotados os seguintes parâmetros e variáveis:

**I. Precipitação Pluvial:** Foram utilizadas séries de dados de chuva preferencialmente com 30 anos de dados. Somente em regiões com escassez de séries de dados de longa duração foram consideradas séries com um mínimo de 15 anos de dados diários, contabilizando um total de 3.500 séries pluviométricas.

**II. Evapotranspiração de referência (ET<sub>o</sub>):**

A ET<sub>o</sub> foi utilizada através de médias decendiais calculadas pelo método de Hargreaves e Samani, previamente adaptado e recalibrado para as condições brasileiras.

**III. Coeficiente de cultura (K<sub>c</sub>):**

As curvas de K<sub>c</sub>, conforme modelo conceitual FAO - 56, foram geradas para valores decendiais, por meio de um modelo bilogístico ajustado a partir de valores de K<sub>c</sub> iniciais (0,40), máximo (1,00) e final (0,40). Os valores decendiais de K<sub>c</sub> foram gerados para cada agrupamento de cultivares, usando-se como referência as Regiões homogêneas de adaptação de cultivares de trigo. O K<sub>c</sub>, utilizado para a determinação da Evapotranspiração Máxima da Cultura (Etc.) decendial para cada unidade da federação, são apresentados nas tabelas abaixo:

Ciclo (dias)	Decêndios								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	0,4	0,44	0,56	0,74	0,89	0,96	0,98	0,97	0,92

120	0,4	0,44	0,55	0,72	0,88	0,95	0,98	0,98	0,96
130	0,4	0,44	0,54	0,7	0,86	0,94	0,98	0,99	0,98
140	0,4	0,44	0,53	0,69	0,84	0,93	0,97	0,98	0,99
150	0,4	0,43	0,52	0,67	0,83	0,92	0,97	0,98	0,99
160	0,4	0,43	0,51	0,65	0,81	0,91	0,96	0,98	0,99
170	0,4	0,43	0,51	0,64	0,79	0,9	0,96	0,98	0,99

Ciclo (dias)	Decênios								
	10	11	12	13	14	15	16	17	
110	0,76	0,51							
120	0,9	0,74	0,5						
130	0,96	0,89	0,72	0,5					
140	0,98	0,95	0,87	0,71	0,49				
150	0,98	0,97	0,94	0,86	0,69	0,49			
160	0,99	0,98	0,97	0,93	0,84	0,68	0,49		
170	0,99	0,99	0,98	0,96	0,92	0,83	0,67	0,49	

Norte do PR

Ciclo (dias)	Decênio												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	0,40	0,44	0,57	0,76	0,91	0,97	0,98	0,93	0,78	0,51			
110	0,40	0,44	0,56	0,74	0,89	0,96	0,98	0,97	0,92	0,76	0,51		
120	0,40	0,44	0,55	0,72	0,88	0,95	0,98	0,98	0,96	0,90	0,74	0,50	
130	0,40	0,44	0,54	0,70	0,86	0,94	0,98	0,99	0,98	0,96	0,89	0,72	0,50

#### IV. Temperatura:

Foi considerado o risco de geada foi estimado pela análise da frequência de ocorrência de temperaturas do ar igual ou menor a 1,0 °C, com base na temperatura do ar em abrigo meteorológico. O diagnóstico de risco de geada foi considerado em dois decênios (20 dias) ao redor do espigamento, incluindo o decênio imediatamente anterior (n-1) e no decênio do espigamento (n).

#### V. Ciclo e Fases fenológicas:

Fase I: Estabelecimento da cultura (semeadura/emergência); Fase II: Crescimento Vegetativo; Fase III: Espigamento/floração/enchimento de grãos; Fase IV: Maturação. As cultivares de trigo foram classificadas em três grupos conforme a região homogênea de adaptação de cultivares:

Região 1:

Grupo	Nº médio de dias da emergência à maturação ponto de colheita
Grupo I	≤ 120
Grupo II	121 - 140
Grupo III	> 140

Região 2:

Grupo	Nº médio de dias da emergência à maturação ponto de colheita
-------	--

Grupo I	≤ 110
Grupo II	111 - 130
Grupo III	> 130

Região 3:

Grupo	Nº médio de dias da emergência à maturação ponto de colheita
Grupo I	≤ 110
Grupo II	111 – 120
Grupo III	> 120

#### VI. Capacidade de Água Disponível (CAD):

A Capacidade de Armazenamento de Água Disponível (CAD) para a cultura ~~de soja~~ do trigo foi estimada com base na profundidade efetiva do sistema radicular (Ze), e a Água Disponível (AD) nas diferentes classes. Foram considerados 6 classes de solos, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5 e AD6; com capacidade de armazenamento de 24 mm, 32 mm, 42 mm, 55 mm, 72 mm e 95mm, respectivamente; e uma profundidade efetiva média do sistema radicular (Ze) de 60 cm.

Estas informações foram incorporadas ao modelo de balanço hídrico para a realização das simulações necessárias para identificação dos períodos favoráveis para a semeadura. Foram realizadas simulações para 36 períodos de semeadura, espaçados de 10 dias, entre os meses de janeiro a dezembro.

#### VII. Índice de Satisfação das Necessidades de Água (ISNA):

A partir das simulações foram obtidos os valores médios do ISNA para cada data de simulação de semeadura. O modelo estimou os índices de satisfação da necessidade de água (ISNA), definidos como sendo a razão existente entre evapotranspiração real (ET<sub>r</sub>) e a evapotranspiração máxima da cultura (E<sub>c</sub>) para cada fase de interesse da cultura e para cada estação pluviométrica.

Procedeu-se a análise frequencial das séries de resultados anuais para a verificação da frequência de ocorrência de anos-safra com valores de ISNA abaixo do limite crítico para a cultura em cada fase de interesse.

O evento adverso fica caracterizado quando o ISNA de uma determinada safra ficou abaixo do limite crítico. Posteriormente, os valores de ISNA correspondentes aos percentis de 20%, 30% e 40% de risco foram georreferenciados por meio da latitude e longitude e, com a utilização de um sistema de informações geográficas (SIG), foram espacializados por meio de um estimador espacial geoestatístico (krigagem ordinária) para a determinação dos mapas temáticos de risco.

Foi considerado um ISNA ≥ 0,6 na Fase I - Estabelecimento da cultura, ISNA ≥ 0,45 na Fase III – Espigamento/floração/enchimento de grãos.

**VIII. Risco de Excesso Hídrico:** O risco de excesso hídrico no final do ciclo na Fase IV (20 dias final do ciclo) foi calculado pelo total de chuva maior ou igual a 185 mm.

#### IX. Critérios Auxiliares:

Adicionalmente, como estratégia para melhor posicionamento da cultura, adotou-se o início e término dos períodos de semeadura dos sistemas de produção de grãos consolidados em cada zona de produção para definir as delimitações regionais, utilizando resultados de experimentação conduzida em 144 locais no País, entre 2000 e 2020.

Considerou-se apto para o cultivo do trigo os municípios que apresentaram, em no mínimo 20% de sua área, com condições climáticas dentro dos critérios considerados.

#### Notas:

Os resultados do Zarc são gerados considerando um manejo agrônômico adequado para o bom desenvolvimento, crescimento e produtividade da cultura, compatível com as condições de cada localidade. Falhas ou deficiências de manejo de diversos tipos, desde a fertilidade do solo até o manejo de pragas e doenças; ou escolha de cultivares inadequados para o ambiente edafoclimático, podem resultar em perdas graves de produtividade ou agravar perdas geradas por eventos meteorológicos adversos. Portanto, é indispensável: utilizar tecnologia de produção adequada para a condição edafoclimática; controlar efetivamente as plantas daninhas, pragas e doenças durante o cultivo; adotar práticas de manejo e conservação de solos.

A gestão de riscos de natureza climática na cultura de trigo pode ser melhorada pela assistência técnica local, via a diluição de riscos, quando são associadas, ao calendário de semeadura preconizado nas Portarias de ZARC,

práticas de manejo de cultivos que contemplem a rotação de culturas, o escalonamento de épocas de semeadura e a diversificação de cultivares (com ciclos diferentes) em uma mesma propriedade rural.

As lavouras irrigadas não estão restritas aos períodos de plantio indicados nas Portarias para sequeiro, cabendo ao interessado observar as indicações: do ZARC específico para a cultura irrigada (quando houver); ou da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) oficial para as condições locais de cada agroecossistema.

Informações detalhadas para a condução de uma lavoura de trigo de sequeiro, da semeadura à colheita, podem ser encontradas nas Informações Técnicas anuais da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale, disponíveis em (escolher a versão mais atual, conforme safra alvo):

<https://www.reuniaodetrigo.com.br/>

<https://static.conferenceplay.com.br/conteudo/arquivo/informacoestecnicastrigotriticalesafra2023-1683736866.pdf>

## 2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo da cultura no estado as seis classes de água disponível AD1, AD2, AD3, AD4, AD5 e AD6, que podem ser estimadas por função de pedotransferência em função dos percentuais granulométricos de areia total, silte e argila, conforme especificado na Instrução Normativa SPA/MAPA nº 1, de 21 de junho de 2022.

Limite inferior e superior para seis classes de AD a serem utilizadas nas avaliações de risco de déficit hídrico do Zoneamento Agrícola de Risco Climático.

Limite inferior (mm cm <sup>-1</sup> )	Classes de AD			Limite superior (mm cm <sup>-1</sup> )
0,34	≤	AD1	<	0,46
0,46	≤	AD2	<	0,61
0,61	≤	AD3	<	0,80
0,80	≤	AD4	<	1,06
1,06	≤	AD5	<	1,40
1,40	≤	AD6	≤	1,84*

\* amostras de solo com composição granulométrica que eventualmente resulte em estimativa de AD acima de 1,84 mm cm<sup>-1</sup> serão representadas pela classe AD6.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;
- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matações ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.
- áreas que não atendam às determinações da Legislação Ambiental vigente, do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) dos estados.

## 3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

O Zarc indica os períodos de plantio em períodos decendiais (dez dias). As tabelas abaixo indicam a data e o mês que corresponde cada período de plantio/semeadura decendial.

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1 <sup>º</sup> a 10	11 a 20	21 a 31	1 <sup>º</sup> a 10	11 a 20	21 a 28	1 <sup>º</sup> a 10	11 a 20	21 a 31	1 <sup>º</sup> a 10	11 a 20	21 a 30
Meses	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		

Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1 <sup>º</sup> a 10	11 a 20	21 a 31	1 <sup>º</sup> a 10	11 a 20	21 a 30	1 <sup>º</sup> a 10	11 a 20	21 a 31	1 <sup>º</sup> a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Maio			Junho			Julho			Agosto		

Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1 <sup>º</sup> a 10	11 a 20	21 a 30	1 <sup>º</sup> a 10	11 a 20	21 a 31	1 <sup>º</sup> a 10	11 a 20	21 a 30	1 <sup>º</sup> a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		

## 4. CULTIVARES INDICADAS

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores/mantenedores para o estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

### Região 1

### GRUPO I

**BIOTRIGO GENÉTICA LTDA:** BAR 10;

**CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA:** CD 1303;  
**EMBRAPA TRIGO - CNPT:** BRS Jacana, BRS GRAÚNA e BRS Sanhaço;  
**IAC:** IAC 370 (ARMAGEDDON), IAC 385 Mojave e IAC 388 Arpoador;  
**IDR - PARANÁ:** IPR 144, IPR Catuara TM e IPR Potyporã;  
**OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA:** ORS GUARDIÃO, ORSFEROZ, ORSSENA, ORSABSOLUTO, ORS AGILE, ORS 2102, ORS TURBO e ORS FALCÃO;  
**TAMONA AGROPECUARIA LTDA:** RBO 2B5, RBO 3B6, JVC Cerne, RBO Crescente e RBO Treseme.

#### **GRUPO II**

**BIOTRIGO GENÉTICA LTDA:** TBIO Audaz, TBIO Sagaz, TBIO Aton, Suporte 01M20, Suporte 02M23S, Suporte 03M23S, TBIO Motriz, TBIO Sonic, BS Etanol 8, TBIO Calibre, FPS Regente, TBIO Astro, BAR 20, TBIO Capaz, TBIO Duque, FPS Luminus, TBIO Trunfo, BIO198020, TBIO Sintonia, Celebra, TBIO Iguaçu, INOVA, TBIO Mestre, TBIO Toruk, TBIO Noble, FPS Amplitude, FPS Certero, TBIO Sossego, TBIO Convicto, TBIO Capricho CL, TBIO Ello CL, TBIO Referência, TBIO Conduta, FPS Xerife, TBIO Blanc, TBIO Ênfase, BS Etanol, TBIO Parâmetro, BIO198009, BIO182480, BIO188027, BIO182385, BIO182455, Roos90, Suporte 04M23SH, TBIO Energia II, TBIO Energia 30, TBIO Energia I, BIO198050 e BIO191163;  
**CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA:** CD 1550, CD 1440, CD 1104, ESPORÃO, CD 1705 e ANAK;  
**EMBRAPA TRIGO - CNPT:** BR 18 (Terena), BRS Anambé, BRS Pardela, BRS Sabiá, BRS Atobá, BRS Gralha Azul, BRS Guamirim, BRS Tangará, BRS 327, BRS 374, BRS 331, BRS Marcante, BRS Reponte, BRS Belajoia, BRS TR271, BRS TR191, BRS TR322, BRS Nambu e BRS Coleiro;  
**IDR - PARANÁ:** IPR Panaty;  
**LIMAGRAIN BRASIL S.A:** LGPRISMA, LGCROMO, LGSUPRA, LGSAGA, LGBIANCO, LGORO e LGFORTALEZA;  
**OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA:** ORS DESTAK, ORS Madrepérola, ORS 1403, ORS Vintecinco, ORSCONFEITARIA, Ametista, ORS 1401, ORS 1405, ORS 1402, ORS Citrino, ORS 2101, ORS SOBERANO, ORS SELVAGEM e ORSGLADIADOR;  
**SEMEVINEA AGRONEGÓCIOS LTDA:** VENCITORE.

#### **GRUPO III**

**BIOTRIGO GENÉTICA LTDA:** TBIO Sinuelo, TBIO Alpaca, TBIO Consistência, TBIO Ponteiro, TBIO Pastejo I, BIO188035 e BIO182617;  
**CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA:** CD 1595;  
**EMBRAPA TRIGO - CNPT:** BRS Tarumã, BRS TR733, BRS TR874, BRS TR931 e BRS TR133.

### **Região 2**

#### **GRUPO I**

**EMBRAPA TRIGO - CNPT:** BRS GRAÚNA;  
**IDR - PARANÁ:** IPR Catuara TM;  
**OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA:** ORSSENA, ORSABSOLUTO, ORS TURBO e ORS FALCÃO.

#### **GRUPO II**

**BIOTRIGO GENÉTICA LTDA:** TBIO Audaz, TBIO Sagaz, TBIO Aton, Suporte 01M20, Suporte 03M23S, TBIO Motriz, TBIO Sonic, BS Etanol 8, TBIO Calibre, FPS Regente, TBIO Astro, BAR 10, BAR 20, TBIO Capaz, TBIO Duque, FPS Luminus, TBIO Trunfo, BIO198020, TBIO Sintonia, Celebra, TBIO Iguaçu, INOVA, TBIO Mestre, TBIO Toruk, TBIO Noble, FPS Virtude, FPS Amplitude, TBIO Alpaca, FPS Certero, TBIO Sossego, TBIO Convicto, TBIO Capricho CL, TBIO Ello CL, TBIO Referência, TBIO Conduta, FPS Xerife, TBIO Blanc, TBIO Ênfase, BIO198009, BIO182480, BIO188027, BIO182385, BIO182455, Roos90, Suporte 04M23SH, TBIO Energia II, TBIO Energia 30, TBIO Energia I, BIO190057 e BIO191163;  
**CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA:** CD 1550, CD 1252, CD 1440, CD 1104, ESPORÃO, CD 1303, CD 1705, ANAK e CD 150;  
**EMBRAPA TRIGO - CNPT:** BRS Guamirim, BRS Gralha Azul, BRS Sabiá, BRS Sanhaço, BRS Atobá, BRS Jacana, BRS Anambé, BRS 327, BRS Belajoia, BRS TR271, BRS Nambu e BRS Coleiro;  
**IDR - PARANÁ:** IPR 85, IPR 144, IPR Potyporã e IPR Panaty;  
**LIMAGRAIN BRASIL S.A:** LGPRISMA, LGCROMO, LGSUPRA, LGSAGA, LGBIANCO, LGORO e LGFORTALEZA;  
**OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA:** ORS Vintecinco, Ametista, ORS 1401, ORS 1402, ORS 1403, ORS Madrepérola, ORS Citrino, ORS AGILE, ORS DESTAK, ORSFEROZ, ORS GUARDIÃO, ORSCONFEITARIA, ORS 2102, ORS 2101, ORS SOBERANO e ORSGLADIADOR;  
**SEMEVINEA AGRONEGÓCIOS LTDA:** VENCITORE;  
**TAMONA AGROPECUARIA LTDA:** RBO 2B5, RBO 3B6, RBO Combatente, RBO Chimoio, JVC Cerne, JVC Athena, RBO Crescente, RBO Treseme e RBO 303.

#### **GRUPO III**

**BIOTRIGO GENÉTICA LTDA:** TBIO Sinuelo, TBIO Consistência, TBIO Ponteiro, TBIO Parâmetro, BIO188035, BIO198050 e BIO182617;  
**CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA:** CD 1595;  
**EMBRAPA TRIGO - CNPT:** BRS Pardela, BRS Tangará, BRS 374 e BRS Reponte;  
**OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA:** ORS 1405 e ORS SELVAGEM.

### **Região 3**

#### **GRUPO I**

**BIOTRIGO GENÉTICA LTDA:** TBIO Sonic, BS Etanol 8, TBIO Calibre, FPS Regente, TBIO Astro, BAR 10 e TBIO Capaz;

**EMBRAPA TRIGO - CNPT:** BRS Jacana e BRS GRAÚNA;

**IDR - PARANÁ:** IPR 85 e IPR Catuara TM;

**OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA:** ORSFEROZ, ORSSENA, ORSABSOLUTO, ORS AGILE, ORS 2102, ORS TURBO e ORS FALCÃO.

#### **GRUPO II**

**BIOTRIGO GENÉTICA LTDA:** TBIO Audaz, TBIO Sagaz, TBIO Aton, Suporte 01M20, Suporte 03M23S, BAR 20, TBIO Duque, FPS Luminus, TBIO Trunfo, BIO198020, TBIO Sintonia, Celebra, TBIO Iguazu, INOVA, TBIO Mestre, TBIO Toruk, TBIO Noble, FPS Virtude, FPS Amplitude, FPS Certero, TBIO Convicto, TBIO Ello CL, TBIO Referência, FPS Xerife, BIO198009, BIO182480, BIO182385, BIO182455, Roos90, TBIO Energia II, TBIO Energia 30, BIO190057, BIO191163 e TBIO Ênfase;

**CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA:** CD 150;

**EMBRAPA TRIGO - CNPT:** BR 18 (Terena), BRS Anambé, BRS Sabiá, BRS Sanhaço, BRS Atobá, BRS Guamirim, BRS Nambu e BRS Coleiro;

**IDR - PARANÁ:** IPR 144 e IPR Potyporã;

**LIMAGRAIN BRASIL S.A:** LGFORTALEZA;

**OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA:** ORS GUARDIÃO, ORS DESTAK, ORS Madrepérola, Ametista, ORS 2101 e ORS SOBERANO;

**TAMONA AGROPECUARIA LTDA:** RBO 2B5, RBO 3B6, RBO Chimoio, JVC Athena, RBO Crescente e RBO Treseme.

#### **GRUPO III**

**BIOTRIGO GENÉTICA LTDA:** TBIO Motriz, TBIO Sinuelo, TBIO Sossego, TBIO Ponteiro, TBIO Capricho CL, TBIO Blanc, TBIO Parâmetro, BIO188035, BIO188027, Suporte 04M23SH, TBIO Energia I, BIO198050 e BIO182617;

**CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA:** CD 1550, CD 1440, CD 1104, ESPORÃO, CD 1303, CD 1705, ANAK e CD 1595.

**EMBRAPA TRIGO - CNPT:** BRS Pardela, BRS Tangará, BRS Galha Azul e BRS 327;

**IDR - PARANÁ:** IPR Panaty;

**LIMAGRAIN BRASIL S.A:** LGSAGA e LGORO.

**OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA:** ORS 1403, ORS 1401, ORS 1405, ORS Citrino, ORS SELVAGEM e ORSGLADIADOR;

**SEMEVINEA AGRONEGÓCIOS LTDA:** VENCITORE;

**TAMONA AGROPECUARIA LTDA:** RBO 303, RBO Combatente e JVC Cerne.

#### **NOTAS:**

1. Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2. Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020).

3. As regiões homogêneas de adaptação de cultivares de trigo estão especificadas na Instrução Normativa nº 3, de 14 de outubro de 2008, da Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada no Diário Oficial da União de 15 de outubro de 2008; e alterada através da retificação publicada no Diário Oficial da União de 07 de maio de 2021.

4. Consoante ao disposto no inciso XXIX do art. 3º do Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020, ficam indicadas as misturas de cultivares no Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura do Trigo, desde que as cultivares que compõem a mistura estejam indicadas individualmente, no mesmo grupo de classificação de cultivares e região de adaptação.

#### **5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA**

**NOTA:** Para culturas anuais, o ZARC faz avaliações de risco para períodos decendiais (10 dias) de semeadura e assume que a emergência ocorra, majoritariamente, em até 10 dias após a semeadura. Para os casos excepcionais em que a emergência ocorrer com 11 ou mais dias de atraso em relação a semeadura, deve-se considerar como referência o risco do decêndio em que ocorreu a emergência.

A relação dos municípios aptos ao cultivo e os períodos indicados para semeadura estão disponibilizados no painel de indicação de risco do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através do sítio: <https://mapa-indicadores.agricultura.gov.br/publico/extensions/Zarc/Zarc.html>

Para a busca do Zarc Trigo de Sequeiro entre em Zarc Oficial e selecione nos campos:

1. Safra: Selecione a opção "2023/2024";
2. Cultura: Selecione a opção "Trigo Sequeiro";
3. Grupo: Selecione o grupo em que a cultivar esteja agrupada;
4. Solo: Selecione a classe de AD desejado;

5. UF: Selecione a unidade da federação desejada;
6. Município: Selecione o município desejado;