

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO.
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 304, DE 20 DE JULHO DE 2021.

Portaria publicada no D.O.U do dia 21 de julho de 2021, seção 1.

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 10.253, de 20 de fevereiro de 2020, e observado, no que couber, o contido no Decreto nº 9.841 de 18 de junho de 2019, na Portaria nº 412 de 30 de dezembro de 2020 e nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008, da Secretaria de Política Agrícola, e nº 16, de 9 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de maracujá, cultivo de sequeiro, no Estado do Piauí conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 2 de agosto de 2021.

GUILHERME SORIA BASTOS FILHO

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

Alteração no item 1. NOTA TÉCNICA, através do ato de Retificação publicado no Diário Oficial da União de 27 de julho de 2021, Seção 1, pág. 7.

O maracujá (*Passiflora* spp.) é uma planta trepadeira herbácea ou lenhosa, semi-perene, com origem na América Tropical. É cultivado em todos os biomas, regiões e Estados brasileiros, o que torna o Brasil o maior produtor e consumidor mundial.

O maracujá pode ser plantado em qualquer época do ano em áreas com irrigação. Entretanto, para cada região existe um período em que o desenvolvimento inicial é mais favorável. Geralmente, coincide com o período chuvoso e com temperaturas mais elevadas. O plantio em épocas de clima mais ameno associado à altas precipitações e elevada umidade relativa do ar deve ser evitado, principalmente no Centro-Sul do país, pois isso favorece a incidência de doenças da parte aérea, como a verrugose, que pode inviabilizar o plantio em situações de elevada infestação. Por isso, a tecnologia agronômica de ponta aliada a manejos e datas de plantio adequados podem refletir diretamente na produtividade e qualidade de frutos do maracujazeiro.

A ocorrência de doenças que têm sido fator limitante da rentabilidade do maracujazeiro, reduzindo a vida útil dos pomares. A qualidade das mudas constitui um dos principais fatores que influenciam o desenvolvimento e produtividade do maracujazeiro. Assim, as mudas devem ser obtidas a partir de plantas-matrizes de alta produtividade e, de preferência, livres de pragas e doenças.

O maracujazeiro se adapta a vários ambientes e às mais diversas características climáticas. A cultura desenvolve-se bem em regiões com altitudes entre 100 e 1.000 metros. Os limites térmicos na fase de desenvolvimento vegetativo situam-se entre 20 °C e 32 °C, enquanto na frutificação a temperatura ideal é de 26 °C. Temperaturas elevadas, em especial à noite, retardam o florescimento e, se aliadas à baixa umidade relativa do ar, dificultam a fecundação das flores e a formação dos frutos e, consequentemente, reduzem a produtividade.

Para o seu desenvolvimento, o maracujá necessita de precipitações pluviométricas acima de 1.200 mm/ano, bem distribuídas durante todo o ciclo. Além disso, é uma planta muito exigente em luminosidade e fotoperíodo, pois necessita de no mínimo 11 horas de luz por dia na época de florescimento. Por isso, o cultivo a pleno sol é fundamental. Nas regiões de baixa latitude, onde a variação da temperatura do ar e o comprimento do dia ao longo do ano não variam muito, o maracujazeiro produz continuamente. Já em locais com maiores latitudes, a produção diminui sensivelmente nos meses com dias curtos e com baixas temperaturas.

Objetivou-se, com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, identificar os municípios aptos e os períodos de semeadura, para o cultivo do maracujá, em cultivo de sequeiro, no Estado, em três níveis de risco: 20%, 30%, 40%.

Essa identificação foi realizada com a aplicação de um modelo de balanço hídrico da cultura. Neste modelo são consideradas as exigências hídrica e térmica, duração do ciclo, das fases fenológicas e da reserva útil de água dos solos para cultivo desta espécie, bem como dados de precipitação pluviométrica e evapotranspiração de referência de séries com, no mínimo, 15 anos de dados diários registrados em 3.750 estações pluviométricas selecionadas no país.

Ressalta-se que por se tratar de um modelo agroclimático, parte-se do pressuposto de que não ocorrerão limitações quanto à fertilidade dos solos ou danos às plantas devido à ocorrência de plantas daninhas, insetos-pragas e doenças.

Para delimitação das áreas aptas ao cultivo do maracujá e os respectivos riscos, foram adotados os seguintes parâmetros e variáveis:

I. Temperatura: Foram restringidos os decêndios com temperaturas mínimas menores ou igual a 3°C e durante as Fases I a IV, temperaturas máximas superiores ou igual a 39°C, observadas no abrigo meteorológico, durante a Fase IV;

II. Ciclo e Fases fenológicas: O maracujá é uma planta tropical semi-perene que sobrevive por mais de um ano em ambiente adequado. A instalação do pomar é realizada por meio de mudas, que são classificadas em dois grupos, denominadas de mudas simples e mudas altas (mudão), que se distinguem na duração média do ciclo e nas fases de interesse para avaliação de riscos climáticos.

O ciclo do maracujazeiro foi dividido em 5 fases, sendo elas: Fase 0: Formação da muda no viveiro; Fase I: Estabelecimento, que inclui plantio e estabelecimento da muda no campo; Fase II, Crescimento Vegetativo inicial; Fase III Crescimento Vegetativo Final; Fase IV: Floração e Frutificação; e Fase V: Produção Final. Os ciclos médios do plantio da muda (Fase I) à maturidade fisiológica (Fase V) e duração das fases da cultura estão representados na tabela abaixo:

Tipo de mudas	Ciclo representativo (dias)	Fase 0 Viveiro (dias)	Fase I (dias)	Fase II (dias)	Fase III (dias)	Fase IV (dias)	Fase V (dias)
Muda Simples – Grupo I	360	60	20	60	80	70	70
Mudas Altas (Mudão) – Grupo II	330	120	20	-	50	70	70

III. Capacidade de Água Disponível (CAD): Foi estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da reserva útil de água dos solos. Foram considerados os solos Tipo 1 (textura arenosa), Tipo 2 (textura média), Tipo 3 (textura argilosa), com capacidade de armazenamento de 42 mm, 66 mm e 90mm, respectivamente, e uma profundidade efetiva média do sistema radicular de 60 cm;

IV. Índice de Satisfação das Necessidades de Água (ISNA): O ISNA para mudas simples que deve ser igual ou superior a 0,80 na Fase I; 0,55 nas Fase II e III; e 0,50 na Fase IV; Para a mudas altas ou mudão o ISNA deve ser igual ou superior a 0,80 na Fase I; 0,55 na Fase III; e 0,50 na Fase IV;

Os resultados do Zarc são gerados considerando um manejo agronômico adequado para o bom desenvolvimento, crescimento e produtividade da cultura, compatível com as condições de cada localidade. Falhas ou deficiências de manejo de diversos tipos, desde a fertilidade do solo até o manejo de pragas e doenças ou escolha de cultivares inadequados para o ambiente edafoclimático, podem resultar em perdas graves de produtividade ou agravar perdas geradas por eventos meteorológicos adversos. Portanto, é indispensável: utilizar tecnologia de produção adequada para a condição edafoclimática; controlar efetivamente as plantas daninhas, pragas e doenças durante o cultivo; adotar práticas de manejo e conservação de solos.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de maracujá no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;
- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 1,5m ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matações ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE PLANTIO

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 28	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30
Meses	Janeiro		Fevereiro			Março			Abril			

Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Maio		Junho			Julho			Agosto			

Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Setembro		Outubro			Novembro			Dezembro			

4. CULTIVARES INDICADAS

Devem ser utilizadas no plantio do maracujá mudas produzidas em viveiros ou unidades de propagação credenciados em conformidade com a legislação de sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003 e Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR

Alteração no item 5. PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR E PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR, através do ato de Retificação publicado no Diário Oficial da União de 27 de julho de 2021, Seção 1, pág. 7.

MUNICÍPIOS	PERÍODOS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POMAR COM MUDAS ALTAS – GRUPO II								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Agricolândia					2 a 3	1 + 4	2 a 3	1 + 4	
Água Branca					2 a 3	1	2 a 3	1	4
Alto Longá					3	2 + 4	3	2 + 4	1 + 5
Altos			3 a 4	3	2 + 4	1 + 5	2 a 4	1 + 5	6
Alvorada Do Gurguéia					36	1	36	1	2 + 34 a 35
Amarante					1 a 2	3	1 a 2	3	4 + 36
Angical Do Piauí			3		1 a 3		2 a 3	1	4
Antônio Almeida			1	1	36 + 2	35	36 a 2	35	34 + 3
Aroazes						3		3	2
Arraial						1 a 2		1 a 2	3
Assunção Do Piauí									4
Avelino Lopes								36	34 a 35
Baixa Grande Do Ribeiro		1	36	36 a 1	33 a 35 + 2		34 a 2	33	32 + 3
Barra D'Alcântara						2		2	1 + 3
Barras	4	5	3	4 a 5	2 a 3 + 6		3 a 6	2	1 + 7
Barreiras Do Piauí		36	33 a 35	33 a 36	1	32	33 a 1		2 + 32
Barro Duro					2 a 3	1	2 a 3	1 + 4	
Batalha		4 a 5	3 + 6	4 a 5	3 + 6	2	4 a 6	3	2 + 7
Beneditinos					2 a 3	1 + 4	3	2 + 4	1 + 5
Bertolínia					1	36		36 a 1	35 + 2
Boa Hora		4	3 + 5	4	3 + 5	2 + 6	4 a 5	3 + 6	2
Bom Jesus					36	33 a 35 + 1	36	33 a 35 + 1	2
Bom Princípio Do Piauí		5	4 + 6	5	4 + 6	7	5 a 6	4 + 7	3
Boqueirão Do Piauí		4	5	4	3 + 5	2	4 a 5	3 + 6	2
Brasileira		4	5	4 a 5		3 + 6	4 a 5	6	7 + 3
Brejo Do Piauí									1
Buriti Dos Lopes		4 a 5	6	4 a 5	6	7 + 3	4 a 6	7	8 + 3
Buriti Dos Montes						4		4	5
Cabeceiras Do Piauí	4		3 + 5	4	2 a 3 + 5	1 + 6	3 a 5	2 + 6	1 + 7
Cajazeiras Do Piauí						1 a 2		1 a 2	3
Cajueiro Da Praia		5		5	6	4	5 a 6		4 + 7
Campo Largo Do Piauí	4 a 5		3 + 6	4 a 5	2 a 3 + 6	7	3 a 6	2 + 7	1 + 8

Campo Maior			4	4	3	2 + 5	4	2 a 3 + 5	1 + 6
Canavieira					1	36	1	36	35 + 2
Canto Do Buriti									36 a 1
Capitão De Campos		4		4	5	3	4 a 5	3	2 + 6
Caracol									36
Caraúbas Do Piauí		4 a 5	6	4 a 5	6	7 + 3	4 a 6	3 + 7	
Castelo Do Piauí						4		4	3 + 5
Caxingó		4 a 5	6	4 a 5	6	7 + 3	4 a 6	7	8 + 3
Cocal		4 a 5	6	5	4 + 6	3 + 7	4 a 6	7	3
Cocal De Telha			4	4		3 + 5	4 a 5	3	2 + 6
Cocal Dos Alves		5	4 + 6	5	4 + 6		5 a 6	4	3 + 7
Coivaras			4		2 a 4	1 + 5	3 a 4	2 + 5	1
Colônia Do Gurguéia						36		36 a 1	35
Colônia Do Piauí									1 a 2
Corrente			34		33 a 35	36	33 a 35	36	1 + 32
Cristalândia Do Piauí			34		33 a 35	36	33 a 35	36	32
Cristino Castro						36 a 1		36 a 1	34 a 35
Curimatá						34 a 36		34 a 36	33 + 1
Currais					36 a 1	33 a 35	36 a 1	34 a 35 + 2	33
Curralinhos			3	3	1 a 2	4	2 a 4	1	5
Demerval Lobão			3	3	2 + 4	1	2 a 4	1	5
Domingos Mourão			4 a 5		4 a 5	6	5	4 + 6	3
Elesbão Veloso						1 a 3		2 a 3	1 + 4
Eliseu Martins						36 a 1		36 a 1	35 + 2
Esperantina	4	5	6 + 3	4 a 5	3 + 6	2 + 7	4 a 6	3 + 7	2
Flores Do Piauí						1		1	
Floriano					1	2	1	36 + 2	3
Francinópolis						1 a 3		2 a 3	1
Francisco Ayres					1 a 2		1	2	3 + 36
Gilbués			33 a 36	36	33 a 35 + 1	32	33 a 1	2	32
Guadalupe			1	1	2	36	1 a 2	36	35 + 3
Guaribas						36		36	34 a 35 + 1
Hugo Napoleão					2 a 3	1	2	1 + 3	4
Ilha Grande		5	4 + 6	5	4 + 6	7	5 a 6	4 + 7	8
Inhumã									2
Ipiranga Do Piauí									2
Itaueira						1	1	36	2
Jardim Do Mulato					2	1 + 3	2	1 + 3	4

São João Do Arraial	4 a 5		3 + 6	4 a 5	3 + 6	2 + 7	3 a 6	2 + 7	8
São José Do Divino		4 a 5	6	4 a 5	6	7 + 3	4 a 6	3 + 7	2
São José Do Peixe						1		1	2
São Miguel Da Baixa Grande					3	1 a 2	3	2	1 + 4
São Miguel Do Fidalgo									1
São Miguel Do Tapuio									3 a 4
São Pedro Do Piauí			3	3	1 a 2	4	2 a 3	1 + 4	
Sebastião Barros					34	33 + 35 a 36		33 a 36	
Sebastião Leal					36 a 1	35	36 a 1	35 + 2	34
Sigefredo Pacheco			4		4	3 + 5	4	5	3
Socorro Do Piauí									1
Tamboril Do Piauí									1
Tanque Do Piauí						1 a 2		1 a 2	3
Teresina			3 a 4	3 a 4	2	1 + 5	2 a 4	1 + 5	6
União	4		2 a 3 + 5	3 a 5	2	1 + 6	2 a 5	1 + 6	7
Uruçuí			1	36 a 1	35 + 2	34	36 a 2	34 a 35	33 + 3
Valença Do Piauí						3			2 a 3
Várzea Grande						1 a 2		2	1 + 3
Wall Ferraz									2

*Com base nos parâmetros e variáveis utilizados não há períodos indicados para o Estado para implantação do pomar com mudas simples.