

-  /minsaude
-  /minsaude
-  /MinSaudeBR
-  /minsaude

COM O SEU APOIO, VAMOS ACABAR COM A
TUBERCULOSE

PROFISSIONAL DE SAÚDE, O SEU APOIO É
FUNDAMENTAL PARA ACABAR COM A TUBERCULOSE.



DEQUE SAÚDE
136
www.saude.gov.br



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



#BRASILSEMTUBERCULOSE
Saiba mais em: saude.gov.br/tuberculose

TUBERCULOSE NO BRASIL

A doença é um sério problema da saúde pública, com profundas raízes sociais. Anualmente, são notificados cerca de 70 mil casos novos de tuberculose e, aproximadamente, 4,5 mil óbitos em decorrência da doença.

O QUE É TUBERCULOSE?

Doença infecciosa e transmissível causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, embora possa atingir outros órgãos e sistemas.

COMO É TRANSMITIDA A TUBERCULOSE?

Ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, durante a fala, espirro ou tosse das pessoas com tuberculose pulmonar ou laríngea, que lançam no ar partículas em forma de aerossóis que contêm bacilos.

COMO SABER SE ALGUÉM ESTÁ COM TUBERCULOSE?

O principal sintoma da tuberculose é a tosse. Na população geral, tosse por três semanas ou mais deve ser investigada. Há outros sinais e sintomas que também podem estar presentes, tais como: febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento e cansaço/fadiga.

COMO DIAGNOSTICAR A TUBERCULOSE?

O diagnóstico é realizado por exames bacteriológicos como a baciloscopia, Teste Rápido Molecular (TRM-TB) e cultura, além de exame complementar como radiografia de tórax.

COMO TRATAR A TUBERCULOSE?

O tratamento da tuberculose dura, no mínimo, seis meses, é gratuito e disponibilizado no Sistema Único de Saúde. O tratamento é composto por fase

intensiva, que dura dois meses, com a utilização de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol em dose fixa combinada, seguidos de quatro meses de rifampicina e isoniazida, totalizando seis meses de tratamento. O Tratamento Diretamente Observado (TDO) é indicado como fundamental ação de apoio e monitoramento do tratamento das pessoas com tuberculose pelos profissionais de saúde.

COMO PREVENIR A TUBERCULOSE?



As crianças devem tomar a vacina BCG ao nascer ou, no máximo, até 04 anos, 11 meses e 29 dias. A BCG protege a criança das formas mais graves da doença, como a tuberculose miliar e a meníngea.



A vacina é ofertada gratuitamente no Sistema Único de Saúde.



O diagnóstico precoce também é uma forma de prevenção, pois ao iniciar o tratamento de maneira adequada é possível quebrar a cadeia de transmissão da doença.



Manter ambientes bem ventilados e com entrada de luz solar também previne a tuberculose.

A tuberculose pode atingir a todos, mas alguns grupos populacionais mais vulneráveis possuem maior risco de adquirir a doença ativa, devido às condições de saúde e de vida a que estão expostos. Esses grupos incluem: população em situação de rua, privados de liberdade, pessoas vivendo com HIV, indígenas e os trabalhadores de saúde.



PROFISSIONAL DE SAÚDE, O SEU APOIO É MUITO IMPORTANTE. INCENTIVE O TRATAMENTO ATÉ O FINAL. VOCÊ FAZ A DIFERENÇA!

COM O APOIO DE TODOS, VAMOS ACABAR COM A TUBERCULOSE!

#BRASILEM TUBERCULOSE