

# Protocolo Radiologia Odontológica



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE  
**RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA**

# Radiografia Panorâmica

<b>Nome do Procedimento</b>	<b>Radiografia Panorâmica</b>
<b>Indicação</b>	<p>Deve ser realizada sempre após exame clínico, avaliando sinais e sintomas.</p> <p>Fornecer uma imagem "geral" das arcadas e regiões adjacentes.</p> <p>Planejamento ortodôntico (associado à documentação)</p> <p>Planejamento protético extenso ou auxiliar no implante.</p> <p>Diagnóstico e planejamento para remoção de Dentes Inclusos/Impactados e Terceiros Molares.</p> <p>Suspeita de lesões intra-ósseas (diagnóstico e acompanhamento)</p> <p>Traumatologia buco maxilo (acompanhamento de traumas e fraturas).</p> <p>Avaliação de crescimento e desenvolvimento.</p> <p>Avaliações cronológicas das erupções dentárias e dos eixos de erupções dos dentes permanentes.</p> <p>Pode ou não estar associada com bite wing (crianças com dentição mista, adolescentes com todos os dentes permanentes e dentes inclusos e adultos com pelo menos um dente).</p>
<b>Contra-Indicação</b>	<p>Deteção de cárie, identificação de lesões periapicais, doença periodontal e envolvimento de furca. Não permite analisar detalhes, portanto nestes casos o indicado é um RX periapical.</p>
<b>Códigos TUSS</b>	<b>Descrição</b>
81.000.405	Radiografia panorâmica de mandíbula/maxila
<b>Materiais Especiais</b>	Aparelho de radiografia panorâmica
<b>Rastreabilidade</b>	Sim
<b>Observações</b>	Deve ser realizado um exame clínico, no caso de sinais e sintomas, proceder para o exame de imagem mais indicado.
<b>Comentários (para uso da OPS)</b>	

# Radiografia Panorâmica

- Em determinados casos, pode ser substituída pela tomografia computadorizada (TC)
- Localização topográfica de dentes retidos, (não irrompidos) - informações tridimensionais geram mudanças no plano de tratamento (Alquerban, 2011)
- Contra-indicação : detecção de cáries proximais em dentes posteriores - técnica radiográfica interproximal (bitewing). (Kamburoglu, 2012)

# Radiografia Periapical

<b>Nome do Procedimento</b>	<b>Radiografia Periapical (boca toda)</b>
<b>Indicação</b>	Realizada sempre após exame clínico avaliando sinais e sintomas. Doença bucal generalizada – perda óssea generalizada, cárie generalizada (em muitos dentes). Pacientes com doença periodontal. Necessidade de observar detalhes de tratamentos (paciente com extenso histórico de tratamento ou que será submetido a extenso tratamento). Quando não existem evidências de doença generalizada, devem ser indicadas periapicais ou bitewing seletivas.
<b>Contra-Indicação</b>	Perda óssea localizada, cáries localizadas, diagnóstico para regiões específicas – neste caso deve-se utilizar radiografias periapicais seletivas.
<b>Códigos TUSS</b>	<b>Descrição</b>
81.000.421 81.000.294	Radiografia periapical Levantamento Periapical (exame radiodôntico)
<b>Materiais Especiais</b>	Aparelho de RX
<b>Rastreabilidade</b>	Sim
<b>Observações</b>	Deve ser realizado um exame clínico, no caso de sinais e sintomas, proceder para o exame de imagem mais indicado.
<b>Comentários (para uso da OPS)</b>	

# Radiografia Periapical

- Avaliação de lesões cariosas: corretamente indicada em dentes anteriores ou lesões de grande extensão em superfície oclusal
- Contra-indicação: cáries em superfícies proximais (mesial e distal) de dentes posteriores (premolares e molares) – indicação de radiografias interproximais (bitewing) (Kamburoglu, 2012).

# Radiografia Internproximal

<b>Nome do Procedimento</b>	<b>Radiografia <i>bitewing</i></b>
<b>Indicação</b>	Novos pacientes, podendo ou não estar associada com panorâmica (crianças com dentição mista, adolescentes com todos os dentes permanentes e dentes inclusos e adultos com pelo menos um dente), pacientes em controle (verificar risco à carie e periodicidade). Realizada sempre após exame clínico avaliando sinais e sintomas.
<b>Contra-Indicação</b>	Quando houverem <u>evidências</u> de doença generalizada deve-se utilizar periapicais para exame completo ou panorâmica, de acordo com o caso.
<b>Caráter da Indicação</b>	Eletiva SIM
<b>Códigos TUSS</b>	Descrição
81.000.375	Radiografia interproximal - bitewing
<b>Materiais Especiais</b>	Aparelho de RX
<b>Rastreabilidade</b>	Sim
<b>Observações</b>	Deve ser realizado um exame clínico, no caso de sinais e sintomas, proceder para o exame de imagem mais indicado.
<b>Comentários (para uso da OPS)</b>	

# Radiografia Interproximal

- Lesões cariosas : dentes anteriores ou em lesões de grande extensão em superfície oclusal – indica-se a radiografia periapical
- Lesões cariosas em superfícies proximais (mesial e distal) de dentes posteriores (premolares e molares) – indica-se a radiografia interproximal (bitewing) (Kamburoglu, 2012).
- Eletiva : não
- Solicitação de radiografias periapicais da boca toda e radiografias interproximais dos dentes posteriores para um mesmo indivíduo.