

# Encaminhamentos AGA

## Critérios:

- Deverá ser feito por geriatra usando instrumento padronizado pela SBG
- DUT proposta:

1. Cobertura obrigatória para pacientes acima de 60 anos, quando for realizado por médico geriatra , utilizando instrumento específico reconhecido pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) disponibilizado no sítio eletrônico [www.sbgg.org.br](http://www.sbgg.org.br), e preenchido pelo menos um dos critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do Grupo II:

## Grupo I:

- Internação recente
- Idade  $\geq 85$  anos
- Incapacidade funcional
- Neoplasias malignas
- Insuficiência cardíaca  $\geq$  CF II
- Insuficiência cognitiva
- Fragilidade psicossocial e/ou depressão
- Incontinência urinaria e/ou fecal,
- Instabilidade postural e/ou história de quedas

## Grupo II:

- Doença terminal
- Demência Severa
- Dependência funcional severa
- Suporte de enfermagem domiciliar já existente e inevitável

\*Ainda será discutida uma primeira consulta de base para pacientes assintomáticos a partir de 60 anos.

# Encaminhamentos Oftalmologia

- Pantofotocoagulação a laser na retinopatia da prematuridade com diretriz de utilização:

Cobertura obrigatória para pacientes que apresentem retinopatia da prematuridade no estágio 3 diagnosticada através de oftalmoscopia indireta.

- Implante intravítreo de polímero farmacológico de liberação controlada com diretriz de utilização:

Cobertura obrigatória para pacientes que apresentem um dos seguintes critérios:

- a. Uveíte crônica não infecciosa intermediária ou posterior
- b. Edema macular nas oclusões venosas de ramo e central quando não responsivo ao tratamento com antiangiogênico (seguindo DUT de descontinuidade) ou se houver contra-indicação a este.

- Farmacomodulação com antiangiogênico para retinopatia diabética e obstrução venosa retiniana com diretriz de utilização:

Cobertura obrigatória para pacientes que apresentem edema macular com espessura maior que 275 micra com visão entre 20/20 sintomático e 20/400 quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios:

- a. Paciente diabético maior que 18 anos de idade e com HbAc < 11 e sem história de AVC e IAM nos 3 meses anteriores
- b. Paciente com obstrução venosa retiniana central ou de ramo

# Encaminhamentos Oftalmologia

- Diretriz de utilização para tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico apresentada pela UNIMED segundo NICE:

Alterações: de 20/40 para 20/20 sintomático

De 20/320 para 20/400

Critério de descontinuidade: item b mudar de 15 para 30 letras e retirar o item c

- Plástica de conjuntiva sem DUT
- Termoterapia transpupilar a laser com diretriz de utilização:  
Cobertura obrigatória em adjuvância a braquiterapia para pacientes portadores de melanoma de coróide.