



ALOCÇÃO E AMAMENTAÇÃO PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO



Para alocação, manter em alojamento conjunto. **Priorizar leitos de pressão negativa ou quartos individuais**, de porta fechada e bem ventilado. Na ausência, proceder isolamento por coorte, separando enfermarias ou áreas específicas para casos de Coronavirus. **Manter em precaução padrão e de gotícula** (verificar a recomendação da SCIH da Instituição). **Manter distância de leitos e berços de pelo menos 1 metro.**



Recomendado **transporte de RN em incubadora**, quando possível. Atenção aos cuidados de higiene e EPIs para transporte.



Mãe e bebê podem ficar juntos em alojamento conjunto, com exceção de quando houver critérios de cuidado intensivo. Puérpera deve utilizar **máscara cirúrgica durante todo tempo** e ser orientada a **higienizar as mãos adequadamente** antes e após qualquer contato com RN.

Apesar de informações insuficientes nesse momento, ainda não há documentação de transmissão vertical durante a gestação e nem no período neonatal, pela amamentação. Por isso, considerando os benefícios, não há contraindicação ao aleitamento, desde que a mãe queira e siga as medidas preventivas necessárias:

- 1 Lavar as mãos antes de tocar no bebê na hora da mamada;**
- 2 Usar máscara cirúrgica durante a amamentação.**

Obs: Não recomendado puérpera frequentar o Banco de Leite.

Fontes: Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia – Febrasgo, Organização Mundial de Saúde – OMS