



Critérios epidemiológicos nacionais de IRAS por SARS-CoV-2



Para pacientes Pediátricos e Adultos



Critério 1:

Paciente internado por período >14 dias



Paciente internado por > 14 dias, por outro diagnóstico

E



Com infecção pelo SARS-CoV-2 confirmada por RT-PCR em tempo real em amostra*1 coletada após o 14º dia de internação

Critério 2:

Paciente internado por período > 7 dias e ≤ 14 dias



Paciente internado por > 7 dias e ≤ 14 dias, por outro diagnóstico

E



Não foi classificado como suspeito ou confirmado de infecção por SARS-CoV-2*2 durante os 7 primeiros dias de internação*3

E



Com infecção pelo SARS-CoV-2 confirmada por RT-PCR em tempo real em amostra*1 coletada após o 7º dia de internação

E



Durante a internação, teve vínculo epidemiológico de contato desprotegido *5 com:


a) Profissional de saúde com infecção pelo SARS-CoV-2 confirmada por RT-PCR em tempo real *1,*4

OU




b) Outro paciente com infecção pelo SARS-CoV-2 confirmada por RT-PCR em tempo real na mesma enfermaria ou em leito de UTI sem isolamento*1,*4

OU



c) Acompanhante ou visitante com infecção pelo SARSCoV-2 confirmada por RTPCR tempo real *1,*4



Observações:

*1 Amostra de: swab de naso ou orofaringe OU aspirado de naso ou orofaringe OU aspirado traqueal OU lavado broncoalveolar.

*2 Conforme definição de caso suspeito e confirmado do Ministério da Saúde:


<https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao>

*3 Para paciente com até 7 dias de internação, a infecção por SARS-CoV-2 será considerada de origem comunitária

*4 Para pacientes com até 7 dias de internação, a infecção por SARS-CoV-2 será considerada de origem comunitária ou originária de outro hospital, caso o paciente tenha internação prévia.

5 Esse contato desprotegido do paciente com o profissional de saúde ou com outro paciente ou com acompanhante/visitante COVID-19 positivo (por RT-PCR em tempo real 2) deve ter ocorrido a partir de 2 dias (48 horas) antes da confirmação da COVID-19 nessas pessoas (devido a fase pré sintomática da doença).

Critérios epidemiológicos nacionais de IRAS por SARS-CoV-2



Para Neonatologia (0-28 dias)



Critério 1:

Para recém-nascido internado desde o nascimento



RN com mais de 48 horas de vida, internado desde o nascimento*1

E



Com infecção pelo SARS-CoV-2 confirmada por RT-PCR em tempo real em amostra*2 coletada depois de 48 horas de vida.

Critério 2:

Para recém-nascido readmitido na unidade neonatal com menos de 7 dias após a alta.



RN, readmitido na unidade neonatal do mesmo hospital, com menos de 7 dias após a alta, com suspeita de infecção por SARSCoV-2*3

E



Com infecção pelo SARS-CoV-2 confirmada por RT-PCR em tempo real em amostra*2 coletada na admissão

E



Sem vínculo epidemiológico domiciliar (com pessoa com COVID-19 suspeita ou confirmada).

Critério 3:

Para recém-nascido internado por período > 14 dias



RN, procedente do domicílio, internado por período > 14 dias, por outro diagnóstico

E



Com infecção pelo SARS-CoV-2 confirmada por RT-PCR em tempo real em amostra*2 coletada após o 14º dia de internação.

Critério 4:

Para recém-nascido, internado por período > 7 dias e ≤14 dias



RN, proveniente do domicílio, internado por > 7 dias e ≤14 dias, por outro diagnóstico *4

E




Não foi classificado como suspeito ou confirmado de infecção por SARS-CoV-2 durante os 7 primeiros dias de internação*3

E



Com infecção pelo SARS-CoV-2 confirmada por RT-PCR em tempo real em amostra*2 coletada após o 7º dia de internação

E



Durante a internação, teve vínculo epidemiológico de contato desprotegido *5 com:

a) profissional de saúde identificado como caso confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2

confirmada por RT-PCR em tempo real *2



OU




b) Outro paciente que foi identificado como confirmado por RT-PCR em tempo real na mesma

enfermaria ou em leito de UTI sem isolamento*2

OU



c) Acompanhante ou visitante que foi identificado como confirmado por RT-PCR em tempo real*2



Observações:

*1 RN com infecção pelo SARS-CoV-2 confirmada por RT-PCR em tempo real, coletado em uma ou mais amostras*2 nas primeiras 48 horas de vida, considerar possível transmissão vertical.

*2 Amostra de: swab de naso ou orofaringe OU aspirado de naso ou orofaringe OU aspirado traqueal OU lavado broncoalveolar.

*3 Conforme definição de caso suspeito e confirmado do Ministério da Saúde: <https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao>

*4 Para RN com até 7 dias de internação, a infecção por SARS-CoV-2 será considerada de origem comunitária ou originária de outro hospital, caso o RN tenha internação prévia.

*5 Esse contato desprotegido do paciente com o profissional de saúde ou com outro paciente ou com acompanhante/visitante COVID-19 positivo (por RT-PCR em tempo real*2) deve ter ocorrido a partir de 2 dias (48 horas) antes da confirmação da COVID19 nessas pessoas (devido a fase pré sintomática da doença).