

Monitoramento Semanal das Condições das Lavouras

09 de março de 2026

Destaques da Semana



Arroz

19,1% colhido.

No RS, o tempo seco tem favorecido a colheita, especialmente, na Planície Costeira Externa. A produtividade tem sido boa e as condições climáticas, no florescimento e enchimento dos grãos, também propiciou boa qualidade do produto colhido.

Em SC, lavouras encontram-se predominantemente em maturação e colheita.

Algumas áreas ainda apresentam registros pontuais de brusone e manchas foliares, além de áreas com presença de arroz-vermelho e gramíneas invasoras. De uma forma geral, as lavouras estão em boas condições.

Em GO, a colheita avança nas áreas remanescentes e algumas lavouras sob pivôs foram colhidas com bons rendimentos. Na região de São Miguel do Araguaia, a colheita avança de forma escalonada, com boas produtividades, e algumas áreas de arroz sequeiro estão em maturação.

No MA, a semeadura de arroz sequeiro foi finalizada e as lavouras estão em pleno desenvolvimento vegetativo, com áreas já iniciando o florescimento e em boas condições.

No TO, nas várzeas, as chuvas estão contínuas e volumosas, reduzindo a operação da colheita.

Em MT, a colheita tem evoluído conforme a maturação das lavouras. Predominam, em campo, áreas em estádios reprodutivos, entre a floração e o enchimento de grãos.

No PR, as lavouras estão em boas condições, com a maioria das áreas em enchimento de grãos e maturação, e com avanço significativo da área colhida.



Feijão 1ª Safra

62,2% colhido.

Em MG, a colheita está quase concluída, restando pequenos talhões em regiões pontuais.

No PR, a colheita foi finalizada na última semana. O rendimento da cultura foi satisfatório e a qualidade dos grãos ficou em bom padrão.

Na BA, a colheita avança lentamente em decorrência das chuvas, gerando perdas pontuais de qualidade por conta da umidade na maturação.

No PI, o cultivo é mais tardio, ocorrendo a partir do início da estação chuvosa. As lavouras estão todas implantadas e vêm se desenvolvendo bem na maioria das regiões. A exceção é o Sudeste, que tem registrado déficit hídrico.

No RS, o clima foi mais seco no Planalto Superior, algo que viabilizou a secagem dos grãos em maturação, porém gerou estresse nas lavouras mais tardias, ainda em desenvolvimento. A colheita ainda avança lentamente.

Em SC, pouco mais de 68% da área está colhida. A qualidade e o rendimento dos grãos são considerados bons, embora observam-se danos pontuais por ataques de mosca-branca ou incidência de antracnose e mancha-angular em algumas áreas.



Milho 1ª Safra

29,5% colhido.

Em MG, a colheita ocorre nas áreas irrigadas com boas produtividades sendo obtidas.

No RS, a colheita avança no estado, com bons rendimentos. Nas áreas de safrinha, a estiagem já causa perdas no potencial produtivo.

No MA, BA e PI, as precipitações ocorridas favoreceram as lavouras em todos os estádios.

Em SP, o tempo seco favoreceu o avanço da colheita.

Em SC, a redução das chuvas favoreceu o avanço na colheita e as produtividades são consideradas satisfatórias.

Em GO, o tempo seco favoreceu a maturação das lavouras.

No PA, as precipitações frequentes favorecem o desenvolvimento do cereal.



Milho 2ª Safra

75,9% semeado.

Em MT, o plantio avança e as condições climáticas favorecem o desenvolvimento do cereal.

No PR, o tempo seco e as altas temperaturas afetam o desenvolvimento do milho em parte do estado.

Em MS, o plantio não acompanha a colheita da soja por falta de umidade no solo.

Em GO, apesar do atraso, o plantio segue para a reta final e a umidade do solo favorece o desenvolvimento da cultura.

Em MG, o clima favorável permitiu grande avanço da área semeada.

No TO, as chuvas constantes beneficiam o desenvolvimento da cultura e a semeadura deve se prolongar até meados de março. No MA e PI, as chuvas frequentes retardam a colheita da soja e consequentemente o plantio da segunda safra.

No PA, o plantio acompanha a colheita da soja e as condições climáticas continuam a favorecer o desenvolvimento do cereal.



Soja

50,6% colhido.

Em MT, a colheita se aproxima da finalização, com o restante das áreas em campo já em maturação. As produtividades continuam a superar as estimadas inicialmente.

No RS, a colheita foi iniciada e o déficit hídrico, em algumas regiões, tem acelerado o ciclo da cultura.

No PR, a redução das chuvas afeta o potencial produtivo das lavouras em enchimento de grãos.

Em GO, a redução das precipitações permitiu um grande avanço na área colhida e melhorou a qualidade dos grãos. Em MS, o tempo quente e seco acelerou a maturação e favoreceu o avanço da colheita. Em MG, o tempo firme permitiu um grande avanço na área colhida.

Em SP, a colheita avança com boas produtividades sendo obtidas.

Na BA, a frequência das chuvas atrasa a colheita e prejudica, pontualmente, a qualidade dos grãos.

No TO, as chuvas intensas têm atrasado os trabalhos de colheita.

No MA, o excesso de chuvas atrasa a colheita nos Gerais de Balsas, mas beneficia as lavouras nas demais regiões.

No PI, as chuvas frequentes impedem o avanço na colheita e comprometem, pontualmente, a qualidade dos grãos.

Em SC, a colheita avança, com boas produtividades sendo obtidas, e as condições das lavouras remanescentes são consideradas satisfatórias, com baixa incidência de doenças.

No PA, a colheita foi finalizada no polo da BR-163 e se aproxima da finalização no polo de Redenção, com boas produtividades sendo obtidas. Em Santarém, apesar dos menores acumulados de chuvas, as lavouras apresentam bom desenvolvimento.

Monitoramento Semanal das Condições das Lavouras

09 de março de 2026

Previsão Agrometeorológica (09/03/2026 a 16/03/2026)


N-NE: Os maiores acumulados de chuva estão previstos para o AP, Sudeste e Nordeste do PA, Centro-Oeste do AM, Centro-Norte do MA e Noroeste do PI. No Litoral e Sul do CE, Oeste e Sul da BA os acumulados serão menores, enquanto, no Leste de RR, extremo Noroeste do PA e restante da região Nordeste, as chuvas tendem a ser fracas, isoladas ou escassas. No geral, as condições serão favoráveis para os cultivos de primeira e segunda safra, exceto em parte do Semiárido, onde a umidade no solo ainda permanecerá baixa.

CO: As chuvas tendem a se concentrar no Centro-Norte de MT e MS e no Centro-Sul de GO, favorecendo o desenvolvimento dos cultivos de segunda safra. No Leste de GO, Pantanal mato-grossense e Sul de MS, são previstos baixos acumulados de chuva. Com exceção de parte do Sul de MS, a umidade no solo deve ser suficiente para a maioria das lavouras.


SE: A semana deve apresentar chuvas persistentes, com volumes consideráveis no Norte de SP e Triângulo Mineiro, causando impactos na colheita da soja e na semeadura do milho segunda safra em algumas áreas. No Leste de SP, Sul e Leste de MG, os acumulados serão menos significativos. Chuvas mais fracas e com menores acumulados devem ocorrer no Norte de MG. No geral, as condições serão favoráveis para o cultivos de grãos, cana-de-açúcar e café.

S: Há previsão de chuvas fracas e de baixos acumulados durante a semana em grande parte da região. Apenas no Nordeste e na faixa litorânea do PR, bem como, no Sudeste e Noroeste do RS e no Leste de SC, os acumulados devem ser maiores. Na metade Oeste do PR e no RS, a umidade no solo deve permanecer baixa, expandindo a área de restrição hídrica aos cultivos de primeira e segunda safra.

Condições hídricas para as lavouras nas principais regiões produtoras (09/03/2026 a 16/03/2026)



Soja



Milho 1ª e 2ª Safras

Condição

	Favorável
	Baixa Restrição (Falta de Chuva)

Fonte: Conab

Fonte: Conab

Estádios

E	Emergência
DV	Desenvolvimento Vegetativo
F	Floração
EG	Enchimento de Grãos
FM	Formação de Maças
M	Maturação
C	Colheita

	PA	TO	MA	PI	BA	MT	MS	GO	MG	SP	PR	SC	RS
Algodão			DV/F	DV/F	DV/FM	DV/FM	DV/F	DV/FM	DV/FM	FM/M			
Arroz		F/EG/M/C	DV/F/EG			F/EG/M/C	EG/M/C	C	EG/M	M/C	EG/M/C	EG/M/C	F/EG/M/C
Feijão 1ª				DV/F/EG	EG/M/C				C			EG/M/C	DV/F/C
Feijão 2ª					DV				E/DV		E/DV	E/DV/F	E/DV/F
Milho 1ª	EG/M/C		DV/F/EG	DV/F/EG/M	F/EG/M/C			EG/M	EG/M	EG/M/C	EG/M/C	EG/M/C	DV/F/EG/M/C
Milho 2ª	E/DV	E/DV	E/DV	E/DV	DV	E/DV	E/DV	E/DV	E/DV	E	E/DV		
Soja	F/EG/M/C	EG/M/C	DV/F/EG/M/C	EG/M/C	EG/M/C	M/C	EG/M/C	M/C	EG/M/C	EG/M/C	EG/M/C	EG/M/C	F/EG/M
Sorgo					E/DV			E/DV	E/DV				

Fonte: Conab

Para mais informações
www.gov.br/conab/pt-br/atuacao/informacoes-agropecuarias/safras

*Fonte: Adaptado de Inmet. Disponível em:
<https://portal.inmet.gov.br/informativos#>

Como citar esta publicação:

CONAB – COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Monitoramento semanal das condições das lavouras. Brasília, DF, 09 de março de 2026.



INFORMAÇÕES:

WWW.GOV.BR/CONAB
DIPAI@CONAB.GOV.BR



@CONABOFICIAL
@CONAB_OFICIAL
@CONAB_OFICIAL



CONAB
@CONAB