

Monitoramento Semanal das Condições das Lavouras

19 de janeiro de 2026

Destaques da Semana

 Arroz	 Feijão 1ª Safra	 Milho 1ª Safra	 Soja
96,6% semeado. No RS, mesmo com a ocorrência de dias nublados, os produtores realizam os devidos tratamentos fitossanitários, assim como adubações e o controle de plantas invasoras. Em SC, as lavouras apresentam bom desenvolvimento, apesar de temporais, com vento forte na região do litoral Norte, além de umidade elevada podendo favorecer doenças fúngicas nas áreas em floração e enchimento de grãos. As lavouras no litoral Sul encontram-se em perfilhamento final a início do estágio reprodutivo. Em GO, a colheita avança de forma escalonada, enquanto as lavouras ainda em campo encontram-se em fase reprodutiva, exibindo boas condições de desenvolvimento. No MA, o plantio de sequeiro segue lento devido à irregularidade das chuvas, sendo interrompido em algumas áreas devido ao veranico. No TO, metade das lavouras estão em desenvolvimento vegetativo e as restantes nos estádios reprodutivos. Em MT, as plantas apresentam bom desenvolvimento e, nas áreas sob pivô central, a colheita foi iniciada. No PR, as condições climáticas favorecem o desenvolvimento do cereal e a colheita avança.	22,5% colhido. Em MG, as chuvas esparsas, nas principais regiões, mantiveram a umidade nos solos e o atendimento da demanda hídrica da cultura. As lavouras seguem em boas condições, estando, majoritariamente, em estádios reprodutivos. No PR, a semana foi de chuvas esparsas e temperaturas médias elevadas. Esse cenário viabilizou o bom desenvolvimento das lavouras e também permitiu o avanço na colheita, que atingiu 58% da área total. Na BA, a colheita segue avançando nas lavouras mais precoces. As condições gerais da cultura se mantêm favoráveis, especialmente no Oeste do estado. Em GO, iniciou-se a colheita nas primeiras áreas no Sul e Leste do estado, porém ainda incipiente. As lavouras seguem com bom desenvolvimento, sem registros de danos por pragas e doenças. No RS, a semeadura foi concluída, favorecida pelo clima mais estável na última semana. Esse cenário também propiciou o avanço da colheita, que alcançou cerca de 20% da área total, restringindo-se a lavouras de feijão preto. Em SC, o calor e a alta umidade têm favorecido o aumento de pragas e doenças, como mosca-branca e antracnose, em algumas regiões. Nos dias sem chuvas, houve avanço da colheita, especialmente no Oeste, chegando a 1/4 da área. Em SP, a colheita foi finalizada.	4,4% colhido. Em MG, as lavouras continuam a ser beneficiadas pelas condições climáticas favoráveis. No RS, o avanço da colheita continua tímido devido às chuvas localizadas e ao atraso no ciclo da cultura. As produtividades iniciais têm superado as estimativas. Na BA, as boas precipitações aliadas aos períodos de sol têm favorecido a cultura. No PI, o plantio foi finalizado no Sudoeste. Nas demais regiões, ele acompanha a ocorrência das chuvas, que continuam irregulares. No PR, as boas precipitações ocorridas em janeiro ajudaram a consolidar o potencial produtivo das lavouras. Em SC, a colheita está no início e as produtividades têm refletido as boas condições climáticas. No MA, o plantio avança lentamente devido à irregularidade e falta de chuvas nas regiões produtoras. Em GO e SP, as primeiras áreas semeadas já se aproximam da maturação. No PA, a regularização das precipitações ocorrida na última semana permitiu um grande avanço da área semeada, aproximando-se da finalização. As primeiras áreas plantadas estão no estágio de enchimento de grãos.	2,3% colhido. Em MT, a redução das chuvas alternada com períodos de sol favoreceu o avanço da colheita em todo o estado. As produtividades iniciais têm animado os produtores. No RS, as chuvas, embora não volumosas, são recorrentes e colaboram para o desenvolvimento da cultura. Essa situação, entretanto, tem aumentado a pressão de doenças. No PR, as precipitações favoreceram o desenvolvimento da cultura, mas retardaram a colheita e a maturação em algumas regiões. Em GO, a colheita foi iniciada principalmente em áreas irrigadas. As chuvas frequentes têm dificultado as operações de dessecação e a maturação natural, apesar de favorecerem as lavouras nos demais estádios de desenvolvimento. Em MS, a colheita acontece em áreas de várzea e as demais áreas têm apresentado desenvolvimento satisfatório. Em MG, as primeiras lavouras irrigadas começaram a ser colhidas, com boas produtividades sendo alcançadas. As demais áreas, majoritariamente em enchimento de grãos, estão em boas condições. Na BA, a colheita foi iniciada nas áreas irrigadas, com bons rendimentos sendo obtidos. A redução das chuvas durante a semana favoreceu a realização de tratos culturais. Em SP, muitas áreas já entraram em maturação e as condições climáticas continuam a favorecer a oleaginosa. No TO, as condições climáticas têm favorecido o aumento da incidência de doenças, como o mofo-branco e antracnose, nas lavouras mais adiantadas. Porém, essas condições climáticas também favorecem o desenvolvimento da cultura e a colheita se aproxima do início. No MA, a redução das precipitações afeta o desenvolvimento de algumas lavouras no sudoeste do estado. Nas demais regiões, o plantio acompanha a ocorrência das chuvas. No PI, o plantio ainda ocorre no centro-norte do estado e está atrasado devido à irregularidade das chuvas. A maioria das lavouras do sudoeste do estado apresenta boas condições, mas algumas áreas já manifestam sintomas de déficit hídrico. Em SC, a soja se encontra, majoritariamente, nos estádios reprodutivos e em boas condições. No PA, a colheita avança no polo da BR-163 e foi iniciada no de Redenção. Nos polos de Santarém e Paragominas, a regularização das chuvas permitiu um grande avanço da área semeada e a recuperação de lavouras afetadas pelo déficit hídrico anteriormente.

Monitoramento Semanal das Condições das Lavouras

19 de janeiro de 2026

Previsão Agrometeorológica (19/01/2026 a 26/01/2026)


N-NE: As chuvas continuarão regulares e bem distribuídas na região Norte, especialmente no AM, áreas do PA e RO, favorecendo os cultivos de primeira safra. Na região Nordeste, a previsão é de pouca chuva, mas, no Sul do MA, Oeste da BA e Oeste do PI, haverá um cenário mais úmido, com ocorrência de precipitações mais significativas, principalmente, na primeira metade da semana. No geral, as condições serão favoráveis para o desenvolvimento das lavouras no MATOPIBA, permanecendo a condição de restrição hídrica no Semiárido.

CO: Há previsão de chuvas volumosas no Norte de MT, GO e DF, podendo dificultar a colheita da soja em algumas áreas. Na maior parte da região, os bons volumes de chuva favorecerão as lavouras em estádios reprodutivos. Em MS, a previsão é de pouca chuva, mas a umidade no solo deve ser suficiente.


SE: Há um cenário bastante chuvoso para MG, ES e Norte do RJ, o que demandará maior atenção quanto aos riscos por excesso de umidade em algumas lavouras de grãos, em maturação e colheita, e café. Espera-se um tempo mais firme em SP, favorecendo o manejo das áreas. No geral, as condições serão favoráveis para o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra, além da cana-de-açúcar e do café.

S: A previsão é de tempo mais seco e firme, favorecendo o manejo das lavouras. Chuvas fracas e isoladas deverão atingir o litoral e interior de SC a partir de quinta-feira. As temperaturas permanecerão em declínio, na primeira metade da semana, voltando a se elevar em seguida. Com exceção do Sul do RS, a umidade no solo deve ser suficiente para o desenvolvimento das lavouras.

Condições hídricas para as lavouras nas principais regiões produtoras (19/01/2026 a 26/01/2026)



Soja



Milho 1ª Safra

Condição

Favorável

Baixa Restrição (Falta de Chuva)

Fonte: Conab

Fonte: Conab

Estádios

E	Emergência
DV	Desenvolvimento Vegetativo
F	Floração
EG	Enchimento de Grãos
FM	Formação de Maças
M	Maturação
C	Colheita

	PA	TO	MA	PI	BA	MT	MS	GO	MG	SP	PR	SC	RS
Algodão			DV	E/DV	DV	E/DV	DV	DV	E/DV	DV/F/FM			
Arroz		DV/F/EG/M	E/DV			DV/F/EG	F/EG/M/C	DV/F/EG/M/C	DV/F/EG	EG/M/C	DV/F/EG/M/C	DV/F/EG	DV/F
Feijão 1ª				E/DV	DV/F/EG/M/C			F/EG/M	F/EG/M		EG/M/C	DV/F/EG/M/C	DV/F/EG/M/C
Feijão 2ª											E/DV		E
Milho 1ª	E/DV/F/EG		E/DV	E/DV	DV/F/EG			DV/F	DV/F/EG/M	DV/F/EG/M	F/EG/M	F/EG/M	DV/F/EG/M/C
Milho 2ª						E/DV					E/DV		
Soja	E/DV/F/EG	DV/F/EG/M	E/DV/F/EG	DV/F/EG	F/EG/M	EG/M/C	F/EG	DV/F/EG	DV/F/EG/M	F/EG/M	DV/F/EG/M	DV/F/EG	DV/F/EG

Fonte: Conab

Para mais informações

www.gov.br/conab/pt-br/atuacao/informacoes-agropecuarias/safras

*Fonte: Adaptado de Inmet. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/informativos#>

Como citar esta publicação:

CONAB – COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Monitoramento semanal das condições das lavouras. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2026.



INFORMAÇÕES:

WWW.GOV.BR/CONAB

DIPAI@CONAB.GOV.BR



@CONABOFICIAL



@CONAB_OFICIAL



@CONAB_OFICIAL



CONAB



@CONAB