

Monitoramento Semanal das Condições das Lavouras

02 de março de 2026

Destaques da Semana

 Arroz	 Feijão 1ª Safra	 Milho 1ª Safra	 Soja
9,2% colhido. No RS, as lavouras encontram-se em sua maioria em floração, enchimento de grãos e maturação, enquanto a colheita ainda segue lenta, alcançando 4% da área cultivada, e apresentando bom rendimento e boa qualidade dos grãos colhidos. Em SC, a colheita avança nas principais regiões produtoras, principalmente, nas áreas do Norte e Litoral. Em algumas áreas ocorreram alto volume de precipitações, diminuindo o ritmo da colheita e a qualidade do grão a ser colhido, mas, na maioria das regiões, as condições permanecem favoráveis. Em GO, nas áreas de tabuleiros da região Leste, o arroz foi colhido com bons rendimentos. Na região de São Miguel do Araguaia, a colheita avança de forma escalonada com boas produtividades. No MA, o plantio de sequeiro foi finalizado e as lavouras estão em pleno desenvolvimento vegetativo, com áreas iniciando o florescimento, em boas condições. No TO, a colheita na Lagoa da Confusão tem avançado conforme a maturação. A maioria das lavouras se encontram em enchimento de grãos e maturação, enquanto, em Formoso do Araguaia, as produtividades variam em função das condições climáticas ocorridas no ciclo. Em MT, a colheita segue avançando conforme a maturação das lavouras. A qualidade dos grãos colhidos é considerada boa. No PR, as lavouras estão em boas condições, com a maioria das áreas em enchimento de grãos e maturação. Houve avanço significativo da área colhida.	60,7% colhido. Em MG, a colheita está em fase final, com boas produtividades, mas com redução de qualidade devido aos períodos úmidos em lavouras em ponto de colheita. No PR, a colheita está praticamente concluída, restando cerca de 1% da área. Na BA, as chuvas ocorreram em grandes volumes na última semana, o que dificultou o avanço da colheita e reduziu a qualidade de alguns lotes do grão que estavam em secagem pré-colheita. Em GO, a colheita foi finalizada na última semana, confirmando a boa produtividade média, porém com certa depreciação na qualidade dos grãos, devido ao excesso de umidade na maturação e colheita. No RS, as chuvas no Planalto Superior melhoraram as condições das lavouras, que são de plantio mais tardio e ainda estão em fase de desenvolvimento. Nas outras regiões, a colheita avança lentamente. Em SC, pouco mais de 64% da área está colhida. A qualidade dos grãos é considerada boa. Observa-se, pontualmente, impacto por déficit hídrico em lavouras de plantio mais tardio que ainda estão em enchimento de grãos.	24,9% colhido. Em MG, a colheita ocorre em áreas destinadas a produção de sementes. O excesso de chuvas tem aumentado a ocorrência de mancha de bipolaris em algumas áreas. No RS, a colheita avança e foi favorecida pelo tempo estável. Na BA, a colheita avança no estado e as chuvas favoreceram as áreas em enchimento de grãos. No PI e MA, o plantio foi finalizado. As frequentes precipitações favorecem o desenvolvimento do cereal. No PR, a colheita foi favorecida pelo tempo seco e as produtividades continuam satisfatórias. Em SC, a redução das chuvas favoreceu a maturação e a colheita.  Milho 2ª Safra 64,9% semeado. Em MT, o plantio avança e as áreas semeadas são favorecidas pelas chuvas frequentes. No PR, a semeadura se aproxima da metade da área estimada, mas a redução das chuvas provocou paralisação pontual da operação em algumas áreas. Em MS, o tempo firme permitiu grande avanço na área plantada. Em GO, o plantio registrou significativo progresso na semana, mesmo com os altos volumes de chuva registrados. Em MG, o plantio segue atrasado devido ao excesso de chuvas e, em algumas áreas, as lavouras apresentam amarellecimento devido à falta de luminosidade. O plantio ocorre em todo o estado e em algumas regiões será realizado fora da janela ideal de cultivo. No MA e PI, o plantio avança nas áreas recém-colhidas de soja e as lavouras são favorecidas pelas chuvas regulares. No PA, as chuvas frequentes favorecem o desenvolvimento inicial do cereal.	41,7% colhido. Em MT, a colheita avança e, apesar das precipitações frequentes, a qualidade do grão está sendo preservada dentro dos padrões. No RS, a colheita se aproxima do início e as chuvas ocorridas desde 15/02 limitaram as perdas por estresse hídrico. No PR, a colheita acelerou na semana e foi favorecida pelo tempo seco e as altas temperaturas. Em GO, as chuvas frequentes limitaram o avanço na área colhida, principalmente, nas regiões Leste e Oeste. Em MS, o tempo seco permitiu um grande avanço na área colhida e as áreas que não estão em maturação têm umidade suficiente para finalizar o ciclo. Em MG, o clima chuvoso dificultou e impediu um avanço na colheita. Algumas áreas dessecadas já apresentam grãos avariados devido ao excesso de umidade. Na BA, a colheita das áreas irrigadas se aproxima do fim e avança nas áreas de sequeiro. Em SP, as chuvas continuam atrasando a colheita e as produtividades alcançadas são consideradas satisfatórias. No TO, a colheita avança no estado, apesar das paralisações frequentes ocasionadas pelas chuvas. No MA, a colheita avança nos Gerais de Balsas, mas continua atrasada devido ao atraso no plantio. Nas demais regiões, as chuvas favorecem o desenvolvimento da cultura. No PI, a colheita começa a ganhar ritmo e as produtividades têm superado as estimativas iniciais. Em SC, o plantio da safrinha foi finalizado e as primeiras áreas colhidas apresentam rendimentos variados. No PA, a colheita foi finalizada no polo da BR-163 e avança no de Redenção. Em Paragominas e Santarém, as chuvas frequentes favorecem o desenvolvimento da cultura e a colheita já ocorre em Rondon do Pará.

Monitoramento Semanal das Condições das Lavouras

02 de março de 2026

Previsão Agrometeorológica (02/03/2026 a 09/03/2026)



NE: São previstas chuvas em bons volumes na maior parte da região Norte, com exceção de RR e do Noroeste do PA, onde praticamente não haverá precipitações. No MA, PI, CE, Sertões da PB e PE, além do Norte e Oeste da BA, há previsão de chuvas intensas, com volumes que podem superar 80 mm. No Matopiba, a alta umidade no solo continuará beneficiando o desenvolvimento das lavouras, mas o excesso de chuvas pode dificultar a colheita da soja em algumas áreas no TO, MA e PI.

CO: Há previsão de chuvas fortes, com volumes maiores que 80 mm, principalmente, em MT e no Centro-Oeste de GO. A umidade no solo continuará favorecendo o desenvolvimento dos cultivos, mas o excesso de chuvas pode afetar a colheita da soja e o plantio do milho 2ª safra em algumas áreas. No Sudoeste de MS, apesar dos baixos acumulados de chuva, as condições serão favoráveis para os cultivos.

SE: São previstos baixos acumulados de chuva em praticamente toda a região ao longo da semana, com os maiores volumes previstos para o ES, Noroeste e Triângulo de MG e Norte de SP. Essa redução no volume de chuvas será favorável para a maturação e colheita dos cultivos de 1ª safra e para a semeadura dos cultivos de 2ª safra. No geral, a umidade no solo será suficiente para o desenvolvimento dos cultivos de grãos e da cana-de-açúcar, assim como para a granação do café.

S: Há previsão de pouca chuva, com os maiores volumes previstos no Sul do RS, e altas temperaturas na região, o que favorecerá os cultivos de 1ª safra em maturação e colheita. No entanto, persistirá a restrição hídrica à soja em floração e enchimento de grãos, em parte do RS, ampliando a restrição para o milho 2ª safra em algumas regiões do PR.

Condições hídricas para as lavouras nas principais regiões produtoras (02/03/2026 a 09/03/2026)



Condição	
■	Favorável
■	Baixa Restrição (Falta de Chuva)

Fonte: Conab

Fonte: Conab

Estádios

E	Emergência
DV	Desenvolvimento Vegetativo
F	Floração
EG	Enchimento de Grãos
FM	Formação de Maças
M	Maturação
C	Colheita

	PA	TO	MA	PI	BA	MT	MS	GO	MG	SP	PR	SC	RS
Algodão			DV	DV	DV/F/M	DV/F/M	DV	DV/F/EG	DV/F	F/M/M			
Arroz		DV/F/EG/M/C	DV/F			F/EG/M/C	F/EG/M/C	M/C	EG/M	M/C	DV/F/EG/M/C	EG/M/C	DV/F/EG/M
Feijão 1ª				DV/F/EG	EG/M/C				C		C	F/EG/M/C	DV/F/M/C
Feijão 2ª					E/DV				E/DV		E/DV/F/EG	E/DV	E/DV/F
Milho 1ª	F/EG/M/C		DV/F	DV/F/EG	F/EG/M/C			EG/M	EG/M	F/EG/M/C	EG/M/C	EG/M/C	DV/F/EG/M/C
Milho 2ª	E/DV	E/DV	E/DV	E/DV	DV	E/DV	E/DV	E/DV	E/DV		E/DV		
Soja	DV/F/EG/M/C	EG/M/C	DV/F/EG/M/C	EG/M/C	EG/M/C	M/C	EG/M/C	EG/M/C	EG/M/C	F/EG/M/C	EG/M/C	F/EG/M/C	F/EG/M
Sorgo					E/DV			E	E/DV				

Fonte: Conab

Para mais informações
www.gov.br/conab/pt-br/atuacao/informacoes-agropecuarias/safras

*Fonte: Adaptado de Inmet. Disponível em:
<https://portal.inmet.gov.br/informativos#>

Como citar esta publicação:
CONAB – COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Monitoramento semanal das condições das lavouras. Brasília, DF, 02 de março de 2026.



INFORMAÇÕES:

WWW.GOV.BR/CONAB
DIPAI@CONAB.GOV.BR

