

Contribuições da Consulta Pública - PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Crianças e Adolescentes - Módulo 2 - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
08/10/2023	Interessado no tema	Boa	Não	Não
09/10/2023	Profissional de saúde	Muito boa	Quero ajuda do governo em relação ao processo na defensoria pública contra o INSS, pois estou há sete meses sem receber salários, mesmo apresentar laudo psiquiátrico e médica do trabalho me dando inapto	Quero voltar a receber meu auxílio doença pelo INSS vcs podem me ajudar um.
09/10/2023	Interessado no tema	Regular	nao	nao
10/10/2023	Interessado no tema	Boa	Não	Não
17/10/2023	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não
27/10/2023	Empresa	Muito boa	Contribuição apresentada no anexo.	NA
29/10/2023	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito ruim	1) permitir o uso do Zolgensma aos pacientes pré sintomáticos, pois esse é o melhor momento para tratar c/ melhores resultados, 2) permitir a migração dos tratamentos. Uma vez diagnosticada a AME o médico deve usar o medicamento disponível, p/a a doença não avançar, mas se depois o SUS tiver o Zolgensma e essa for uma opção melhor de tratamento então q seja permitida a migração., 3) Que o critério para interrupção do tratamento continue como está.	3) Que o critério para interrupção do tratamento continue como está, comparando-se a medição feita antes do inicio tratamento com a medição atual, pois a forma proposta não leva em consideração outras questões q podem influenciar na medição, como uma viagem longa até o centro de referência q pode afetar a respiração do paciente, etc.
30/10/2023	Profissional de saúde	Boa	Sugiro rever a indicação para pacientes pré-sintomáticos. O tratamento proativo faz completo sentido e temos evidências disponíveis.	Entendo que o critério de exclusão relacionado à disfagia precisa ser revisto.
30/10/2023	Profissional de saúde	Muito boa	Sugiro revisar algumas tabelas que apresentam erros de digitação. Na página 11, parágrafo 7, na segunda linha, sugiro fazer a correção do texto. Em relação a profilaxia de P. Jeroveci, a dose do SMXTMP poderia ser dose 5-10 mg/kg/diaria, c 1x/dia ,como uma estratégia alternativa para a adesão?! Ver guideline pediátrico CDC	Gostaria de parabenizar a equipe organizador a deste PCDT pela qualidade técnica e capacidade de organização dos temas.