

Contribuições da Consulta Pública - PCDT para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) Oral à Infecção pelo HIV - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
02/09/2024	Profissional de saúde	Boa	Não	Nao
04/09/2024	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Eu acho que a prep deveria ser mais divulgada porque inúmeras pessoas que eu conheço nunca ouviram falar
07/09/2024	Profissional de saúde	Muito boa	Não.	Sugiro ofertar vacina contra hepatite A para usuários da PREP que tem IgM e IgG não reagentes para HAV.
07/09/2024	Profissional de saúde	Boa	Não! Mas vou ler com mais calma!	No momento não
11/09/2024	Paciente	Muito boa	I, , Primeiramente gostaria de trazer a realidade do CTA do Município de Osasco, onde, devido a péssima gestão, descaso do atual governo com a Saúde da população LGBTQIAPN+ fruto de orientações políticas retrogradadas e falta de profissionais, muitas pessoas enfrentam dificuldades para acessar a PrEP, por exemplo, tendo que aguardar meses após a primeira visita, pois não seguem a orientação de ofertar o medicamento assim que o paciente chega, mesmo este tendo o perfil pra uso. A partir disso importante haver orientação técnica mais clara sobre este ponto, pois esta realidade, que coloca várias pessoas em risco, pode ser a realidade de varios municipios que sucateiam seus serviços em IST', s. Acrescento sobre a questão da busca ativa e acompanhamento de pessoas usuárias de PreP, pois devido ao sucateamento já citado, muitas pessoas abandonam a prevenção. Creio que uma orientação técnica sobre busca ativa, inclusive de forma virtual, possa reduzir os índices de abandono e consequentemente de contaminação pelo vírus HIV e consequentemente obrigar os municípios a readequarem os serviços poara estarem mais próximos das pessoas atendidas.	Haveria possibilidade de acrescentar, caso exista, sobre uso da PrEP em pacientes com MonkeyPox? Se houver creio que seja importante.
13/09/2024	Interessado no tema	Muito boa	Não	A abordagem das práticas sexuais de risco, como o uso de drogas no contexto sexual, e a importância da identificação e acompanhamento de indivíduos com outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), são cruciais para uma estratégia de prevenção abrangente, e como o assunto ainda é um tabu, deve-se levar em questão as discussões publicas de tais assuntos

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
14/09/2024	Interessado no tema	Muito boa	A minha proposta de contribuição visa integrar inúmeros esforços de diferentes agentes , sociais para promover um maior zelo pela integridade da população brasileira e, especialmente, do , público vulnerável a contrair diferentes IST's. Demandaria dos veículos de informação uma via para , propagar informação técnica e verídica por meio da ética, que combinaria junto ao Ministério da Saúde, um documento básico para ser divulgado, promovendo a promoção e prevenção de saúde, além da , divulgação de mecanismos para o tratamento da doença e seu respectivo meio de contato para o público , portador de doença ter acesso a um tratamento imediato. Demandaria maiores esforços a melhorar a , estrutura básica das APS para receber e promover o cuidado com esse público, com a disposição de , exames e tratamentos profiláticos.	Não.
14/09/2024	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não
14/09/2024	Profissional de saúde	Muito boa	Do ponto de vista técnico, a eficácia é bem documentada, com até 95% de proteção quando há adesão correta ao tratamento. Ademais, a inclusão de autotestes de HIV e a opção da PrEP sob demanda facilitam ainda mais o acesso, tornando essa estratégia uma ferramenta fundamental na luta contra o HIV. No aspecto ético, a PrEP ajuda a garantir o direito à saúde para todos, isso inclui adolescentes, que podem iniciar o tratamento sem a necessidade de autorização dos pais, assegurando privacidade e proteção. Tal fato reforça a ideia de equidade no sistema de saúde, oferecendo a mesma chance de prevenção para todos. Socialmente, a PrEP também é importante para combater o estigma e a discriminação relacionados ao HIV. Ao focar em populações vulneráveis, como pessoas pretas e pardas, a tecnologia ajuda a reduzir as desigualdades no acesso à saúde. A incorporação dessa estratégia no SUS não só diminui a transmissão do HIV, mas também ajuda a garantir direitos e inclusão social, especialmente para aqueles que mais precisam.	Não
14/09/2024	Paciente	Muito boa	não	não

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
16/09/2024	Profissional de saúde	Muito boa	GOSTARIA DE SUGERIR QUE HOUVESSE UM TÓPICO NO NOVO PCDT ABORDANDO OS CASOS DE PACIENTE EM USO DE PREP DIÁRIA QUE TIVERAM EXPOSIÇÕES SEXUAIS DESPROTEGIDAS MAS QUE FALHARAM EM ALGUM DIA A PREP NA SEMANA DA EXPOSIÇÃO. QUAIS SERÃO OS CRITÉRIOS PARA CONSIDERAR A FALHA COM RISCO PARA INFECÇÃO DO HIV E NECESSIDADE DE PEP? POR EXEMPLO: PACIENTE COM EXPOSIÇÃO SEM PRESERVATIVO NA QUARTA FEIRA E ESQUECEU DE TOMAR A PREP NO DIA DA EXPOSIÇÃO (MAS TOMOU NA TERÇA E NA QUINTA), NESTES CASOS QUAIS OS CRITÉRIOS PARA CONSIDERAR A PEP? OU ESTE PACIENTE APENAS PRECISA CONTINUAR SUA PREP DIÁRIA E JÁ ESTARIA PROTEGIDO? OUTRO EXEMPLO SERIA UM PACIENTE COM EXPOSIÇÃO QUE ESQUECEU DE TOMAR A PREP NO DIA ANTERIOR, MAS NO DIA DA EXPOSIÇÃO TOMOU APÓS A RELAÇÃO. AS CONCENTRAÇÕES DA MEDICAÇÃO USADA NOS OUTROS DIAS SERIA SUFICIENTE PARA GARANTIR A PROTEÇÃO MESMO FALHANDO A PREP UM DIA ANTES DA RELAÇÃO? (ABORDAR NESSE TÓPICO TANTO HOMEM CIS/TRANS COMO MULHER CIS/TRANS).	NENHUM
17/09/2024	Profissional de saúde	Muito boa	Sugiro considerar os estudos que mencionam não existir impactos clínicos importantes na ampliação dos intervalos entre as consultas de PrEP. Podendo trazer benefícios para os usuários com boa adesão, quando ampliado o intervalo para 6 meses. , , , Tenho dúvida quanto ao tempo a ser considerado para a descontinuidade da PrEP (1 semana, 1 mês?), sugiro também deixar o texto mais claro sobre isso.	Não
18/09/2024	Profissional de saúde	Boa	Vimos por meio deste documento registrar a solicitação de nova retirada da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) para o pacientes, devido à perda dos medicamentos em função de roubo ou furto., , O paciente apresentará o Boletim de Ocorrência, realização de um novo teste de HIV, no qual consta a descrição do incidente. Com base neste documento, autorizamos a reposição dos frascos faltantes para garantir a continuidade do tratamento até o próximo retorno.	Não
18/09/2024	Empresa	Muito boa	Não	Sim. Conforme anexo.

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
18/09/2024	Profissional de saúde	Boa	Explicação:, Nas Unidades Distribuidoras de Medicamentos das grandes áreas urbanas é comum ter ocorrências de perda do(s) frasco(s) recém dispensado ao usuário, por furto, roubo ou algum acidente que inviabiliza a utilização do medicamento. Como é necessário que a rede de saúde remova as barreiras de acesso às populações, de modo a acolhê-las na sua integralidade e individualidade, na garantia de seus direitos à saúde de qualidade, o ideal é dispensarmos novamente a quantidade aviada na primeira dispensação ao usuário. Deste modo, é interessante inserir uma observação de que o seguimento clínico é quadrimestral (a cada 120 dias) e as dispensações subsequentes ocorrerão de acordo com a capacidade de fornecimento da UDM. E, que se deve considerar a manutenção de um estoque mínimo para a dispensação adicional dos medicamentos ao usuário mediante ocorrência de perda dos frascos, para garantir a continuidade do tratamento. , Sugestão de alteração:, 9. SEGUIMENTO DO USUÁRIO DE PrEP, 9.1. Acompanhamento clínico e laboratorial , (...), Usuários que, por ventura, não recebam o quantitativo integral da PrEP para o tempo de profilaxia solicitados pelo profissional de saúde, poderão receber em outro momento, sem a necessidade de um novo TR de HIV, desde que não ultrapassada a validade do formulário, para complementar o tempo indicado da profilaxia. , Considerar uma reserva mínima de medicamentos, de acordo com o histórico da UDM, para possível dispensação adicional ao usuário mediante ocorrência de perda dos frascos por furto, roubo ou acidente que inviabilize a utilização do medicamento, para que seja garantida a continuidade da profilaxia sem prejuízo ao indivíduo.,	Não