

## 12ª Reunião Extraordinária da Conitec

Data e horário: 29 de novembro de 2022 - 9h às 18h

1. Apreciação inicial da atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hepatite B e Coinfecções.  
**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.**
2. Apresentação das contribuições de consulta pública dos temas:
  - a) Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Carcinoma de Mama;  
**Recomendação final de atualização.**
  - b) mesilato de lomitapida para adjuvante a uma dieta pobre em lipídeos e outros tratamentos hipolipemiantes para reduzir o LDL-colesterol em pacientes adultos com hipercolesterolemia familiar homozigótica;  
**Recomendação final de não incorporação.**
  - c) betaína anidra para tratamento de pacientes com homocistinúria com deficiências ou defeitos da cistationina-beta-sintetase, não responsivos a piridoxina (B6);  
**Recomendação final de não incorporação.**
  - d) espectrometria de massas em tandem para detecção da doença deficiência de acil-CoA desidrogenase de cadeia média - MCADD no Programa Nacional de Triagem Neonatal.  
**Recomendação final de incorporação.**
3. Apreciação inicial da elaboração do Protocolo de Uso do Blinatumomabe para Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) B derivada pediátrica em primeira recidiva medular de alto risco.  
**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.**
4. Apreciação inicial da Vacina Covid-19 (P/fizer/BioNTech) para imunização ativa de crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos incompletos para a prevenção da Covid-19.  
**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.**
5. Apreciação inicial da Vacina pneumocócica conjugada 13 valente para imunização de crianças com até cinco anos de idade para a prevenção de doença pneumocócica invasiva e pneumonia.  
**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.**
6. Apreciação inicial da ampliação de uso do procedimento Peptídeos Natriuréticos tipo B (BNP e NT-ProBNP) para o diagnóstico da insuficiência cardíaca em pacientes de 18 a 44 anos.  
**Será pautada na próxima reunião.**

7. Apreciação inicial da empagliflozina para o tratamento de pacientes com Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Preservada e Levemente Reduzida (FEVE>40%) e classes funcionais NYHA II e III.

**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.**