

140ª Reunião Ordinária Conitec

Data e horário: 7 de maio de 2025 - 9h às 18h

8 de maio de 2025 - 9h às 18h

Comitê de Medicamentos

7 de maio

1. Apreciação inicial da vacina adsorvida hexavalente acelular (DTaP/HB/VIP/Hib) para a prevenção contra difteria, tétano, *pertussis* acelular, hepatite B (rDNA), poliomielite inativada 1, 2 e 3 (VIP) e *Haemophilus influenzae* b (conjugada) será utilizada nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais - Crie, em indicações específicas, até a idade de 6 anos, 11 meses e 29 dias.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.
2. Apreciação inicial do sulfato de selumetinibe para o tratamento de pacientes pediátricos a partir de 2 anos de idade que apresentem neurofibromas plexiformes sintomáticos e inoperáveis.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.
3. Apreciação inicial do micofenolato de mofetila/ micofenolato de sódio para o tratamento da síndrome nefrótica em crianças e adolescentes.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.
4. Apreciação inicial do rituximabe para o tratamento da síndrome nefrótica em crianças e adolescentes.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.

8 de maio

5. Esclarecimento sobre o ravulizumabe para o tratamento de pacientes com Síndrome Hemolítico-Urêmico atípia (SHUa).
Retirado de pauta.
6. Apreciação inicial do implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel 68mg para contraceção de adolescentes de 14 a 17 anos.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.

7. Apreciação das contribuições de consulta pública dos seguintes temas:
 - a. dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel para pacientes com endometriose com contraindicação ou não adesão aos contraceptivos orais combinados; e
Recomendação final de incorporação.
 - b. progestágenos orais para o tratamento de endometriose.
Recomendação final de incorporação do desogestrel e de não incorporação de acetato de noretisterona (10 mg) e dienogeste.
8. Apreciação inicial da semaglutida para o tratamento da obesidade graus II e III, sem diabetes, com idade a partir de 45 anos e com doença cardiovascular estabelecida.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.
9. Apreciação inicial da liraglutida para o tratamento da obesidade e diabetes mellitus tipo 2.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.