

# GUIA DE ORIENTAÇÃO AO PACIENTE

## Metilprednisolona, Ciclofosfamida, Ciclosporina e Imunoglobulina Humana

Este é um guia sobre o medicamento que você está recebendo gratuitamente pelo SUS.  
Seguindo suas orientações você terá mais chance de se beneficiar com o tratamento.  
O medicamento é utilizado no tratamento de anemia hemolítica autoimune.

### 1 DOENÇA

- Anemia hemolítica autoimune é uma doença na qual ocorre a destruição das hemácias pelo próprio organismo. Às vezes a doença pode não ter sintomas, mas a maioria dos pacientes apresenta cansaço, dor de cabeça, falta de ar, palidez ou pele amarelada.

### 2 MEDICAMENTO

- Estes medicamentos não curam a doença, porém melhoram a anemia e seus sintomas.

### 3 GUARDA DO MEDICAMENTO

- Guarde o medicamento protegido do calor, ou seja, evite lugares onde exista variação de temperatura (cozinha e banheiro). Conserve o medicamento embalagem original.
- A imunoglobulina humana deve ser guardada na geladeira, mas não deve ser congelada.

### 4 ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO

- Tome as cápsulas ou drágeas sem mastigar ou abrir com ajuda de um líquido, de preferência durante as refeições.
- Tome exatamente a dose e nos dias que o médico indicou, estabelecendo um mesmo horário todos os dias.
- Em caso de esquecimento de uma dose tome assim que lembrar. Não tome a dose em dobro para compensar a que foi esquecida.
- A imunoglobulina humana deve ser aplicada em ambiente hospitalar.

### 5 REAÇÕES DESAGRADÁVEIS

- Apesar dos benefícios que o medicamento pode trazer, é possível que apareçam algumas reações desagradáveis, que variam de acordo com o medicamento, tais como dor de cabeça, náuseas, vômitos, diarreia, perda de cabelo, perda de apetite, reações alérgicas, febre, calafrios, falta de ar.
- Se houver algum destes ou outros sinais/sintomas, comunique-se com o médico ou farmacêutico.
- Maiores informações sobre reações adversas constam no Termo de Esclarecimento e Responsabilidade, documento assinado por você ou pelo responsável legal e pelo médico.

### 6 USO DE OUTROS MEDICAMENTOS

- Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento do médico ou orientação de um profissional de saúde.

### 7 PARA SEGUIR RECEBENDO O MEDICAMENTO

- Retorne à farmácia a cada mês, com os seguintes documentos:
  - Receita médica atual
  - Cartão Nacional de Saúde ou RG
  - Exames:

Para ciclofosfamida: hemograma e plaquetas semanalmente no primeiro mês, quinzenalmente no segundo e terceiro meses e, após, mensalmente ou se mudança nas doses. ALT, AST, GGT e bilirrubinas no mesmo intervalo que do hemograma nos primeiros 6 meses e, após, trimestralmente. Anemia Hemolítica Autoimune Anemia Hemolítica Autoimune Para ciclosporina: níveis séricos do fármaco com intervalo a critério médico. Creatinina a cada 2 semanas nos primeiros 3 meses de tratamento e, após, mensalmente.

Para imunoglobulina humana: creatinina, hemograma com intervalos a critério médico.

### 8 EM CASO DE DÚVIDA

- Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar qualquer atitude, procure orientação com o médico ou farmacêutico do SUS.

### 9 OUTRAS INFORMAÇÕES

---

---

---

---

---

---

---

---

Se, por algum motivo, não usar o medicamento, Devolva-o à farmácia.

Para Imunoglobulina Humana:

Levar caixa de isopor para transportar o medicamento da farmácia até sua casa e guardá-lo imediatamente na geladeira.