

DATA:	ALERGIA:	Preencha os dados completos do(a) paciente OU cole aqui a etiqueta de identificação	
NOME:			
DATA DE NASCIMENTO:	NOME DA MÃE:		
PRONTUÁRIO:	ENFERMARIA:		

PREPARO DA SOLUÇÃO DE PENICILINA V ORAL (10.000ui/mL):

Penicilina V oral (80.000ui/mL): aspirar 1 mL da solução e diluir em 7 mL de água filtrada = **Penicilina V oral (10.000ui/mL)**

PREPARO DA SOLUÇÃO DE PENICILINA V ORAL (1.000ui/mL):

Penicilina V oral (10.000ui/mL): aspirar 1 mL da solução e diluir em 9 mL de água filtrada = **Penicilina V oral (1.000ui/mL)**

PLANO TERAPÊUTICO	HORÁRIOS
1. Penicilina V oral (1.000 Unidades Internacionais/mL) – 0,1 mL Via Oral.	
2. Penicilina V oral (1.000 Unidades Internacionais/mL) – 0,2 mL Via Oral, 15 minutos após item 1	
3. Penicilina V oral (1.000 Unidades Internacionais/mL) – 0,4 mL Via Oral, 15 minutos após item 2	
4. Penicilina V oral (1.000 Unidades Internacionais/mL) – 0,8 mL Via Oral, 15 minutos após item 3	
5. Penicilina V oral (1.000 Unidades Internacionais/mL) – 1,6 mL Via Oral, 15 minutos após item 4	
6. Penicilina V oral (1.000 Unidades Internacionais/mL) – 3,2 mL Via Oral, 15 minutos após item 5	
7. Penicilina V oral (1.000 Unidades Internacionais/mL) – 6,4 mL Via Oral, 15 minutos após item 6	
8. Penicilina V oral (10.000 Unidades Internacionais/mL) – 1,2 mL Via Oral, 15 minutos após item 7	
9. Penicilina V oral (10.000 Unidades Internacionais/mL) – 2,4 mL Via Oral, 15 minutos após item 8	
10. Penicilina V oral (10.000 Unidades Internacionais/mL) – 4,8 mL Via Oral, 15 minutos após item 9	
11. Penicilina V oral (80.000 Unidades Internacionais/mL) – 1 mL Via Oral, 15 minutos após item 10	
12. Penicilina V oral (80.000 Unidades Internacionais/mL) – 2 mL Via Oral, 15 minutos após item 11	
13. Penicilina V oral (80.000 Unidades Internacionais/mL) – 4 mL Via Oral, 15 minutos após item 12	
14. Penicilina V oral (80.000 Unidades Internacionais/mL) – 8 mL Via Oral, 15 minutos após item 13	
15. Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 Unidades (Frasco-Ampola). Administrar 1.200.000, Unidades em cada nádega POR VIA INTRAMUSCULAR , após administração do item 14 .	