

	Plano Terapêutico	PLT.MED-OBS.017 - Página 1/1
	INFECÇÃO PUERPERAL	Emissão: 18/08/2016
		Revisão Nº: 04 – 31/07/2018

DATA:	ALERGIA:	Preencha os dados completos do (a) paciente OU cole aqui a etiqueta de identificação	
NOME:			
DATA DE NASCIMENTO:	NOME DA MÃE:		
PRONTUÁRIO:	ENFERMARIA:		

PLANO TERAPÊUTICO	HORÁRIOS
1) Dieta ZERO. ATÉ 2ª ORDEM.	
2) Soro Fisiológico 0,9%. Administrar 2000 ml, EndoVenoso , 42 gotas/ minuto.	
3) Soro Glicosado 5% 500ml. Administrar 1000 ml, EndoVenoso , 42 gotas/ minuto.	
4) Clindamicina 150 mg/ml. AMPOLA com 4ml. Diluir 4ml (600mg) em 100 ml de Soro Fisiológico 0,9%. Administrar, EndoVenoso , em 20 minutos. Fazer de 6/6 horas.	
5) Gentamicina 40 mg/ml. AMPOLA com 2ml. Diluir 6ml (240mg) em 250mL de Soro Fisiológico 0,9%. Administrar, EndoVenoso , em 1 hora Fazer de 24/24 horas.	
6) Dipirona 500 mg/ml, AMPOLA com 2ml. Diluir 2 ml (1g) em 18 ml de Água Destilada. Administrar, EndoVenoso, LENTO, SE DOR OU TEMPERATURA ≥ 37,8° C, ATÉ NO MÁXIMO DE 6/6 horas. ATENÇÃO: SE PACIENTE ALÉRGICA A DIPIRONA E OUTROS AINES, SUSPENDER ESSE ITEM E MANTER O ITEM 7.	
7) Paracetamol 500 MG, COMPRIMIDO. Administrar 1 comprimido (500mg) de 6/6 horas, Via Oral, SE DOR OU TEMPERATURA ≥ 37,8°C. NA FALTA DESTA APRESENTAÇÃO, FAZER: Paracetamol 200mg/ml, GOTAS. Administrar 50 gotas (500mg), Via Oral, de 6/6 horas, SE DOR OU TEMPERATURA ≥ 37,8° C. FAZER SOMENTE SE NÃO FIZER O ITEM 6.	
8) Providenciar HEMOGRAMA COMPLETO, SUMÁRIO DE URINA, URINOCULTURA, URÉIA, CREATININA, TGO, TGP, E VDRL.	
9) ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL.	
10) Extração de leite humano.	
11) Curva de pulso e temperatura.	
12) Checar sinais vitais de 6/6 horas e cuidados gerais.	
13) Encaminhar ao 2º Andar.	
14)	
15)	
16)	
17)	

OBS 1: SOLICITAR ULTRASSONOGRRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL, SE SUSPEITA DE COLEÇÃO DE PAREDE.