

	Plano Terapêutico		PLT.MED-SUP.001 Página 1/1
	PROFILAXIAS APÓS EXPOSIÇÃO DE RISCO		Emissão: 27/12/2016
			Revisão Nº: 02 – 17/10/2018

DATA:	ALERGIA:	Preencha os dados completos do(a) paciente OU cole aqui a etiqueta de identificação	
NOME:			
DATA DE NASCIMENTO:	NOME DA MÃE:		
PRONTUÁRIO:	ENFERMARIA:		

PLANO TERAPÊUTICO	HORÁRIOS
1) Azitromicina 500mg comprimido. Administrar 1 g (2 comprimidos) por Via Oral, em dose única.	
2) Ceftriaxona 1g, frasco-ampola. Diluir 1 g (1 Frasco-Ampola) em 10 mL de água destilada, fazer 2,5mL da solução por via IntraMuscular.	
3) Penicilina G Benzatina 1.200.000 Unidades (300.000 Unidades/mL), Frasco-Ampola (4mL). Fazer 2.400.000 Unidades (2 Frascos-Ampola – 8 mL) por via IntraMuscular profunda.	
4) Levonorgestrel 0,75mg comprimido. Administrar 1,5 mg (2 comprimidos) por Via Oral, em dose única.	
5) Imunoglobulina Humana Anti-Hepatite B. Fazer _____ mL por via IntraMuscular, em dose única. (0,06 mL/Kg – ampola 200 Unidades Internacionais). VER OBSERVAÇÃO 1	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	

OBS1.: Até 72h – máximo 14 dias.