



EDITAL Nº 01/2024 – RESIDÊNCIA MÉDICA

CADERNO QUESTIONÁRIO

PROVA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA EM OTORRINOLARINGOLOGIA (R4)

Prezado(a) Participante,

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, a eficiência da fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável obediência aos itens do Edital e aos que seguem:

01. Deixe sobre a carteira **APENAS caneta transparente e documento de identidade**. Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira, em saco entregue para tal fim. Os **celulares devem ser desligados**, antes de guardados. O candidato que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame.
02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala, na capa deste Caderno de Prova.
03. Antes de iniciar a resolução das 20 (vinte) questões, verifique se o Caderno está completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos após o início da prova.
04. Ao receber a Folha de Respostas, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha de Respostas.
05. A prova tem duração de **2 (duas) horas** e o tempo mínimo de permanência em sala de prova é de **1 (uma) hora**.
06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito.
07. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha de Respostas, no campo destinado à assinatura, e de entregar o Caderno de Prova e a Folha de Respostas ao fiscal de sala.

Boa prova!

Fortaleza, 15 de dezembro de 2024

Inscrição

Sala

1. Paciente de 7 anos, com histórico de uso frequente de antimicrobianos devido otites e rinossinusites de repetição, chega a UBS com quadro de tosse e durante o exame físico percebe-se que a ausculta cardíaca é mais audível na linha média e à direita. Qual seria a principal hipótese diagnóstica da causa base das infecções desta criança?

- (A) Discinesia ciliar primária.
- (B) Fibrose cística.
- (C) Imunodeficiência primária.
- (D) Neutropenia cíclica da infância.

2. Em relação as rinites NÃO ALÉRGICAS, assinale a alternativa correta:

- (A) A Rinite Eosinofílica Não Alérgica (RENA) apresenta eosinofilia nasal e IgE sérica aumentada.
- (B) Os sintomas da rinite não alérgica são diversos dos da rinite alérgica.
- (C) A fisiopatologia é distinta para cada tipo de rinite não alérgica e em alguns casos ainda não elucidados.
- (D) A rinite vasomotora ou idiopática apresenta dosagem de IgE aumentada.

3. Paciente masculino, 20 anos, refere intensa ardência bucal há 24 horas, febre e dificuldade de engolir. Nega alergias, uso de medicamentos e episódios anteriores semelhantes, mas cita que sua sobrinha de 4 anos está com um quadro parecido. Ao exame da cavidade oral observam-se algumas pequenas vesículas e várias minúsculas áreas ulceradas com halo eritematoso na gengiva, rebordo alveolar e palato, além de edema, hiperemia e pequenos pontos de sangramento na gengiva marginal. Assinale a melhor hipótese diagnóstica?

- (A) Herpangina pelo vírus Cocksackie A.
- (B) Primoinfecção pelo vírus Herpes Simples tipo I.
- (C) Recorrência do vírus varicela-zoster.
- (D) Manifestação oral do vírus do sarampo.

4. Paciente masculino, 25 anos, chega a UPA, referindo cefaleia e náuseas há alguns dias e recentemente febre, além de diversas lesões no lábio e gengiva, observa-se ao exame hiperemia conjuntival importante, lesões bolhosas menores de 3 cm acometendo menos de 10% da superfície corporal e algumas lesões em alvo. Qual a melhor hipótese e achado que define, entre as opções abaixo, o diagnóstico diferencial?

- (A) Eritema multiforme maior e ocorrência de lesões menores de 3 cm.
- (B) Eritema multiforme menor e presença de lesões em alvo.
- (C) Necrólise epidérmica tóxica e acometimento de mucosa.
- (D) Síndrome de Stevens-Johnson e percentual da superfície corporal acometida.

5. JS, 3 anos, masculino, apresenta infecções de vias aéreas superiores frequentes, respiração bucal de suplência, sono agitado e roncos noturnos diários há aproximadamente 1 ano, já utilizou corticoide tópico nasal por 2 meses sem melhora dos roncos. Qual a melhor hipótese diagnóstica e conduta mais apropriada neste momento?

- (A) Hiperplasia adenoideana e deve ser solicitado uma fibronasofaringoscopia.
- (B) Apneia do sono e deve ser solicitado uma polissonografia.
- (C) Imunodeficiência primária e deve ser solicitado uma dosagem de imunoglobulinas.
- (D) Rinite alérgica e deve ser solicitado um *prick test*.

6. Criança com 1 ano e 6 meses de vida, previamente sem queixas clínicas, chega ao pronto atendimento com estridor. Assinale a alternativa CORRETA em relação a suspeita diagnóstica:

- (A) Laringomalácia é a melhor hipótese diagnóstica.
- (B) Corpo estranho é a melhor hipótese diagnóstica.
- (C) Hemangioma subglótico é a melhor hipótese diagnóstica.
- (D) Estenose laríngea é a melhor hipótese diagnóstica.

7. MSS, 35 anos, há 3 anos apresenta episódios de rinossinusite de repetição e obstrução nasal que se tornou persistente nos últimos meses, faz uso regular de corticoide inalatório associado a broncodilatador por asma de início aos 18 anos de idade. Cita alergia a alguns medicamentos, mas não sabe o nome destes. Qual a principal suspeita clínica da causa da obstrução nasal?

- (A) Desvio septal com cornetos hipertróficos.
- (B) Carcinoma nasossinusal.
- (C) Papiloma invertido.
- (D) Rinossinusite crônica com polipose nasossinusal.

8. Em relação à doença de Ménière (DM), assinale a alternativa correta:

- (A) Pode ocorrer em qualquer idade, mas costumeiramente os sintomas se iniciam entre 40 e 60 anos.
- (B) Quando acomete crianças, está comumente associada a migrânea vestibular.
- (C) Uma das teorias para DM está associada ao deslocamento de otocônias saculares, bloqueando o fluxo de endolinfa.
- (D) Apesar de não afetar a audição, a neurectomia vestibular tem baixo índice (<50%) de controle da vertigem.

9. Qual dos fatores abaixo está mais diretamente relacionado à remodelação óssea anormal observada na otosclerose?

- (A) Alteração na via do receptor RANK/RANKL na regulação da osteoclastogênese.
- (B) Disfunção metabólica envolvendo deposição de cálcio no ligamento anular.
- (C) Presença de depósitos de proteína amiloide no estribo.
- (D) Atividade anormal de osteoblastos e osteoclastos na cápsula ótica.

10. Na eletrococleografia, qual dos componentes abaixo é mais útil para identificar a presença de hidropsia endolinfática?

- (A) O potencial de ação (AP) originado do nervo auditivo.
- (B) O potencial de soma (SP) gerado pelas células ciliadas internas.
- (C) A relação entre o potencial de soma (SP) e o potencial de ação (AP).
- (D) O microfonismo coclear (CM), que reflete a atividade das células ciliadas externas.

11. Paciente de 55 anos, masculino, chega ao serviço de Otorrinolaringologia de hospital terciário com diagnóstico de Schwannoma vestibular à direita. O tumor apresentava um componente extracanalicular de 3 cm em seu maior diâmetro e havia crescido 3 mm nos últimos 12 meses. Audição em orelha direita com média nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz de 55 dB. Em orelha esquerda essa mesma média era de 25 dB. Índice percentual de reconhecimento de fala de 52% em orelha direita e 96% em orelha esquerda. Qual seria a conduta mais apropriada para o caso?

- (A) Tratamento cirúrgico, via translabiríntica, sem preservação de audição.
- (B) Tratamento cirúrgico, via retrolabiríntica, com preservação de audição.
- (C) Tratamento cirúrgico, via fossa média, com preservação da audição.
- (D) Acompanhamento e nova ressonância magnética nuclear em 12 meses.

12. Paciente com queixa de vertigem súbita e fugaz, associada aos movimentos cefálicos, foi submetido a Manobra de Dix-Hallpike que mostrou nistagmo torcional anti-horário, com componente vertical inferior, com a cabeça girada para direita. Qual seria o seu diagnóstico em relação ao canal semicircular acometido? CSC = canal semicircular.

- (A) CSC posterior direito.
- (B) CSC anterior direito.
- (C) CSC anterior esquerdo.
- (D) CSC posterior esquerdo.

13. Assinale a alternativa correta:

- (A) As causas ditas sindrômicas perfazem cerca de 2/3 dos casos de surdez genética.

- (B) Aproximadamente 90% dos casos de surdez pré-lingual não sindrômica se manifestam como formas autossômicas dominantes.
- (C) Muta  o do gene OTOF, que codifica a prote  na citos  lica otoferlina, pode estar associada a neuropatia auditiva.
- (D) A maioria das formas autoss  micas recessivas de surdez causa perda p  s-lingual tardia de grau leve a moderado.

14. Sobre a Surdez S  bita, assinale o correto:

- (A)   definida como qualquer perda de audi  o que se desenvolva em at  24 horas.
- (B) A maioria dos pacientes apresentam-se com perda de audi  o sensorioneural bilateral.
- (C) Corticosteroides intratimp  nicos n  o devem ser indicados se o paciente n  o teve boa resposta   terapia com glicocorticoide sist  mico.
- (D) A terapia com glicocorticoides deve ser iniciada preferencialmente dentro de duas semanas de aparecimento dos sintomas.

15. Sobre os testes vestibulares, assinale a alternativa correta:

- (A) No teste do impulso cef  lico, quando o paciente apresenta sacada corretiva ap  s o movimento da cabe  a da direita para esquerda, sugere-se perda da fun  o vestibular esquerda.
- (B) Teste de Romberg normal em pacientes com disfun  o vestibular cr  nica deve ser considerado um sinal de s  ndrome central.
- (C) Nas les  es vestibulares agudas unilaterais, o paciente se desvia para o lado do labirinto mais ativo durante a prova de Unterberger.
- (D) O teste de skew alterado sugere les  o perif  rica.

16. Homem, 70 anos, com bom status cl  nico, tabagista pesado h   mais de 4 d  cadas, procurou o Servi  o de ORL do Hospital Universit  rio Walter Cant  dio queixando-se de rouquid  o progressiva h   6 meses. Nos   ltimos 30 dias evolui com Disfagia. Exame f  sico ORL: otoscopia D\E sem altera  es; rinoscopia anterior sem altera  es significativas; oro-faringoscopia revelou dentes em p  ssimo estado de conserva  o; Pesco  o sem adenomegalias palp  veis. Naso-fibro-laringoscopia: Les  o com aspecto infiltrativo em toda extens  o da prega vocal direita, aparentemente poupando a comissura anterior; observa-se discreto abaulamento da prega vestibular direita; hemilaringe direita paralisada; mobilidade preservada   esquerda. Subglote aparentemente sem altera  es. Base da l  ngua, val  culas e recessos piriformes sem altera  es. TC cervical sem evid  ncias de infiltra  o da cartilagem tire  ide ou extens  o para o espa  o paragl  tico. EDA sem altera  es. Bi  psia revelou CEC moderadamente diferenciado.

Qual prov  vel estadiamento:

- (A) T2bNOMx

- (B) T2aN0Mx
- (C) T3N0Mx
- (D) T4N0Mx

17. Ainda sobre o paciente acima, assinale a correta:

- (A) Por se tratar de um caso de câncer da laringe avançado, está contraindicado o tratamento com quimioterapia + radioterapia para preservação da laringe, sendo a laringectomia total a única opção possível.
- (B) Por se tratar de um caso de câncer da laringe avançado, paciente sem queixas respiratórias, e com a hemilaringe esquerda livre de doença, pode ser pensado no protocolo de preservação do órgão com quimioterapia + radioterapia. Além disso, se na análise clínica, a epiglote estiver livre, pode-se pensar em laringectomia horizontal parcial supracricóidea.
- (C) Por se tratar de um caso de câncer da laringe avançado, está contraindicada cirurgias parciais, sendo a laringectomia total a única opção possível.
- (D) Por se tratar de um caso de câncer da laringe avançado, está indicado o tratamento com quimioterapia + radioterapia com fins paliativos, pois não há proposta de tratamento curativo.

18. O carcinoma nasofaríngeo (CNF) é uma doença maligna rara, assintomática nas fases iniciais. Apresenta diferentes manifestações clínicas. Muitos casos se apresentam com doença locorregional avançada no momento do diagnóstico. Quais os sintomas associados a extensão da neoplasia para a base do crânio?

- (A) Epistaxe, hipoacusia e obstrução nasal.
- (B) Zumbido, hipoacusia e dor facial.
- (C) Perda do olfato, epistaxe e obstrução nasal.
- (D) Diplopia, cefaléia, dor facial, parestesia facial e paralisia do VI par craniano.

19. Os tumores malignos dos seios paranasais são patologias raras. Qual o tipo histológico e a localização mais frequentes?

- (A) Carcinoma espinocelular de seio etmoidal.
- (B) Carcinoma indiferenciado de seio etmoidal.
- (C) Carcinoma espinocelular de seio maxilar.
- (D) Carcinoma adenóide cístico de seio maxilar.

20. Lesões pré-malignas podem associar-se ao câncer de cavidade oral. Qual apresenta maior risco de malignização?

- (A) Eritroplasia.
- (B) Leucoplasia.
- (C) Líquen plano.
- (D) Leucoplasia verrucosa.

