



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.URFO.136 - Página 1/4	
Título do Documento	UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIÁRIO CANGURU (UCIN-CA)	Emissão: 26/09/2019	Próxima revisão: 26/09/2021
		Versão: 02	

1. OBJETIVO(S)

- Incentivar as genitoras quanto ao aleitamento materno.
- Orientar as genitoras quanto ao aleitamento materno.
- Possibilitar alimentação segura e eficaz por via oral, através de meio alternativo, quando a amamentação não for possível.

2. MATERIAL

- Luva para procedimento;
- Seringa;
- Sonda nº6;
- Sonda nº4.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

3.1. Avaliação Fonoaudiológica

- Coletar informações do nascimento: capurro, APGAR primeiro minuto e quinto minuto, perímetro cefálico, perímetro torácico, comprimento e diagnósticos.
- Avaliar os reflexos orais de procura, mordida, vômito, sucção, deglutição e os órgãos fonoarticulatórios (lábios, língua, bochechas, mandíbula, palato duro, palato mole) quanto a morfologia, postura e tonicidade.
- Decidir se o paciente precisará de um trabalho terapêutico ou avaliação da deglutição (via oral).

3.2. Estratégias Terapêuticas

- Massagear extra e intra oralmente: objetivando estimular reflexos ausentes e dessensibilizar reflexos exacerbados.
- Estimular não nutritivamente: RN ou lactente suga o dedo enluvado, enquanto a dieta é oferecida por gavagem. Promover fortalecimento da musculatura orofacial e possibilitar transição da alimentação de sonda orogástrica para via oral mais segura.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.URFO.136 - Página 2/4	
Título do Documento	UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIÁRIO CANGURU (UCIN-CA)	Emissão: 26/09/2019	Próxima revisão: 26/09/2021
		Versão: 02	

- Estimular nutritivamente (finger-feeding): Acoplar uma sonda nº6 ao dedo do profissional e a outra extremidade da sonda na seringa sem o êmbolo, onde é colocado o leite. O profissional regula a altura da seringa e a liberação do fluxo à medida que o RN ou lactente suga o dedo que está com a sonda. Essa técnica pode ser utilizada para avaliação da deglutição ou como técnica terapêutica objetivando melhorar o controle do fluxo oral.

- Estimular nutritivamente (translactação): RN ou lactente suga o seio materno com a sonda nº 4 acoplada ao mesmo, realizando simultaneamente a ordenha do leite ao seio materno e retirada do leite pela sonda. Utilizada para bebês sonolentos ou com alguma dificuldade que possa vir a comprometer o ganho ponderal e ingesta. Utiliza-se leite materno.

- Estimular nutritivamente (relactação): RN ou lactente suga o seio materno com a sonda nº4 acoplada ao mesmo, realizando simultaneamente a ordenha do leite ao seio materno e retirada do leite pela sonda. Essa técnica ajuda na relactação da mãe e possibilita alimentação exclusivamente por seio materno. Utiliza-se fórmula infantil.

- Avaliar Seio Materno Livre Demanda: O profissional auxilia o RN ou lactente em seio materno e observa a performance em seio materno. Em alguns casos em que o aleitamento materno não for possível o fonoaudiólogo deve conversar com a equipe médica sobre introdução da mamadeira. Dependendo do padrão de sucção e das características orais o fonoaudiólogo escolhe o melhor tipo de bico para o caso. É importante ressaltar que a introdução da mamadeira ocorre em casos raros: RN ou lactentes neurológicos ou quando a genitora possui alguma patologia que contraindica o aleitamento materno.

O Hospital Universitário Lauro Wanderley é credenciado como Hospital Amigo da Criança e segue os 10 passos para sucesso do aleitamento materno. Portanto **não oferece bicos artificiais e chupetas a crianças amamentadas no seio materno.**

OBS: RN ou lactentes que não conseguirem se alimentar de forma segura e eficiente por via oral após trabalho terapêutico deve-se indicar a gastrostomia. Tal decisão é conjunta com a equipe médica.

3.3. Procedimentos Realizados

- Avaliação fonoaudiológica;
- Terapia fonoaudiológica;
- Orientação fonoaudiológica;
- Evolução em prontuário;
- Realização da estatística mensal dos procedimentos realizados.

As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais e necessários de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais para prevenção de IRAS (infecções relacionadas à assistência



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.URFO.136 - Página 3/4	
Título do Documento	UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIÁRIO CANGURU (UCIN-CA)	Emissão: 26/09/2019	Próxima revisão: 26/09/2021
		Versão: 02	

à saúde) causadas por transmissão cruzada pelas mãos conforme orientações do POP/CCIH/001/2019.

4. REFERÊNCIAS

BAUER, M. A.; YAMAMOTO, R. C. C.; WEIMANN, R. M.; KESKE-SOARES, M. **Avaliação da estimulação sensorio motor oral na transição da alimentação enteral para via oral plena em recém nascido pré termo.** Revista Brasileira Saúde Materno Infantil. Vol. 09, nº04, 2009.

CRIVELLARO, I. **Curso Avançado em amamentação 2.0.** Disponível em: <https://cursoavancadoemamamentacao.com.br/>. Acessado em: 25/07/2019.

OTTO, D. M.; ALMEIDA, S. T. **Desempenho da alimentação oral em recém nascido prematuro estimulados pelo treino de deglutição.** Audiol. Commun. Res. 2017.


XAVIER, C. Avaliação dos padrões de sucção e recém nascido prematuros visando a transição da alimentação de sonda gástrica para via oral. Universidade de São Paulo (TESE). 2002. Disponível em: bdpi.br/item/01320803. Acessado em: 17/07/2019.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	13/03/2017	Elaboração do POP.
02	26/09/2019	Revisão do POP segundo a norma NO.SGQVS.001 da Ebserh.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.URFO.136 - Página 4/4	
Título do Documento	UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIÁRIO CANGURU (UCIN-CA)	Emissão: 26/09/2019	Próxima revisão: 26/09/2021
		Versão: 02	

Elaboração Divany Guedes Pereira da Cunha Kyssia Augusto de Queiroz Lima	Data: 26/09/2019
Revisão Keila Maruze de França Albuquerque	Data: 30/09/2019
Validação Lecidamia Cristina Leite Damascena	Data: 03/10/2019
Aprovação Maria Lucrécia de Aquino Gouveia, Chefe da Unidade de Reabilitação.  Chefe da Unidade de Reabilitação MULVIERE Mat. SIAPE 1444-24	Data: 07/10/2019