



UNIVERSIDADE FEDERAL DO  
TOCANTINS  
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.EMTN.009 – Página 1/3	
Título do Documento	<b>EVENTOS ADVERSOS NA TNE – RETIRADA NÃO PLANEJADA DA Sonda ENTERAL</b>	Emissão: 17/11/2021 Versão: 02	Próxima revisão: 17/11/2023

## 1. CONCEITO

É a saída acidental da sonda enteral, com a perda da via de alimentação. Nas unidades de terapia intensiva é frequente a perda de tubos, sondas e cateteres de alimentação, resultantes da expulsão deliberada destes dispositivos pelo próprio paciente, bem como durante os cuidados de enfermagem e procedimentos diagnósticos.

As sondas de alimentação naso/oro entéricas permanecem em média de 30 dias, acima deste período enterostomias estão indicadas para nutrição enteral. Embora a alimentação enteral seja benéfica existem riscos e potenciais eventos adversos inerentes a sua aplicação.

As causas que levam a retirada não planejada da sonda no paciente em uso de dieta enteral são:

- ✓ Obstrução do lúmen interno por incrustação de medicamentos ou dietas;
- ✓ Alterações de cognição, agitação motora, em especial o delirium e a demência;
- ✓ Fixação ineficaz com perda parcial ou total da viabilidade do acesso pela sonda;
- ✓ Realização de procedimentos médicos e de enfermagem;
- ✓ Êmese e tosse que propiciam à expulsão acidental.

## 2. OBJETIVO

Padronizar os procedimentos em caso de retirada não planejada da Sonda Enteral ocorridos durante a terapia nutricional, proporcionando o conhecimento das causas e realização de ações que devem ser realizadas diante desde evento adverso.

## 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Em caso de perda do dispositivo de alimentação o Técnico em Enfermagem comunica ao Enfermeiro que avaliará as causas da perda do dispositivo enteral;
- O enfermeiro deverá comunicar o fonaudiólogo para teste de deglutição se possível;
- Se indicado passagem de sonda novamente o enfermeiro repassa o dispositivo (ver POP passagem SNG e SNE);
- Em caso de obstrução da sonda, lavar o lúmen com 20 ml de água filtrada, se não obtiver êxito na tentativa de desobstrução, retirar o dispositivo e repassar outro. (Ver POP passagem SNE e SNG);
- Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem comunica ao médico e nutricionista sobre o evento adverso e repassa as informações;
- Se paciente agitado acionar equipe médica e relatar o fato;
- Equipe médica ver possibilidade de prescrever fármacos para controle de agitação do paciente.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO  
TOCANTINS  
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.EMTN.009 – Página 2/3	
Título do Documento	<b>EVENTOS ADVERSOS NA TNE – RETIRADA NÃO PLANEJADA DA SONDA ENTERAL</b>	Emissão: 17/11/2021 Versão: 02	Próxima revisão: 17/11/2023

- Equipe de Enfermagem ver possibilidade de realizar a contenção do paciente. (Ver POP contenção mecânica)
- O técnico em enfermagem deve trocar a fixação da sonda diariamente após higiene do paciente;
- Na realização de procedimento o profissional envolvido irá verificar fixação da sonda e fará manejo com atenção aos dispositivos utilizados pelo paciente.
- O técnico em enfermagem deverá passar 20 ml de água filtrada após administração de medicações para evitar obstrução do lúmen;

#### 4. RESULTADOS ESPERADOS

- ✓ Diminuir os eventos de retirada não planejada da Sonda Enteral em pacientes submetidos em dietoterapia;
- ✓ Realizar condutas adequadas diante dessa intercorrência, diminuindo esse evento adverso
- ✓ Melhorar a qualidade e eficácia da terapia nutricional no HDT-UFT.

#### 5. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES

- ✓ Comunicar as intercorrências ao enfermeiro e médico realizando os registros necessários;
- ✓ Comunicar a EMTN;
- ✓ Notificar, comunicar o VIGIHOSP.

#### 6. REFERÊNCIAS

1. Carrión MI, Ayuso D, Marcos M, Paz Robles M, de la Cal MA, Alía I, et al. Accidental removal of endotracheal and nasogastric tubes and intravascular catheters. Crit Care Med. 2000;28(1):63-6.
2. CERVO et al. Eventos adversos relacionados ao uso de terapia nutricional enteral. Rev. Gaúcha Enferm. 2014 jun;35(2):53-9.
3. FRAGA, P. et al Equipe Multiprofissional em Terapia em Prática, 1 ed. Rio de Janeiro; Atheneu 2017
4. SMELTZER, S.C.; BARE, B.G.; HINKLE, J.L. et al, Brunner & Suddarth. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica, v.1, 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO  
TOCANTINS  
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.EMTN.009 – Página 3/3	
Título do Documento	<b>EVENTOS ADVERSOS NA TNE – RETIRADA NÃO PLANEJADA DA Sonda ENTERAL</b>	Emissão: 17/11/2021 Versão: 02	Próxima revisão: 17/11/2023

## 7. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
02	19/04/2021	Adequação na Padronização de Documentos da Ebserh

<b>Elaboração</b> Nadya Kelly Carvalho Batista, Enfermeira Kael Rafael Silva, Enfermeiro Fabrício Arrais de Oliveira, Enfermeiro	Data: 23/07/2018
<b>Revisão</b> Nadya Kelly Carvalho Batista, Enfermeira Fabrício Arrais de Oliveira, Enfermeiro	Data: 24/06/2021
<b>Análise</b> Divisão de Enfermagem	Data: 10/11/2021
<b>Validação</b> Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente	Data: 16/11/2021
<b>Aprovação</b> Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional	Data: 26/08/2021

*Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte*