



Quais EPIs devem ser utilizados

- **Luvas** - as mesmas indicadas na rotina do serviço de higienização
- **Sapato impermeável**
- **Capote** (se houver risco de molhar o uniforme utilizar capote impermeável)
- **Óculos de proteção** ou máscara facial
- **Gorro**
- **Máscara cirúrgica**
- **Máscara N95 ou PFF2** - indicada para procedimentos **geradores de aerossol** (ex. aspiração de vias aéreas, intubação, coleta de suabe para pesquisa do vírus). **Evitar entrar na área no momento de realização destes procedimentos pela equipe assistencial.**

TERAPIA INTENSIVA: POR SER ÁREA DE MAIOR RISCO DE GERAÇÃO DE AEROSSOL, OS PROFISSIONAIS ESCALADOS PARA REALIZAR AS ATIVIDADES NESTE LOCAL DEVERÃO UTILIZAR MÁSCARA N95 OU PFF2 DURANTE SUAS ATIVIDADES.



Quando utilizar os EPIs

Antes de entrar na área a ser higienizada:

CTI 3° leste, enfermarias do 7° norte, enfermaria 1 do 10° norte, maternidade - enfermaria 4° norte, quarto de isolado e sala de procedimento da UDC-PS, ambulatório Borges da Costa COVID-19, demais ambulatórios, sala cirúrgica destinada ao atendimento aos casos suspeitos, sala de tomografia radiologia), mesmo após saída do paciente.

Quais produtos utilizar para limpeza e desinfecção das áreas?

- Quaternário de amônio ou
- Hipoclorito de sódio ou
- Alcool 70% para superfície

Quais superfícies devem ser limpas com maior frequência?




As superfícies altamente tocadas pelo paciente, acompanhantes e profissionais de saúde, como: grades de camas, mesas, maçanetas, interruptores, botão de elevador, catracas, corrimão, guichês etc

Limpeza do piso

Seguir técnica de varredura úmida com esfregação ou mops úmido com produtos padronizados e diluídos adequadamente



NÃO UTILIZAR PANO DE CHÃO, POIS AUMENTA O RISCO DE CONTATO DO PROFISSIONAL DA HIGIENIZAÇÃO



Materiais utilizados para limpeza e desinfecção

Devem ser de uso exclusivo para limpeza e desinfecção das áreas.

Devem ser higienizados ou descartados em resíduo infectante conforme rotina do serviço.

COMO RETIRAR O EPI: REMOVA DE FORMA NÃO CORRER O RISCO DE SE CONTAMINAR

1. Retirar as luvas, descartar no resíduo infectante.



2. Higienizar as mãos com água e sabonete ou álcool 70% gel ou glicerinado (se não estiver com sujeira).



3. Retirar capote, desfazendo os laços e puxando o capote com cuidado pegando na parte interna até que ela saia pelo lado avesso, descartar no resíduo infectante.



4. Retirar o gorro pela parte superior, descartar no resíduo infectante.

5. Higienizar as mãos com água e sabonete ou álcool 70% gel ou glicerinado (se não estiver com sujeira).



6. Retirar óculos de proteção, higienizar com água e sabonete, secar com papel toalha e guardar.




7. Higienizar as mãos com água e sabonete ou álcool 70% gel ou glicerinado (se não estiver com sujeira).



8. Retirar a máscara cirúrgica e descartar no resíduo infectante



9 - Retirar a máscara N95 puxando pelo elástico, sem encostar na superfície das máscara. Ela deverá ser guardada num envelope de papel com o elástico para fora.



10 - Higienizar as mãos com água e sabonete ou álcool 70% gel ou glicerinado (se não estiver com sujeira).

