

PROTOCOLO
NÚCLEO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA 06/2018

HIGIENE COTO UMBILICAL

Versão 1.0

NÚCLEO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS
DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA 06/2018

HIGIENE COTO UMBILICAL

© 2018 Ebserh. Todos os direitos reservados
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh
www.Ebserh.gov.br

Material produzido por **Tatiana Siqueira Saraiva** em parceria com Setor de Pediatria HU-UFJF.
Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins comerciais.

Hospital Universitário da Universidade Federal De Juiz de Fora (HU-UFJF),
administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) –
Ministério da Educação

PROTOCOLO ASSISTENCIAL. Higiene coto umbilical. Juiz de Fora- MG:
HU-UFJF/Ebserh, 2018.

Descritores: 1. Pop 2. Higiene coto umbilical 3. Pediatria

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
ADMINISTRADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

Rua Catulo Breviglieri, s/n
Bairro Santa Catarina | CEP: 36036-110 | Juiz de Fora-MG
Telefone: (32) 4009-5159 | huufjf.ebserh.gov.br

ROSSIELI SOARES DA SILVA

Ministro de Estado da Educação

KLEBER DE MELO MORAIS

Presidente da Ebserh

DIMAS AUGUSTO CARVALHO DE ARAÚJO

Superintendente do HU-UFJF

LUDMILLA RODRIGUES COSTA GONÇALVES

Gerente Administrativo do HU-UFJF

SERGIO PAULO DOS SANTOS PINTO

Gerente de Atenção à Saúde do HU-UFJF

ANGELA MARIA GOLNER

Gerente de Ensino e Pesquisa do HU-UFJF

**EXPEDIENTE
DIVISÃO DE ENFERMAGEM
GERÊNCIA DE ENFERMAGEM PEDIATRIA**

Elaborado por:**(06/2018)****Paula Bruno de Martin
Tatiana Siqueira Saraiva
Bianca Naiara Pio Pereira Morais****Gerente de Enfermagem da pediatria do HU/UFJF
Enfermeira Assistencial
Técnica de Enfermagem**

Data	Versão	Coordenador do protocolo	Validação por especialistas
06/2018	1.0	Tatiana Siqueira Saraiva Enfermeira Assistencial da Pediatria HU/UFJF	Maria Auxiliadora Vieira Mendes- Chefe Divisão de enfermagem Lucio Henrique de Oliveira- Chefe da unidade de saúde da criança e adolescente Aline Landim Farani Faria – Enfermeira de Saúde da Criança e Adolescente Ana Paula Rocha Gomes – Enfermeira Oncologista Luciana Cunha Piva- Enfermeira Assistencial Tamires Rodrigues Gonçalves- Enfermeira Assistencial Nara Gonçalves da Rocha Vianna- Enfermeira Assistencial Juliana Laurentino Rosas- Enfermeira Assistencial

SUMÁRIO

1. DEFINIÇÃO.....	6
2. OBJETIVO.....	6
3. PÚBLICO ALVO.....	6
4. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.....	6
5. INDICAÇÃO.....	6
6. ORIENTAÇÃO.....	6
7. OBSERVAÇÕES.....	6
8. PROCEDIMENTO.....	7
8.1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.....	7
8.2 RESPONSÁVEIS.....	7
8.3 DESCRIÇÃO.....	7
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	8

	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Hospital Universitário	Data: 06/18 Versão: 1.0
Protocolo Assistencial de Enfermagem pediátrica HIGIENE COTO UMBILICAL		

1. DEFINIÇÃO

Processo que visa padronizar a higiene do coto umbilical em recém-nascidos, promovendo a melhoria da qualidade da assistência prestada aos clientes.

2. OBJETIVO

Padronizar a higiene do coto umbilical em recém-nascidos para promover a qualidade e eficiência do procedimento para os clientes internados no setor de pediatria.

3. PÚBLICO ALVO

Recém-nascidos internados no setor de pediatria.

4. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Na unidade de internação do Hospital Universitário de Juiz de fora, setor de pediatria do HU UFJF unidade Santa Catarina.

5. INDICAÇÃO

Recém-nascidos que ainda possuam coto umbilical internados no setor de pediatria;

6. ORIENTAÇÃO

Observar condições do coto umbilical e registrar aspectos (presença de sinais flogísticos, secreções e sangramentos);

7. OBSERVAÇÕES

Realizar a higiene do coto umbilical a cada troca de fraldas e após o banho;

Após a queda do coto umbilical, continuar higienizando a base com álcool 70% até a completa cicatrização.

8. PROCEDIMENTO

8.1 Equipamentos e materiais necessários

Bandeja, Frasco com álcool 70%, 3 hastes flexíveis com algodão estéreis, luvas de procedimentos, 2 gazes estéreis;

8.2 Responsável: Enfermeiro, técnico e auxiliares de enfermagem

8.3 Descrição

- Explicar o procedimento à criança e acompanhante;
- Iniciar a higiene após colocar fralda limpa ou banho;
- Abrir o invólucro das hastes flexíveis com algodão e das gazes;
- Retirar uma das hastes flexíveis com algodão do invólucro, sem tocar na parte com algodão;
- Umedecer as extremidades da haste em álcool 70%;
- Utilizar a mão não dominante para envolver a extremidade distal do coto com uma das gazes estéreis, elevando o mesmo delicadamente e mantendo-o nessa posição;
- Utilizando uma das extremidades da haste, proceder à antissepsia da base do coto, com movimento circular único, girando a haste entre os dedos indicador e polegar;
- Repetir o procedimento, utilizando a outra extremidade da haste;
- Umedecer as extremidades de outra haste e realizar a antissepsia ao longo do coto, no sentido da base para a extremidade, com movimentos únicos, girando a haste após cada movimento;
- Umedecer as extremidades de outra haste e utilizar uma delas para realizar a antissepsia do clamp, com movimentos únicos, girando a haste após cada movimento;
- Soltar a extremidade do coto e segurá-lo pelo clamp, usando a outra gaze estéril;
- Utilizar a outra extremidade da haste para realizar a antissepsia da extremidade distal do coto, com movimentos únicos, girando a haste após cada movimento;
- Soltar o coto e colocar a parte inferior da vestimenta, se houver;
- Vestir o bebê;
- Assegurar que a criança esteja confortável e berço (grades elevadas);
- Descartar o material utilizado em local apropriado;
- Registrar em prontuário;

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROS, C.E.S. E COLS. Semiotécnica do recém-nascido. São Paulo. Ed. Atheneu, 2005

Bowden, Vicky R., Greenberg, Cindy Smith. Procedimentos de Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 2005.

HOCKENBERRY, M.J.; WILSON, D. Wong Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 8.ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2011.

