

 	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP ENF 8.3
	COMISSÃO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS	Data da Emissão: 19/09/2018
		Versão: 01
		Data de Revisão: 19/09/2018 Próxima Revisão: 19/09/2020
CURATIVO DE FERIDAS OPERATÓRIAS		
Responsável pela elaboração do POP: Enfermeira Máuria Cavalcante Viégas Enfermeira R2 Letycia das Chagas Castro.	Aprovado por: Enf. Sandra de Souza Lima Rocha (DIEN) Enf. Maria Helena de Souza Praça Amaral (Educação Continuada de Enfermagem)	
Responsável pela REVISÃO do POP: Enfermeira Cláudia Cruz da Silva Enfermeira Maria Helena de Souza Praça Amaral Enfermeira Stella Maris Gomes Renault		
1. DEFINIÇÃO		
Lesão com ruptura da derme causada por incisão e em condições assépticas.		
2. OBJETIVOS		
Promover ambiente adequado à cicatrização e evitar contaminação da ferida.		
3. INDICAÇÃO		
No pós-operatório imediato ou até 48 h após evento cirúrgico e feridas cirúrgicas não complicadas.		
4. PESSOAS E PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR O PROCEDIMENTO		
Equipe de enfermagem e médica.		
5. MATERIAL A SER UTILIZADO		
<ul style="list-style-type: none"> • Luva de procedimento; • Máscara descartável; • Luva estéril; • Gaze estéril; • Filme transparente ou adesivo hipoalergênico estéril; • SF 0,9%; • Clorexidine alcoólica; • Álcool 70%; • Transferidor. 		
6. DESCREVER DETALHADAMENTE AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Reunir todo material em uma bandeja; 2. Higienização das mãos (conforme POP de higienização das mãos); 3. Informar ao paciente sobre o procedimento a ser realizado; 4. Colocar o paciente na posição adequada; 5. Calçar luva de procedimento; 6. Retirar curativo antigo observando o aspecto da ferida quanto à hiperemia, exsudato, edema, bordas e sutura; 7. Descartar em recipiente adequado, (conforme POP de resíduos); 8. Abrir o lacre do frasco de SF 0.9%; 9. Fazer antisepsia do frasco; 10. Adaptar o transferidor; 11. Abrir o pacote de luva estéril; 12. Abrir sobre o pacote de luva aberto os pacotes de gaze e o filme transparente; 		

13. Calçar luva estéril na mão destra;
14. Pegar um chumaço de gaze;
15. Pegar com a mão esquerda o frasco de SF 0.9% e umedecer a gaze;
16. Limpar a ferida em movimento único circular e de dentro para fora;
17. Repetir procedimento até total limpeza da ferida;
18. Umedecer gaze com Clorexidine alcoólica ou álcool 70 % e limpar pele ao redor da ferida também em movimento circular e de dentro para fora;
19. Aguardar secar a cicatriz cirúrgica;
20. Aplicar o filme transparente ou adesivo hipoalergênico estéril;
21. Colocar data, nome do profissional que executou ou procedimento;
22. Recolher todo material mantendo o ambiente em ordem.

7. ATENÇÃO A PONTOS IMPORTANTES E POSSÍVEIS RISCOS

- O primeiro curativo deveria ser feito no C.C.G. com gaze e filme transparente;
- Se nas primeiras 24/48 h apresentar umidade deveria ser trocado e mantido com gaze estéril;
- Se a ferida estiver seca poderá ser mantida apenas com filme transparente até completar 7 dias.

8. RESULTADOS ESPERADOS

Cicatrização da ferida operatória.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SMANIOTTO, PHS; et al. Sistematização de curativos para o tratamento clínico das feridas. Rev. Bras. Cir. Plást. [online]. 2012, vol.27, n.4. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S1983-51752012000400026>>.