

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP ENF 1.14
	GERAL (TODOS OS SERVIÇOS E/OU ENFERMARIAS)	Data da Emissão: 09/12/2016
		VERSÃO: 04
ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL		
Responsável pela elaboração do POP: Enf. Maria da Penha Pinheiro Enf. Nilson Lima Linhares Responsável pela revisão do POP: Enf. Cláudia Cruz da Silva Enf. Katerine Gonçalves Moraes Enf. Maria Helena de Souza Praça Amaral Enf. Stella Maris Gomes Renault	Aprovado por: Enf. Sandra Souza de Lima Rocha (DIEN) Enf. Maria Helena de Souza Praça Amaral (Educação Continuada de Enfermagem)	
1. DEFINIÇÃO		
Administração de solução estéril, que contém os nutrientes necessários ao cliente, por via endovenosa.		
2. OBJETIVO		
Oferecer nutrientes essenciais e equilibrados para suprir as necessidades básicas de nutrição		
3. INDICAÇÃO		
<ul style="list-style-type: none"> • Trato digestivo não funcionamento, obstruído ou inacessível, com previsão de que esta condição continuará por pelo menos sete dias; • Incapacidade para tolerar ingestão enteral; • Quando a absorção de nutriente é incompleta; • Quando as condições acima estão associadas ao estado de desnutrição não corrigível por nutrição enteral. 		
4. PESSOAS E PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR O PROCEDIMENTO		
<ul style="list-style-type: none"> • Enfermeiros. 		
5. MATERIAL A SER UTILIZADO		
<ul style="list-style-type: none"> • Bolsa com NPT; • Equipo de bomba infusora; • Bomba infusora; • Luva estéril; • Pacote de gazes estéril; • Máscara; • Álcool 70%. 		
6. DESCREVER DETALHADAMENTE AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS		
<ul style="list-style-type: none"> • Receber a NPT da farmácia, conferir no rótulo o nome e registro do cliente, volume total, validade e observar a integridade da embalagem e a homogeneidade da solução; • Programar o início da infusão a fim de evitar o armazenamento de bolsas de NPT na unidade; • Retirar adereços (anéis, relógios, pulseiras e etc.); • Realizar desinfecção da bancada com álcool 70%; • Higienizar as mãos; • Retirar da embalagem a bolsa de NPT e conferir os dados do rótulo com a prescrição médica; 		

- Inspeccionar a bolsa de NPT quando à: coloração, separação de fase, presença de corpo estranho ou qualquer outra anormalidade;
- Colocar máscara;
- Romper os lacres conforme orientação do fabricante;
- Abrir o pacote de gases e o equipo, calçar luvas estéreis;
- Fazer assepsia das conexões e do local de inserção do equipo com álcool a 70%;
- Preencher o equipo com a NPT;
- Programar a bomba infusora e instalar o equipo à mesma, e logo após, ao acesso venoso central do paciente.

7. ATENÇÃO A PONTOS IMPORTANTES E POSSÍVEIS RISCOS

- Na vigência de choque pirogênico, interromper a infusão imediatamente e remover o equipo utilizado, comunicar a equipe médica, anotar os sinais e sintomas e os procedimentos realizados e encaminhar a bolsa e o equipo a farmácia, acompanhados de relatório.
- Cabe ao enfermeiro iniciar e encerrar a infusão de NPT;
- Ao receber a NPT da farmácia, conferir no rótulo: nome, registro do cliente, validade e volume;
- A NPT deveser infundida por uma via exclusiva;
- Providenciar a monitorização do cliente durante a terapia com a NPT (balanço hídrico, diurese, peso e glicemia).

8. RESULTADOS ESPERADOS

Proporcionar suporte energético e nutricional para manter as funções orgânicas preservar a estrutura corpórea em cliente cuja via digestória esteja comprometida ou não seja suficiente para suprir suas necessidades.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CALIXTO-LIMA, LARISSA et al. Manual de nutrição parenteral. Rio de Janeiro: Rubio, 2010.

CARMAGNAL, M.I.S. Procedimentos de enfermagem: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.