







ALERTA VE 02 – Agosto/2019


REFORÇAMOS À TODOS OS ESTUDANTES, DOCENTES, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E DEMAIS TÉCNICOS DO HUGG AS ORIENTAÇÕES DA SMS/RJ QUANTO A VACINAÇÃO PARA SARAMPO, RUBÉOLA E CAXUMBA (VACINA TRÍPLICE VIRAL).

- ✓ A vacina tríplice viral é a única forma de prevenir a ocorrência dessas doenças na população e está disponível na rotina de vacinação das unidades básicas de saúde.
- ✓ **REITERAMOS QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE REVACINAÇÃO** – Pessoas que tenham comprovação do número de doses da vacina tríplice viral, recomendadas para cada faixa etária (*figura abaixo*), não precisam se revacinar.

 6 a 11 meses e 29 dias	Recomendada a dose zero da tríplice viral*	
 1 a 4 anos	1ª dose (ideal aos 12 meses**)	2ª dose (15 meses)
 5 a 29 anos	2 doses (intervalo de 30 dias)	
 30 a 49 anos	DOSE ÚNICA	
 acima de 50 anos	Se for viajar para locais de risco ou tiver contato com casos suspeitos/confirmados	
	A vacina é contraindicada para gestantes e imunodeprimidos	

*Obs: É preciso haver 30 dias de diferença da dose dos 12 meses. Essa vacina é contraindicada para bebês com menos de 6 meses

**Crianças com mais de 12 meses devem tomar 2 doses com intervalo de 30 dias



OBS: PROFISSIONAIS DE SAÚDE DEVEM TER DUAS DOSES COMPROVADAS DE VACINA, INDEPENDENTE DA FAIXA ETÁRIA.