




**Papagaios
do Brasil**



Manual de Identificação
dos papagaios do Programa Papagaios do Brasil

Papagaio-chauá


(*Amazona rhodocorytha*)



Foto: Marina Somenzari

Área de ocorrência

A espécie ocorre na Floresta Atlântica, de Alagoas ao Rio de Janeiro e leste de Minas Gerais.



Status de conservação

Lista Internacional
Vulnerável (IUCN, 2017)

Lista Nacional
Vulnerável (MMA, 2014)

Listas Estaduais

- Alagoas - não possui lista;
- Bahia - Em perigo (Portaria 37, 2017);
- Espírito Santo - dados insuficientes (Espécies de Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado do Espírito Santo, 2007);
- Rio de Janeiro - vulnerável (Diário Oficial, 1997);
- Leste de Minas Gerais - Em Perigo (Deliberação Normativa COPAM 147, 2010).



Foto: Carlos Garske

Principais características

- 35-37 cm de comprimento
- "Loro" Laranja/amarelado
- Bochecha e garganta azulada
- Espelho Alar e cauda com nódoas vermelhas

Fronte, píleo e base de maxila vermelha/alaranjado •

Margens das penas escurecidas no pescoço e nuca •




Foto: Carlos Garske

Observação

As características citadas variam entre os indivíduos.

A estação reprodutiva do papagaio-chauá acontece de setembro a fevereiro.




Foto: Carlos Garske

Papagaio-moleiro


(*Amazona farinosa*)



Foto: Marina Somenzari

Área de ocorrência

Espécie florestal, ocorrendo do Panamá ao Equador, Colômbia, Bolívia. No Brasil ocorre na Amazônia e Mata Atlântica: sul da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.



Status de conservação

Lista Internacional

Quase Ameaçada (IUCN, 2017)

Lista Nacional

Pouco Preocupante (MMA, 2014)

Listas Estaduais

- Bahia - Vulnerável (Portaria 37, 2017);
- São Paulo - Quase Ameaçada (Decreto 60.133, 2014);
- Espírito Santo - Criticamente Ameaçada (Espécies de Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado do Espírito Santo, 2007);
- Rio de Janeiro - Vulnerável (Diário Oficial, 1997);
- Minas Gerais - Criticamente em Perigo (SIAM, 2010).



Foto: Marina Somenzari

Principais características

- 90 cm de comprimento (maior papagaio brasileiro)
- Esporadicamente pode apresentar boné amarelo, azul ou vermelho
- Anel perioftálmico e bico brancos
- Plumagem verde coberta por pó branco
- Ponta da cauda verde clara
- Espelho Alar vermelho



Observação

A estação reprodutiva do papagaio-moleiro acontece de outubro a janeiro

Papagaio-verdadeiro


(*Amazona aestiva*)



Foto: Gláucia Seixas

Área de ocorrência

A espécie ocorre no Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina. No Brasil é encontrado na caatinga, cerrado, Mata Atlântica do interior e Pantanal, incluindo a região norte (Tocantins e sudoeste Rondônia), nordeste (interior do Piauí, Pernambuco, Bahia), centro-oeste (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), sudeste (oeste de São Paulo e Minas Gerais) e sul (noroeste do Paraná).



Status de conservação

Lista Internacional

Pouco Preocupante (IUCN, 2017)

Lista Nacional

Quase Ameaçada (MMA, 2014)

Listas Estaduais

- Bahia - não consta;
- Minas Gerais - não consta;
- Paraná - não consta;
- São Paulo - Quase Ameaçada (Decreto 30.133, 2014);
- Demais estados - não possuem listas de animais ameaçados.




Foto: Glaucia Seixas/PPV

Principais características

- 36-37 cm de comprimento
- +/- 400 gramas de peso
- Penas na nuca, laterais do pescoço e ventre com margens escuras
- Encontro com asas vermelho ou amarelo ou misto (vermelho e amarelo)
- Cabeça com amarelo, fronte azul e bico preto

Foto: Fabian NCI



- Penas de voo verde azulado
- Base das retrizes externas vermelhas e pés cinza escuro




Foto: Lucia / PPV




Foto: Thiago BA



Observação

As características citadas variam entre os indivíduos.

Foto: Lucia / PPV





Foto: Victor Moriyama

- Estação reprodutiva (maior parte do Brasil): agosto a novembro;
- Filhotes: com bico preto, penas amarelas na cabeça e vermelhas ou amarelas no encontro da asas.

Papagaio-charão


(*Amazona pretrei*)



Foto: Elenise Sipinski

Área de ocorrência

A espécie ocorre nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.



Status de conservação

Lista Internacional
Vulnerável (IUCN, 2017)

Lista Nacional
Vulnerável (MMA, 2014)

Listas Estaduais

- Santa Catarina - não cita a espécie (FATMA, 2011);
- Rio Grande do Sul - Vulnerável (2014);

Observação

A estação reprodutiva do papagaio-charão acontece de setembro a dezembro.



Foto: Fernando Farias

Principais características

- 34 cm de comprimento
- Fronte (teste), redor dos olhos e encontro das asas vermelhas
- Secundárias e partes primárias azuis




Foto: Adrian E. Rupp




Foto: Haroldo Palo Jr.



Foto: Eliton Rezende



- Filhotes com penas vermelhas na testa e ao redor dos olhos.



Foto: Eliton Rezende

- Única espécie de papagaio que apresenta diferença entre os sexos (diformismo sexual);
- Espelho de asa e máscara mais vermelho nos machos

Papagaio-de-peito-roxo


(*Amazona vinacea*)



Foto: Éliton Rezende

Área de ocorrência

A espécie ocorre no sudeste e sul do Brasil, Paraguai e Argentina.



Status de conservação

Lista Internacional

Em Perigo (IUCN, 2017)

Lista Nacional

Vulnerável (MMA, 2014)

Listas Estaduais


- Rio Grande do Sul - Em Perigo (FZB, 2014);
- Santa Catarina - Criticamente Ameaçada (FATMA, 2011);
- Paraná - Vulnerável (Decreto 11.797/2018);
- São Paulo - Ameaçada (Decreto 60.133, 2014);
- Rio de Janeiro - Vulnerável (Diário Oficial, 1997);
- Espírito Santo - Criticamente em Perigo (IEMA, 2015);
- Minas Gerais - Vulnerável (COPAM, 2010);
- Bahia - Criticamente Ameaçada (SEMA, 2017);



Foto: Jonas Kilpp

Principais características

- 35 cm de comprimento
- Loro, fronte e base do bico vermelhos
- Peito arroxeadado, com as penas com as bordas escuras dando um aspecto de escamado
- Nuca azulada com bordas das penas escuras



Observação

A estação reprodutiva do papagaio-de-peito-roxo acontece de setembro a fevereiro.



Foto: Roberto Tomasi Junior

- Antes dos 20 dias de idade as características ainda não estão tão marcantes. A partir de 28 dias, as penas do peito já estão arroxeadas e o vermelho da testa já é aparente.



Foto: Eliton Rezende



Foto: Jonas Kilpp

Observação

As características citadas do peito-arroxeadado variam entre os indivíduos.

Papagaio-de-cara-roxa


(Amazonas brasiliensis)



Foto: Zig Koch

Área de ocorrência

Espécie ocorre na região costeira do litoral sul de São Paulo, todo litoral do Paraná e extremo norte de Santa Catarina.



Status de conservação

Lista Internacional

Quase Ameaçada (IUCN, 2017)

Lista Nacional

Quase Ameaçada (MMA, 2014)

Listas Estaduais

- São Paulo - Ameaçado de Extinção (Decreto 60.133, 2014);
- Paraná - Vulnerável (Decreto 11.797/2018);
- Santa Catarina - Criticamente Ameaçado (FATMA, 2011).



Foto: Zig Koch

Principais características

- 36 cm de comprimento
- Garganta, lados da cabeça arroxeados
- Testa e loros vermelhos
- Retrizes com as pontas vermelhas e amarelo-esverdeadas
- Bordas das penas e das asas amareladas



Foto: Roberta Boss

Observação

A estação reprodutiva do papagaio-de-cara-roxa acontece de outubro a fevereiro.



Foto: Arquivo SPVS



Foto: Zig Koch



Foto: Arquivo SPVS

- Característica dos filhotes: Antes do 20 dias de idade as características ainda não são marcantes. A partir de 28 dias, as penas da testa já estão vermelhas, bochechas azuladas e as asas com as bordas amareladas.



www.PapagaiosdoBrasil.com.br