

Plantas da Floresta Atlântica

– Editores –

*João Renato Stehmann, Rafaela Campostrini Forzza,
Alexandre Salino, Marcos Sobral,
Denise Pinheiro da Costa e Luciana H. Yoshino Kamino*

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Rua Jardim Botânico 1008 - Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22460-180

@ JBRJ

ISBN 978-85-60035-05-2

Presidência da República

LUIS INÁCIO LULA DA SILVA – *Presidente*

Ministério do Meio Ambiente

CARLOS MINC BAUMFELD – *Ministro*

IZABELLA MÔNICA VEIRA TEIXEIRA – *Secretária Executiva*

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

LISZT VIEIRA – *Presidente*

MARLI PIRES MORIM – *Diretora de Pesquisa Científica*

KAREN L. G. DE TONI – *Editoria Científica*

Projeto Gráfico

Carla Molinari

Simone Bittencourt

Editoração

Carla Molinari

Simone Bittencourt

Tratamento de Imagens

Simone Bittencourt

Revisão

Carla Molinari

Capa

Simone Bittencourt,
sobre ilustrações de Maria Alice Rezende

P713 Plantas da Floresta Atlântica / Editores João
Renato Stehmann ... [et al.]. – Rio de Janeiro: Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, 2009.

516 p.

Inclui bibliografia.

ISBN 978-85-60035-05-2

1. Mata Atlântica. 2. Flora. 3. Brasil. I.
Stehmann, João Renato, ed.

CDD 577.35

Apresentação

As iniciativas de documentação da diversidade vegetal no Brasil têm sido realizadas através de ações isoladas, o que dificulta a obtenção e a respectiva compilação das informações sobre a nossa flora. Esse panorama começou a mudar nos últimos anos através de projetos de listagem de espécies, de informatização das coleções e dos herbários virtuais. Nesse contexto, os pesquisadores João Renato Stehmann e Rafaela Campostrini Forzza assumiram o desafio de coordenar um projeto que contou com cerca de 200 taxonomistas para que fosse viável publicar a lista das plantas do Domínio Atlântico, agregando o conhecimento existente para disponibilizar os dados existentes para toda a comunidade.

Os editores iniciam o livro com um histórico do projeto, metodologia para elaboração da lista e, por fim, apresentam uma análise da diversidade total registrada no Domínio Atlântico. Nos capítulos seguintes, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, cada autor fornece uma breve caracterização do respectivo grupo vegetal e discute sua riqueza, endemicidade e conservação.

A lista é a parte mais aguardada deste livro, onde as famílias, gêneros e espécies são apresentados, sendo que para as espécies são fornecidos dados sobre a formação vegetal onde cada uma ocorre, indicação de endemismo e a categoria de ameaça nas diferentes listas vermelhas publicadas. Esta obra representa uma ferramenta multiplicadora para o estudo das plantas localizadas na Floresta Atlântica, fornecendo informações sobre diversidade, endemismo e conservação dos táxons.

Assim, é com muito prazer que apresento esta obra dos editores Drs. João Renato Stehmann, Alexandre Salino e Luciana H. Yoshino Kamino (Universidade Federal de Minas Gerais), Dr. Marcos Sobral (Universidade Federal de São João del-Rey), Dras. Rafaela Campostrini Forzza e Denise Pinheiro da Costa (Jardim Botânico do Rio de Janeiro), não somente pela mesma preencher uma lacuna no conhecimento da flora do Brasil, como também porque registra o concreto resultado do intercâmbio científico entre as instituições brasileiras.

Plantas da Floresta Atlântica é uma obra importante para a comunidade científica brasileira, pois demonstra como viabilizar parcerias profícuas, bem como representa a perseverança na nossa missão de estudo e difusão do conhecimento da flora brasileira.

Liszt Vieira
Presidente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Os resultados de estudos, pesquisas e levantamentos técnico-científicos realizados sobre a Mata Atlântica, especialmente nas últimas duas décadas, confirmam a notável diversidade de espécies desse Domínio. As estratégias de conservação na região sempre foram subsidiadas por essas informações, mas com ênfase na fauna, principalmente dos primatas considerados como “espécies-bandeira”. Entretanto, a complexidade e a exuberância da Mata Atlântica exige um novo olhar, capaz de desvendar outros segredos e verdadeiras jóias desse patrimônio biológico, ou seja, a sua flora.

Esta publicação é uma avaliação inédita e valiosa sobre as plantas da Mata Atlântica. As informações aqui apresentadas são fruto da participação e da colaboração de dezenas de pesquisadores, evidenciando a grande capacidade institucional e a rede de parcerias atuante na região. Os resultados confirmam a posição de destaque da Mata Atlântica entre os *hotspots* mundiais de biodiversidade, assim como ressalta a necessidade de mais investimentos em ciência e tecnologia, devido ao número significativo de espécies novas revelado nesse bioma anualmente e as lacunas de conhecimento ainda existentes para alguns grupos biológicos.

É importante enfatizar ainda que esta publicação torna acessível as informações sobre a flora do Domínio Atlântico. Trata-se, portanto, de uma obra para todos envolvidos com pesquisa, conservação e desenvolvimento sustentável. São dados essenciais para fornecer a ligação entre a análise científica e a tomada de decisões, tão necessárias para expandir os esforços de conservação e a sustentabilidade desse que é um dos maiores repositórios de biodiversidade do planeta.

Luiz Paulo de Souza Pinto
Diretor do Programa Mata Atlântica
Conservação Internacional

Agradecimentos

Esta publicação é resultado do empenho de muitos pesquisadores de instituições nacionais e internacionais que dedicaram uma parte do seu tempo para elaborar a primeira lista das espécies da flora do Domínio Atlântico. A eles, que acreditaram na importância desta obra, agradecemos e dedicamos este trabalho.

Agradecemos também à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) e ao Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), por apoiarem o projeto nas suas diferentes fases.

Por fim, gostaríamos de agradecer à Conservação Internacional (CI) e ao Fundo e Parceria para Ecossistemas Críticos (Critical Ecosystem Partnership Fund - CEPF), que apoiaram nossos projetos na Floresta Atlântica e possibilitaram a organização de uma base de dados, o embrião da publicação que aqui apresentamos.

Sumário

Parte I. Floresta Atlântica: riqueza, endemismo e conservação

Diversidade taxonômica na Floresta Atlântica	3
Briófitas	13
Pteridófitas	19
Gimnospermas e Angiospermas	27

Parte II. Listas das espécies

Lista das Briófitas	41
Lista das Pteridófitas	81
Lista das Gimnospermas e Angiospermas	113

Lista de Autores	501
------------------------	-----

PARTE I

Floresta Atlântica: riqueza, endemismo e conservação



Diversidade taxonômica na Floresta Atlântica

*João Renato Stehmann, Rafaela Campostrini Forzza, Alexandre Salino,
Marcos Sobral, Denise Pinheiro da Costa & Luciana H. Yoshino Kamino*

Introdução

O Domínio da Floresta Atlântica é um complexo de ecossistemas de grande importância, pois abriga uma parcela significativa da diversidade biológica do Brasil e do mundo. Os altos níveis de riqueza e endemismo, associados à destruição sofrida no passado, incluíram a Floresta Atlântica definitivamente no cenário mundial como um dos 34 *hotspots* de biodiversidade (Mittermeier *et al.* 2004). Desde a época da colonização européia, as interferências dos sucessivos ciclos de exploração econômica e das expansões urbana e agroindustrial fizeram com que a vegetação natural da Floresta Atlântica fosse reduzida a valores alarmantes.¹ Calcula-se que a área original cobria entre 1.300.000 a 1.500.000 km², estendendo-se por mais de 3.300 km ao longo da costa leste do Brasil (Morellato & Haddad 2000, Câmara 2005). Os números do que resta da cobertura vegetal variam de acordo com a fonte e a metodologia utilizada (*vide* Galindo-Leal & Câmara 2005, Fundação SOS Mata Atlântica & INPE 2008), porém, dados mais atuais indicam que restam cerca de 11% da vegetação original (Ribeiro *et al.* 2009), distribuída em fragmentos florestais de tamanho reduzido (<100 ha), biologicamente empobrecidos e cuja restauração poderia levar centenas de anos (Liebsch *et al.* 2008).

Aproximadamente 95% da Floresta Atlântica encontra-se em território brasileiro e o restante na Argentina e no Paraguai (Conservation International *et al.* 2000). A região nuclear do Domínio corresponde a uma série de ecossistemas quase contínuos ao longo da costa brasileira, ocorrendo desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Hoje, áreas florestais mais continentais e outras disjuntas inseridas como encaves no Cerrado, Pantanal, Caatinga e Pampa também são consideradas como pertencentes à Floresta Atlântica. Como exemplos podemos citar os brejos de altitude localizados na região da Caatinga, as florestas decíduas ao longo do médio rio São Francisco e ao sul do Piauí, e as florestas decíduas e semidecíduas isoladas ao longo da Serra da Bodoquena no Mato Grosso do Sul (IBGE 2008).

Diferentemente da maioria das florestas tropicais, a Floresta Atlântica possui um conjunto de variáveis geográficas e climáticas que a tornam singular, tais como: 1) amplitude latitudinal de

¹Recomendamos a leitura de Dean (1996) para o conhecimento da história da devastação da Floresta Atlântica.

27 graus, desde os 3°S aos 30°S; 2) uma variação longitudinal máxima de aproximadamente 17°; 3) variação altitudinal desde o nível do mar até 2.890 m nas serras do Complexo da Mantiqueira, e 4) diferenças na pluviosidade, que varia de locais sub-úmidos, com estações secas no nordeste brasileiro, até áreas hiper-úmidas, acima dos 3.600 mm anuais, na Serra do Mar (Rizzini 1979, Thomas *et al.* 1998, Oliveira-Filho & Fontes 2000, Câmara 2005, Silva & Casteleti 2005, Leme & Siqueira-Filho 2006). A heterogeneidade ambiental não foi ainda suficientemente detalhada e seu entendimento é fundamental para que se possa analisar os padrões de distribuição geográfica das espécies, bem como as barreiras que limitam a distribuição dos táxons.

A Floresta Atlântica encontra-se isolada dos grandes blocos florestais sul-americanos (Florestas Amazônica e Andina). Essas formações já foram de alguma forma interligadas no passado (Morley 2000), mas atualmente encontram-se separadas por um corredor mais seco na região que engloba parte das formações da Caatinga, Cerrado e Chaco (Bigarella *et al.* 1975, Ab'Saber 1990, Prado & Gibbs 1993). Assim, a Floresta Atlântica reúne elementos antigos do Terciário, bem como outros que se diferenciaram ou colonizaram a formação durante o Quaternário, resultando em uma flora extremamente rica, formada por uma gama de elementos atlânticos e amazônicos na sua porção tropical (Andrade-Lima 1982, Silva & Casteleti 2005, Santos *et al.* 2007). A evidência dessa ligação pretérita é corroborada pelos elementos compartilhados entre a Floresta Amazônica e as Florestas de Tabuleiros no sul da Bahia e Espírito Santo (Andrade-Lima 1966, Mori *et al.* 1981, 1983, Martini *et al.* 2007, Amorim *et al.* 2008, 2009). Em sua porção sul/sudeste, nas regiões subtropical ou tropical de altitude, encontramos elementos característicos de clima temperado (andinos e austral-antárticos) que se distribuem especialmente na Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Densa Altomontana e nas formações campestres de altitude (Rambo 1951, Safford 2007). Alguns desses elementos estendem sua distribuição geográfica em latitudes mais baixas, até o sul da Bahia, como os gêneros *Drimys* e *Fuchsia* (Amorim *et al.* 2009). Uma síntese dos estudos fitogeográficos brasileiros pode ser encontrada em Fiaschi & Pirani (2009) e para entender melhor as relações biogeográficas e florísticas da Floresta Atlântica sugerimos a leitura de Rizzini (1979), Por (1992), bem como Oliveira-Filho & Fontes (2000), Tabarelli & Cavalcanti (2004), Oliveira-Filho *et al.* (2006) e Leme & Siqueira-Filho (2006). Na última década, análises filogenéticas e filogeográficas com grupos diversificados na Floresta Atlântica, associadas às reconstituições da paisagem do passado através de dados polínicos e/ou modelagem, reacqueram a discussão sobre a história evolutiva do Domínio, fornecendo informações sobre a dinâmica vegetacional e climática no quaternário (Behling & Lichte 1997, Behling & Negrelle 2001, Behling *et al.* 2002, Perret *et al.* 2006, Carnaval & Moritz 2008).

A riqueza da Floresta Atlântica foi estimada por Myers *et al.* (2000) em 20 mil espécies de plantas vasculares, sendo oito mil (40%) endêmicas. Esses números constituíram o marco referencial da diversidade vegetal encontrada nessa floresta, pois permitiram a comparação da riqueza e endemismo em uma escala planetária. Apesar do substantivo aumento do conhecimento acerca da flora da Floresta Atlântica, podemos considerá-la ainda insuficientemente conhecida, visto que em menos de duas décadas, mais de 1.000 novas espécies de angiospermas foram descobertas, o que representa 42% do total descrito para o Brasil neste período (Sobral & Stehmann 2009).

As iniciativas de documentação da diversidade vegetal no Brasil têm sido realizadas através de ações isoladas em diferentes instituições de pesquisa. A consequência disso é a dificuldade na obtenção de informações da nossa flora, um gargalo para a realização de projetos científicos que demandam a identificação correta dos táxons, bem como da utilização sustentada e conservação dos nossos recursos naturais. Esse panorama começou a mudar nos últimos anos, tanto no âmbito nacional como regional, através de projetos de listagens de espécies, elaboração das floras estaduais, informatização das coleções e sua disponibilização em herbários virtuais, bem como da elaboração da Lista da Flora do Brasil, prevista para ser concluída em 2010.

Nesse contexto, aceitamos o desafio de coordenar a publicação da lista das plantas ocorrentes no Domínio Atlântico, acreditando que ao agregar a colaboração dos taxonomistas e juntar o conhecimento existente podemos documentar e disponibilizar dados sobre a sua diversidade vegetal.

Metodologia para elaboração da lista

Em 2005 teve início o projeto *Endemismo de Plantas Vasculares no Bioma Mata Atlântica* com apoio do Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), chamado no Brasil de Fundo e Parceria para Ecossistemas Críticos. O objetivo do CEPF foi consolidar estratégias de conservação integrada da biodiversidade dos *hotspots*, sendo fruto de uma aliança entre a Conservação Internacional, o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, o Banco Mundial, a Fundação MacArthur e o Governo do Japão. Durante dois anos, foi montado um banco de dados contendo informações de ocorrência de espécies endêmicas da Floresta Atlântica, obtidas de bases disponíveis e registros de herbários.

Para avaliar os resultados obtidos nessa etapa, foi realizado entre 13 e 15 de agosto de 2007, em Belo Horizonte, um *workshop* que contou com a participação de pesquisadores e representantes de organizações não-governamentais que atuam nas áreas de taxonomia, ecologia e conservação (Figura 1.1). Nesse evento, decidiu-se pela organização de uma publicação contendo a listagem de todas as espécies de plantas conhecidas do Domínio Atlântico, com a indicação de endemismo e tipos vegetacionais onde ocorrem.

A partir dos resultados obtidos pelo projeto *Endemismo de Plantas Vasculares no Bioma Mata Atlântica* foram elaboradas planilhas parciais por família contendo as seguintes informações para cada espécie: hábito, distribuição geográfica, estado de conservação e a indicação de endemismo para o Domínio. Posteriormente, essas planilhas foram enviadas aos especialistas para correção e complementação dos dados. O resultado deste trabalho é a lista apresentada na Parte II deste livro.

Para a elaboração da lista foi considerado o conceito amplo (*sensu lato*) da Floresta Atlântica, ou seja, um Domínio composto por uma série de tipologias ou unidades fitogeográficas, constituindo um mosaico vegetacional, em concordância com a Lei nº 11.428/2006: "... consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica as seguintes formações florestais nativas e os ecossistemas associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em Mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista; também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual;



Figura 1.1

Participantes do Workshop Endemismos de Plantas Vasculares no Bioma Mata Atlântica. Em pé, da esquerda para a direita: Alexandre Salino, Vinicius C. Souza, Claudio N. Fraga, Adriano P. Paglia, André M. A. Amorim, Luciana C. N. Melo, Rafael C. Spósito, Fábio de Barros, Rubens C. Mota, Leonardo D. Meireles, José A. Siqueira Filho, Gustavo Martinelli, Gustavo Heringer, Renato Goldenberg, Vinicius A. O. Dittrich, Diego Lara, Gabriel Machado, João A. Jarenkow, Rafaela C. Forzza, Márcio S. Werneck, Rafaella C. Ribeiro, Caetano T. Oliveira, Marina W. F. Faria. Em baixo, da esquerda para a direita: Aristônio M. Teles, Ariane L. Peixoto, Thaís E. Almeida, Elena C. Landau, Ademir Reis, Mônica T. Fonseca, Ivana R. Lamas, Luciana H. Y. Kamino, Haroldo C. Lima, João R. Stehmann e Marcos Sobral.

Floresta Estacional Decidual; bem como os manguezais, as vegetações de restingas; campos de altitude; brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste”. A Floresta Atlântica estende-se por quase todo território da província de Misiones, na Argentina, e, no Paraguai, está localizada na região oriental do país, delimitada pelo rio Paraná e cordilheiras de Amambay (a leste e sul), rio Paraguai (a oeste) e rio Apa (ao norte) (Fragano & Clay 2005, Giraudo *et al.* 2005).

A lista é apresentada por grandes grupos, a saber: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nas briófitas, as famílias encontram-se agrupadas em três distintas divisões: Anthocerotophyta (antóceros), Marchantiophyta (hepáticas) e Bryophyta (musgos). Dentro de cada grupo, as famílias estão organizadas em ordem alfabética, assim como os gêneros e as espécies. Para as briófitas a lista segue a classificação de Stotler & Crandall-Stotler (2005) para Anthocerotophyta, He-Nygrén *et al.* (2006) para Marchantiophyta e Buck & Goffinet (2000) para Bryophyta; com relação às pteridófitas, a lista segue a classificação de Kramer & Tryon (1990) para as licófitas e Smith *et al.* (2006) para as samambaias, com a aceitação do gênero *Cnemidaria* em Cyatheaceae; para as angiospermas, seguiu-se APG II (2003), com pequenas modificações. Para as gimnospermas não há ainda uma classificação consensual. Assim

as famílias seguiram os nomes classicamente encontrados na literatura. Categorias taxonômicas infraespecíficas não foram consideradas, assim como híbridos.

Na frente do nome da família e do gênero é apresentado o número de espécies ocorrentes no Domínio Atlântico seguido pelo número total de táxons aceitos para o mundo. O símbolo (*) após o epíteto específico ou genérico indica que a planta é endêmica do Domínio. Também são informadas para cada táxon os tipos vegetacionais onde os mesmos ocorrem, a saber: Floresta Ombrófila Densa/Aberta (FOD); Floresta Ombrófila Mista (FOM); Floresta Estacional Semidecidual (FES); Floresta Estacional Decidual (FED); Formações Campestres (FCA); Afloramentos Rochosos (AFL); Restinga (RST); e Manguezal (MAN). Para possibilitar o reconhecimento da flora adventícia, incluímos a indicação para espécies ruderais e subespontâneas (RUD). A presença em listas de espécies ameaçadas de extinção também foi indicada, bem como a categoria de ameaça. Utilizamos como referências a lista oficial brasileira (MMA 2008), a lista elaborada pela comunidade científica coordenada pela Fundação Biodiversitas (2009) e a lista da IUCN (2009).

Todas as informações apresentadas neste livro acrescidas de hábito, países de ocorrência, material testemunho e referências bibliográficas das espécies estão disponibilizadas no sítio: <<http://www.icb.ufmg.br/bot/mataatlantica/basededados.php>>.

É importante ressaltar que as indicações de distribuição geográfica, endemidade e formações de ocorrência foram de responsabilidade dos autores das listas. Coube aos editores apenas padronizar as informações incluídas e orientar sobre os conceitos e delimitações a serem utilizados. Assim, é possível que não haja uma homogeneidade nessas indicações.

Diversidade

No levantamento aqui apresentado são reconhecidas para o Domínio Atlântico 15.782 espécies, distribuídas em 2.257 gêneros e 348 famílias, o que corresponde cerca de 5% da flora mundial, estimada atualmente em 300.000 espécies de plantas (Judd *et al.* 2009). Do total de gêneros e espécies, 132 (6%) e 7.155 (45%) são endêmicos, respectivamente. As briófitas estão representadas por 1.230 espécies, as pteridófitas por 840, as gimnospermas por quatro e as angiospermas por 13.708.

As plantas vasculares somam 14.552, das quais 6.933 são endêmicas. Essa riqueza é menor do que aquela estimada por Myers *et al.* (2000) para a Floresta Atlântica, porém a taxa de endemidade de 48% é maior do que a predita por esses autores (Tabela 1.1). Isso significa que quase metade de toda a diversidade de plantas vasculares encontradas nessa formação é exclusiva e representa quase 2% das espécies de plantas do planeta. Esses números confirmam ser a Floresta Atlântica o quinto *hotspot* mais rico em endemismo, ficando atrás dos Andes (15.000 espécies), Sunda (15.000), Bacia do Mediterrâneo (11.700) e Madagascar e Ilhas do Oceano Índico (11.600) (Myers *et al.* 2000, Mittermeier *et al.* 2004).

As angiospermas apresentam as maiores taxas de endemismo (6.663 espécies – 49%) e também concentram todos os gêneros endêmicos de plantas vasculares. Das quatro espécies de gimnospermas, apenas o pinheiro-do-paraná, *Araucaria angustifolia*, é endêmica. As pteridófitas apresentaram 269 espécies endêmicas, o que corresponde a cerca de 32% dos táxons. As briófitas apresentam a menor proporção de endemismo, com 222 espécies, o que representa 18% da riqueza (Tabela 1.1).

A análise da distribuição das espécies nas diferentes formações do Domínio Atlântico evidenciou que mais da metade da riqueza (60%) e a maior parte dos endemismos (80%) são encontrados na Floresta Ombrófila Densa. A maior concentração de espécies (9.661) ocorre nas Florestas Ombrófilas Densa/Aberta, seguidas pela Floresta Estacional Semidecidual (3.841), pelas Formações Campestres (3.740), Floresta Ombrófila Mista (2.776), Restinga (1.808), Floresta Estacional Decidual (1.113), Afloramentos Rochosos (1.004), Formações Aquáticas (178) e o Manguezal (65) (Tabela 1.1). Secundariamente, a Floresta Ombrófila Mista teve destaque para as gimnospermas e para as briófitas, enquanto a Floresta Estacional Semidecidual e as Formações Campestres tiveram maior importâncias para as pteridófitas.

A ordem de importância em número de espécies endêmicas por formação foi a seguinte: Floresta Ombrófila Densa (5.164), Floresta Estacional Semidecidual (1.081), Formações Campestres (962), Floresta Ombrófila Mista (946), Restinga (742), Afloramentos Rochosos (420), Floresta Estacional Decidual (165), Manguezal (15) e Formações Aquáticas (14) (Tabela 1.1). Uma discussão detalhada da contribuição da riqueza e endemismo nas diferentes formações vegetais em cada grupo taxonômico é apresentada nos capítulos que se seguem.

Tabela 1.1

Distribuição da riqueza e dos endemismos de plantas nos tipos vegetacionais ocorrentes no Domínio Atlântico (área baseada MMA 2000). FOD/FOA: Floresta Ombrófila Densa/Floresta Ombrófila Aberta; FOM: Floresta Ombrófila Mista; FES/FED: Floresta Estacional Semidecidual/ Floresta Estacional Decidual; FCA: Formações Campestres; AFL: Afloramentos Rochosos; RST: Restinga; MAN: Manguezal.

Grupo taxonômico		Total	FOD/FOA	FOM	FES/FED	FCA	AFL	RST	MAN	FAQ
	Área (km ²)		237.530	168.916	635.552			264.423		
	(%)		(18,18%)	(12,93%)	(48,65%)			(20,24%)		
Briófitas	Espécies	1.230	1.166	600	293/391	6	0	88	14	0
	(%)	(100%)	(95%)	(48%)	(24%/32%)	(0,4%)	(0%)	(7%)	(1%)	(0%)
	Endemismos	222	200	103	10/69	3	0	1	0	0
	(%)	(18%)	(90%)	(46%)	(4%/31%)	(1%)	(0%)	(0,4%)	(0%)	(0%)
Pteridófitas	Espécies	840	631	57	406/38	142	9	14	1	15
	(%)	(100%)	(75%)	(7%)	(48%/4%)	(17%)	(1%)	(2%)	(0,1%)	(2%)
	Endemismos	269	219	15	89/1	41	4	1	0	1
	(%)	(32%)	(81%)	(5,5%)	(33%/0,3%)	(15%)	(1,4%)	(0,3%)	(0%)	(0,3%)
Gimnospermas	Espécies	4	2	2	1/0	0	0	1	0	0
	(%)	(100%)	(50%)	(50%)	(25%/0%)	(0%)	(0%)	(25%)	(0%)	(0%)
	Endemismos	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	(%)	(25%)	(0%)	(100%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)
Angiospermas	Espécies	13.708	7.862	2.117	3.141/684	3.592	995	1.705	50	163
	(%)	(100%)	(57%)	(15%)	(23%/5%)	(26%)	(7%)	(12%)	(0,4%)	(1,2%)
	Endemismos	6.663	4.745	827	982/95	918	416	740	15	13
	(%)	(49%)	(71%)	(12%)	(15%/1%)	(14%)	(6%)	(11%)	(0,2%)	(0,2%)

A vasta perda de habitats e a extrema fragmentação deste Domínio deixaram poucos ecossistemas extensos e intactos, o que pode gerar sérias consequências na manutenção das espécies em longo prazo (Galindo-Leal & Câmara 2005, Ribeiro *et al.* 2009). Em termos de conservação, vale destacar a endemividade encontrada na Restinga (41%), que cobre a planície quaternária da costa brasileira. Esse é um dos ecossistemas mais ameaçados do Domínio Atlântico, tanto pela exploração imobiliária como pelas perspectivas do aquecimento global, com o aumento da temperatura e do nível dos oceanos (Magrin *et al.* 2007). Um esforço para avaliar o estágio de conservação das espécies endêmicas dessa formação se faz urgente.

O número de espécies ameaçadas de extinção na Floresta Atlântica não é consensual (Tabela 1.2). A lista oficial da flora ameaçada de extinção do Brasil (MMA 2008) inclui 238 espécies, enquanto que aquela referendada pela comunidade científica (Fundação Biodiversitas 2009) cita 719 ameaçadas e oito extintas e a da IUCN (2009) refere 160 ameaçadas e quatro extintas. As duas primeiras listas basearam-se em dados obtidos em 2005. Entretanto, um montante de 300 novas espécies (Stehmann *com. pess.*), a maioria restrita ao Domínio, foi descrito nos últimos três anos, o que deixa ambas as listas defasadas. A falta de uma base de dados dinâmica, consistente e atualizada impede o monitoramento e avaliações que nos permitam ter indicadores de mudança do estado de ameaça das espécies, como já vem sendo feito para uma pequena parcela da fauna brasileira (Paglia & Fonseca 2009).

Apesar da publicação desta lista representar um avanço no conhecimento da flora da Floresta Atlântica, enfatizamos que ela deve ser interpretada apenas como a primeira etapa de uma estratégia para conservação. Consideramos importante manter atualizada uma base de dados com informações detalhadas e confiáveis sobre a diversidade, endemividade e estado de conservação das espécies ocorrentes no Domínio. Para conservação, no entanto, será fundamental localizar com precisão e numa escala geográfica mais detalhada, os centros de riqueza e

Tabela 1.2

Número de espécies de plantas ameaçadas de extinção ocorrentes no Domínio Atlântico segundo IUCN (2009), Fundação Biodiversitas (2009) e MMA (2008).

Grupo taxonômico	IUCN					Biodiversitas					MMA AMEAÇADAS
	CR	EN	VU	EX	EW	CR	EN	VU	EX	EW	
Briófitas	0	1	1	0	0	4	3	8	0	0	15
Pteridófitas	1	0	0	0	0	25	30	10	1	0	17
Gimnospermas	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Angiospermas	17	54	86	3	1	110	151	376	3	4	204
Sub-total	18	55	87	3	1	139	185	395	4	4	-
TOTAL	164					727					238

Categoria de Ameaça: CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; EX – Extinta; EW – Extinta na Natureza.

endemismo, aumentar o número de áreas protegidas, bem como compreender os processos históricos e evolutivos que contribuíram para tamanha diversificação. Somente assim poderemos garantir para as futuras gerações a utilização sustentada dos recursos naturais e a gestão do patrimônio genético encontrado em uma das mais exuberantes florestas tropicais do planeta.

Referências Citadas

- Ab' Sáber, A. N. 1990. Paleoclimas quaternários e pré-história da América tropical - II. *Revista Brasileira de Biologia* 50: 821-831.
- Andrade-Lima, D. 1966. Vegetação. *In*: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atlas Nacional do Brasil. Conselho Nacional de Geografia, Rio de Janeiro, 9p.
- Andrade-Lima, D. 1982. Present day forest refuges in Northeastern Brazil. *In*: Prance, G. T. (ed.). Biological diversification in the tropics. Columbia University Press, New York. Pp. 245-254.
- Amorim, A. M.; Thomas, W. W.; Carvalho, A. M. V. & Jardim, J. G. 2008. Floristic of the Una Biological Reserve, Bahia, Brazil. *In*: Thomas, W. W. (ed.). The Atlantic coastal forests of Northeastern Brazil. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 100: 67-146.
- Amorim, A. M.; Jardim, J. G.; Lopes, M. M. M.; Fiaschi, P.; Borges, R. A. X.; Perdiz, R. O. & Thomas, W. W. 2009. Angiospermas em remanescentes de floresta montana no sul da Bahia, Brasil. *Biota Neotropica* 9: 313-348.
- APG - The Angiosperm Phylogeny Group. 2003. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. *Botanical Journal of the Linnean Society* 141: 399-436.
- Behling, H. & Lichte, M. 1997. Evidence of dry and cold climatic conditions at glacial times in tropical SE Brazil. *Quaternary Research* 48: 348-358.
- Behling, H. & Negrelle, R. R. B. 2001. Tropical Rain Forest and climate dynamics of the Atlantic lowland, Southern Brazil, during the Late Quaternary. *Quaternary Research* 56: 383-389.
- Behling, H.; Arz, H. W.; Patzold, J. & Wefer, G. 2002. Late Quaternary vegetational and climate dynamics in southeastern Brazil, inferences from marine cores GeoB 3229-2 and GeoB 3202-1. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 179: 227-243.
- Bigarella, J. J.; Andrade-Lima, D. & Riehs, P. J. 1975. Considerações a respeito das mudanças paleoambientais na distribuição de algumas espécies vegetais e animais no Brasil. *Anais da Academia Brasileira de Ciências* 47: 411- 464.
- Buck, W. R. & Goffinet, B. 2000. Morphology and classification of mosses. *In*: Shaw, A.J. & Goffinet, B. (eds.). *Bryophyte biology*. Cambridge University Press, New York, 476p.
- Câmara, I. G. 2005. Breve história da conservação da Mata Atlântica. *In*: Galindo-Leal, C. & Câmara, I.G. (eds.). *Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas*. Fundação SOS Mata Atlântica/Conservação Internacional, São Paulo/Belo Horizonte. Pp. 31-42.
- Carnaval, A. & Moritz, C. 2008. Historical climate modelling predicts patterns of current biodiversity in the Brazilian Atlantic forest. *Journal of Biogeography* 35: 1187-1201.
- Conservation International, Fundação SOS Mata Atlântica, Fundação Biodiversitas, Instituto de Pesquisas Ecológicas, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo & Instituto de Florestas-MG. 2000. Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da Floresta Atlântica e Campos Sulinos. MMA/SBF, Brasília, 41p.
- Dean, W. 1996. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. Cia. Letras, São Paulo, 484p.
- Fiaschi, P. & Pirani, J. R. 2009. Review of plant biogeographic studies in Brazil. *Journal of Systematics and Evolution* 47: 477-496.

- Fragano, F. & Clay, R. 2005. *Status* da biodiversidade da Mata Atlântica de interior do Paraguai. *In*: Galindo-Leal, C. & Câmara, I. G. (eds.). *Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas*. Fundação SOS Mata Atlântica/Conservação Internacional, São Paulo/Belo Horizonte. Pp. 288-307.
- Fundação Biodiversitas. 2009. Lista da flora brasileira ameaçada de extinção. Disponível em <<http://www.biodiversitas.org.br/floraBr/>>. Acessado em 15 junho 2009.
- Fundação SOS Mata Atlântica & INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 2008. Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica período 2005 – 2008. Relatório Parcial. Fundação SOS Mata Atlântica / Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São Paulo, 156p.
- Galindo-Leal, C. & Câmara, I.G. 2005. *Status* do *hotspot* Mata Atlântica: uma síntese. *In*: Galindo-Leal, C. & Câmara, I. G. (eds.). *Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas*. Fundação SOS Mata Atlântica/Conservação Internacional, São Paulo / Belo Horizonte. Pp. 3-11.
- Giraud, A.; Povedano, H.; Belgrano, M. J.; Krauczuk, E.; Pardiñas, U.; Miquelarena, A.; Ligier, D.; Baldo, D. & Castelino, M. 2005. *Status* da biodiversidade da Mata Atlântica de interior da Argentina. *In*: Galindo-Leal, C. & Câmara, I. G. (eds.). *Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas*. Fundação SOS Mata Atlântica/Conservação Internacional, São Paulo/Belo Horizonte. Pp. 160-180.
- He-Nygrén, X.; Juhlén, A.; Gelnny, D. & Piippo, S. 2006. Illuminating the evolutionary history of liverworts (Marchantiophyta) – towards a natural classification. *Cladistics* 22: 1-31.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2008. Mapa da área de aplicação da Lei nº 11.428 de 2006.
- IUCN. 2009. IUCN redlist of threatened species. Disponível em <<http://www.iucnredlist.org>>. Acessado em 15 setembro 2009.
- Judd, W. S.; Campbell, C. S.; Kellogg, E. A.; Stevens, P. F. & Donoghue, M. J. 2009. *Sistemática vegetal: um enfoque filogenético*. 3 ed. Artmed, Porto Alegre, 632p.
- Kramer, K. U. & Tryon, R. M. 1990. Introduction to the treatment of pteridophytes. *In*: Kramer, K. U. & Green, P. S. *The families and genera of vascular plants*. Springer-Verlag, New York. Pp. 12-13.
- Leme, E. M. C. & Siqueira-Filho, J. A. 2006. A Mata Atlântica - aspectos gerais. *In*: Siqueira-Filho, J. A. & Leme, E. M. C. (eds.). *Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste - Biodiversidade, conservação e suas bromélias*. Andréa Jakobsson Estúdio, Rio de Janeiro. Pp. 47-79.
- Liebsch, D.; Marques, M. C. M. & Goldenberg, R. 2008. How long does the Atlantic Rain Forest take to recover after a disturbance? Changes in species composition and ecological features during secondary succession. *Biological Conservation* 141: 1717–1725.
- Magrin, G.; Gay García, C.; Cruz Choque, D.; Giménez, J. C.; Moreno, A. R.; Nagy, G. J.; Nobre, C. & Villamizar, A. 2007. Latin America. Climate change 2007: Impacts, adaptation and vulnerability. *In*: Parry, M. L.; Canziani, O. F.; Palutikof, J.P.; van der Linden, P. J. & Hanson, C. E. (eds.). *Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge. Pp. 581-615.
- Martini, A. M. Z.; Fiaschi P.; Amorim, A. M. & Paixão, J. L. 2007. A hot-point within a hot-spot: a high diversity site in Brazil's Atlantic Forest. *Biodiversity and Conservation* 16: 3111-3128.
- Mittermeier, R. A.; Gil, P. R.; Hoffmann, M.; Pilgrim, J.; Brooks, T.; Mittermeier, C. G.; Lamourex, J. & Fonseca, G. A. B. 2004. *Hotspots revisited*. CEMEX, Mexico City, 392p.
- MMA - Ministério do Meio Ambiente. 2000. Programa piloto para a proteção das florestas tropicais brasileiras: subprograma Mata Atlântica (PPG7). Versão 1.1. setembro/2000. MMA, Brasília.
- MMA - Ministério do Meio Ambiente. 2008. Instrução Normativa nº 6, 23 de setembro de 2008.
- Morellato, L. P. C. & Haddad, C. F. B. 2000. Introduction: The Brazilian Atlantic Forest. *Biotropica* 32: 786-792.

- Mori, S. A.; Boom, B. M. & Prance, G. T. 1981. Distribution patterns and conservation of eastern Brazilian coastal forest tree species. *Brittonia* 33: 233-245.
- Mori, S. A.; Boom, B. M.; Carvalho, A. M. & Santos, T. S. 1983. Southern Bahian moist forests. *The Botanical Review* 49:155-232.
- Morley, R. J. 2000. Origin and evolution of tropical rain forests. John Wiley & Sons, Chichester 362p.
- Myers, N.; Mittermeier, R. A.; Mittermeier, C. G.; Fonseca, G. A. B. & Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403: 853-858.
- Oliveira-Filho, A. T. & Fontes, M. A. L. 2000. Patterns of floristic differentiation among Atlantic forests in Southeastern Brazil and the influence of climate. *Biotropica* 32: 793-810.
- Oliveira-Filho, A. T.; Jarenkow, J. A. & Rodal, M. J. N. 2006. Floristic relationships of seasonally dry forest of eastern South America based on tree species distribution patterns. *In*: Pennington, R. T. & Rater, J. A. (eds.). *Neotropical Savannas and Seasonally Dry Forests: Plant diversity, biogeography, and conservation*. CRC Press, Boca Raton. Pp. 151-184.
- Paglia, A. P. & Fonseca, G. A. B. 2009. Assessing changes in the conservation status of threatened Brazilian vertebrates. *Biodiversity and Conservation* 13: 3563-3577.
- Perret, M.; Chautems, A. & Spichiger, R. 2006. Dispersal-vicariance analyses in the tribe Sinningieae (Gesneriaceae): A clue to understanding biogeographical history of the Brazilian Atlantic forest. *Annals of Missouri Botanical Garden* 93: 340-358.
- Por, F. D. 1992. Sooretama: the Atlantic Forest of Brazil. SPB Academic Publishing, New York, 130p.
- Prado, D. E. & Gibbs, P. E. 1993. Patterns of species distributions in the dry seasonal forests of South America. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 80: 902-927.
- Rambo, B. 1951. O elemento andino no Pinhal Riograndense. *Anais Botânicos do Herbário Barbosa Rodrigues* 3: 3-39.
- Ribeiro, M. C.; Metzger, J. P.; Martensen, A. C.; Ponzoni, F. J. & Hirota, M. M. 2009. The Brazilian Atlantic Forest: How much is left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. *Biological Conservation* 142: 1144-1156.
- Rizzini, C. T. 1979. Tratado de fitogeografia do Brasil. v.2. Aspectos ecológicos. Hucitec/Edusp, São Paulo, 374p.
- Safford, H. D. 2007. Brazilian Páramos IV. Phytogeography of the campos de altitude. *Journal of Biogeography* 34: 1701-1722.
- Santos, A. M. M.; Cavalcanti, D. R.; Silva J. M. C. & Tabarelli, M. 2007. Biogeographical relationships among tropical forests in North-Eastern Brazil. *Journal of Biogeography* 34: 437-446.
- Silva, J. M. C. & Casteleti, C. H. M. 2005. Estado da biodiversidade da Mata Atlântica brasileira. *In*: Galindo-Leal, C. & Câmara, I. G. (eds.). *Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas*. Fundação SOS Mata Atlântica/Conservação Internacional, São Paulo/Belo Horizonte. Pp. 43-59.
- Smith, A. R.; Pryer, K. M.; Schuettpelz, E.; Korall, P.; Schneider, H. & Wolf, P. G. 2006. A classification for extant ferns. *Taxon* 55: 705-731.
- Sobral, M. & Stehmann, J. R. 2009. An analysis of new angiosperm species discoveries in Brazil (1990 - 2006). *Taxon* 58: 227-232.
- Stotler, R. E. & Crandall-Stotler, B. 2005. A revised classification of the Anthocerotophyta and a checklist of the hornworts of North America, North of México. *Bryologist* 108: 16-26.
- Tabarelli, M. & Cavalcanti, D. R. 2004. Distribuição das plantas amazônico-nordestinas no centro de endemismo Pernambuco: brejos de altitude vs. florestas de terras baixas. *In*: Pôrto, K. C.; Cabral, J. J. P. & Tabarelli, M. (eds.). *Brejos de Altitude: história natural, ecologia e conservação*. Ministério do Meio Ambiente, Brasília. Pp. 279-290.
- Thomas, W. W.; Carvalho, A. M. V.; Amorim, A. M.; Garisson, J. & Arbeláez, A. L. 1998. Plant endemism in two forests in southern Bahia, Brazil. *Biodiversity and Conservation* 7: 311-322.



Briófitas

Denise Pinheiro da Costa

As briófitas são plantas pequenas representadas por três diferentes grupos vegetais, os antóceros, as hepáticas e os musgos, que pertencem, respectivamente, às divisões ou filos Anthocerotophyta (Stotler & Crandall-Stotler 2005), Marchantiophyta (He-Nygrén *et al.* 2006) e Bryophyta (Buck & Goffinet 2000). Fazem parte do sub-reino Embryophyta, caracterizado por plantas que apresentam embrião formado a partir do zigoto, produto da união das células sexuais. Estão incluídas no grupo das criptógamas, ou seja, das plantas sem flores e avasculares. Apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações, onde a geração gametofítica haplóide (n) é dominante, enquanto a geração esporofítica diplóide ($2n$) é dependente da primeira e efêmera. Possuem clorofilas A e B, carotenos, xantofilas, amido, gorduras, celulose e hemicelulose, como os demais membros do reino Plantae (Vanderpoorten & Goffinet 2009).

Podem viver sobre troncos e ramos de árvores (corticícolas), folhas (epífilas), troncos em decomposição (epíxilas), solo (terrícolas) ou rochas (rupícolas), ocorrendo geralmente em locais úmidos, já que necessitam de água para possibilitar a mobilidade dos gametas masculinos flagelados (anterozóides) durante o processo de fecundação. Podem tolerar condições ambientais extremas e por isso estão amplamente distribuídas no mundo, ocorrendo assim nos mais variados ecossistemas e numa grande quantidade de habitats. São encontradas desde o Ártico até as florestas tropicais, desde o deserto até ambientes submersos, mas nunca no ambiente marinho (Delgadillo & Cárdenas 1990). São plantas pioneiras na colonização de ambientes alterados e atuam no combate à erosão do solo e na manutenção da umidade dos ecossistemas pois acumulam a água da chuva (Pócs 1982, Schofield 2001). Segundo Gradstein *et al.* (2001), já existiam no Paleozóico há 300 milhões de anos, pertencendo às mais antigas linhagens de plantas terrestres, com formas próximas às atuais. Permaneceram praticamente sem mudanças morfológicas e com taxas de evolução baixas, sendo por isso consideradas um grupo de plantas “conservativas”.

Gradstein *et al.* (2001) e Shaw & Goffinet (2000) afirmam que são o segundo maior grupo de plantas terrestres, com cerca de 18.000 espécies, sendo cerca de 100 espécies de antóceros, 5.000 de hepáticas e 13.000 de musgos. A maior diversidade encontra-se na região neotropical, com cerca de 4.000 espécies. No Brasil, estima-se que a brioflora apresente cerca de 1.660 espécies, o que representa 41% dos táxons reconhecidos para o neotrópico e 9% para o mundo. Deste total, 11 são de antóceros, 750 de hepáticas e 900 de musgos (Gradstein & Costa 2003, Costa *com. pess.*).

Riqueza e endemismo

No Brasil, a primeira lista de briófitas para a Floresta Atlântica foi elaborada por Pôrto & Germano (2003) para Pernambuco, onde os autores citam 315 espécies, sendo cinco de antóceros, 143 de hepáticas e 167 de musgos. Posteriormente, Costa *et al.* (2005) publicaram um diagnóstico enfatizando a diversidade e importância das briófitas para a conservação dos ecossistemas do estado do Rio de Janeiro, onde apresentam uma lista com 1.039 táxons, sendo cinco de antóceros, 333 de hepáticas e 701 de musgos.


No levantamento apresentado neste livro são reconhecidas para o Domínio Atlântico 1.230 espécies de briófitas, distribuídas em 357 gêneros e 104 famílias. Assim sendo, a Floresta Atlântica é a mais rica região do Brasil em termos de diversidade de briófitas, com 71% dos táxons reconhecidos para o país, 30% para o neotrópico e 6% para o mundo. Do total de 1.230 espécies, 10 são de antóceros (3 famílias e 6 gêneros), 464 são de hepáticas (34 famílias e 110 gêneros) e 756 são de musgos (67 famílias e 241 gêneros).

Entre as 104 famílias de briófitas registradas para a Floresta Atlântica, dez se destacam pela riqueza específica: Lejeuneaceae (194), Sphagnaceae (81), Fissidentaceae (53), Pottiaceae (49), Dicranaceae (49), Bryaceae (49), Sematophyllaceae (48), Orthotrichaceae (44), Pilotrichaceae (43) e Lepidoziaceae (31) (Figura 2.1). Essas famílias também estão entre aquelas de maior representatividade na região tropical (Gradstein & Pócs 1989).

As briófitas ocorrem em todas as formações vegetacionais do Domínio Atlântico, sobretudo na Floresta Ombrófila Densa que conta com 1.166 espécies (95%), seguida da Floresta Ombrófila Mista, com 600 (48%), Floresta Estacional Decidua, com 391 (32%), Floresta Estacional Semidecidual, com 293 (24%), Restinga, com 88 (7%), Manguezal, com 14 (1%) e Formações Campestres/Afloramentos Rochosos, com seis (0,4%) (Tabela 1.1).

Em relação ao endemismo, no total existem 222 espécies endêmicas do Domínio Atlântico (Tabela 2.1), sendo duas de antóceros, 51 de hepáticas e 169 de musgos, o que corresponde a 13% da brioflora conhecida para o país. O número de espécies endêmicas é considerado alto, sendo a maior concentração de táxons encontrada na Serra da Mantiqueira, principalmente no Parque Nacional do Itatiaia. Esse número é mais alto do que aquele citado para outras áreas neotropicais, isso devido provavelmente à extensão territorial e diversidade ecológica do Domínio Atlântico. Dez famílias, especialmente Sphagnaceae, Lejeuneaceae e Sematophyllaceae, se destacam pelo número de táxons endêmicos (Figura 2.1).

Segundo Gradstein *et al.* (2001), os gêneros *Pluvianthus* (hepática), *Cladastomum*, *Crumuscus*, *Itatiella*, *Paranapiacabae* e *Pylasiadelphina* (musgos) são endêmicos do Domínio Atlântico. Além disso, seis outros gêneros com distribuição ampla no mundo são encontrados no neotrópico somente na Floresta Atlântica: *Balantiopsis*, *Saccogynidium*, *Southbya* e *Sphaerocarpus* (hepáticas) e *Sclerodontium* e *Sphaerothecium* (musgos).

**Figura 2.1**

Distribuição da riqueza e endemismo, em número de espécies, nas dez famílias mais importantes de briófitas ocorrentes no Domínio Atlântico.

Conservação

Para promover o conhecimento e a conservação das briófitas na Floresta Atlântica, consideramos importante a realização de inventários florísticos em áreas reconhecidas como lacunas no conhecimento, como os estados da Bahia, do Paraná e de Santa Catarina e o estudo das coleções de briófitas depositadas nos herbários desses estados, bem como naqueles das Regiões Nordeste e Sudeste.

Também é fundamental a elaboração de diferentes ferramentas visando ampliar o conhecimento do grupo, como por exemplo: revisões taxonômicas em famílias ou gêneros pouco conhecidos do ponto de vista taxonômico (*Anthoceros*, *Callicostella*, *Cheilolejeunea*, *Cyclodictyon*, *Entodon*, *Frullania p.p.*, *Hyophila*, *Isopterygium*, *Lejeunea*, *Lepidopilidium*, *Macromitrium*, *Mitthenothamnium*, *Papillaria*, *Physcomitrium*, *Plagiochila p.p.*, *Radula*, *Riccardia*, *Rhynchostegium*, *Schlotheimia*, *Sematophyllum*, *Taxilejeunea* e *Weissia*), floras e listas de espécies para os estados que apresentam diferentes formações do Domínio (principalmente BA, MG, SC e SP) e manuais para estimular o conhecimento e estudo desse grupo.

Para a conservação, é essencial promover a proteção de habitats considerados importantes pela sua diversidade e endemismo; incentivar estudos de biologia das espécies ameaçadas, endêmicas ou raras; avaliar periodicamente o estado de conservação das espécies de briófitas neste Domínio, e, finalmente, propor a criação e/ou ampliação de Unidades de Conservação, principalmente nas Regiões Nordeste e Sul.

Em relação ao estado de conservação dos táxons de briófitas ocorrentes na Floresta Atlântica, dentre as 17 espécies incluídas no Anexo I da Lista Oficial Brasileira (MMA 2008), um total de 15 táxons ocorrem no Domínio Atlântico, sendo nove de hepáticas e seis de musgos.

Tabela 2.1

Distribuição da riqueza e endemismo de espécies nos gêneros mais diversos de briófitas no Domínio Atlântico.


Gênero	Total de espécies no mundo N	Total de espécies no Domínio Atlântico N (%)*	Total de espécies endêmicas do Domínio Atlântico N (%)*
<i>Sphagnum</i>	290	81 (27,9)	53 (18,3)
<i>Fissidens</i>	444	53 (11,9)	4 (0,9)
<i>Campylopus</i>	161	30 (18,6)	7 (4,3)
<i>Frullania</i>	596	29 (4,9)	4 (0,7)
<i>Lejeunea</i>	319	28 (8,8)	7 (2,2)
<i>Metzgeria</i>	94	25 (26,6)	5 (5,3)
<i>Plagiochila</i>	623	24 (3,9)	1 (0,2)
<i>Radula</i>	223	22 (10)	2 (0,9)
<i>Sematophyllum</i>	170	17 (10)	6 (3,5)
<i>Bazzania</i>	251	15 (6)	1 (0,4)
<i>Drepanolejeunea</i>	116	14 (12,1)	2 (1,7)
<i>Macromitrium</i>	368	14 (3,8)	2 (0,5)
<i>Aphanolejeunea</i>	26	13 (50)	1 (3,8)
<i>Chiloscyphus</i>	253	13 (5,1)	1 (0,4)
<i>Schlotheimia</i>	121	13 (10,7)	6 (4,9)
<i>Syrrhopodon</i>	101	13 (12,9)	2 (2)
<i>Bryum</i>	448	12 (2,7)	0
<i>Cheilolejeunea</i>	147	12 (8,2)	0
<i>Philonotis</i>	170	12 (7,1)	1 (0,6)
<i>Riccardia</i>	277	12 (4,3)	1 (0,4)
Outros gêneros	10.272	779 (7,6)	119 (0,8)
Total		1.230	222

*Porcentagem relativa ao total de espécies aceitas no gênero.

Segundo dados da Fundação Biodiversitas (2009), quatro desses táxons estão Criticamente em Perigo (*Erythrophyllum andinum*, *Myriocoleopsis fluviatilis*, *Plagiochila boryana* e *Southbya organensis*), três Em Perigo (*Blepharolejeunea securifolia*, *Drepanolejeunea aculeata* e *Jungermannia decolor*) e oito Vulneráveis (*Atractylocarpus brasiliensis*, *Atractylocarpus longisetus*, *Bromeliophila natans*, *Campylopus densicoma*, *Leptoscyphus gibbosus*, *Leptodontium wallisii*, *Paracromastigum dusenii* e *Pringleella subulata*). É fundamental que haja uma avaliação periódica do estado de conservação das espécies ameaçadas, bem como de espécies com distribuição restrita ao Domínio Atlântico.

Referências Citadas

- Buck, W. R. & Goffinet, B. 2000. Morphology and classification of mosses. *In*: Shaw, A. J. & Goffinet, B. Bryophyte biology. Cambridge University Press, Cambridge, 476p.
- Costa, D. P.; Imbassahy, C. A. A. & Silva, V. P. A. V. 2005. Diversidade e importância das espécies de briófitas na conservação dos ecossistemas do estado do Rio de Janeiro. *Rodriguésia* 56: 13-49.
- Delgadillo M. C. & Cárdenas S. A. 1990. Manual de briófitas. 2 ed. Instituto de Biología da Universidad Nacional Autonoma de Mexico, México, 135p.
- Fundação Biodiversitas. 2009. Lista da flora brasileira ameaçada de extinção. Disponível em <<http://www.biodiversitas.org.br/floraBr/>>. Acessado em 15 junho 2009.
- Gradstein, S. R.; Churchill, S. P. & Salazar-Allen, N. 2001. Guide to the bryophytes of tropical America. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 86: 1-577.
- Gradstein, S. R. & Costa, D. P. 2003. The Hepaticae and Anthocerotae of Brazil. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 87: 1-336.
- Gradstein, S. R. & Pócs, T. 1989. Bryophytes. *In*: Lieth, H. & Werger, M. J. A. (eds.). Tropical Rain Forest ecosystems. Elsevier, Amsterdam. Pp. 311-325.
- He-Nygrén, X.; Juhlén, A.; Gelny, D. & Piippo, S. 2006. Illuminating the evolutionary history of liverworts (Marchantiophyta) – towards a natural classification. *Cladistics* 22: 1-31.
- MMA - Ministério do Meio Ambiente. 2008. Instrução Normativa nº 6, 23 de setembro de 2008.
- Pócs, T. 1982. Tropical forest bryophytes. *In*: Smith, A. J. E. (ed.). Bryophyte ecology. Chapman and Hall, New York. Pp. 59-103.
- Pôrto, K. C. & Germano, S. R. 2003. Biodiversidade e importância das briófitas na conservação dos ecossistemas naturais de Pernambuco. *In*: Tabarelli, M. & Silva, J. M. C. Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco. Massangana, Recife. Pp. 125-152.
- Schofield, W. B. 2001. Introduction to bryology. 2 ed. The Blackburn Press, New Jersey, 431p.
- Shaw, A. J. & Goffinet, B. 2000. Bryophyte biology. Cambridge University Press, Cambridge, 476p.
- Stotler, R. E. & Crandall-Stotler, B. 2005. A revised classification of the Anthocerotophyta and a checklist of the hornworts of North America, North of Mexico. *Bryologist* 108: 16-26.
- Vanderpoorten, A. & Goffinet, B. 2009. Introduction to bryophytes. Cambridge University Press, Cambridge, 303p.



Pteridófitas

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

As pteridófitas são plantas vasculares sem sementes, que apresentam ciclo de vida com alternância de gerações, onde a gametofítica é inconspícua e efêmera, e a esporofítica possui maior porte, complexidade anatômica e período de vida mais longo. Essas plantas estão hoje incluídas em duas linhagens monofiléticas distintas: licófitas e monilófitas (Pryer *et al.* 2004). As licófitas possuem 1.350 espécies, que se distinguem pela presença de micrófilo, e incluem as Lycopodiaceae, Selaginellaceae e Isoetaceae (Moran & Riba 1995). Já a linhagem das monilófitas inclui aproximadamente 11.500 espécies, que possuem megáfilos e uma vascularização distinta com o protoxilema confinado a lobos do cordão do xilema (Pryer *et al.* 2004). Os táxons desta linhagem estão agrupados nas classes Psilotopsida (Ophioglossaceae e Psilotaceae), Equisetopsida (Equisetaceae), Marattiopsida (Marattiaceae) e Polypodiopsida (Smith *et al.* 2006). Este último é o grupo das pteridófitas leptosporangiadas, o maior dentre as monilófitas atuais, com cerca de 11.000 espécies distribuídas em várias famílias e que compreende a maioria das plantas que são vulgarmente chamadas de samambaias ou fetos (Smith *et al.* 2006).

A maior parte das espécies de pteridófitas (ca. 80%) está distribuída nas regiões tropicais do Novo e do Velho Mundo, sendo que aproximadamente 75% dessa riqueza está restrita a duas grandes áreas: o sudeste da Ásia e a Australásia, com cerca de 4.500 espécies, e a região que abrange as Grandes Antilhas, o sudeste do México, a América Central e os Andes (do oeste da Venezuela ao sul da Bolívia), com cerca de 2.250 espécies (Tryon & Tryon 1982).

Para as Américas, estima-se a ocorrência de 3.250 espécies, estando 3.000 distribuídas na região tropical, sendo 40% consideradas endêmicas (Tryon & Tryon 1982). Nesta região, quatro centros de diversidade são reconhecidos: 1) Grandes Antilhas, com cerca de 900 espécies; 2) sul do México e América Central, também com cerca de 900; 3) Andes, com cerca de 1.500; 4) sudeste e sul do Brasil, com cerca de 600 (Tryon & Tryon 1982). Essas regiões de alta diversidade e endemismo coincidem com as áreas montanhosas do neotrópico.

O número de pteridófitas estimado para o Brasil varia de 1.150 (Windisch 1996) a 1.200-1.300 (Prado 1998). Para a Amazônia brasileira é relatada a ocorrência de cerca de 300 (Windisch 1996) a 550 espécies (Prado 2003); para a Região Nordeste, Planalto Central e para a área que vai do sul da Bahia até o norte do Rio Grande do Sul, Prado (2003) estimou a riqueza em cerca de

400, 300 e 800 espécies, respectivamente; para a Região Sul, Windisch (1996) citou 493 espécies. Para as Regiões Sudeste e Sul existem algumas estimativas de riqueza de espécies por estado: São Paulo 500-600 (Prado 1998); Minas Gerais, 687 (Salino & Almeida 2009); Espírito Santo, 420 (Salino *et al.* dados não publicados); Rio de Janeiro, 587 (Sylvestre 2009); Paraná, 390-420 (Salino *et al.* 2005); Santa Catarina, cerca de 420 (Windisch 1996) e Rio Grande do Sul, 270 (Dutra 1938).

Riqueza e endemismo

Foram registradas para a Floresta Atlântica 840 espécies, distribuídas em 116 gêneros e 33 famílias, o que representa 6,4% da diversidade mundial, estimada em 13.000 espécies (Moran 2008). As famílias mais representativas em número de espécies foram Pteridaceae (133), Dryopteridaceae (126), Polypodiaceae (112), Thelypteridaceae (78), Aspleniaceae (58), Hymenophyllaceae (50), Lycopodiaceae (41), Anemiaceae (39), Blechnaceae (27) e Cyatheaceae (25) (Figura 3.1). Já os gêneros mais ricos foram *Thelypteris* (78), *Elaphoglossum* (62), *Asplenium* (55), *Adiantum* (41), *Anemia* (39), *Huperzia* (29), *Blechnum* e *Doryopteris* (26 cada), *Selaginella* (22) e *Hymenophyllum* (21). Dentre os gêneros, merecem destaque ainda *Doryopteris*, *Lellingeria*, *Pecluma*, *Anemia* e *Megalastrum* por possuírem no Domínio grande parte das espécies descritas para o mundo (Tabela 3.1).

É importante ressaltar que algumas espécies paleotropicals subespontâneas no Brasil e ocorrentes na Floresta Atlântica não foram incluídas na listagem, como *Nephrolepis hirsutula* (G. Forst.) C. Presl, *Pteris longifolia* L., *Pteris multifida* Poir., *Pteris vittata* L., *Macrothelypteris torresiana* (Gaudich.) Ching, *Thelypteris dentata* (Forssk.) E.P. St. John e *Deparia petersenii* (Kunze) M. Kato.

A riqueza encontrada na Floresta Atlântica corresponde a 70% das espécies ocorrentes no Brasil, tomando por base a estimativa de 1.200 espécies apresentada por Prado (1998). A distribuição desta riqueza, no entanto, não é homogênea ao longo do Domínio. Do total de espécies não há nenhuma que ocorra exclusivamente ao norte do rio São Francisco e apenas 47 (5,6%) são restritas à Região Sul do Brasil. Isto significa que 94,3% das espécies da Floresta Atlântica podem ser encontradas entre a Bahia e o Rio Grande do Sul. A maior proporção de espécies ocorre em áreas montanhosas com predominância de formações florestais ombrófilas e semidecíduas. Das 840 espécies, 631 (75%) ocorrem em Floresta Ombrófila e 406 (48%) em Floresta Estacional Semidecidual. Nas formações florestais semidecíduais de áreas baixas (como a Floresta de Tabuleiro), florestas decíduas, campos de altitude e formações pioneiras, a riqueza e a taxa de endemismo podem ser consideradas baixas. Apesar disso, foram registradas 142 espécies (17%) em Formações Campestres, muitas delas endêmicas (Tabela 1.1).

Vale destacar dois novos registros para o Brasil: *Alsophila salvinii*, anteriormente conhecida do sul do México até Nicarágua e Peru (Moran 2008) e *Huperzia aqualupiana*, conhecida apenas das Antilhas Ocidentais, Venezuela e Colômbia (Øllgaard 1992). Ambas foram coletadas recentemente em Minas Gerais.

Do total de 840 espécies ocorrentes na Floresta Atlântica, 269 (32%) são consideradas endêmicas do Domínio e estão distribuídas em 16 das 33 famílias registradas na área. Destaca-se

que, dentre as cinco famílias com maior número de espécies endêmicas, apenas Dryopteridaceae apresentou proporção de endemismo acima de 50%, enquanto famílias com baixo número de espécies na Floresta Atlântica apresentaram uma alta proporção de endemismo, como Isoetaceae e Cyatheaceae, com 81,8% e 50%, respectivamente.

Dos 116 gêneros, 44 (38%) possuem espécies endêmicas no Domínio. Dentre os gêneros com mais de 20 espécies na Floresta Atlântica a porcentagem de endemidade variou de 12% (*Adiantum*) a 59% (*Huperzia*). Já alguns gêneros com baixo número de espécies apresentaram alta proporção de espécies endêmicas, atingindo os 100%, como *Stigmatopteris* (Dryopteridaceae), *Eupodium* e *Marattia* (Marattiaceae), *Pellaea* (Pteridaceae), *Sphaeropteris* (Cyatheaceae) e *Zygophlebia* (Polypodiaceae). Também se destacaram *Megalastrum* (Dryopteridaceae), *Isoetes* (Isoetaceae) e *Ceradenia* (Polypodiaceae), todos com taxa alta de endemidade (> 80%).

A identificação dos espécimes registrados é um possível viés na análise de riqueza dos gêneros, uma vez que erros dessa natureza podem subestimar ou superestimar a mesma. Na maior parte dos gêneros e famílias, a identificação é pouco problemática, existindo boas revisões taxonômicas ou materiais identificados por especialistas para comparação. Existem grupos, entretanto, que podem causar alguma distorção nessa análise. O gênero *Anemia*, bem diverso na Floresta Atlântica, apresenta grandes problemas em sua taxonomia e está atualmente em revisão pelo especialista John T. Mickel (The New York Botanical Garden).

Os nomes aceitos e circunscrições dos táxons utilizados neste trabalho seguem esta autoridade. Já *Elaphoglossum* é um grupo extremamente diverso e algumas espécies possuem

Figura 3.1

Distribuição da riqueza e endemismo em número de espécies nas dez famílias mais importantes de pteridófitas ocorrentes no Domínio Atlântico.




Tabela 3.1

Distribuição da riqueza e endemismo de espécies nos gêneros mais diversos de pteridófitas ocorrentes no Domínio Atlântico.

Gênero	Total de espécies no mundo N	Total de espécies no Domínio Atlântico N (%)*	Total de espécies endêmicas do Domínio Atlântico N (%)*
<i>Thelypteris</i>	900	78 (8,6)	36 (4)
<i>Elaphoglossum</i>	600	62 (10,3)	24 (4)
<i>Asplenium</i>	650	55 (8,5)	21 (3,2)
<i>Adiantum</i>	200	42 (21)	5 (2,5)
<i>Anemia</i>	100	39 (39)	12 (12)
<i>Huperzia</i>	300	29 (9,7)	17 (5,6)
<i>Blechnum</i>	200	26 (13)	4 (2)
<i>Doryopteris</i>	30	26 (86,7)	13 (43,3)
<i>Selaginella</i>	700	22 (3,1)	8 (1,14)
<i>Hymenophyllum</i>	250	21 (8,4)	6 (2,4)
<i>Cyathea</i>	120	19 (15,8)	10 (8,3)
<i>Megalastrum</i>	55	18 (32,7)	15 (27,7)
<i>Diplazium</i>	375	17 (4,5)	6 (1,6)
<i>Pteris</i>	250	17 (6,8)	6 (2,4)
<i>Pecluma</i>	35	16 (45,7)	5 (14,2)
<i>Ctenitis</i>	150	15 (10)	10 (6,6)
<i>Pleopeltis</i>	80	14 (17,5)	5 (6,25)
<i>Lellingeria</i>	60	13 (21,7)	8 (13,3)
<i>Lindsaea</i>	150	13 (8,7)	4 (2,7)
<i>Trichomanes</i>	60	13 (21,7)	0
Outros gêneros	7835	286 (3,6)	54 (0,7%)
Total		840	269

*Porcentagem relativa ao total de espécies aceitas no gênero.

populações polimórficas. Estima-se que uma grande parte dos nomes atualmente existentes e aceitos nesse gênero sejam sinônimos. Por isso, a identificação e a determinação dos nomes aceitos foram feitas por comparação com tipos depositados em diversos herbários nacionais e internacionais. Além disso, muito material existente nas coleções brasileiras encontra-se indeterminado.

Em alguns gêneros, adotou-se a revisão taxonômica existente, embora acreditemos que hajam mais espécies na Floresta Atlântica do que o aceite nessas obras. Enquadram-se nessa situação os gêneros *Sticherus* e *Campyloneurum*. Nos gêneros *Adiantum*, *Hypolepis* e *Isoetes*, que estão em estudo ou são pouco conhecidos, pode haver erros de identificação ou na

circunscrição de espécies e subestimativas de riqueza. É importante ressaltar que as identificações duvidosas foram descartadas da listagem, como forma de evitar uma superestimativa da riqueza.

Das 269 espécies endêmicas, 219 (81%) ocorrem em Floresta Ombrófila Densa, 89 (33%) em Floresta Estacional Semidecidual e 41 (15%) em Formações Campestres (Tabela 1.1). A maior proporção de espécies endêmicas na Floresta Ombrófila pode estar associada à maior riqueza nesta fitofisionomia e ao fato desta formação ocorrer nas regiões mais montanhosas da Floresta Atlântica. As regiões montanhosas conhecidamente influenciam a distribuição e diversidade das pteridófitas, impedindo a migração e promovendo níveis elevados de endemismo (Moran 1995).

Tryon (1972) considerava o sudeste e sul do Brasil um dos grandes centros de endemismo de pteridófitas. Baseado nas informações disponíveis em algumas revisões taxonômicas, ele estimou que cerca de 40% das espécies ocorrentes nessa área seriam endêmicas. Embora o autor não considerasse apenas o Domínio Atlântico, os dados aqui encontrados são similares (cerca de 32% de endemismo).

Conservação

A distribuição das coletas na Floresta Atlântica está longe de ser uniforme. As áreas mais bem coletadas no Domínio correspondem àquelas próximas aos centros de pesquisa, principalmente na Região Sudeste, e às áreas no entorno das grandes cidades. Observa-se também que onde há Unidades de Conservação (UC), principalmente as mais antigas, o esforço de coleta é maior do que onde estas não existem. Há um direcionamento de coletas nas florestas ombrófilas, principalmente ao longo do litoral, e consequentemente um menor esforço amostral nas florestas estacionais semidecíduais continentais. Além disso, há lacunas nas regiões de transição com outros Domínios. Vale mencionar também a falta de coletas em grupos específicos que apresentam peculiaridades que influenciam na amostragem, como: a) grupos com folhas dimorfas, nos quais as folhas férteis são produzidas em apenas uma parte do ano (ex.: *Elaphoglossum*, *Polybotrya*, *Lomariopsis* e *Lomagramma*); b) grupos em que as folhas aparecem apenas em um período do ano (*Ophioglossaceae* e *Athyrium*) e c) espécies com esporófitos muito pequenos que passam despercebidos (ex.: *Hymenophyllaceae* e algumas *Polypodiaceae*).

De acordo com MMA (2008), 17 das espécies de pteridófitas registradas no Domínio Atlântico estão ameaçadas de extinção: *Asplenium beckeri*, *A. bradeanum*, *A. castaneum*, *A. schwackei* (*Aspleniaceae*), *Blechnum andinum*, *B. squamipes* (citado como *B. machaenum* var. *squamipes*), *B. sprucei* (*Blechnaceae*), *Dicksonia sellowiana* (*Dicksoniaceae*), *Isoetes bradei* (*Isoetaceae*), *Huperzia aqualupiana* (*Lycopodiaceae*), *Cerademia warmingii*, *Terpsichore semihirsuta* (*Polypodiaceae*), *Adiantum diphyllum*, *Cheilanthes incisa*, *Eriosorus flexuosus*, *E. rufescens* (*Pteridaceae*) e *Thelypteris novaena* (*Thelypteridaceae*).

A lista apresentada pela Fundação Biodiversitas (2009), que teve a participação de todos os taxonomistas de pteridófitas do Brasil, incluiu 65 espécies ameaçadas que ocorrem no Domínio Atlântico, sendo 25 na categoria Criticamente em Perigo (CR), 30 Em Perigo (EN) e 10 Vulnerável (VU),

além de *Asplenium beckeri* Brade indicada como Extinta (EX) (Tabela 1.2). Considerando a lista da Fundação Biodiversitas (2009), constata-se que 7,7% da flora de pteridófitas da Floresta Atlântica está ameaçada. Nesta mesma lista, 36 espécies do Domínio foram consideradas Deficientes em Dados (DD), pois o conhecimento disponível sobre elas não é suficiente para uma classificação do seu estado de conservação. Entretanto, a falta de informação sobre esses táxons não significa que muitos deles não estejam sob ameaça de extinção. A situação desses táxons é merecedora de preocupação, uma vez que não há nenhum mecanismo legal para protegê-las.

Comparando-se as duas listas, observa-se que 48 espécies de pteridófitas consideradas ameaçadas na lista da Fundação Biodiversitas (2009) não foram aceitas como ameaçadas na lista do MMA (2008). Essas espécies foram enquadradas no Anexo II da Instrução Normativa nº 06/2008 que é a lista de espécies da flora brasileira com deficiência de dados. Um reavalição do estado de conservação dessas espécies faz-se atualmente necessária.


Agradecimentos

Agradecemos aos pteridologistas Alan R. Smith (UC), James Hickey (UM) e John Mickel (NY) pelas identificações e esclarecimentos. Aos curadores dos herbários B, BHCB, BM, CEPEC, CESJ, CVRD, ESAL, FI, FLOR, GH, HAS, HB, HBR, HRCB, HUFU, ICN, K, MBML, MO, NY, OUPR, P, PACA, PEUFR, R, RB, SI, SJRP, SP, SPF, UFP, US, VIC e VIES. pela recepção durante as visitas.

Referências Citadas

- Dutra, J. 1938. A flora pteridófitas do estado do Rio Grande do Sul. *In*: 1ª Reunião Sul-Americana de Botânica. Anais da Reunião Sul-Americana de Botânica II, Rio de Janeiro. Pp. 19-68
- Fundação Biodiversitas. 2009. Lista da flora brasileira ameaçada de extinção. Disponível em <<http://www.biodiversitas.org.br/floraBr/>>. Acessado em 15 junho 2009.
- MMA - Ministério do Meio Ambiente. 2008. Instrução Normativa nº 6, 23 de setembro de 2008.
- Moran, R. C. 1995. The importance of montains to pteridophytes, with emphasis on neotropical montane forests. *In*: Churchill, S. P.; Balslev, H.; Forero, E. & Luteyn, J. L. (eds.). Biodiversity and conservation of neotropical montane forests. The New York Botanical Garden, New York. Pp. 359-363.
- Moran, R. C. 2008. Divesity, biogeography, and floristics. *In*: Ranker, T. A. & Haufler, C. H. (eds.). Biology and evolution of ferns and lycophytes. Cambridge University Press, New York. Pp. 367-394.
- Moran, R. C & Riba, R. (eds.). 1995. Lycopodiopsida. *In*: Davidse, G.; Souza, M. & Knapp, S. (eds.). Flora Mesoamericana. Vol. 1. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad del México. Pp. 5.
- Øllgaard, B. 1992. Neotropical Lycopodiaceae – An overview. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 79: 687-717.
- Prado, J. 1998. Pteridófitas do estado de São Paulo. *In*: Bicudo, C. E. M. & Shepherd, G. J. (eds.). Biodiversidade do estado de São Paulo: síntese do conhecimento ao final do século XX – Fungos macroscópicos e plantas. FAPESP, São Paulo. Pp. 49-61.
- Prado, J. 2003. Taxonomia das pteridófitas no Brasil - Revisões e monografias como base para análise da diversidade, o quanto conhecemos sobre a nossa flora. *In*: 54º Congresso Nacional de Botânica. Belém- PA. Desafios da Botânica

- Brasileira no Novo Milênio: Inventário, Sistematização e Conservação da Diversidade Vegetal. Vol. 1. Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém. Pp. 278-279.
- Pryer, K. M.; Schuettpelz, E.; Wolf, P. G.; Schneider, H.; Smith, A. R. & Cranfill, R. 2004. Phylogeny and evolution of ferns (Monilophytes) with a focus on the early leptosporangiate divergences. *American Journal of Botany* 91: 1582- 1598.
- Salino, A. & Almeida, T. E. 2009. Diagnóstico do conhecimento da diversidade botânica: pteridófitas. *In*: Drummond, G. M.; Martins, C. S.; Greco, M. B. & Vieira, F. (org.). Biota Minas: diagnóstico do conhecimento sobre a biodiversidade no estado de Minas Gerais – subsídio ao Programa Biota Minas. Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte. Pp. 331-352.
- Salino, A.; Silva, S. M.; Dittrich, V. A. O. & Britez, R. M. 2005. Flora pteridofítica. *In*: Marques, M. C. M. & Britez, R. M. (eds.). História natural e conservação da Ilha do Mel. Editora UFPR, Curitiba. Pp. 85-101.
- Smith, A. R.; Pryer, K. M.; Schuettpelz, E.; Korall, P.; Schneider, H. & Wolf, P. G. 2006. A classification for extant ferns. *Taxon* 55: 705-731.
- Sylvestre, L. Pteridófitas. *In*: Coelho, M. A. N. (org.). Checklist da flora do Rio de Janeiro. Disponível em <http://www.jbrj.gov.br/pesquisa/div_tax/acessobd.php>. Acessado em 13 novembro 2009.
- Tryon, R. M. 1972. Endemic areas and speciation in tropical American ferns. *Biotropica* 4: 76-84.
- Tryon, R. M. & Tryon, A. F. 1982. Ferns and allied plants with special reference to Tropical America. Springer-Verlag, New York, 857p.
- Zuloaga, F. O.; Morrone, O. & Beltrano, M. J. (eds.) 2008. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur. *Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden* 107: 1-984.
- Windisch, P. G. 1996. Towards assaying biodiversity in Brazilian pteridophytes. *In*: Bicudo, C. E. M. & Menezes, N. A. (eds.). Biodiversity in Brazil. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), São Paulo. Pp. 109-117.



Gimnospermas e Angiospermas

João Renato Stehmann, Rafaela Campostrini Forzza,
Marcos Sobral & Luciana H. Yoshino Kamino

Gimnospermas

As gimnospermas compreendem plantas lenhosas caracterizadas por possuírem óvulos expostos, isto é, sem que estejam protegidos em carpelos. O grupo surgiu há mais de 300 milhões de anos, tendo se diversificado no Mesozóico, mas declinou com a expansão das angiospermas, a partir do Cretáceo. Restam hoje pouco mais de 800 espécies, distribuídas em 15 famílias e cerca de 80 gêneros, que habitam principalmente as regiões temperadas do planeta (Soltis *et al.* 2005). Pertencem ao grupo os pinheiros, os ciprestes e as sequóias, bem como as maiores e mais longevas plantas conhecidas. A sistemática das gimnospermas é ainda bastante controversa, não havendo uma classificação consensual. Há pouco mais de uma década, elas eram reconhecidas como um grupo parafilético, mas estudos utilizando dados moleculares sugeriram a monofilia do grupo (Soltis *et al.* 2005). As dificuldades encontradas na análise evolutiva do grupo devem-se à pequena diversidade encontrada, visto serem os táxons atuais muitos divergentes e distantes geneticamente. Dependendo da classificação utilizada, são reconhecidas três ou quatro linhagens distintas, que compreendem as ordens Coniferales, Gnetales, Cycadales e Ginkgoales (Judd *et al.* 2009), às vezes interpretadas como subclasses (Chase & Reveal 2009).

No Brasil ocorrem 20 espécies pertencentes a seis gêneros: *Araucaria* (Araucariaceae), *Ephedra* (Ephedraceae), *Gnetum* (Gnetaceae), *Podocarpus* e *Retrophyllum* (Podocarpaceae) e *Zamia* (Zamiaceae) (Souza & Lorenzi 2005).

Riqueza e endemismo

No Domínio da Floresta Atlântica são encontradas apenas quatro espécies e os gêneros *Araucaria*, *Podocarpus* e *Ephedra*. *Araucaria*, um elemento austral-antártico na flora brasileira, aparece na Floresta Atlântica unicamente representado por *A. angustifolia*, o pinheiro-do-paraná, espécie endêmica da Floresta Atlântica e certamente a de maior destaque, tanto como elemento na paisagem, como também pela sua importância econômica. A espécie, pela sua arquitetura e abundância, caracteriza fisionomicamente a Floresta Ombrófila Mista, conhecida como a região dos pinhais no sul do Brasil (Veloso *et al.* 1991), uma formação que originalmente cobria 200.000 km²

(Auler *et al.* 2002). Estudos paleoecológicos, utilizando dados palinológicos, mostraram que a expansão da *Araucaria* sobre os campos no planalto sul-brasileiro ocorreu efetivamente no Holoceno Médio e Superior (em torno de 4.320 – 1.000 anos antes do presente), formando uma rede de florestas de galeria ao longo dos rios em meio à vegetação campestre dominante, quando o clima tornou-se mais úmido (Behling 2002). Na região tropical, populações disjuntas de *Araucaria* estão confinadas às áreas de maior altitude (geralmente acima de 1.000 m), especialmente na Serra da Mantiqueira, entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A distribuição geográfica da *Araucaria* também se estende para o interior, atingindo a região nordeste da província de Misiones, na Argentina (Hueck 1953).

A semente da *Araucaria*, conhecida como pinhão, é bastante utilizada na alimentação regional, especialmente nos meses de abril a junho, quando é colhida. Em termos ecológicos, o pinheiro pode ser considerado uma espécie pioneira e suas sementes, abundantes em determinadas épocas do ano, são muito apreciadas pela fauna. Em termos econômicos, o aproveitamento madeireiro do pinho movimentou a economia de parte do sul do Brasil nas décadas de 1960 e 1970, sendo posteriormente as áreas dos pinhais desmatadas para fins agrícolas, especialmente para o plantio de soja e trigo, e mais recentemente utilizadas para o reflorestamento com *Pinus* (Behling & Pillar 2007). A consequência foi a drástica redução em cerca de 90% de sua área original em pouco mais de 40 anos e o empobrecimento genético das populações da espécie, hoje considerada ameaçada de extinção (Ribeiro *et al.* 2009).

Duas espécies de *Podocarpus* são encontradas na Floresta Atlântica, *P. lambertii* e *P. sellowii*, conhecidas popularmente como pinheiros-bravos. A primeira acompanha a *Araucaria*, na Floresta Ombrófila Mista, mas sua distribuição geográfica se estende também para a região Pampeana até o Uruguai; a segunda, distribui-se ao longo da Floresta Atlântica desde o Rio Grande do Sul até as pequenas serras e brejos de altitude no Nordeste, especialmente junto às Florestas Ombrófilas Densa e Estacional Semidecidual, além das florestas de galerias serranas no Domínio do Cerrado.

Na região limítrofe entre a Floresta Atlântica e o Pampa, no Rio Grande do Sul, ocorre *Ephedra tweediana*, um arbusto apoiante que habita a borda dos capões de mata, em solos arenosos, próximos do lago Guaíba, na cidade de Porto Alegre. Sua distribuição estende-se para o sul, na Lagoa dos Patos, e também é encontrada no Uruguai e na Argentina. Embora não possa ser caracterizada como um elemento típico da Floresta Atlântica, sua ocorrência na zona de contato das formações e as poucas populações conhecidas merecem ser destacadas.

Conservação

A conservação das gimnospermas na Floresta Atlântica envolve não somente aspectos biológicos, mas também um olhar biogeográfico, uma vez que as espécies do grupo possuem uma distribuição predominante temperada, e a distribuição tropical de alguns elementos junto às áreas montanhosas é considerada relictual. Dentre as quatro espécies de gimnospermas ocorrentes na Floresta Atlântica, duas são ameaçadas de extinção. *Araucaria angustifolia* está incluída na categoria

Em Perigo (EN) (Fundação Biodiversitas 2009) devido à exploração comercial, redução drástica das populações, da área de ocupação, da extensão de ocorrência, bem como da qualidade do habitat. É importante considerar que a espécie vem sendo explorada – muitas vezes de forma ilegal – com maior ou menor intensidade ao longo de toda sua área de ocorrência. Adicionalmente, faltam ainda iniciativas de reflorestamento e/ou estabelecimento de conectividade entre os remanescentes de forma a garantir a variabilidade genética da espécie (Behling & Safford 2009). Já *Ephedra tweediana* é considerada Vulnerável (VU) (Fundação Biodiversitas 2009) pelo número reduzido de populações conhecidas. Na Floresta Atlântica, sua distribuição é marginal, e parece estar restrita à restinga próxima da região metropolitana de Porto Alegre e áreas junto à Lagoa dos Patos. Apesar de existirem populações na Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger, um raro caso de Unidade de Conservação criada originalmente para preservar uma espécie de planta, esforços para se mapear a área de ocupação desta espécie e localizar novas populações se fazem necessários.

Angiospermas

As angiospermas (Magnoliophyta) compreendem as plantas que produzem flores e frutos. É o grupo de plantas mais diversificado, com cerca de 13.500 gêneros e 250.000 espécies, distribuídos em todas as regiões do planeta (Thorne 1992, 2001). O sucesso evolutivo das angiospermas deve-se às inúmeras aquisições, como a presença de elementos de vaso no sistema vascular, dupla fecundação com formação de endosperma secundário, responsável pela nutrição do embrião, um ciclo reprodutivo relativamente curto e polinização e dispersão extremamente diversificadas e especializadas. Essas e outras estratégias permitiram ao grupo ocupar e se difundir nos diferentes ambientes, mesmo aqueles com condições climáticas e edáficas extremas (Soltis & Soltis 2004, De Bodt *et al.* 2005).

Por muito tempo as dicotiledôneas e as monocotiledôneas constituíram duas classes das angiospermas, as Magnoliopsida e as Liliopsida, respectivamente (Cronquist 1988, Taktajan 1997). Essa divisão, no entanto, tem sido refutada pelos estudos filogenéticos (APG 1998, APG II 2003, APG III 2009) que, utilizando principalmente dados moleculares, sustentam um novo arranjo, reconhecendo as linhagens evolutivas basais com ordens inclusas no grado ANITA e no clado das magnolídeas (originalmente incluídas nas dicotiledôneas), as monocotiledôneas, com sua antiga circunscrição, e as eudicotiledôneas, incluindo a maioria das dicotiledôneas.

As monocotiledôneas são morfologicamente caracterizadas pelo sistema radicular adventício, folhas com nervuras paralelas, flores trímeras e pólen com uma única abertura; já as eudicotiledôneas são sustentadas pelo pólen com três aberturas (ou derivados desse tipo). A nova classificação das angiospermas reconheceu esses grupos supraordinais informais e um total de 45 ordens e 457 famílias (APG II 2003). Recentemente, atualizações foram realizadas nesta classificação (APG III 2009), onde as angiospermas foram reconhecidas como uma subclasse, e os grupos informais, em sua maioria, aceitos como superordens (Chase & Reveal 2009). As eudicotiledôneas são

mais diversificadas, englobando cerca de dois terços da riqueza total, seguidas das monocotilêneas, com um quarto da riqueza, e dos grupos ANITA e magnoliídeas, com um número menor de representantes.


Riqueza e endemismo

A riqueza de plantas vasculares na Floresta Atlântica foi estimada por Myers *et al.* (2000) em 20.000 espécies, sendo 8.000 endêmicas (40%). Essas estimativas, juntamente com o da vegetação remanescente, foram utilizadas para nortear estratégias de conservação a nível global, como a delimitação de *hotspots* (Myers *et al.* 2000; Mittermeyer *et al.* 2004). Como as angiospermas representam 95% das plantas vasculares, a riqueza e a endemidade para a Floresta Atlântica pode ser projetada para 19.000 e 7.600 espécies, respectivamente.

O inventário realizado por cerca de 180 taxonomistas (ver Listagem das Angiospermas) listou 13.708 espécies e 1.782 gêneros agrupados em 208 famílias de angiospermas. Não há famílias exclusivas, mas 126 gêneros (7%) e 6.663 espécies (49%) são endêmicos da Floresta Atlântica (Tabela 1.1). Esses números indicam que a riqueza total estava superestimada, possivelmente resultado do excesso de táxons descritos para a região, ou seja, a existência de mais nomes do que espécies (inflação taxonômica). Vale ressaltar que boa parte da diversidade foi descrita a partir de amostras coletadas pelos naturalistas viajantes no século XIX e concentradas numa faixa estreita da Floresta Atlântica do sudeste do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Para essa região há ainda um número considerável de táxons com identidade obscura, necessitando de revisão. Com relação à proporção de endemismos, os valores obtidos confirmam a elevada riqueza de grupos exclusivos, que perfazem mais de 50% da flora de angiospermas. Para as espécies arbóreas, Mori *et al.* (1981), ao estudar as florestas costeiras do sul da Bahia, haviam registrado taxas semelhantes de endemismo (53%). Esses dados indicam que a Floresta Atlântica teve uma história evolutiva bastante distinta daquela dos outros blocos florestais neotropicais, tendo sido palco no passado de processos de radiação de linhagens evolutivas próprias (gêneros), assim como de intensa diversificação (espécies).

As famílias mais diversas são Orchidaceae (1.257), Fabaceae (945), Asteraceae (910), Bromeliaceae (816), Poaceae (782), Myrtaceae (636), Melastomataceae (571), Euphorbiaceae (473), Rubiaceae (463) e Apocynaceae (323) (Figura 4.1). Essas 10 famílias, em conjunto, somam mais da metade do total de espécies de angiospermas da Floresta Atlântica. Orchidaceae e Bromeliaceae se destacaram tanto em termos de riqueza absoluta, como em endemismos, e são ricas em espécies epifíticas, especialmente nas florestas ombrófilas que recobrem a encosta litorânea.

Orchidaceae destacou-se tanto pela extraordinária riqueza de gêneros (176) quanto pela de espécies (1.257), sendo a família melhor representada no Domínio Atlântico (8% do total de espécies). São dignos de nota os gêneros *Acianthera*, *Habenaria*, *Epidendrum*, *Octomeria* e *Anathallis*, que possuem mais de 50 espécies cada. Com relação à endemidade, 18 gêneros (10%) e 791 espécies (63%) são elementos exclusivos do Domínio. Os gêneros mais ricos acima citados, juntamente

**Figura 4.1**

Distribuição da riqueza e endemismo, em número de espécies, nas dez famílias mais importantes das angiospermas ocorrentes no Domínio Atlântico.

com *Specklinia* e *Pleurothallis*, possuem também o maior número de espécies endêmicas (mais de 30 cada). É sabido que a maior diversidade de Orchidaceae é encontrada na região neotropical, especialmente junto aos Andes, e que o leste do Brasil é considerado a segunda região mais rica (Pridgeon 1995). Orchidaceae é mais abundante e diversa em habitats com pluviosidade anual alta sem meses efetivamente secos, como nas florestas pluviais montanas ou nebulares (Dressler 1981). Isso explica a grande riqueza em gêneros e espécies encontrados na Floresta Atlântica, especialmente junto à Serra do Mar (Brieger 1969). É importante ressaltar que filogenias moleculares têm alterado substantivamente a circunscrição de grupos de Orchidaceae, dividindo gêneros como *Pleurothallis* (Pridgeon & Chase 2001) e *Maxillaria* (Whitten *et al.* 2007) ou unindo outros, como *Cattleya* e *Sophronitis* (van den Berg 2008). Enquanto não houver uma estabilidade na classificação, os números relativos à endemidade genérica podem se alterar, uma vez que 57 gêneros ocorrentes no Domínio são monotípicos (32%), muitos deles endêmicos, de ocorrência restrita e nunca avaliados em estudos filogenéticos com dados moleculares.

Fabaceae, a terceira maior família das angiospermas, é a segunda mais rica no Domínio Atlântico, onde ocorrem 133 gêneros e 945 espécies. *Mimosa*, com 105 espécies, representa mais de 10% de toda a diversidade encontrada na família. Este é um dos maiores gêneros de Fabaceae e possui distribuição predominantemente neotropical, com centros de diversidade no México, sul da Amazônia e adjacências do Paraguai, Argentina e Uruguai (Barneby 1991, Lewis *et al.* 2005). No Brasil, *Mimosa* é bem representado em diferentes formações, como a Caatinga (Queiroz 2009) e o Cerrado *s.l.* (Simon & Proença 2000) e foi considerado um grupo indicador de regiões de endemismos altitudinais nesta última região, o que poderia explicar a alta riqueza do gênero associada às formações campestres da Floresta Atlântica. Outros gêneros com expressiva riqueza foram *Inga* (47), *Machaerium* (39), *Senna* (33) e *Chamaecrista* (33). As análises florísticas do componente arbóreo na Floresta Atlântica

realizadas por Oliveira-Filho & Fontes (2000) evidenciaram que de maneira geral a importância da família é maior nas terras baixas, tanto junto das florestas ombrófilas como das estacionais, e que os gêneros mais importantes nestas formações seriam *Inga* e *Machaerium*. Com relação à endemidade, foram registrados sete gêneros e 391 espécies endêmicas, o que representa respectivamente 5% e 42% do total, um valor menor que a média das outras nove famílias mais diversas no Domínio. É possível que a menor endemidade relativa registrada esteja associada à preferência de grande parte das Fabaceae a áreas mais secas e quentes, encontradas apenas em parte do Domínio Atlântico. Uma altíssima taxa de endemidade foi registrada nos gêneros *Machaerium* e *Swartzia*, 83 e 79%, respectivamente.

Embora mais diversificada nos ambientes campestres, Asteraceae figurou como a terceira família mais rica no Domínio Atlântico. Foram registrados 140 gêneros e 910 espécies, com especial destaque para *Mikania* e *Baccharis*, que estão representados por 122 e 113 espécies, respectivamente, o que representa 26% do total da riqueza da família. O primeiro gênero, predominantemente escandente e de ambiente florestal, possui aproximadamente 400 espécies, das quais cerca de 170 ocorrem no Brasil (King & Robinson 1987). O segundo, geralmente arbustivo, é encontrado preferencialmente nas formações campestres, possui maior riqueza e endemidade associada a regiões mais altas, como os campos de altitude (Barroso 1976). No Brasil, a Região Sudeste concentra a maior parte da riqueza de ambos os gêneros (Barroso 1958, Müller 2006). Com relação à presença de endemismos, há sete gêneros e cerca de 250 espécies endêmicas do Domínio, a maioria pertencente aos dois gêneros mais ricos supracitados. À exceção de uns poucos gêneros, como *Senecio* e *Piptocarpha*, que são bem representados por espécies endêmicas, a grande maioria dos gêneros de Asteraceae contabiliza um número pequeno de espécies com distribuição restrita, o que parece estar relacionado ao habitat preferencial campestre, menos representado no Domínio.

Bromeliaceae, apesar de não figurar entre as mais diversas famílias de angiospermas, aparece como a quarta mais rica em número de espécies no Domínio Atlântico. Das quase 3.100 espécies aceitas, 816 foram registradas neste levantamento (cerca de 25% do total da família) e 651 destas são endêmicas (80% do total). Esses números evidenciam a costa leste do Brasil como um grande centro de diversidade e de endemismo da família, como já referido por diversos autores (ver Smith 1955 e Martinelli *et al.* 2008). Dos 31 gêneros registrados, dez são endêmicos (*Canistropsis*, *Canistrum*, *Edmundoa*, *Eduandrea*, *Fernseea*, *Lymania*, *Nidularium*, *Portea*, *Quesnelia* e *Wittrockia*) e abrigam 118 espécies. *Vriesea*, *Aechmea* e *Neoregelia* são os mais diversos e juntos somam quase metade das espécies de Bromeliaceae da Floresta Atlântica. Também merecem destaque *Alcantarea*, *Cryptanthus* e *Orthophytum* que não são exclusivos da Floresta Atlântica, mas apresentam neste Domínio seus centros de diversidade.

Os gêneros mais diversos na Floresta Atlântica são *Eugenia*, *Begonia*, *Croton*, *Solanum*, *Vriesea*, *Leandra*, *Aechmea*, *Piper*, *Myrcia* e *Peperomia* (Tabela 4.1). Alguns deles, como *Eugenia*, *Solanum*, *Croton*, *Piper* e *Begonia* são amplamente distribuídos nas regiões tropicais (Frodin 2004), mas outros como *Miconia*, *Leandra*, *Vriesea* e *Aechmea* são tipicamente neotropicais. Os vinte maiores gêneros, juntos, são responsáveis por cerca de 19% da riqueza total de espécies, bem como por 11,3% do

Tabela 4.1

Distribuição da riqueza e endemismo de espécies nos gêneros mais diversos de angiospermas ocorrentes no Domínio Atlântico.

Gênero	Total de espécies no mundo N	Total de espécies no Domínio Atlântico N (%)*	Total de espécies endêmicas do Domínio Atlântico N (%)*
<i>Eugenia</i>	600	241 (40)	202 (34)
<i>Begonia</i>	ca. 1400	179 (13)	133 (10)
<i>Croton</i>	750	172 (23)	37 (5)
<i>Solanum</i>	1500	171 (11)	112 (8)
<i>Vriesea</i>	250	165 (66)	144 (58)
<i>Leandra</i>	250	149 (60)	132 (53)
<i>Aechmea</i>	254	136 (54)	120 (47)
<i>Piper</i>	1000	135 (14)	57 (6)
<i>Myrcia</i>	350	132 (38)	101 (29)
<i>Peperomia</i>	1000	125 (13)	48 (5)
<i>Mikania</i>	400	122 (31)	36 (9)
<i>Miconia</i>	1050	115 (11)	75 (7)
<i>Baccharis</i>	ca. 360	113 (31)	50 (14)
<i>Paspalum</i>	ca. 400	116 (27)	7 (2)
<i>Mimosa</i>	ca. 500	105 (21)	58 (12)
<i>Tibouchina</i>	240	104 (43)	85 (35)
<i>Neoregelia</i>	112	97 (87)	87 (78)
<i>Paepalanthus</i>	ca. 500	91 (18)	64 (13)
<i>Hyptis</i>	280	85 (30)	16 (6)
<i>Acianthera</i>	140	78 (56)	59 (42)
Total		2631	1622

*Porcentagem relativa ao total de espécies aceitas no gênero.

endemismo encontrado na Floresta Atlântica (Tabela 4.1). Estudos centrados no entendimento das relações evolutivas desses táxons, na datação dos eventos de radiação e dos padrões de distribuição geográfica das espécies poderão fornecer evidências acerca da evolução florística ocorrida no Domínio.

Analisando a distribuição da riqueza e dos endemismos nas tipologias vegetacionais encontradas no Domínio da Floresta Atlântica (Tabela 1.1), observa-se que grande parte da riqueza está associada à Floresta Ombrófila Densa. Essa formação, que representa pouco mais de 18% da área de cobertura total, concentra aproximadamente 57% da riqueza e 71% das espécies endêmicas. Vale destacar também a importância da Floresta Estacional Semidecidual e Decidual, bem como das formações campestres, que juntas contém cerca de 50% da diversidade. Outra formação que merece destaque é a Restinga, que compreende uma estreita faixa arenosa litorânea formada por depósitos

quaternários, para a qual foram registradas 1.706 espécies, quase metade delas endêmicas do Domínio. É importante ressaltar que esses números incluem espécies que ocorrem em mais de uma formação vegetal.

Conservação

Atualmente, a principal estratégia para conservação da natureza é o estabelecimento e a manutenção de áreas protegidas, que contemplam a inclusão de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção (Heywood & Iriondo 2003, Young 2007). Com relação ao Domínio Atlântico, a comunidade científica reconhece 637 espécies de angiospermas ameaçadas de extinção, sendo que 110 estão inseridas na categoria Criticamente em Perigo, 151 Em Perigo e 376 Vulnerável (Fundação Biodiversitas 2009). Dentre essas, 204 espécies constam no Anexo I da lista oficial do governo brasileiro (MMA 2008) e 157 espécies na lista mundial da IUCN (2009) (Tabela 1.2). Ressalta-se que do total das angiospermas ameaçadas indicadas pela comunidade científica, 83% (529) são endêmicas da Floresta Atlântica, especialmente junto às famílias Bromeliaceae, Myrtaceae, Malpighiaceae, Rubiaceae, Asteraceae, Melastomataceae e Orchidaceae.

Diferentemente das gimnospermas, a distribuição das angiospermas ameaçadas está dispersa em todas as fitofisionomias vegetacionais. As Florestas Ombrófilas Densas concentram o maior número de espécies ameaçadas (356), seguidas das Formações Campestres (108), Restingas (96), Afloramentos Rochosos (91), Florestas Estacionais Semidecíduais (86), Florestas Ombrófilas Mistas (51), Florestas Decíduais (21), Manguezais e Formações Aquáticas, essas com duas espécies.

Os motivos pelos quais as espécies da Floresta Atlântica estão ameaçadas já são bem conhecidos, sendo as causas diretas perda do hábitat, fragmentação, introdução de espécies exóticas e exploração de espécies com valor comercial, que estão associados a fatores sociais, culturais, políticos e econômicos.² Muitas espécies abundantes no passado hoje são raras na natureza, com populações em declínio, restritas a áreas de difícil acesso ou extintas localmente. Inúmeros são os exemplos que ilustram as consequências causadas pelas atividades humanas. Espécies arbóreas como o pau-brasil (*Caesalpinia echinata*), jacarandá-da-bahia (*Dalbergia nigra*), a braúna (*Melanoxylon brauna*) e a imbuia (*Ocotea porosa*), apreciadas pela qualidade e pelo alto valor comercial de sua madeira, foram extraídas exaustivamente, levando também à destruição de milhares de hectares de matas nativas (Gonzaga 2006).

Além da madeira, outros recursos biológicos são alvos da exploração, como por exemplo, o extrativismo exacerbado do palmito (*Euterpe edulis*), que é muito utilizado na culinária brasileira. O extrativismo ocorreu ao longo de séculos, contribuindo para diminuição de populações e levando a inclusão da palmeira nas listas nacionais e estaduais das espécies ameaçadas de extinção (Pivari & Forzza 2004). Outro tipo de extrativismo é a coleta predatória visando o comércio ilegal de espécies com potencial ornamental como bromélias, orquídeas e cactos.

²Para maiores detalhes recomendamos a leitura de Dean (1996), Galindo Leal *et al.* (2005) e Siqueira-Filho & Leme (2006).

Exemplos acima ilustram casos isolados de exploração de angiospermas, mas que no somatório vêm modificando áreas contínuas em inúmeros fragmentos isolados, de tamanhos diferentes, promovendo a simplificação biológica nos remanescentes naturais (Tabarelli & Gascon 2005).

A presença das angiospermas ameaçadas de extinção em Unidades de Conservação nunca foi efetivamente avaliada. Dessa forma, não sabemos quais e quantas espécies encontram-se protegidas nos sistemas de Unidades de Conservação, que hoje totaliza apenas 2% da área total do Domínio. É emblemático o caso de *Anomochloa marantoidea*, o táxon mais basal da família Poaceae, conhecido apenas por três populações no sul da Bahia, e que não se encontra protegido (Filgueiras & Gonçalves 2004). Como este caso, dezenas de outros podem ser enumerados.

O conhecimento taxonômico das angiospermas brasileiras avançou muito nos últimos anos, especialmente nas regiões próximas aos grandes centros de pesquisa das Regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Para algumas áreas da Floresta Atlântica certamente ele é ainda insuficiente, o que é atestado pelas espécies conhecidas apenas de coletas antigas ou mesmo só pelo seu tipo nomenclatural (Martinelli *et al.* 2008) e as outras tantas recentemente descritas ou desconhecidas para a ciência, que possivelmente já se encontram ameaçadas (Sobral & Stehmann 2009). Esperamos, por fim, que a listagem de angiospermas aqui apresentada, especialmente aquela de endemismos, seja foco de especial atenção nas futuras avaliações sobre o estado de conservação da flora brasileira, contribuindo assim para a preservação deste inestimável patrimônio biológico que representa cerca de 5% da diversidade mundial do grupo.

Referências Citadas

- APG - The Angiosperm Phylogeny Group. 1998. An ordinal classification for the families of flowering plants. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 85: 531-553.
- APG - The Angiosperm Phylogeny Group. 2003. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants - APG II. *Botanical Journal of the Linnean Society* 141: 399-436.
- APG - The Angiosperm Phylogeny Group. 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. *Botanical Journal of the Linnean Society* 161: 105-121.
- Auler, N. M. F.; Reis, M. S.; Guerra, M. P. & Nodari, R. O. 2002. The genetics and conservation of *Araucaria angustifolia*: Genetic structure and diversity of natural populations by means of non-adaptive variation in the state of Santa Catarina, Brazil. *Genetics and Molecular Biology* 25: 329-338.
- Barneby, R. C. 1991. *Sensitivae censitae*, a description of the genus *Mimosa* L. (Mimosaceae) in the New World. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 65: 1-835.
- Barroso, G. M. 1958. Mikaniae do Brasil. *Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro* 16: 239-333.
- Barroso, G. M. 1976. Compositae - subtribo Baccharidinae Hoffmann. Estudo das espécies ocorrentes no Brasil. *Rodriguésia* 28: 1-272.
- Behling, H. & Pillar, V. P. 2007. Late quaternary vegetation, biodiversity and fire dynamics on the southern Brazilian highland and their implication for conservation and management of modern *Araucaria* forest and grassland ecosystems. *Philosophical Transactions of the Royal Society, Botany* 362: 243-251.
- Behling, H. 2002. South and Southeast Brazilian grasslands during late quaternary times: A synthesis. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 177: 19-27.

- Behling, H. & Safford, H. D. 2009. Late glacial and holocene vegetation climate and fire dynamics in the Serra dos Orgãos, Rio de Janeiro State, Southeastern Brazil. *Global Change Biology* DOI 10.1111/j.1365/2486.2009.02029.x.
- Brieger, F. G. 1969. Patterns of evolutionary and geographic distribution in Neotropical orchids. *Biological Journal of Linnean Society* 1: 197-217.
- Chase, M. W. & Reveal, J. L. 2009. A phylogenetic classification of the land plants to accompany APG III. *Botanical Journal Linnean Society* 161: 122-127.
- Cronquist, A. 1988. The evolution and classification of flowering plants. 2 ed. The New York Botanical Garden, New York, 555p.
- De Bodt, S.; Maere, S. & Van de Peer, Y. 2005. Genome duplication and the origin of angiosperms. *Trends in Ecology and Evolution* 20: 591-597.
- Dean, W. 1996. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. Cia. Letras, São Paulo, 484p.
- Dressler, R. L. 1981. The orchids: Natural history and classification. Harvard University Press, Cambridge, 286p.
- Filgueiras, T. & Gonçalves, A. P. S. 2004. A checklist of the basal grasses and bamboos in Brazil (Poaceae). *Bamboo Science and Culture: The Journal of the American Bamboo Society* 18: 7-18.
- Frodin, V. G. 2004. History and concepts of big plant genera. *Taxon* 53: 753-776.
- Fundação Biodiversitas. 2009. Lista da flora brasileira ameaçada de extinção. Disponível em <<http://www.biodiversitas.org.br/floraBr/>>. Acessado em 15 junho 2009.
- Galindo-Leal, C.; Jacobsen, T. R.; Langhammer, P. F. & Olivieri, S. 2005. Estado dos *hotspots*: a dinâmica da perda de biodiversidade. In: Galindo-Leal, C. & Câmara, I. G. Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas. Fundação SOS Mata Atlântica/Conservação Internacional, São Paulo/Belo Horizonte. Pp. 12-23.
- Gonzaga, A. L. 2006. Madeira: uso e conservação. IPHAN, Brasília, 244p.
- Heywood, V. H. & Iriondo, J. M. 2003. Plant conservation: old problems, new perspectives. *Biological Conservation* 113: 321-335.
- Hueck, K. 1953. Distribuição e habitat natural do pinheiro do Paraná (*Araucaria angustifolia*). *Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, Botânica*, 10: 1-24.
- IUCN. 2009. IUCN redlist of threatened species. Disponível em <<http://www.iucnredlist.org>>. Acessado em 15 setembro 2009.
- Judd, W. S.; Campbell, C. S.; Kellogg, E. A.; Stevens, P. F. & Donoghue, M. J. 2009. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. 3 ed. Artmed, Porto Alegre, 632p.
- King, R. M. & Robinson, H. 1987. The genera of the Eupatorieae (Asteraceae). Allen Press, Lawrence, 581p.
- Lewis, G. P.; Schrire, B.; Mackinder, B. & Lock, M. 2005. Legumes of the world. Royal Botanic Gardens, Kew. 577p.
- Martinelli, G.; Vieira, C.M.; Gonzalez, M.; Leitman, P.; Piratininga, A.; Costa, A.F.C. & Forzza, R.C. 2008. Bromeliaceae da Mata Atlântica brasileira: lista de espécies, distribuição e conservação. *Rodriguésia* 59: 209-258.
- Mittermeier, R. A.; Gil, P. R.; Hoffmann, M.; Pilgrim, J.; Brooks, T.; Mittermeier, C. G.; Lamourex, J. & Fonseca, G. A. B. 2004. Hotspots revisited. CEMEX, Mexico City, 392p.
- MMA - Ministério do Meio Ambiente. 2008. Instrução Normativa nº 6, 23 de setembro de 2008.
- Mori, S. A.; Boom, B. M. & Prance, G. T. 1981. Distribution patterns and conservation of Eastern Brazilian coastal forest tree species. *Brittonia* 32: 233-245.
- Müller, J. 2006. Systematic of *Baccharis* (Compositae-Astereae) in Bolivia, including a overview of the genus. *Systematic Botany Monographs* 76: 1-341.

- Myers, N.; Mittermeier, R. A.; Mittermeier, C. G.; Fonseca, G. A. B. & Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403: 853-858.
- Oliveira-Filho, A. T. & Fontes, M. A. L. 2000. Patterns of floristic differentiation among Atlantic forests in Southeastern Brazil and the influence of Climate. *Biotropica* 32: 793-810.
- Pivari, M. O. & Forzza, R. C. 2004. A família Palmae na Reserva Biológica da Represa do Grama - Descoberto, Minas Gerais, Brasil. *Rodriguésia* 55:115-124.
- Pridgeon, A. 1995. The illustrated encyclopaedia of orchids. Timber Press, Portland, 83p.
- Pridgeon, A. M. & Chase, M. W. 2001. A phylogenetic reclassification of Pleurothallidinae (Orchidaceae). *Lindleyana* 16: 235-271.
- Queiroz, L. P. 2009. Leguminosas da Caatinga. Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. 467p.
- Ribeiro, M. C.; Metzger, J. P.; Martensen, A. C.; Ponzoni, F. J. & Hirota, M. M. 2009. The Brazilian Atlantic Forest: how much is left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. *Biological Conservation* 142: 1144-1156.
- Sobral, M. & Stehmann, J. R. 2009. An analysis of new angiosperm species discoveries in Brazil (1990-2006). *Taxon* 58: 227-232.
- Siqueira-Filho, J. A. & Leme, E. M. C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste. Biodiversidade, conservação e suas bromélias. Andrea Jakobsson Estúdio, Rio de Janeiro, 415p.
- Simon, M. F. & Proença, C. 2000. Phytogeographic patterns of *Mimosa* (Mimosoideae, Leguminosae) in the Cerrado biome of Brazil: an indicator genus of high-altitude center of endemism? *Biological Conservation* 96: 279-296.
- Soltis, D. E.; Soltis, P. S.; Endress, P. K. & Chase, M. W. 2005. Phylogeny and evolution of angiosperms. Sinauer Associates, Sunderland. 370p.
- Soltis, P. S. & Soltis, D. E. 2004. The origin and diversification of angiosperms. *American Journal of Botany* 91: 1614-1626.
- Souza, V. C. & Lorenzi, H. 2005. Botânica sistemática: guia ilustrado para a identificação das famílias de angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. Instituto Plantarum, Nova Odessa, 640p.
- Smith, L. B. 1955. The Bromeliaceae of Brazil. *Smithsonian Miscellaneous Collections* 126: 1-290.
- Tabarelli, M. & Gascon, C. 2005. Lessons from fragmentation research: improving management and policy guidelines for biodiversity conservation. *Conservation Biology* 19: 734-739.
- Takhtajan, A. 1997. Diversity and classification of flowering plants. Columbia University Press, New York, 620p.
- Thorne, R. F. 1992. Classification and geography of the flowering plants. *Botanical Review* 58: 225-348.
- Thorne, R. F. 2001. Classification and geography of the flowering plants: Dicotyledons of the class Angiospermae. *Botanical Review* 66: 441-647.
- van den Berg, C. 2008. New combinations in the genus *Cattleya* Lindl. (Orchidaceae). *Neodiversity* 3: 3-12.
- Veloso, H. P.; Rangel Filho, A. L. R. & Lima, J. C. A. 1991. Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal. IBGE, Rio de Janeiro, 123p.
- Whitten, W. M.; Blanco, M. A.; Williams, N. H.; Koehler, S.; Carnevali, G.; Singer, R. B.; Endara, L. & Neubig, K. M. 2007. Molecular phylogenetics of *Maxillaria* and related genera (Orchidaceae: Cymbidieae) based upon combined molecular data sets. *American Journal of Botany* 94: 1860-1889.
- Young, B. E. 2007. Endemic species distributions on the east slope of the Andes in Peru and Bolivia. *NatureServe*, Arlington, 91p.

PARTE II

Lista de Espécies



Lista de Briófitas

Briófitas – Antóceros

Denise Pinheiro da Costa, Nívea Dias dos Santos, Caio Amitrano
Alencar Imbassahy & Douglas Junqueira Lopes

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ANTHOCEROTACEAE – 3/80				
<i>Anthoceros</i> – 2/61				
<i>A. lamellatus</i> Steph.*	FOD	-	-	-
<i>A. punctatus</i> L.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Folioceros</i> – 1/17				
<i>F. apiahyanus</i> (Steph.) Hässel*	FOD	-	-	-
DENDROCEROTACEAE – 2/77				
<i>Dendroceros</i> – 1/43				
<i>D. crispus</i> (Sw.) Nees	FOD	-	-	-
<i>Megaceros</i> – 1/21				
<i>M. vicentianus</i> (Lehm. & Lindenb.) Campb.	FOD, FES	-	-	-
NOTOTHYLADACEAE – 5/65				
<i>Phaeoceros</i> – 2/42				
<i>P. bulbiculosus</i> (Broth.) Prosk.	FOD	-	-	-
<i>P. laevis</i> (L.) Prosk.	FES, FOM, FOD	-	-	-
<i>Notothylas</i> – 3/20				
<i>N. breutelii</i> (Gottsche) Gottsche	FES	-	-	-
<i>N. orbicularis</i> (Schwein.) Sull.	FES	-	-	-
<i>N. vitalii</i> Udar & Singh	FES	-	-	-

Briófitas – Hepáticas

Denise Pinheiro da Costa, Nívea Dias dos Santos, Caio Amitrano
Alencar Imbassahy & Douglas Junqueira Lopes

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ACROBOLBACEAE – 2/50				
<i>Lethocolea</i> – 1/8				
<i>L. glossophylla</i> (Spruce) Grolle	FOD	-	-	-
<i>Tylimanthus</i> – 1/12				
<i>T. laxus</i> (Lehm. & Lindenb.) Spruce	FOD, FOM	-	-	-
ADELANTHACEAE – 2/19				
<i>Adelanthus</i> – 2/15				
<i>A. carabayensis</i> (Mont.) Grolle	FOD	-	-	-
<i>A. decipiens</i> (Hook.) Mitt.	FOD	-	-	-

(*) Caráter endêmico do grupo taxonômico: gênero e espécie.

Os números que estão à frente de cada gênero e família representam o número de espécies ocorrentes na Floresta Atlântica e número total de espécies ocorrentes no mundo, respectivamente.

Vegetação: FOD – Floresta Ombrófila Densa/Aberta; FOM – Floresta Ombrófila Mista; FES – Floresta Estacional Semidecidual; FED – Floresta Estacional Decidual; FCA – Formações Campestres; AFL – Afloramentos Rochosos; RST – Restinga; MAN – Manguezal; RUD – Ruderal.

Categoria de Ameaça: CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; EX – Extinta; EW – Extinta na Natureza; ANEXO I – Ameaçada e ANEXO II – Dados Deficientes.

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ANEURACEAE – 14/326				
Aneura – 2/43				
A. pinguis (L.) Dumort.	FOD	-	-	-
A. pseudopinguis (Herzog) Pócs	FOM, FOD	-	-	-
Riccardia – 12/277				
R. amazonica (Spruce) S.W. Arnell.	FOD, FES	-	-	-
R. cataractarum (Spruce) Schiffn.	FOD, RST, FOM	-	-	-
R. chamedryfolia (With.) Grolle	FOD	-	-	-
R. digitiloba (Spruce ex Steph.) Pagán	FOD, FES	-	-	-
R. emarginata (Steph.) Hell*	FOD	-	-	-
R. fucoidea (Sw.) Schiffn.	FOD	-	-	-
R. glaziovii (Spruce) Meenks	FOD, FOM, FED	-	-	-
R. metzgeriiformis (Steph.) R.M. Schust.	FOD	-	-	-
R. multifida (L.) S.F.Gray	FOD	-	-	-
R. regnellii (Ångstr.) Hell	FOD, FES, FOM, FES	-	-	-
R. schwaneckeii (Steph.) Pagán	FOD, FED	-	-	-
R. tenuicula (Spruce) Meenks	FOD	-	-	-
ARNELLIACEAE – 3/24				
Gongylanthus – 1/13				
G. liebmanianus (Lindenb. & Gottsche) Steph.	FOD	-	-	-
Southbya – 1/4				
S. organensis Herzog*	FOD	-	CR	ANEXO I
Stephaniella – 1/5				
S. paraphyllina J.B.Jack	FOD	-	-	-
AYTONIACEAE – 2/93				
Asterella – 1/57				
A. venosa (Lehm. & Lindenb.) A. Evans	FOM, FOD, FED	-	-	-
Plagiochasma – 1/18				
P. rupestre (Forster) Steph.	FOM, FES, FOD, FED	-	-	-
BALANTIOPSISIDACEAE – 9/60				
Balantiopsis – 1/17				
B. brasiliensis Steph.*	FOD, FED	-	-	-
Isotachis – 4/31				
I. aubertii (Schwägr.) Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
I. inflata Steph.	FOD	-	-	-
I. multiceps (Lindenb. & Gottsche) Gottsche	FOD, FED	-	-	-
I. serrulata (Sw.) Gottsche	FOD	-	-	-
Neesioscyphus – 4/5				
N. argillaceus (Nees) Grolle	FOD	-	-	-
N. bicuspidatus (Steph.) Grolle*	FOD	-	-	-
N. carneus (Nees) Grolle*	FOD, FOM	-	-	-
N. homophyllus (Nees) Grolle*	FOD	-	-	-
CALYPOGEIACEAE – 9/70				
Calypogeia – 6/51				
C. grandistipula (Steph.) Steph.*	FOD	-	-	-
C. laxa Gottsche & Lindenb.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. lechleri</i> (Steph.) Steph.	FOD, FED	-	-	-
<i>C. miquelii</i> Mont.	FOD, FES	-	-	-
<i>C. peruviana</i> Nees & Mont.	FOD, FED, FOM	-	-	-
<i>C. uncinulatula</i> Herzog	FOD	-	-	-
<i>Mnioloma</i> – 3/15				
<i>M. cellulosa</i> (Spreng.) R.M. Schust.	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. cyclostipa</i> (Spruce) R.M. Schust.	FOD	-	-	-
<i>M. parallelogramma</i> (Spruce) R.M. Schust.	FOD	-	-	-
CEPHALOZIACEAE – 7/107				
<i>Anomoclada</i> – 1/1				
<i>A. portoricensis</i> (Hampe & Gottsche) Váña	FOD	-	-	-
<i>Cephalozia</i> – 2/42				
<i>C. crassifolia</i> (Lindenb. & Gottsche) Fulford.	FOD	-	-	-
<i>C. crossii</i> Spruce	FOD, FOM	-	-	-
<i>Odontoschisma</i> – 4/20				
<i>O. brasiliense</i> Steph.	FOD	-	-	-
<i>O. denudatum</i> (Nees) Dumort.	FOD, FOM	-	-	-
<i>O. falcifolium</i> Steph.	FOD	-	-	-
<i>O. longiflorum</i> (J. Taylor) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
CEPHALOZIELLACEAE – 8/128				
<i>Cephaloziella</i> – 3/93				
<i>C. divaricata</i> (Sm.) Schiffn.	RST, FOD	-	-	-
<i>C. granatensis</i> (J.B. Jack) Fulford.	FOD	-	-	-
<i>C. stellulifera</i> (Tayl.) Schiffn.	FOD	-	-	-
<i>Cephaloziopsis</i> – 1/3				
<i>C. intertexta</i> (Gottsche) R.M. Schust.	FOD	-	-	-
<i>Cylindrocolea</i> – 3/15				
<i>C. brasiliensis</i> Costa, Santos & Váña*	FOD	-	-	-
<i>C. planifolia</i> (Steph.) R.M. Schust.	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. rhizantha</i> (Mont.) R.M. Schust.	RST, FOD, FES	-	-	-
<i>Kymatocalyx</i> – 1/4				
<i>K. dominicensis</i> (Spruce) Váña	FOD, FOM	-	-	-
CHONECOLEACEAE – 1/6				
<i>Chonecolea</i> – 1/6				
<i>C. doellingeri</i> (Nees) Grolle	RST, FOD, FOM, FED	-	-	-
DUMORTIERACEAE – 1/1				
<i>Dumortiera</i> – 1/1				
<i>D. hirsuta</i> (Sw.) Nees	FOD, FED, FES, FOM	-	-	-
FOSSOMBRONACEAE – 1/91				
<i>Fossombronina</i> – 1/88				
<i>F. porphyrorhiza</i> (Nees) Prosk.	FOD, FES	-	-	-
FRULLANIACEAE – 29/596				
<i>Frullania</i> – 29/596				
<i>F. apiculata</i> (Reinw. <i>et al.</i>) Nees	FOD, FES	-	-	-
<i>F. arecae</i> (Spreng.) Gottsche	FOM, FOD, FED, FES	-	-	-
<i>F. atrata</i> (Sw.) Nees	FOM, FOD, FED, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>F. beyrichiana</i> (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	FOM, FOD, FED, FES	-	-	-
<i>F. brasiliensis</i> Raddi	MAN, FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
<i>F. caulisequa</i> (Nees) Nees	MAN, RST, FOM, FOD, FED, FES	-	-	-
<i>F. cuensis</i> Taylor	FOD	-	-	-
<i>F. dusenii</i> Steph.	MAN, RST, FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
<i>F. ecklonii</i> (Spreng.) Gottsche <i>et al.</i>	FOD	-	-	-
<i>F. ericoides</i> (Nees) Mont.	MAN, RST, FOM, FOD, FED, FES	-	-	-
<i>F. flexicaulis</i> Spruce	FOD, FOM	-	-	-
<i>F. gaudichaudii</i> (Nees & Mont.) Nees & Mont.	FOD	-	-	-
<i>F. gibbosa</i> Nees	MAN, RST, FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
<i>F. glomerata</i> (Lehm. & Lindenb.) Mont.	MAN, FOD, FOM	-	-	-
<i>F. griffithsiana</i> Gottsche*	FOM, FED	-	-	-
<i>F. guadalupensis</i> Gottsche <i>ex</i> Steph.	FOD, FED	-	-	-
<i>F. intumescens</i> (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	FOD	-	-	-
<i>F. kunzei</i> (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	MAN, RST, FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
<i>F. lindenberghii</i> Lehm. & Lindenb.	FOM, FOD	-	-	-
<i>F. lindmannii</i> Steph.*	FOM, FOD	-	-	-
<i>F. montagnei</i> Gottsche	FOD, FED	-	-	-
<i>F. mucronata</i> (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	FOD	-	-	-
<i>F. nodulosa</i> (Reiw. <i>et al.</i>) Gottsche <i>et al.</i>	FES	-	-	-
<i>F. platycalyx</i> Herzog*	RST, FOM, FED	-	-	-
<i>F. riojaneirensis</i> (Raddi) Ångstr.	MAN, FOD, FES, FED	-	-	-
<i>F. schaefer-verwimpii</i> Yuzawa & Hatt.*	MAN, FOD	-	-	-
<i>F. setigera</i> Steph.	FOM, FOD, FED	-	-	-
<i>F. supradecomposita</i> (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	FOD, FED	-	-	-
<i>F. vitalii</i> Yuzawa & Hatt.	MAN, RST, FOD	-	-	-
GEOCALYCEAE – 1/19				
<i>Saccogynidium</i> – 1/9				
<i>S. caldense</i> (Ångstr.) Grolle*	FOD, FOM	-	-	-
GYMNOMITRIACEAE – 1/70				
<i>Marsupella</i> – 1/33				
<i>M. microphylla</i> R.M. Schust.	FOD	-	-	-
HERBERTACEAE – 4/50				
<i>Herbertus</i> – 3/45				
<i>H. grossispinus</i> (Steph.) Fulford	FOD	-	-	-
<i>H. juniperoideus</i> (Sw.) Grolle	FOD	-	-	-
<i>H. oblongifolius</i> (Steph.) Gradst. & Cleef	FOD	-	-	-
<i>Triandrophyllum</i> – 1/5				
<i>T. subtrifidum</i> (Hook. & J. Taylor) Fulford & Hatch.	FOD	-	-	-
JAMESONIELLACEAE – 7/56				
<i>Cryptochila</i> – 1/6				
<i>C. grandiflora</i> (Lindenb. & Gottsche) Grolle	FOD	-	-	-
<i>Jamesoniella</i> – 1/14				
<i>J. rubricaulis</i> (Nees) Grolle	FOD, FOM	-	-	-
<i>Syzygiella</i> – 5/20				
<i>S. anomala</i> (Lindenb. & Gottsche) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. integerrima</i> Steph.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. liberata</i> Inoue	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. perfoliata</i> (Sw.) Spruce	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. uleana</i> Steph.*	FOD	-	-	-
JUNGERMANNIACEAE – 4/46				
<i>Jungermannia</i> – 4/30				
<i>J. amoena</i> Lindenb. & Gottsche	FOD, FOM	-	-	-
<i>J. decolor</i> Schiffn.	FOD	-	EN	ANEXO I
<i>J. hyalina</i> Lyell	FOD	-	-	-
<i>J. sphaerocarpa</i> Hook.	FOD	-	-	-
LEJEUNEACEAE – 194/1858				
<i>Acanthocoleus</i> – 2/8				
<i>A. aberrans</i> (Lindenb. & Gottsche) Kruijt	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>A. trigonus</i> (Nees & Mont.) Gradst.	FOM	-	-	-
<i>Acrolejeunea</i> – 2/15				
<i>A. emergens</i> (Mitt.) Steph.	RST, FOD	-	-	-
<i>A. torulosa</i> (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.	RST, FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>Anoplolejeunea</i> – 1/1				
<i>A. conferta</i> (Meissn.) A. Evans	FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Aphanolejeunea</i> – 13/26				
<i>A. asperrima</i> Steph.	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. camillii</i> (Lehm.) R.M. Schust.	RST, FOD	-	-	-
<i>A. cingens</i> Herzog	FOD	-	-	-
<i>A. clavatapapillata</i> (Steph.) E. Reiner	FOD	-	-	-
<i>A. gracilis</i> Jovet-Ast	FOD	-	-	-
<i>A. kunertiana</i> Steph.	FOD, FED	-	-	-
<i>A. longifolia</i> Jovet-Ast	FOM	-	-	-
<i>A. microscopica</i> (Pócs) Pócs & Bernecker	FOD	-	-	-
<i>A. paucifolia</i> (Spruce) E. Reiner*	RST, FOD	-	-	-
<i>A. sicaefolia</i> (Gottsche ex Steph.) A. Evans	FES, FOD	-	-	-
<i>A. sintenisii</i> (Steph.) Steph.	FOD	-	-	-
<i>A. truncatifolia</i> Horik	RST, FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
<i>A. verrucosa</i> Jovet-Ast	FOD	-	-	-
<i>Archilejeunea</i> – 3/35				
<i>A. auberiana</i> (Mont.) A. Evans	FOD, FED	-	-	-
<i>A. fuscescens</i> (Hampe ex Lehm.) Fulford	FOD, FES	-	-	-
<i>A. parviflora</i> (Nees) Schiffn.	RST, FOD, FES	-	-	-
<i>Aureolejeunea</i> – 1/6				
<i>A. fulva</i> R.M. Schust.	FOD	-	-	-
<i>Blepharolejeunea</i> – 2/5				
<i>B. incongrua</i> (Lindenb. & Gottsche) Van Slageren & Kruijt	FOD	-	-	-
<i>B. securifolia</i> (Steph.) R.M. Schust.	FOD	-	EN	ANEXO I
<i>Brachiolejeunea</i> – 3/6				
<i>B. laxifolia</i> (J. Taylor) Schiffn.	RST, FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>B. leiboldiana</i> (Gottsche & Lindenb.) Schiffn	FOD	-	-	-
<i>B. phyllorhiza</i> (Nees) Kruijt & Gradst.	FOD	-	-	-
<i>Bromeliophila</i> – 1/2				
<i>B. natans</i> (Steph.) R.M. Schust.*	RST, FOD	-	VU	ANEXO I

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Bryopteris – 2/5				
B. diffusa (Sw.) Nees	FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
B. filicina (Sw.) Nees	FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
Caudalejeunea – 1/13				
C. lehmanniana (Gottsche) A. Evans	FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
Ceratolejeunea – 8/44				
C. ceratantha (Nees & Mont.) Steph.	FOD	-	-	-
C. coarina (Gottsche) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
C. cornuta (Lindenb.) Schiffn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. cubensis (Mont.) Schiffn.	FOD, FES	-	-	-
C. fallax (Lehm. & Lindenb.) Bonner	FOD, FES	-	-	-
C. filaria (Tayl. ex Lehm.) Steph.	FOD, FES	-	-	-
C. laetefusca (Austin) R.M. Schust.	RST, FOD, FES	-	-	-
C. rubiginosa Gottsche	FOD	-	-	-
Cheilolejeunea – 12/147				
C. acutangula (Nees) Grolle	FOD, FES, FOM	-	-	-
C. adnata (kunze) Grolle	FOD, FES, FOM	-	-	-
C. clausa (Nees & Mont.) R.M. Schust.	RST, FOD, FES, FOM	-	-	-
C. comans (Spruce) R.M. Schust.	FOD	-	-	-
C. discoidea (Lehm. & Lindenb.) Kachr. & R. N. Schust.	RST, FOD	-	-	-
C. holostipa (Spruce) R.-L. Zhu & Grolle	FOD, FES, FOM	-	-	-
C. inflexa (Hampe ex Lehm.) Grolle	FOD	-	-	-
C. insecta Grolle & Gradst.	FOD	-	-	-
C. oncophylla (Ångstr.) Grolle & E. Reiner	FOD, FOM	-	-	-
C. revoluta (Herzog) Gradst. & Grolle	FOD	-	-	-
C. rigidula (Mont.) R.M. Schust.	RST, FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
C. trifaria (Reinw. et al.) Mizut	FOD, FES, FOM	-	-	-
Cololejeunea – 11/381				
C. cardiocarpa (Mont.) A. Evans	RST, FOD, FOM, FES	-	-	-
C. falcata (Horik.) Benedix	FOD	-	-	-
C. hildebrandtii (Aust.) Steph.	FOD	-	-	-
C. katieae Tixier*	FES	-	-	-
C. minutiloba Herzog	FOD, FOM	-	-	-
C. minutissima (Sm.) Schiffn	RST, FOD, FES, FOM	-	-	-
C. obliqua (Nees & Mont.) Schiffn.	RST, FOD, FOM	-	-	-
C. platyneura (Spruce) S.W. Arnell.	FOD	-	-	-
C. subcardiocarpa Tixier	FOD, FES, FOM	-	-	-
C. vervimpai Tixier	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. vitalana Tixier	FOD	-	-	-
Colura – 6/79				
C. calyptrifolia (Hook.) Dumort.	FOD	-	-	-
C. greig-smithii Jovet-Ast	FOD	-	-	-
C. itatyana Steph.*	FOD	-	-	-
C. tenuicornis (A. Evans) Steph.	FOD, FES, FED	-	-	-
C. tortifolia (Nees & Mont.) Steph.	FOD	-	-	-
C. ulei Jovet-Ast	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Cyclolejeunea – 4/12				
C. accedens (Gottsche) A. Evans	FOD	-	-	-
C. convexistipa (Lehm. & Lindenb.) A. Evans	FOD	-	-	-
C. luteola (Spruce) Grolle	FOD	-	-	-
C. peruviana (Lehm. & Lindenb.) A. Evans	FOD	-	-	-
Cystolejeunea – 1/1				
C. lineata (Lehm. & Lindenb.) A. Evans	FOD	-	-	-
Dicranolejeunea – 1/2				
D. axilaris (Nees & Mont.) Schiff.	FOD	-	-	-
Diplasiolejeunea – 9/72				
D. alata Jovet-Ast	FOD, FOM	-	-	-
D. brunnea Steph.	FOD, FOM, FES	-	-	-
D. cavifolia Steph.	FOD, FOM, FES	-	-	-
D. latipuensis Tixier	FOD	-	-	-
D. pauckertii (Nees) Steph.	FOD	-	-	-
D. pellucida (Meissn.) Schiffn.	FOD, FES, FOM	-	-	-
D. replicata (Spruce) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
D. rudolphiana Steph.	FOD, FOM, FES	-	-	-
D. unidentata (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Drepanolejeunea – 14/116				
D. aculeata Bischl.*	FOD	EN	EN	ANEXO I
D. anoplantha (Spruce) Steph.	FOD	-	-	-
D. araucariae Steph.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
D. bidens (Steph.) A. Evans	FOD, FES	-	-	-
D. biocellata A. Evans	FOD	-	-	-
D. campanulata (Spruce) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
D. crassiretis A. Evans	FOD	-	-	-
D. fragilis Bischl.	FOD, FES	-	-	-
D. granatensis (J.B. Jack & Steph.) Bischl.	FOD	-	-	-
D. inchoata (Meissn.) Schiffn.	FOD	-	-	-
D. lichenicola (Spruce) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
D. mosenii (Steph.) Bischl.	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
D. orthophylla (Nees & Mont.) Bischl.	FOD, FOM	-	-	-
D. palmifolia (Nees) Steph.	FOD, FES	-	-	-
Echinocolea – 1/1				
E. dilatata (A. Evans) R.M. Schust.	FOD	-	-	-
Frullanoides – 4/8				
F. corticalis (Lehm. & Lindenb.) van Slageren	RST, FOD	-	-	-
F. densifolia Raddi	FOM, FOD, FED	-	-	-
F. liebmanniana (Lindenb. & Gottsche) van Slageren	FES, FOD, FOM	-	-	-
F. tristis (Steph.) van Slageren	RST, FOD, FES	-	-	-
Haplolejeunea – 1/3				
H. cucullata (Steph.) Grolle	FOD	-	-	-
Harpalejeunea – 5/27				
H. oxyphylla (Nees & Mont.) Steph.	FOD, FES	-	-	-
H. schiffneri S.W. Arnell	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>H. stricta</i> (Lindenb. & Gottsche) Steph.	FOD	-	-	-
<i>H. subacuta</i> A. Evans	FOD	-	-	-
<i>H. tridens</i> (Besch. & Spruce) Steph.	FOD	-	-	-
<i>Lejeunea</i> – 28/319				
<i>L. anomala</i> Lindenb. & Gottsche	FOD	-	-	-
<i>L. bermudiana</i> (A.Evans) R.M. Schust.	FOD	-	-	-
<i>L. caespitosa</i> Lindenb.	RST, FES, FOD	-	-	-
<i>L. cancellata</i> Nees & Mont.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>L. capensis</i> Gottsche	FOD	-	-	-
<i>L. caulicalyx</i> (Steph.) E. Reiner & Goda	RST, FOD	-	-	-
<i>L. cerina</i> (Lehm. & Lindenb.) Gottsche	FOD	-	-	-
<i>L. controversa</i> Gottsche	FOD	-	-	-
<i>L. cristulaeflora</i> (Gottsche ex Steph.) E. Reiner & Goda*	FOD	-	-	-
<i>L. cristulata</i> (Steph.) E. Reiner & Goda*	RST, FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>L. flava</i> (Sw.) Nees	RST, FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
<i>L. grossiretis</i> (Steph.) E. Reiner & Goda*	FOD	-	-	-
<i>L. grossitexta</i> (Steph.) E. Reiner & Goda*	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. immersa</i> Spruce	FOD	-	-	-
<i>L. inflexiloba</i> J.B. Jack & Steph.	FOD	-	-	-
<i>L. laeta</i> (Lehm. & Lindenb.) Gottsche	FOD	-	-	-
<i>L. laetevirens</i> Nees & Mont.	RST, FOD, FES	-	-	-
<i>L. lepida</i> Lindenb. & Gottsche	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. magnoliae</i> Lindenb. & Gottsche	FOD	-	-	-
<i>L. monimiae</i> (Steph.) Steph.*	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>L. oligoclada</i> Spruce*	FOD	-	-	-
<i>L. phyllobola</i> Nees & Mont.	RST, FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>L. puiggariana</i> Steph.*	FOD	-	-	-
<i>L. raddiana</i> Lindenb.	FOD, FED	-	-	-
<i>L. reflexistipula</i> (Lehm. & Lindenb.) Gottsche, Lindenb. & Nees	FOD	-	-	-
<i>L. setiloba</i> Spruce	FOD	-	-	-
<i>L. tapajosensis</i> Spruce	FOD	-	-	-
<i>L. trinitensis</i> Lindenb.	RST, FOD, FOM	-	-	-
<i>Lepidolejeunea</i> – 2/13				
<i>L. eluta</i> (Nees) R.M. Schust.	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. involuta</i> (Gottsche) Grolle	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>Leptolejeunea</i> – 6/46				
<i>L. brasiliensis</i> Bischl.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>L. diversilobulata</i> Bischl.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>L. elliptica</i> (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>L. exocellata</i> (Spruce) A. Evans.	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. maculata</i> (Mitt.) Schiffn.	FOD	-	-	-
<i>L. moniliata</i> Steph.	FOD	-	-	-
<i>Leucolejeunea</i> – 4/13				
<i>L. caducifolia</i> Gradst. & Schäfer-Verw.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. conchifolia</i> (A. Evans) A. Evans	RST, FOD	-	-	-
<i>L. unciloba</i> (Lindenb.) A. Evans	RST, FOD, FES, FOM, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>L. xanthocarpa</i> (Lehm. & Lindenb.) A. Evans	RST, FOM, FOD	-	-	-
<i>Lopholejeunea</i> – 2/45				
<i>L. nigricans</i> (Lindenb.) Schiffn.	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. subfusca</i> (Nees) Schiffn.	RST, FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>Marchesinia</i> – 1/11				
<i>M. brachiata</i> (Sw.) Schiffn.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Mastigolejeunea</i> – 2/24				
<i>M. auriculata</i> (Wilson) Schiffn.	RST, FOD, FOM	-	-	-
<i>M. plicatiflora</i> (Spruce) Steph.	FOD	-	-	-
<i>Metalejeunea</i> – 1/2				
<i>M. cucullata</i> (Reinw. <i>et al.</i>) Grolle	FOD	-	-	-
<i>Microlejeunea</i> – 8/43				
<i>M. aphanella</i> (Spruce) Steph.	FOD	-	-	-
<i>M. bullata</i> (J. Taylor) Steph.	RST, FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>M. capillaris</i> (Gottsche) Steph.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>M. cystifera</i> Herzog	FOD	-	-	-
<i>M. epiphylla</i> Bischl.	RST, FOD, FES	-	-	-
<i>M. globosa</i> (Spruce) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. stricta</i> (Gottsche <i>et al.</i>) Stepha.	FOD	-	-	-
<i>M. subulistipa</i> Steph.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Myriocoleopsis</i> – 2/2				
<i>M. fluviatilis</i> (Steph.) E. Reiner & Gradst.*	FOD, FOM	VU	CR	ANEXO I
<i>M. gymnocolea</i> (Spruce) E. Reiner & Gradst.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Neurolejeunea</i> – 1/4				
<i>N. breutelii</i> (Gottsche) A. Evans	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
<i>Odontolejeunea</i> – 3/3				
<i>O. decedentata</i> (Spruce) Steph.	FOD	-	-	-
<i>O. lunulata</i> (Weber) Schiffn.	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
<i>O. rhomalea</i> (Spruce) Steph.	FOD	-	-	-
<i>Omphalanthus</i> – 1/7				
<i>O. filiformis</i> (Sw.) Nees	FOD, FES	-	-	-
<i>Oryzolejeunea</i> – 1/3				
<i>O. saccatiloba</i> (Steph.) Gradst. & Cleef	RST, FOD	-	-	-
<i>Pluvianthus</i> * – 1/1				
<i>P. squarrosus</i> (Steph.) R.M. Schust. & Schäf.-Verw.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Prionolejeunea</i> – 5/22				
<i>P. aemula</i> (Gottsche) A. Evans	FOD, FES	-	-	-
<i>P. denticulata</i> (Weber) Schiffn.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. galliotii</i> Steph.	FOD	-	-	-
<i>P. limpida</i> Herzog	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>P. scaberula</i> (Spruce) Steph.	FOD	-	-	-
<i>Pycnolejeunea</i> – 4/13				
<i>P. contigua</i> (Nees) Grolle	RST, FES, FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>P. densistipula</i> (Lehm. & Lindenb.) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. macroloba</i> (Nees & Mont.) Schiffn.	FES, FOD	-	-	-
<i>P. porrectiloba</i> *	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Rectolejeunea – 2/31				
R. berteroa (Gottsche ex Steph.) A. Evans	RST, FOD, FOM	-	-	-
R. emarginuliflora (Gottsche) A. Evans	FOD	-	-	-
Schiffneriolejeunea – 1/14				
S. polycarpa (Nees) Gradst.	RST, FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
Stictolejeunea – 1/3				
S. squamata (Willd. ex Weber) Schiffn.	RST, FOD, FES, FED	-	-	-
Symbiezidium – 2/4				
S. barbiflorum (Lindenb. & Gottsche) A. Evans	RST, FOD, FES, FOM	-	-	-
S. transversale (Sw.) Trevis.	FOD, FOM	-	-	-
Taxilejeunea – 5/87				
T. asthenica (Spruce) Stpeh.	FOD	-	-	-
T. isocalycina (Ness) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
T. lusoria (Lindenb. & Gottsche) Steph.	FOD, FOM	-	-	-
T. obtusangula (Spruce) A. Evans.	FOD, FOM	-	-	-
T. pterigonia (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.	FOD, FOM	-	-	-
Trachylejeunea – 1/11				
T. aneogyna (Spruce) Grolle	FOD	-	-	-
Vitalianthus – 1/2				
V. bischlerianus (Pôrto & Grolle) R.M. Schust. & Giancotti.*	FOD, FES, FOM	-	-	-
Xylolejeunea – 1/4				
X. crenata (Nees & Mont.) X.-L. He & Grolle.	FOD, FES	-	-	-
LEPIDOZIACEAE – 31/665				
Bazzania – 15/251				
B. aurescens Spruce	FOD	-	-	-
B. cuneistipula (Gottsche & Lindenb.) Trevis.	FOD	-	-	-
B. denticulata (Lindenb. & Gottsche) Trevis.	FOD	-	-	-
B. falcata (Lindenb.) Trevis.	FOD, FOM	-	-	-
B. gracilis (Hampe & Gottsche) Steph.	FOD	-	-	-
B. heterostipa (Steph.) Fulford.*	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
B. hookeri (Lindenb.) Trevis.	FOD, FOM, FED	-	-	-
B. jamaicensis (Lehm. & Lindenb.) Trevis.	FOD, FOM	-	-	-
B. longistipula (Lindenb.) Trevis.	FOD, FOM	-	-	-
B. nitida (Weber) Grolle	FOD, FOM	-	-	-
B. pallide-virens (Steph.) Fulford	FOD	-	-	-
B. phyllobola Spruce	FOD, FOM	-	-	-
B. schlimiana (Gottsche) Fulford	FOD	-	-	-
B. stolonifera (Sw.) Trevis.	FOD	-	-	-
B. taleana (Gottsche) Fulford	FOD, FOM	-	-	-
Kurzia – 3/39				
K. brasiliensis (Steph.) Grolle	FOD, FED, FES, FOM	-	-	-
K. capillaris (Sw.) Grolle	FOD, FED, FES, FOM	-	-	-
K. flagellifera (Steph.) Grolle	FOD	-	-	-
Lepidozia – 4/136				
L. coilophylla J. Taylor	FOD, FOM	-	-	-
L. cupressina (Sw.) Lindenb.	FOD	-	-	-
L. inaequalis (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>L. incurvata</i> Lindenb.	FOM	-	-	-
<i>Micropterygium</i> – 2/23				
<i>M. campanense</i> Spruce ex Reimers	FOD	-	-	-
<i>M. pterygophyllum</i> (Nees) Trevis.	FOD	-	-	-
<i>Monodactyliopsis</i> – 1/6				
<i>M. monodactyla</i> (Spruce) R.M. Schust.	RST, FED	-	-	-
<i>Mytilopsis</i> – 1/1				
<i>M. albifrons</i> Spruce	FOD	-	-	-
<i>Paracromastigum</i> – 2/15				
<i>P. dusenii</i> (Steph.) R.M. Schust.	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>P. pachyrhizum</i> (Nees) Fulford	FOD	-	-	-
<i>Telaranea</i> – 2/101				
<i>T. diacantha</i> (Mont.) Howe	RST, FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
<i>T. nematodes</i> (Gottsche ex Austin) M.A. Howe	RST, FOD, FOM	-	-	-
<i>Zoopsidella</i> – 1/6				
<i>Z. integrifolia</i> (Spruce) R.M. Schust.	FOD	-	-	-
LOPHOCOLEACEAE – 22/412				
<i>Chiloscyphus</i> – 13/253				
<i>C. connatus</i> (Sw.) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOD	-	-	-
<i>C. glaziovii</i> (Steph.) J.J. Engel & R.M. Schust.*	FOD, FED	-	-	-
<i>C. latifolius</i> (Steph.) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOD	-	-	-
<i>C. leptanthus</i> (Hook. f. & Tayl.) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOD, FED	-	-	-
<i>C. liebmannianus</i> (Gottsche) J.J. Engel & R.M. Schust.	FES, FOD	-	-	-
<i>C. lindmannii</i> (Steph.) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. martianus</i> (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOM, FOD, FES, FED, FOM	-	-	-
<i>C. muricatus</i> (Lehm.) J.J. Engel & R.M. Schust.	FED, FOD	-	-	-
<i>C. perissodontus</i> (Spruce) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. platensis</i> (C. Massal.) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>C. profundus</i> (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOD, FES	-	-	-
<i>C. quadridentatus</i> (Spruce) J.J. Engel & R.M. Schust.	FOD	-	-	-
<i>C. trapezoides</i> Sande Lac	FOD	-	-	-
<i>Clasmatocolea</i> – 2/23				
<i>C. humilis</i> (Hook. F. & Tayl.) Grolle	FOM	-	-	-
<i>C. vermicularis</i> (Lehm.) Grolle	FOD, FED, FOM	-	-	-
<i>Heteroscyphus</i> – 2/89				
<i>H. combinatus</i> (Nees) Schiffn.	FOD	-	-	-
<i>H. marginatus</i> (Steph.) Fulford	FOD, FOM	-	-	-
<i>Leptoscyphus</i> – 5/31				
<i>L. amphibolius</i> (Nees) Grolle	FOD	-	-	-
<i>L. cuneifolius</i> (Hook.) Mitt.	FOD	-	-	-
<i>L. gibbosus</i> (J. Taylor) Mitt.	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>L. porphyrius</i> (Nees) Grolle	FOD, FES	-	-	-
<i>L. spectabilis</i> (Steph.) Grolle*	FOD, FOM	-	-	-
LUNULARIACEAE – 1/1				
<i>Lunularia</i> – 1/1				
<i>L. cruciata</i> (L.) Dumort.	FOD, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MARCHANTIACEAE – 6/49				
Marchantia – 6/47				
M. berteriana Lehm. & Lindenb.	FOD, FED	-	-	-
M. breviloba A. Evans	FOD	-	-	-
M. chenopoda L.	FOD, FED, FES, FOM	-	-	-
M. paleacea Bert.	FOD	-	-	-
M. papillata Raddi	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. polymorpha L.	FOD, FOM	-	-	-
METZGERIACEAE – 25/100				
Metzgeria – 25/94				
M. acuminata Steph.	FOD, FED	-	-	-
M. adscendens Steph.	FOD, FED	-	-	-
M. agnewiae Kuwah.	FOD	-	-	-
M. albinea Spruce	FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
M. aurantiaca Steph.	FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
M. bahiensis Schiffn.*	FOD, FED	-	-	-
M. brasiliensis Schiffn.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. ciliata Raddi	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
M. conjugata Lindb.	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. consaguinea Schiffn.	FOD	-	-	-
M. convoluta Steph.*	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
M. cratoneura Schiffn.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. dichotoma (Sw.) Nees	FOM, FOD, FED	-	-	-
M. fruticola Spruce	FOD, FED	-	-	-
M. furcata (L.) Dumort.	FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
M. herminieri Schiffn.	FOD, FED	-	-	-
M. lechleri Steph.	FOD, FED, FOM, FES	-	-	-
M. leptoneura Spruce	FOD, FED, FOM, FES	-	-	-
M. liebmanniana Lindenb. & Gottsche	FOD, FED, FES	-	-	-
M. myriopoda Lindb.	FOD, FED, FES, FOM	-	-	-
M. psilocraspeda Schiffn.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. rufula Spruce	FOD, FOM	-	-	-
M. scyphigera A. Evans	FOD, FOM	-	-	-
M. subaneura Schiffn.	FOD, FOM, FED	-	-	-
M. uncigera A. Evans	FES, FOD	-	-	-
MONOCLEACEAE – 1/2				
Monoclea – 1/2				
M. gottschei Gradst. & Mues	FOD, FES, FED	-	-	-
PALLAVICINIACEAE – 8/71				
Jensenia – 2/7				
J. difformis (Nees) Grolle	FOD	-	-	-
J. spinosa (Gottsche) Grolle	FOD	-	-	-
Pallavicinia – 1/13				
P. lyellii (Hook.) S.F. Gray	FOD, FOM, FED	-	-	-
Symphyogyna – 5/44				
S. aspera Steph.	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
S. brasiliensis (Nees) Nees & Mont.	FOD, FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. brongniartii</i> Mont.	FOD	-	-	-
<i>S. leptothelia</i> Tayl.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. podophylla</i> (Thunb.) Mont. & Nees.	FOD	-	-	-
PELLIACEAE – 1/6				
<i>Noteroclada</i> – 1/2				
<i>N. confluens</i> J. Taylor ex Hook. & Wilson	FOD	-	-	-
PLAGIOCHILACEAE – 24/648				
<i>Plagiochila</i> – 24/623				
<i>P. adiantoides</i> (Sw.) Lindenb.*	FOD	-	-	-
<i>P. bifaria</i> (Sw.) Lindenb.	FOD	-	-	-
<i>P. boryana</i> Gottsche ex Steph.	FOD	-	CR	ANEXO I
<i>P. bryopteroides</i> Spruce	FOD	-	-	-
<i>P. corrugata</i> (Nees) Nees & Mont.	RST, FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
<i>P. cristata</i> (Sw.) Lindenb.	FOD	-	-	-
<i>P. disticha</i> (Lehm. & Lindenb.) Lindenb.	RST, FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
<i>P. distinctifolia</i> Lindenb.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. diversifolia</i> Lindenb. & Gottsche	FOD	-	-	-
<i>P. exigua</i> (J. Taylor) J. Taylor	FOD	-	-	-
<i>P. flaccida</i> Lindenb.	FOD	-	-	-
<i>P. gymnocalycina</i> (Lehm. & Lindenb.) Lindenb.	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>P. lingua</i> Steph.	FOD	-	-	-
<i>P. macrostachya</i> Lindenb.	FOD	-	-	-
<i>P. martiana</i> (Nees) Lindenb.	RST, FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
<i>P. micropteryx</i> Gottsche	FED, FOD	-	-	-
<i>P. montagnei</i> Nees	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>P. patentissima</i> Lindenb.	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
<i>P. patula</i> (Sw.) Lindenb.	FOD	-	-	-
<i>P. raddiana</i> Lindenb.	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>P. rutilans</i> Lindenb.	FOM, FOD, FES	-	-	-
<i>P. simplex</i> (Sw.) Lindenb.	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
<i>P. stricta</i> Lindenb.	FOD	-	-	-
<i>P. subplana</i> Lindenb.	FOD, FOM	-	-	-
PORELLACEAE – 3/77				
<i>Porella</i> – 3/76				
<i>P. brasiliensis</i> (Raddi) Schiffn.*	FOM, FOD	-	-	-
<i>P. reflexa</i> (Lehm. & Lindenb.) Trevis.*	FOM, FOD	-	-	-
<i>P. swartziana</i> (Weber) Trevis.	FOM, FES	-	-	-
RADULACEAE – 22/223				
<i>Radula</i> – 22/223				
<i>R. angulata</i> Steph.	FOD, FES	-	-	-
<i>R. brasilica</i> K. Yamada*	FOD	-	-	-
<i>R. decora</i> Gottsche ex Steph.	FOD	-	-	-
<i>R. fendleri</i> Gottsche ex Steph.	FOD	-	-	-
<i>R. gottscheana</i> J. Taylor	FOD	-	-	-
<i>R. javanica</i> Gottsche	FOM, FOD, FES	-	-	-
<i>R. kegelii</i> Gottsche ex Steph.	FOM, FOD	-	-	-
<i>R. ligula</i> Steph.*	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>R. mammosa</i> Spruce	FOD	-	-	-
<i>R. mexicana</i> Lindenb. & Gottsche	FOD, FES	-	-	-
<i>R. nudicaulis</i> Steph.	FOD	-	-	-
<i>R. obovata</i> Castle	FOD	-	-	-
<i>R. pocsii</i> K. Yamada.	FOD	-	-	-
<i>R. quadrata</i> Gottsche	FOD, FES	-	-	-
<i>R. recubans</i> J. Taylor	FOD	-	-	-
<i>R. schaefer-verwimpai</i> K. Yamada	FOD	-	-	-
<i>R. sinuata</i> Gottsche ex Steph.	FOM, FOD, FES	-	-	-
<i>R. stenocalyx</i> Mont.	FOD	-	-	-
<i>R. tectiloba</i> Steph.	FOM, FOD, FES	-	-	-
<i>R. tenera</i> Mitt. ex Steph.	FOD, FES	-	-	-
<i>R. varilobula</i> Castle.	FOD	-	-	-
<i>R. voluta</i> J. Taylor ex Gottsche et al.	FOM, FOD, FES	-	-	-
RICCIACEAE – 10/236				
<i>Riccia</i> – 9/235				
<i>R. albopunctata</i> Jovet-Ast	FES, FOM	-	-	-
<i>R. brasiliensis</i> Schiffn.*	FES	-	-	-
<i>R. curtisii</i> (James ex Austin) Austin	FES	-	-	-
<i>R. grandis</i> Nees*	FOD, FES	-	-	-
<i>R. horrida</i> Jovet-Ast*	FES	-	-	-
<i>R. membranacea</i> Gottsche & Lindenb.	FES, FOD	-	-	-
<i>R. plano-biconvexa</i> Steph.	FOD, FES	-	-	-
<i>R. stenophylla</i> Spruce	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>R. wainionis</i> Steph.	FOD, FES	-	-	-
<i>Ricciocarpus</i> – 1/1				
<i>R. natans</i> (L.) Corda	RST, FES, FOM	-	-	-
SCAPANIACEAE – 6/306				
<i>Anastrophyllum</i> – 3/42				
<i>A. auritum</i> (Lehm.) Steph.	FOD	-	-	-
<i>A. piligerum</i> (Nees) Steph.	FOD	-	-	-
<i>A. tubulosum</i> (Nees) Grolle	FOD, FOM	-	-	-
<i>Lophozia</i> – 2/54				
<i>L. bicrenata</i> (Schmid. ex Hoffm.) Dumort	FOD	-	-	-
<i>L. patagonica</i> Herzog & Grolle*	FOM	-	-	-
<i>Scapania</i> – 1/101				
<i>S. portoricensis</i> Hampe & Gottsche	FOD	-	-	-
TARGIONIACEAE – 1/7				
<i>Cyathodium</i> – 1/7				
<i>C. cavernarum</i> Kunze	FES	-	-	-
TRICHOCOLEACEAE – 4/38				
<i>Trichocolea</i> – 4/36				
<i>T. argentea</i> Herzog*	FOD	-	-	-
<i>T. brevifissa</i> Steph.	FOD, FOM	-	-	-
<i>T. flaccida</i> (Spruce) J.B. Jack & Steph.	FOD	-	-	-
<i>T. tomentosa</i> (Sw.) Gottsche	FOM, FOD	-	-	-

Briófitas – Musgos

Denise Pinheiro da Costa, Kátia Cavalcanti Porto, Andréa Pereira Luiz-Ponzo,
 Anna Luiza Ilkiu-Borges, Cid José Passos Bastos, Paulo Eduardo Aguiar
 Saraiva Câmara, Silvana Vilas Bôas-Bastos, Thais de Freitas Vaz-Imbassahy,
 Caio Amitrano Alencar Imbassahy & Douglas Junqueira Lopes

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ADELOTHECIACEAE – 1/2				
<i>Adelothecium</i> – 1/1				
<i>A. bogotense</i> (Hampe) Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
AMBLYSTEGIACEAE – 3/56				
<i>Amblystegium</i> – 1/18				
<i>A. varium</i> (Hedw.) Lindb.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Leptodictyum</i> – 1/8				
<i>L. riparium</i> (Hedw.) Warnst.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Vittia</i> – 1/1				
<i>V. pachyloma</i> (Mont.) Ochyra	FOD, FOM, FED	-	-	-
ANDREAEACEAE – 2/95				
<i>Andreaea</i> – 2/95				
<i>A. rupestris</i> Hedw.	FOD	-	-	-
<i>A. subulata</i> Harv.	FOD	-	-	-
ANOMODONTACEAE – 1/27				
<i>Herpertineuron</i> – 1/1				
<i>H. tocoae</i> (Sull. & Lesq.) Cardot	FOD, FOM	-	-	-
ARCHIDIACEAE – 7/34				
<i>Archidium</i> – 7/34				
<i>A. amplexicaule</i> Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>A. clavatum</i> I.G. Stone	FOD, FOM, FED	-		
<i>A. donnellii</i> Austin	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>A. hallii</i> Austin	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>A. julicaule</i> Müll. Hal.	FOD, FES	-	-	-
<i>A. microthecium</i> Dixon & P. de La Varde	FOD	-	-	-
<i>A. ohioense</i> Schimp. ex Müll. Hal.	FOD, FED, FES, RST	-	-	-
BARTRAMIACEAE– 22/385				
<i>Bartramia</i> – 2/71				
<i>B. longifolia</i> Hook.	FOD	-	-	-
<i>B. matthewsi</i> Fransén*	FOD	-	-	-
<i>Breutelia</i> – 6/94				
<i>B. grandis</i> (Hampe) Paris *	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. microdonta</i> (Mitt.) Broth.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. subdisticha</i> (Hampe) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>B. subtomentosa</i> (Hampe) A. Jaeger	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. tomentosa</i> (Brid.) A. Jaeg.	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. wainioi</i> Broth.*	FOD, FED	-	-	-
<i>Leiomela</i> – 2/13				
<i>L. bartramioides</i> (Hook.) Paris	FOD	-	-	-
<i>L. piligera</i> (Hampe) Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Philonotis – 12/170				
<i>P. ampliretis</i> Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>P. cernua</i> (Wilson) D.G. Griffin & W.R. Buck	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>P. curvata</i> (Hampe) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>P. elongata</i> (Dum.) H.A. Crum & Steere	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. gardneri</i> (Müll. Hal.) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>P. glaziovii</i> (Hampe) D.G. Griffin & W.R. Buck	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. gracilenta</i> (Hampe) A. Jaeger	FOM	-	-	-
<i>P. hastata</i> (Duby) Wijk & Margad.	FOD	-	-	-
<i>P. longiseta</i> (Michx.) Britt.	FOD	-	-	-
<i>P. rufiflora</i> (Hornsch.) Reichardt	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. sphaericarpa</i> (Hedw.) Brid.	FOD	-	-	-
<i>P. uncinata</i> (Schwägr.) Brid.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
BRACHYTHECIACEAE – 18/567				
Aerolindigia – 1/1				
<i>A. capillacea</i> (Hornsch.) M. Menzel	FOD, FED	-	-	-
Brachythecium – 2/176				
<i>B. poadelphus</i> Müll. Hal.*	FOD	-	-	-
<i>B. ruderales</i> (Brid.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED	-	-	-
Meteoridium – 1/2				
<i>M. remotifolium</i> (Müll. Hal.) Manuel	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
Palamocladium – 1/4				
<i>P. leskeoides</i> (Hook.) E. Britton	FOD, FOM, FED	-	-	-
Platyhypnidium – 1/16				
<i>P. aquaticum</i> (A. Jaeger) Fleisch.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Pseudoscleropodium – 1/1				
<i>P. purum</i> (Hedw.) M. Fleisch.	FOD	-	-	-
Puiggariopsis – 1/1				
<i>P. aurifolia</i> (Mitt.) M. Menzel	FOD, FOM, FED	-	-	-
Rhynchostegium – 1/128				
<i>R. conchophyllum</i> (Tayl.) A. Jaeger	FOD	-	-	-
Squamidium – 6/10				
<i>S. brasiliense</i> Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. diversicoma</i> (Hampe) Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. isocladum</i> (Ren. & Card) Broth.	FOD	-	-	-
<i>S. leucotrichum</i> (Tayl.) Broth.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>S. macrocarpum</i> (Spruce ex Mitt.) Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. nigricans</i> (Hook.) Broth.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
Zelometeorium – 3/5				
<i>Z. ambiguum</i> (Hornsch.) Manuel	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Z. patens</i> (Hook.) Manuel	FOD	-	-	-
<i>Z. patulum</i> (Hedw.) Manuel	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
BRUCHIACEAE – 5/109				
Eobruchia – 1/1				
<i>E. bruchioides</i> (Müll. Hal.) W.R. Buck*	FOD	-	-	-
Pringleella – 1/3				

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. subulata</i> (Müll. Hal.) Broth.*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>Trematodon</i> – 3/83				
<i>T. ambiguous</i> (Hedw.) Hornsch.*	FOD	-	-	-
<i>T. longicollis</i> Michx.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>T. vaginatus</i> Müll. Hal.*	FOD	-	-	-
BRYACEAE – 49/51				
<i>Anomobryum</i> – 2/47				
<i>A. conicum</i> (Hornsch.) Broth.	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. julaceum</i> (Schr. ex P. Gaertn., B. Mey. & Schreb.) Schimp.	FOD	-	-	-
<i>Brachymenium</i> – 8/102				
<i>B. consimile</i> (Mitt.) A. Jaeger	FOD	-	-	-
<i>B. fabronioides</i> (Müll. Hal.) Par.	FOD	-	-	-
<i>B. globosum</i> A. Jaeger	FOD	-	-	-
<i>B. hornschruchianum</i> Mart.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>B. klotzschii</i> (Schwägr.) Par.	FOD	-	-	-
<i>B. morasicum</i> Besch.	FOD, FES	-	-	-
<i>B. regnellii</i> Hampe*	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. speciosum</i> (Hook. f. & Wilson) Steere	FOD	-	-	-
<i>Bryum</i> – 12/448				
<i>B. arachnoideum</i> Müll. Hal.	FOD	-	-	-
<i>B. argenteum</i> Broth.	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
<i>Bryum atrovirens</i> Brid.	FOD	-	-	-
<i>B. duplicatum</i> Broth.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>B. leptocladon</i> Sull.	RST	-	-	-
<i>B. limbatum</i> Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>B. mattogrossense</i> Broth.	FOD	-	-	-
<i>B. pabstianum</i> Müll. Hal.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>B. paradoxum</i> Schwägr.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>B. renauldii</i> Röhl ex Renauld & Cardot	FOD, FED	-	-	-
<i>B. torquatum</i> Mohamed	FOD	-	-	-
<i>B. turbinatum</i> (Hedw.) Turn.	FOD	-	-	-
<i>Gemmabryum</i> – 8/35				
<i>G. acuminatum</i> (Harv.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD, FOM	-	-	-
<i>G. apiculatum</i> (Schwägr.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>G. clavatum</i> (Müll. Hal.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD	-	-	-
<i>G. coronatum</i> (Schwägr.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
<i>G. exile</i> (Dozy & Molke.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>G. laevigatum</i> (Hook. f. & Wilson) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD, FOM	-	-	-
<i>G. radiculosum</i> (Brid.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD, FOM	-	-	-
<i>G. subapiculatum</i> (Hampe) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Imbricobryum</i> – 1/5				
<i>I. muhlenbeckii</i> (Bruch & Schimp.) N. Pedersen	FES	-	-	-
<i>Leptostomopsis</i> – 1/25				
<i>L. systylium</i> (Müll. Hal.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD	-	-	-
<i>Plagiobryum</i> – 3/9				
<i>P. capillare</i> (Hedw.) J.R. Spence	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. cellulare</i> (Hook.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD	-	-	-
<i>P. pseudotriquetrum</i> (Hedw.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD, FOM	-	-	-
<i>Ptychostomum</i> – 2/32				
<i>P. caespiticium</i> (Brid.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD	-	-	-
<i>P. wrightii</i> (Sull.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	FOD	-	-	-
<i>Rhodobryum</i> – 8/34				
<i>R. aubertii</i> (Schwägr.) Thér.	FOD	-	-	-
<i>R. beyrichianum</i> (Hornsch.) Müll. Hal.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>R. grandifolium</i> (J. Taylor) Schimp.	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. procerum</i> (Schimp.) Par.	FOD	-	-	-
<i>R. pseudomarginatum</i> (Geh. & Hampe) Paris*	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. roseolum</i> Müll. Hal.	FOD, FED, FES	-	-	-
<i>R. roseum</i> (Hedw.) Limpr.	FOD, FES	-	-	-
<i>R. subverticillatum</i> Broth.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Rosulabryum</i> – 4/14				
<i>R. billardieri</i> (Schwägr.) J.R. Spence	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
<i>R. densifolium</i> (Brid.) Ochyra	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>R. huillense</i> (Welw. & Duby) Ochyra	FOD	-	-	-
<i>R. pseudocapillare</i> (Besch.) Ochyra	FOD	-	-	-
CALYMPERACEAE – 27/215				
<i>Calymperes</i> – 10/53				
<i>C. afzelii</i> Sw.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>C. erosum</i> Müll. Hal.	FOD, FES	-	-	-
<i>C. lonchophyllum</i> Schwägr.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. othmeri</i> Herz.	FOD	-	-	-
<i>C. palisotii</i> Schwägr.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>C. pallidum</i> Mitt.	FOD	-	-	-
<i>C. platyloma</i> Mitt.	FOD	-	-	-
<i>C. rubiginosum</i> (Mitt.) Reese	FOD	-	-	-
<i>C. smithii</i> E.B. Bartram	FOD	-	-	-
<i>C. tenerum</i> Müll. Hal.	FOD, RST, MAN	-	-	-
<i>Leucophanes</i> – 1/15				
<i>L. molleri</i> Müll. Hal.	FOD, FES	-	-	-
<i>Octoblepharum</i> – 3/16				
<i>O. albidum</i> Hedw.	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
<i>O. cocuiense</i> Mitt.	FOD	-	-	-
<i>O. pulvinatum</i> (Dozy & Molk.) Mitt.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Syrrhopodon</i> – 13/101				
<i>S. brasiliensis</i> W.D. Reese*	FOD	-	-	-
<i>S. cymbifolius</i> Müll. Hal.	FOD	-	-	-
<i>S. gardneri</i> (Hook.) Schwägr.	FOD	-	-	-
<i>S. gaudichaudii</i> Mont.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>S. graminicola</i> Williams	FOD, FES	-	-	-
<i>S. incompletus</i> Schwägr.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>S. ligulatus</i> Mont.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. lycopodioides</i> (Brid.) Müll. Hal.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. parasiticus</i> (Brid.) Besch.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>S. prolifer</i> Schwägr.	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
<i>S. rigidus</i> Hook. & Grev.	FOD	-	-	-
<i>S. simmondsii</i> Steere	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. tortilis</i> Hampe	FOD, FOM	-	-	-
CAMPYLIACEAE – 4/131				
<i>Anacamptodon</i> – 1/12				
<i>A. cubensis</i> (Sull.) Mitt.	FOD	-	-	-
<i>Campyliadelphus</i> – 1/3				
<i>C. chrysophyllus</i> (Brid.) Kanda	FOD	-	-	-
<i>Drepanocladus</i> – 1/21				
<i>D. perplicatus</i> (Dusén) G. Roth	FOD	-	-	-
<i>Warnstorfia</i> – 1/10				
<i>W. exannulata</i> (Schimp.) Loeske	FOD, FED	-	-	-
CATAGONIACEAE – 3/4				
<i>Catagonium</i> – 3/4				
<i>C. brevicaudatum</i> Müll. Hal. ex Broth.	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. emarginatum</i> Lin	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. nitens</i> (Brid.) Card.	FOD	-	-	-
CRYPHAEACEAE – 8/94				
<i>Cryphaea</i> – 6/57				
<i>C. brevipila</i> Mitt.	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. jamesonii</i> Tayl.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>C. orizabae</i> Schimp. ex Besch.	FOM	-	-	-
<i>C. patens</i> Hornsch.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>C. ramosa</i> (Mitt.) Wilson	FOM	-	-	-
<i>C. rhacomitrioides</i> Müll. Hal.*	FOD, FED	-	-	-
<i>Schoenobryum</i> – 2/16				
<i>S. concavifolium</i> (Griff.) Gangulee	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>S. rubricaulis</i> (Mitt.) Manuel	FOD, FOM, FED	-	-	-
DALTONIACEAE – 7/219				
<i>Calypstrochaeta</i> – 2/25				
<i>C. albescens</i> (Hampe) W.R. Buck*	FOD	-	-	-
<i>C. setigera</i> (Mitt.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Daltonia</i> – 4/60				
<i>D. brasiliensis</i> Mitt.	FOD, FOM	-	-	-
<i>D. gracilis</i> Mitt.	FOD	-	-	-
<i>D. longifolia</i> Tayl.	FES	-	-	-
<i>D. stenophylla</i> Mitt.	FOD	-	-	-
<i>Leskeodon</i> – 1/20				
<i>L. aristatus</i> (Geh. & Hampe) Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
DICRANACEAE – 49/901				
<i>Aongstroemia</i> – 3/7				
<i>A. julacea</i> (Hook.) Mitt.	FOD	-	-	-
<i>A. longipes</i> (Somerf.) B.S.G.	FOD	-	-	-
<i>A. orientalis</i> Mitt.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Atractylocarpus – 2/10				
A. brasiliensis (Müll. Hal.) R.S. Williams*	FOD	-	VU	ANEXO I
A. longisetus (Hook.) E.B. Bartram	FOD	-	VU	ANEXO I
Bryohumbertia – 1/3				
B. filifolia (Hornsch.) J.-P. Frahm	FOD, FOM, FED	-	-	-
Campylopus – 30/161				
C. aemulans (Hampe) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. angustiretis (Austin) Lesq. & James	FOD, FOM	-	-	-
C. arctocarpus (Hornsch.) Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. carolinae Grout	FOD, FOM	-	-	-
C. cryptopodioides Broth.	FOD, FOM, FED, RST	-	-	-
C. cuspidatus (Hornsch.) Mitt.	FOD	-	-	-
C. densicoma (Müll. Hal.) Paris	FOD	-	VU	ANEXO I
C. dichrostis (Müll. Hal.) Paris	FOD	-	-	-
C. fragilis (J.-P. Frahm) J.-P. Frahm*	FOD	-	-	-
C. gardneri (Müll. Hal.) Mitt.	FOD, FES	-	-	-
C. gastro-alaris (Müll. Hal.) Paris	FOD	-	-	-
C. gemmatus (Müll. Hal.) Paris*	FOD	-	-	-
C. griseus (Hornsch.) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. heterostachys (Hampe) A. Jaeger	FOD	-	-	-
C. jamesonii (Hook.) A. Jaeger	FOD, FED	-	-	-
C. julaceus A. Jaeger	FOD, FOM	-	-	-
C. julicaulis Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. lamellinervis (Müll. Hal.) Mitt.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
C. occultus Mitt.	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
C. pilifer Brid.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
C. reflexisetus (Müll. Hal.) Broth.	FOD, FOM	-	-	-
C. richardii Brid.	FOD, FOM	-	-	-
C. savannarum (Müll. Hal.) Mitt.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
C. sehnemii Brid.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
C. subcuspidatus (Hampe) A. Jaeger	FOD	-	-	-
C. surinamensis Müll. Hal.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
C. trachyblepharon (Müll. Hal.) Mitt.	FOD, FOM, FED, RST	-	-	-
C. twaitesii (Mitt.) A. Jaeger*	FOD	-	-	-
C. uleanus (Müll. Hal.) Broth.*	FOD, FOM	-	-	-
C. widgrenii (Müll. Hal.) Mitt.*	FOD, FOM	-	-	-
Dicranella – 2/164				
D. guillemianiana (Mont.) Mitt.	FOD	-	-	-
D. hilariana (Mont.) Mitt.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Dicranodontium – 1/15				
D. pulchroalare (Herzog) J.-P. Frahm*	FOD	-	-	-
Dicranum – 1/93				
D. frigidum Müll. Hal.	FOD	-	-	-
Holomitrium – 2/50				
H. arboreum Mitt.	FOD, FES	-	-	-
H. crispulum Mart.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Leucoloma – 3/103				
L. cruegerianum (Müll. Hal.) A. Jaeger	FOD, FES	-	-	-
L. serrulatum Brid.	FOD, FES	-	-	-
L. triforme (Mitt.) A. Jaeger*	FOD	-	-	-
Microcampylopus –1/3				
M. curvisetus (Hampe) Giese & J.-P. Frahm.	FOD	-	-	-
Microdus – 1/11				
M. brasiliensis (Dub.) Thér.	FOD	-	-	-
Paraleucobryum – 1/3				
P. longifolium (Broth.) P. Mueller & J. -P.Frahm*	FOD	-	-	-
Pilopogon – 1/8				
P. guadalupensis (Brid.) J.-P. Frahm	FOD, FOM, FED	-	-	-
DIPHYSCIACEAE – 1/20				
Diphyscium – 1/18				
D. longifolium Griff.	FOD	-	-	-
DITRICHACEAE – 12/186				
Ceratodon – 2/5				
C. purpureus (Hedw.) Brid.	FOD	-	-	-
C. stenocarpus Bruch & Schimp. ex Müll. Hal.	FOD	-	-	-
Chrysoblastella – 1/1				
C. chilensis (Mont.) Reimers	FOD	-	-	-
Cladastomum* – 2/2				
C. robustum Broth.*	FOD	-	-	-
C. ulei Müll. Hal.*	FOD, FOM	-	-	-
Crumescus* – 1/1				
C. vitalis W.R. Buck & Snider*	FOD	-	-	-
Ditrichum – 5/68				
D. crinale (Tayl.) Kuntze	FOD	-	-	-
D. itatiaiae (Müll. Hal.) Paris*	FOD	-	-	-
D. liliputanum (Müll. Hal.) Paris*	FOD, FOM	-	-	-
D. paulense Geh. ex Hampe*	FOD, FOM, FED	-	-	-
D. ulei (Müll. Hal.) Paris*	FOD, FOM, FED	-	-	-
Eccremidium – 1/6				
E. floridanum H.A. Crum	FOD, FOM	-	-	-
ENTODONTACEAE – 11/135				
Entodon – 9/117				
E. beyrichii (Schwägr.) Müll. Hal.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
E. campipatrum Sehnem*	FOM	-	-	-
E. gracilis (Ångstr.) A. Jaeger	FOD, FED	-	-	-
E. hampeanus Müll. Hal.	FOD	-	-	-
E. jamesonii (J. Taylor) Mitt.	FOD, FOM	-	-	-
E. lindbergii Hampe*	FOD, FED	-	-	-
E. macropodus (Hedw.) Müll. Hal.	FOD, FOM	-	-	-
E. mosenii Broth.*	FOD	-	-	-
E. splendidus Hampe	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Erythrodontium – 2/15				
E. longisetum (Hook.) Paris	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
E. squarrosum (Hampe) Paris	FOD, FOM, FED	-	-	-
EPHEMERACEAE – 4/38				
Ephemerum – 2/28				
E. pachyneuron Müll. Hal.*	FOD	-	-	-
E. uleanum Müll. Hal.	FOD	-	-	-
Micromitrium – 2/9				
M. tenerum (Bruch. & Schimp.) M.R. Crosby	FOD, FOM	-	-	-
M. thelephorotheicum (Florsch.) Crosby	FOD, FES	-	-	-
ERPODIACEAE – 5/25				
Aulacopilum – 2/7				
A. glaucum Wilson	FOD, FOM	-	-	-
A. schaeferi H.A. Crum*	FOD	-	-	-
Erpodium – 3/16				
E. beccari Müll. Hal.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
E. coronatum (Hook. f. & Wilson) Mitt.	FOD, FOM	-	-	-
E. glaziovii Hampe	FOD, FOM, FED	-	-	-
FABRONIACEAE – 4/79				
Dimerodontium – 2/10				
D. balansae Müll. Hal.	FOD, FOM	-	-	-
D. mendozense Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Fabronia – 2/61				
F. ciliaris (Hook.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
F. macroblepharis Schwägr.	FOD, FOM	-	-	-
FISSIDENTACEAE – 53/448				
Fissidens – 53/444				
F. acacioides Schrad.	FOD, FOM, FED	-	-	-
F. adiantoides Hedw.	FOD, FES	-	-	-
F. amoenus Müll. Hal.	FOD, FOM	-	-	-
F. angustelimbatus Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
F. asplenioides Hedw.	FOD, FOM	-	-	-
F. brachypus Mitt.	FOD, FOM	-	-	-
F. brevipes Besch.	FOD, FOM, FED	-	-	-
F. bryoides Hedw.	FOD	-	-	-
F. crispus Mont.	FOD, FOM	-	-	-
F. cryptoneuron Hedw.	FOD	-	-	-
F. curvatus Hornsch.	FOD, FOM	-	-	-
F. dendrophilus Brugg.-Nann. & Pursell*	FED	-	-	-
F. dissitifolius Sull.	FOD, FOM	-	-	-
F. elegans Brid.	FOD, FOM	-	-	-
F. flabellatus Hornsch.	FOD, FOM	-	-	-
F. flaccidus Mitt.	FOD, FES	-	-	-
F. fontanus (Pyl.) Steud.	FED	-	-	-
F. gardneri Mitt.*	FOD	-	-	-
F. goyazensis Broth.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>F. guianensis</i> Mont.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>F. gymnostomus</i> Brugg.-Nann.*	FOD	-	-	-
<i>F. hornschurchii</i> Mont.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>F. inaequalis</i> Mitt.	FOD, FES	-	-	-
<i>F. intromarginatus</i> (Hampe) A Jaeger	FOD, FOM	-	-	-
<i>F. lagenarius</i> (Spruce ex Mitt.) Pursell	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>F. leptophyllus</i> Mont.	FOD	-	-	-
<i>F. lindbergii</i> Mitt.	FOD	-	-	-
<i>F. neglectus</i> Crum	FOD, FES	-	-	-
<i>F. oediloma</i> Müll. Hal. ex Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>F. ornatus</i> Herzog	FOD, FES	-	-	-
<i>F. pallidinervis</i> Mitt.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>F. palmatus</i> Hedw.	FOD, FES	-	-	-
<i>F. pauperculus</i> Howe	FES	-	-	-
<i>F. pellucidus</i> Hornsch.	FOD, FOM	-	-	-
<i>F. perfalcatus</i> Broth.	FOD	-	-	-
<i>F. prionodes</i> Mont.	FOD, FES	-	-	-
<i>F. radicans</i> Mont.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>F. ramicola</i> Broth.	FOD	-	-	-
<i>F. rigidulus</i> Hook. f. & Wilson	FOD	-	-	-
<i>F. saprophilus</i> Broth.	FOD, FOM	-	-	-
<i>F. scalaris</i> Mitt.	FOD, FED	-	-	-
<i>F. scariosus</i> Mitt.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>F. semicompletus</i> Hedw.	FOM	-	-	-
<i>F. serratus</i> Müll. Hal.	FOD, FES	-	-	-
<i>F. stenophyllus</i> Ångstr.*	FOD	-	-	-
<i>F. submarginatus</i> Bruch	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>F. subradicans</i> Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>F. subulatus</i> Mitt.	FOD, FES	-	-	-
<i>F. spuriolimbatus</i> Broth.	FOD, FED	-	-	-
<i>F. termitarum</i> (Herzog) Pursell	FOD	-	-	-
<i>F. wallisii</i> Müll. Hal.	FOD	-	-	-
<i>F. weirii</i> Mitt.	FOM, FES	-	-	-
<i>F. zollingerii</i> Mont.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
FONTINALACEAE – 1/27				
<i>Fontinalis</i> – 1/20				
<i>F. duriaei</i> Schimp.	FED	-	-	-
FUNARIACEAE – 8/255				
<i>Entosthodon</i> – 1/83				
<i>E. bonplandii</i> (Hook.) Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Funaria</i> – 3/86				
<i>F. beyrichii</i> Hampe*	FOD, FOM	-	-	-
<i>F. hygrometrica</i> Hedw.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>F. luteolimbata</i> Broth.*	FOD, FCA, FED	-	-	-
<i>Physcomitrium</i> – 4/68				
<i>P. acutifolium</i> Broth.*	FOD, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. badium</i> Broth.*	FOD, FCA, FED	-	-	-
<i>P. brevisrostre</i> Broth.*	FOM, FCA, FED	-	-	-
<i>P. sylvestre</i> Müll. Hal.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
GRIMMIACEAE – 8/278				
<i>Grimmia</i> – 7/122				
<i>G. atrata</i> Miel. ex Hornsch.	FOM	-	-	-
<i>G. elongata</i> Kaulf.	FOD	-	-	-
<i>G. laevigata</i> (Brid.) Brid.	FCA	-	-	-
<i>G. longirostris</i> Hook.	FOD	-	-	-
<i>G. navicularis</i> (Hedw.) Lindb.	FOD	-	-	-
<i>G. ovalis</i> (Hedw.) Lindb.	FOD	-	-	-
<i>G. trichophylla</i> Grev.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Racomitrium</i> – 1/81				
<i>R. crispipilum</i> (Taylor) A. Jaeger	FOD	-	-	-
HEDWIGIACEAE – 5/30				
<i>Braunia</i> – 2/23				
<i>B. plicata</i> (Mitt.) A. Jaeger	FED	-	-	-
<i>B. subincana</i> Broth.*	FOM, FED	-	-	-
<i>Hedwigia</i> – 1/4				
<i>H. ciliata</i> (Hedw.) Ehrh. ex P. Beauv.	FOM, FED	-	-	-
<i>Hedwigidium</i> – 2/2				
<i>H. glyohocarpum</i> (Hampe) A. Jaeger	FOD, FOM	-	-	-
<i>H. integrifolium</i> (P. Beauv.) Dixon	FOD, FOM, FED	-	-	-
HELICOPHYLLACEAE – 1/1				
<i>Helicophyllum</i> – 1/1				
<i>H. torquatum</i> (Hook.) Brid.	FOD, FOM, FES	-	-	-
HOOKERIACEAE – 2/53				
<i>Calypstrochaeta</i> – 1/25				
<i>C. albescens</i> (Hampe) W.R. Buck*	FOD	-	-	-
<i>Hookeria</i> – 1/9				
<i>H. acutifolia</i> Hook. & Grev.	FOD, FOM, FED	-	-	-
HYDROPOGONACEAE – 1/2				
<i>Hydropogon</i> – 1/1				
<i>H. fontinaloides</i> (Hook.) Brid.	FOD	-	-	-
HYPNACEAE – 22/897				
<i>Chrysohypnum</i> – 2/12				
<i>C. diminutivum</i> (Hampe) W.R. Buck	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>C. elegantulum</i> (Hook.) Hampe	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Ctenidium</i> – 1/23				
<i>C. malacodes</i> Mitt.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Ectropothecium</i> – 1/202				
<i>E. leptochaeton</i> (Schwägr.) W.R. Buck	FOD, FOM	-	-	-
<i>Hypnum</i> – 1/81				
<i>H. amabile</i> (Mitt.) Hampe	FOD, FOM	-	-	-
<i>Isopterygium</i> – 5/151				
<i>I. affusum</i> Mitt.	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>I. byssobolax</i> (Müll. Hal.) Paris	FOD, FOM	-	-	-
<i>I. subbrevisetum</i> (Hampe) Broth.	FOD, FOM	-	-	-
<i>I. tenerifolium</i> Mitt.	FOD, FOM, FED, RST	-	-	-
<i>I. tenerum</i> (Sw.) Mitt.	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
<i>Mittenothamnium</i> – 9/82				
<i>M. expallescens</i> (Hampe) Cardot	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. heterostachys</i> (Hampe) Cardot	FOD, FED	-	-	-
<i>M. hylophilum</i> (Müll. Hal.) Cardot	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>M. macrodontium</i> (Hornsch.) Cardot	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>M. reptans</i> (Hedw.) Cardot	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>M. simorrhynchum</i> (Hampe) Cardot	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. subcampaniforme</i> (Geh. & Hampe) Cardot	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>M. subdiminutivum</i> (Geh. & Hampe) Cardot	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. submacrodontium</i> (Geh. & Hampe) Cardot	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Phyllodon</i> – 1/3				
<i>P. truncatulus</i> (Müll. Hal.) W.R. Buck	FOD, FOM	-	-	-
<i>Taxiphyllum</i> – 1/31				
<i>T. taxirameum</i> (Mitt.) Fleisch.	?	-	-	-
<i>Vesicularia</i> – 1/116				
<i>V. vesicularis</i> (Schwägr.) Broth.	?	-	-	-
HYOPTERYGIACEAE – 2/73				
<i>Hypopterygium</i> – 1/55				
<i>H. tamarisci</i> (Sw.) Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Lopidium</i> – 1/16				
<i>L. concinnum</i> (Hook.) Wilson	FOD, FOM, FED	-	-	-
LEMBOPHYLLACEAE – 5/78				
<i>Pilotrichella</i> – 1/50				
<i>P. flexilis</i> (Hedw.) Ångstr.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>Orthostichella</i> – 4/7				
<i>O. pachygastrella</i> (Müll. Hal. ex Ångstr.) B.H. Allen & Magill	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>O. rigida</i> (Müll. Hal. ex Ångstr.) B.H. Allen & Magill	FOD, FED	-	-	-
<i>O. versicolor</i> (Müll. Hal.) B.H. Allen & Buck	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>O. welwitschii</i> (Duby) B.H. Allen & Buck	FOD, FOM	-	-	-
LESKEACEAE – 1/176				
<i>Haplocladium</i> – 1/17				
<i>H. microphyllum</i> (Hedw.) Broth.	FOD, FED	-	-	-
LEUCOBRYACEAE – 7/95				
<i>Leucobryum</i> – 6/83				
<i>L. albicans</i> (Schwägr.) Lindb.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>L. albidum</i> (Brid. ex P. Beauv.) Lindb.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>L. clavatum</i> Hampe	FOD, FOM, FED, MAN	-	-	-
<i>L. crispum</i> Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>L. giganteum</i> Müll. Hal.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>L. martianum</i> (Hornsch.) Hampe ex Müll. Hal.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Ochrobryum</i> – 1/7				
<i>O. gardneri</i> (Müll. Hal.) Lindb.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LEUCODONTACEAE – 1/51				
<i>Pterigoniadelphus</i> – 1/3				
<i>P. assimilis</i> (Müll. Hal.) Ochyra & Zijstra	FOD, FOM, FED	-	-	-
LEUCOMIACEAE – 4/12				
<i>Leucomium</i> – 2/5				
<i>L. steerei</i> B. H. Allen & Veling	FOD	-	-	-
<i>L. strumosum</i> (Hornsch.) Mitt.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Philophyllum</i> – 1/1				
<i>P. tenuifolium</i> (Mitt.) Broth.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Rhynchostegiopsis</i> – 1/6				
<i>R. flexuosa</i> (Sull.) Müll. Hal.	FOD	-	-	-
METEORIACEAE – 12/199				
<i>Aerobryopsis</i> – 1/14				
<i>A. capensis</i> (Müll. Hal.) Fleisch.	FOD	-	-	-
<i>Cryptopappilaria</i> – 1/5				
<i>C. penicillata</i> (Hedw.) Dozy & Molk.	FOD	-	-	-
<i>Floribundaria</i> – 1/18				
<i>F. flaccida</i> (Miit.) Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Meteoriopsis</i> – 1/10				
<i>M. auronitens</i> (Hornsch.) Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Meteorium</i> – 6/37				
<i>M. araucariophila</i> Fleisch.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>M. deppei</i> (Hornsch.) Mitt.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. gemale</i> (Müll. Hal.) Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>M. medium</i> (Ångstr.) Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>M. nigrescens</i> (Hedw.) Dozy & Molk.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>M. squamidioides</i> Sehnem*	FOD	-	-	-
<i>Toloxis</i> – 1/3				
<i>T. imponderosa</i> (Tayl.) W.R. Buck	FOD	-	-	-
<i>Trachypus</i> – 1/5				
<i>T. bicolor</i> Reinw. & Hornsch.	FOD	-	-	-
MNIACEAE – 10/219				
<i>Plagiomnium</i> – 1/25				
<i>P. rhynchophorum</i> (Hook.) T.J. Kop.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Pohlia</i> – 4/127				
<i>P. camptotrachela</i> (Renauld & Cardot) Broth.	FOD	-	-	-
<i>P. elongata</i> Hedw.	FOD	-	-	-
<i>P. papillosa</i> (Müll. Hal. ex A. Jaeger) Broth.	FOD	-	-	-
<i>P. tenuifolia</i> (A. Jaeger) Broth.	FOD	-	-	-
<i>Schizymenium</i> – 5/51				
<i>S. brevicaule</i> (Hornsch.) A.J. Shaw & S.P. Churchill	-	-	-	-
<i>S. campylocarpum</i> (Arn. & Hook.) Shaw	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. lindigii</i> (Hampe) A.J. Shaw	FOD	-	-	-
<i>S. linearicaule</i> (Müll. Hal.) A.J. Shaw	FOD	-	-	-
<i>S. pusillum</i> (Hook. f. & Wilson) A. J. Shaw	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MYRINIACEAE – 5/27				
<i>Austinia</i> – 1/1				
<i>A. tenuinervis</i> (Mitt.) Müll. Hal.	FOD	-	-	-
<i>Helicodontium</i> – 3/21				
<i>H. capillare</i> (Hedw.) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>H. clarazii</i> (Duby) Par.*	FOM, FED	-	-	-
<i>H. pervirens</i> (Müll. Hal.) Par.	FES	-	-	-
<i>Myrinia</i> – 1/2				
<i>M. brasiliensis</i> (Hampe) Schimp.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
NECKERACEAE – 20/305				
<i>Homalia</i> – 1/6				
<i>H. glabella</i> (Hedwig) Schimp.	FOD	-	-	-
<i>Homaliodendron</i> – 1/27				
<i>H. piniforme</i> (Brid.) Enroth.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Isodrepanium</i> – 1/1				
<i>I. lentulum</i> (Wilson) E. Britton	FOD	-	-	-
<i>Neckera</i> – 4/71				
<i>N. caldensis</i> Lindb.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>N. scabridens</i> Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>N. urnigera</i> Müll. Hal.	FOD, FOM	-	-	-
<i>N. villae-ricae</i> Besch.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Neckeropsis</i> – 3/30				
<i>N. disticha</i> (Hedw.) Kindb.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>N. foveolata</i> (Mitt.) Broth.	FOD	-	-	-
<i>N. undulata</i> (Hedw.) Reichardt.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>Pinnatella</i> – 1/16				
<i>P. minuta</i> (Mitt.) Broth.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Porotrichum</i> – 8/38				
<i>P. filiferum</i> Mitt.	FOD	-	-	-
<i>P. korthalsianum</i> (Dozy & Molk.) Mitt.	FOD, FED, FES	-	-	-
<i>P. lancifrons</i> (Hampe) Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>P. leucocaulon</i> Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>P. longirostre</i> (Hook.) Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>P. mutabile</i> Hampe	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>P. substriatum</i> (Hampe) Mitt.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>P. thieleanarum</i> (Müll. Hal.) Mitt.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Thamnobryum</i> – 1/42				
<i>T. fasciculatum</i> (Hedw.) I. Sastre	FOD, FOM, FED	-	-	-
ORTHODONTIACEAE – 1/14				
<i>Orthodontium</i> – 1/14				
<i>O. pellucens</i> (Hook.) B.S.G.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
ORTHOTRICHACEAE – 44/842				
<i>Cardotiella</i> – 1/7				
<i>C. quinquefaria</i> (Hornsch.) Vitt	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Groutiella</i> – 3/13				
<i>G. apiculata</i> (Hook.) H.A. Crum & Steere	FOD, FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>G. tomentosa</i> (Hornsch.) Wijk & Margad.	FOD, FES	-	-	-
<i>G. tumidula</i> (Mitt.) Vitt	FOD, FOM	-	-	-
<i>Macrocoma</i> – 4/10				
<i>M. brasiliensis</i> (Mitt.) Vitt*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>M. frigida</i> (Müll. Hal.) Vitt	FOD	-	-	-
<i>M. orthotrichoides</i> (Raddi) Wijk & Margad.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>M. tenue</i> (Müll. Hal.) Vitt	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>Macromitrium</i> – 14/368				
<i>M. adnatum</i> Müll. Hal.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. argutum</i> Hampe	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>M. catharinense</i> Paris*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>M. cirrosum</i> (Hedw.) Brid. var. <i>cirrosum</i>	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>M. guatemalense</i> Müll. Hal.	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. longifolium</i> (Hook.) Brid.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. microstomum</i> (Hook. & Grev.) Schwägr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. nitidum</i> Hook. f. & Wilson	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>M. pellucidum</i> Mitt.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. podocarp</i> Müll. Hal.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. punctatum</i> (Hook. & Grev.) Brid.	FOD, FED	-	-	-
<i>M. richardii</i> Schwägr.	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
<i>M. stellulatum</i> (Hornsch.) Brid.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. undatum</i> Müll. Hal.*	FOD, FED	-	-	-
<i>Orthotrichum</i> – 2/146				
<i>O. araucarieti</i> Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>O. diaphanum</i> (Müll. Hal.) Lewinsky	FCA	-	-	-
<i>Schlotheimia</i> – 13/121				
<i>S. appressifolia</i> Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. breviseta</i> Ångstr.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. chamissonis</i> Hornsch.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. clavata</i> Geh. & Hampe*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. compacta</i> Müll. Hal.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. fuscoviridis</i> Hornsch.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. gracilescens</i> Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. jamesonii</i> (Arnott) Brid.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>S. pseudoaffinis</i> Müll. Hal.*	FOD, FED	-	-	-
<i>S. rugifolia</i> (Hook.) Schwägr.	FOD, FOM, FED, FES, RST, MAN	-	-	-
<i>S. tecta</i> Hook f. & Wilson	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. torquata</i> (Hedw.) Brid.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>S. trichomitria</i> Schwägr.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Sehnemobryum</i> – 1/1				
<i>S. paraguense</i> (Besch.) Lewinsky-Haapasaari & Hedenas*	FOM, FED	-	-	-
<i>Zygodon</i> – 6/92				
<i>Z. campylophyllus</i> Müll. Hal.*	FOD	-	-	-
<i>Z. obtusifolius</i> Hook.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Z. patrum</i> Sehnem*	FOM	-	-	-
<i>Z. pungens</i> Müll. Hal.	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>Z. reinwardtii</i> (Hornsch.) A. Braun	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Z. viridissimus</i> (Dicks.) Brid.	FOD	-	-	-
PHYLOGONIACEAE – 2/3				
<i>Phyllogonium</i> – 2/3				
<i>P. fulgens</i> (Hedw.) Brid.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. viride</i> Brid.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
PILOTRICHACEAE – 43/442				
<i>Brymela</i> – 1/10				
<i>B. fluminensis</i> (Hampe) W. R. Buck*		-	-	-
<i>Callicostella</i> – 7/97				
<i>C. apophysata</i> (Hampe) A. Jaeger	FOD	-	-	-
<i>C. depressa</i> (Hedw.) A. Jaeger	FOD	-	-	-
<i>C. martiana</i> (Hornsch.) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>C. merkelii</i> (Hornsch.) A. Jaeger	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. microcarpa</i> Ångstr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. pallida</i> (Hornsch.) Ångstr.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>C. rufescens</i> (Mitt.) A. Jaeger	FOD	-	-	-
<i>Crossomitrium</i> – 3/10				
<i>C. epiphyllum</i> (Mitt.) Müll. Hal.	FOD	-	-	-
<i>C. patrisiae</i> (Brid.) Müll. Hal.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. saprophilum</i> Broth.	FOD	-	-	-
<i>Cyclodictyon</i> – 5/90				
<i>C. albicans</i> (Hedw.) O. Kuntze	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>C. limbatum</i> (Hampe) O. Kuntze	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>C. marginatum</i> (Hook. f. & Wilson) O. Kuntze*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>C. olfersianum</i> (Hornsch.) O. Kuntze	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>C. varians</i> (Sull.) O. Kuntze	FOD	-	-	-
<i>Hypnella</i> – 3/9				
<i>H. pallescens</i> (Hook.) A. Jaeger	FOD	-	-	-
<i>H. pilifera</i> (Hook. f. & Wilson) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>H. punctata</i> Broth.	FOD	-	-	-
<i>Lepidopilidium</i> – 5/31				
<i>L. aureo-purpureum</i> (Geh. & Hampe) Broth.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. brevisetum</i> (Hampe) Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>L. laevisetum</i> (Hampe) Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>L. plebejum</i> (Müll. Hal.) Sehnem	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>L. potoricense</i> (Müll. Hal.) H.A. Crum & Steere	FOD	-	-	-
<i>Lepidopilum</i> – 9/61				
<i>L. affine</i> Müll. Hal.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>L. brevipes</i> Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>L. caudicaule</i> (Müll. Hal.) Broth.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. longifolium</i> Hampe	FOD	-	-	-
<i>L. muelleri</i> (Hampe) Mitt.	FOD, FED	-	-	-
<i>L. ovalifolium</i> (Duby) Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>L. scabrisetum</i> (Schwägr.) Steere	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>L. subsubulatum</i> Geh. & Hampe*	FOD, FOM, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>L. surinamense</i> Müll. Hal.	FOD	-	-	-
<i>Pilotrichum</i> – 2/22				
<i>P. bipinnatum</i> (Schaeagr.) Brid.	FOD	-	-	-
<i>P. evanescens</i> (Müll. Hal.) Müll. Hal.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Thamniopsis</i> – 5/14				
<i>T. incurva</i> (Hornsch.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>T. langsдорffii</i> (Hook.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>T. pendula</i> (Hook.) M. Fleisch.	FOD	-	-	-
<i>T. purpureophylla</i> (Müll. Hal. ex E. Britton.) W.R. Buck	FOD	-	-	-
<i>T. undata</i> (Hedw.) W.R. Buck	FOD, FOM	-	-	-
<i>Trachyxiphium</i> – 3/11				
<i>T. aduncum</i> (Mitt.) W.R. Buck	FOD, FED	-	-	-
<i>T. guadalupense</i> (Brid.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>T. variable</i> (Mitt.) W.R. Buck	FOD, FED	-	-	-
PLAGIOTHECIACEAE – 2/52				
<i>Plagiothecium</i> – 2/52				
<i>P. lucidum</i> (Hook f. & Wilson) Paris	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. novogranatense</i> (Hampe) Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
POLYTRICHACEAE – 14/218				
<i>Atrichum</i> – 2/20				
<i>A. oerstedianum</i> (Müll. Hal.) Nyholm	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>A. polycarpum</i> (Müll. Hal.) Mitt.	FOD, FED	-	-	-
<i>Itatiella</i> * – 1/1				
<i>I. ulei</i> (Broth. ex Müll. Hal.) G.L. Smith*	FOD	-	-	-
<i>Notoligotrichum</i> – 1/9				
<i>N. minimum</i> (Cardot) G.L. Smith	FOM	-	-	-
<i>Oligotrichum</i> – 1/28				
<i>O. denudatum</i> G.L. Merill*	FOD	-	-	-
<i>Pogonatum</i> – 4/57				
<i>P. campylocarpon</i> (Müll. Hal.) Mitt.	FOD	-	-	-
<i>P. pensilvanicum</i> (E.B. Bartram ex Hedw.) P. Beauv.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>P. perichaetiale</i> (Kunze ex Müll. Hal.) Hyvönen	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. tortile</i> (Sw.) Brid.	FOD	-	-	-
<i>Polytrichadelphus</i> – 1/25				
<i>P. pseudopolytrichum</i> (Raddi) G.L. Smith.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Polytrichum</i> – 4/39				
<i>P. angustifolium</i> Mitt. *	FOD	-	-	-
<i>P. commune</i> L. ex Hedw.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>P. juniperinum</i> Willd. ex Hedw.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>P. strictum</i> Menzies ex Brid.	FOM	-	-	-
POTTIACEAE – 49/1.356				
<i>Acaulon</i> – 1/20				
<i>A. uleanum</i> Müll. Hal.*	FOM, FED	-	-	-
<i>Anoetangium</i> – 1/49				
<i>A. aestivum</i> (Hedw.) Mitt.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Barbula – 3/171				
B. afrofontana (Müll. Hal.) Broth.	FOD	-	-	-
B. indica (Hook.) Spreng.	FOD, FES	-	-	-
B. riograndensis Bartr.*	FOD, FED	-	-	-
Chenia – 1/3				
C. leptophylla (Müll. Hal.) R.H. Zander	FOD, FOM	-	-	-
Didymodon – 2/122				
D. australasiae (Hook. & Grev.) R.H. Zander	FOD, FOM	-	-	-
D. rigidulus Hedw.	FOD	-	-	-
Dolotortula – 1/1				
D. mnifolia (Sull.) R H. Zander	FOD	-	-	-
Erythrophyllastrum – 1/1				
E. andinum (Sull.) R.H. Zander	FES	-	CR	ANEXO I
Eucladium – 1/1				
E. verticillatum (Brid.) B.S. & G.	FOD	-	-	-
Ganguleea – 1/1				
G. angulosa (Broth. & Dix.) R.H. Zander	FOD	-	-	-
Gymnostomiella – 1/5				
G. vernicosa (Harv.) M. Fleisch.	FOD	-	-	-
Hymenostyliella – 1/3				
H. alata (Herzog) Robins.*	FOD	-	-	-
Hymenostylium – 1/16				
H. recurvirostrum (Hedw.) Dixon	FOD, FOM	-	-	-
Hyophila – 2/72				
H. blanda (Hook. f. & Wilson) A. Jaeger	FOD	-	-	-
H. involuta (Hook.) A. Jaeger	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
Hyophiladelphus – 1/1				
H. agrarius (Hedw.) R.H. Zander	FOD, FES, RST	-	-	-
Leptodontium – 8/36				
L. araucarieti (Müll. Hal.) Paris	FOD, FOM, FED	-	-	-
L. filicola Herzog	FOD, FED	-	-	-
L. flexifolium (Dicks.) Hampe	FOD	-	-	-
L. luteum (Taylor) Mitt.	FOD	-	-	-
L. pungens (Mitt.) Kindb.	FED	-	-	-
L. stellatifolium (Hampe) Broth.*	FOD, FOM	-	-	-
L. viticulosoides (P. Beauv.) Wijk & Margad.	FOD, FOM, FED	-	-	-
L. wallisii (Müll. Hal.) Kindb.	FOD	-	VU	ANEXO I
Luisierella – 1/1				
L. barbula (Schwaegr) Steere	FOD	-	-	-
Molendoa – 1/15				
M. sendmeriana (Bruch, Schimp. & W. Gümbel) Limpr.	FOD, FOM	-	-	-
Plaubelia – 1/2				
P. sprengelii (Schwägr.) R.H. Zander	FOD, FES	-	-	-
Pleurochaete – 1/4				
P. luteola (Besch.) Thér.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>Pseudocrossidium</i> – 1/17				
<i>P. replicatum</i> (Taylor) R.H. Zander	FOD, FOM	-	-	-
<i>Pseudosymblesfaris</i> – 2/10				
<i>P. cavernarum</i> (Broth.) R. H. Zander*	FOD	-	-	-
<i>P. schimperiana</i> (Paris) H.A. Crum	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Streptocalyptra</i> –1/4				
<i>S. lorentziana</i> Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Streptopogon</i> – 2/13				
<i>S. calymperes</i> Müll. Hal.	FOD	-	-	-
<i>S. cavifolius</i> Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Syntrichia</i> – 3/79				
<i>S. amphidiacea</i> (Müll. Hal.) R.H. Zander	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. fragilis</i> (J. Taylor) Ochyra	FOD, FED	-	-	-
<i>S. pagorum</i> (Midle) Amann	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Timmiella</i> – 1/13				
<i>T. barbuloides</i> (Brid.) Moenk.	FOD	-	-	-
<i>Tortella</i> – 2/48				
<i>T. humilis</i> (Hedw.) Jenn.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>T. linearis</i> (Web. & Mohr) R.H. Zander	FOD	-	-	-
<i>Tortula</i> – 1/144				
<i>T. muralis</i> Hedw.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>Trichostomum</i> – 3/116				
<i>T. brachydontium</i> Bruch.	FOD, FES	-	-	-
<i>T. tenuirostre</i> (Hook. & Taylor) Lindb.	FOD	-	-	-
<i>T. termitarum</i> (Müll. Hal.) R.H. Zander*	FOD	-	-	-
<i>Weissia</i> – 4/90				
<i>W. breutelli</i> Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>W. controversa</i> Hedw.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>W. glazioui</i> R.H. Zander	FOD, FED	-	-	-
<i>W. jamaicensis</i> (Mitt.) Grout.	FOD, FOM	-	-	-
PRIONODONTACEAE – 1/9				
<i>Prionodon</i> – 1/9				
<i>P. densus</i> (Hedw.) Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
PTERIGYNANDRACEAE – 1/26				
<i>Trachyphyllum</i> – 1/8				
<i>T. dusenii</i> (Müll. Hal. ex Broth.) Broth.	FOD	-	-	-
PTEROBRYACEAE – 12/169				
<i>Calypthothecium</i> – 1/30				
<i>C. duplicatum</i> (Schwägr.) Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Henicodium</i> – 1/1				
<i>H. geniculatum</i> (Mitt.) W.R. Buck	FOD, FES	-	-	-
<i>Hildebrandtiella</i> – 1/5				
<i>H. guyanensis</i> (Mont.) W.R. Buck	FOD	-	-	-
<i>Jaegerina</i> – 1/9				
<i>J. scariosa</i> (Lorentz) Arz.	FOD, FES	-	-	-
<i>Orthostichopsis</i> – 4/17				
<i>O. tenuis</i> (A. Jaeger) Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>O. tetragona</i> (Hedw.) Broth.	FOD, FES	-	-	-
<i>O. tijucae</i> (Müll. Hal.) Broth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>O. tortipilis</i> (Müll. Hal.) Broth.	FOD, FES	-	-	-
<i>Pirella</i> – 2/12				
<i>P. cymbifolia</i> (Sull.) Cardot	FOD	-	-	-
<i>P. pohli</i> (Schwägr.) Card.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Pterobryon</i> – 1/8				
<i>P. densum</i> (Schwägr.) Hornsch.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Spiridentopsis</i> – 1/1				
<i>S. longissima</i> (Raddi) Broth.	FOD, FOM	-	-	-
PTYCHOMITRIACEAE – 2/71				
<i>Ptychomitrium</i> – 2/54				
<i>P. sellowianum</i> (Müll. Hal.) A. Jaeger	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>P. vaginatum</i> Besch.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
PTYCHOMNIACEAE – 1/15				
<i>Ptychomnion</i> – 1/5				
<i>P. fruticetorum</i> Müll. Hal.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
RACOPILACEAE – 1/61				
<i>Racopilum</i> – 1/53				
<i>R. tomentosum</i> (Hedw.) Brid.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
RHABDOWEISACEAE – 2/25				
<i>Oreoweisia</i> – 1/15				
<i>O. brasiliensis</i> Hampe	FOD	-	-	-
<i>Rhabdoweisia</i> – 1/9				
<i>R. fugax</i> (Hedw.) B.S.G.	FOD	-	-	-
RHACHITHECIACEAE – 5/17				
<i>Jonesiobryum</i> – 2/3				
<i>J. cerradense</i> Vital ex B.H. Allen & Pursell	FOD	-	-	-
<i>J. termitarum</i> Vital ex B.H. Allen & Pursell*	FOD	-	-	-
<i>Rhachithecium</i> – 1/4				
<i>R. perpusillum</i> (Thaites & Mitt.) Broth.	FOD	-	-	-
<i>Uleastrum</i> – 1/2				
<i>U. palmicola</i> (Müll. Hal.) R.H. Zander	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Zanderia</i> – 1/1				
<i>Z. octoblepharis</i> (A. Jaeger) Goffinet	FOD	-	-	-
RHACOCARPACEAE – 2/9				
<i>Rhacocarpus</i> – 2/8				
<i>R. inermis</i> (Müll. Hal.) Lindb.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>R. purpurascens</i> (Brid.) Paris	FOD, FED	-	-	-
RHIZOGONIACEAE – 3/34				
<i>Hymenodon</i> – 1/5				
<i>H. aeruginosus</i> (Hook f. & Wilson) Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Pyrrhobryum</i> – 1/12				
<i>P. spiniforme</i> (Hedw.) Mitt.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>Rhizogonium</i> – 1/8				
<i>R. novae-hollandiae</i> (Brid.) Brid.	FOD	-	-	-


ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
RIGODIACEAE – 1/7				
<i>Rigodium</i> – 1/7				
<i>R. toxarion</i> (Schwägr.) Schimp.	FOD, FOM, FED	-	-	-
RUTTENBERGIACEAE – 1/7				
<i>Pseudocryphaea</i> – 1/1				
<i>P. domingensis</i> (Spreng.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
SELIGERIAACEAE – 2/83				
<i>Blindia</i> – 1/24				
<i>B. magellanica</i> Schimp. ex Müll. Hal.*	FOD	-	-	-
<i>Brachydontium</i> – 1/9				
<i>B. notrogenes</i> W.R. Buck & Schäf.-Verw.*	FOD	-	-	-
SEMATOPHYLLACEAE – 48/863				
<i>Acroporium</i> – 6/68				
<i>A. caespitosum</i> (Hedw.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>A. catharinense</i> Sehnem*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>A. estrellae</i> (Müll. Hal.) W.R. Buck & Schäf.-Verw.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>A. exiguum</i> (Broth.) W.R. Buck & Schäf.-Verw.*	FOD	-	-	-
<i>A. longirostre</i> (Brid.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>A. pungens</i> (Hedw.) Broth.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Aptychella</i> – 1/7				
<i>A. prolifera</i> (Broth.) Herzog	FOD, FOM	-	-	-
<i>Aptychopsis</i> – 3/4				
<i>A. pungifolia</i> (Hampe) Broth.*	FOD, FED	-	-	-
<i>A. pyrrophylla</i> (Müll. Hal.) Wijk & Margad.	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. subpungifolia</i> (Broth.) Broth.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Colobodontium</i> – 1/1				
<i>C. vulpinum</i> (Mont.) S.P. Churchill	FOD, FED	-	-	-
<i>Donnellia</i> – 3/7				
<i>D. commutata</i> (Müll. Hal.) W.R. Buck	FOD	-	-	-
<i>D. lagenifera</i> (Müll. Hal.) W.R. Buck*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>D. lageniformis</i> (Müll. Hal.) W.R. Buck	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Meiothecium</i> – 2/32				
<i>M. boryanum</i> (Müll. Hal.) Mitt.	FOD	-	-	-
<i>M. revolubile</i> Mitt.	FOD, FES	-	-	-
<i>Paranapiacabaeae</i> * – 1/1				
<i>P. paulista</i> W.R. Buck & Vital*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Potamium</i> – 1/1				
<i>P. lonchophyllum</i> (Mont.) Mitt.	FOD	-	-	-
<i>Pterogonidium</i> – 1/2				
<i>P. pulchellum</i> (Hook.) Müll. Hal.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>Pylaisiadelpha</i> – 1/7				
<i>P. brasiliensis</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>Sematophyllum</i> – 17/170				
<i>S. adnatum</i> (Michx.) Brid.	FOD, FED, RST	-	-	-
<i>S. beyrichii</i> (Hornsch.) Broth.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>S. cataractae</i> W.R. Buck*	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. cuspidiferum</i> Mitt.	FOD	-	-	-
<i>S. decumbens</i> Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. galipense</i> (Müll. Hal.) Mitt.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>S. leucostomum</i> (Hampe) W.R. Buck*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. lithophilum</i> (Hornsch.) Ångstr.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>S. macrorhynchium</i> (Hornsch.) Mitt.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. oedophysidium</i> W.R. Buck	FOD	-	-	-
<i>S. subfulvum</i> (Broth.) Broth.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. subpinnatum</i> (Brid.) E. Britton	FOD, FOM, FED, FES, RST, MAN	-	-	-
<i>S. subsimplex</i> (Hedw.) Mitt.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>S. succedaneum</i> (Hook f. & Wilson) Mitt.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. swartzii</i> (Schwägr.) W.H. Welch & H.A. Crum	FOD	-	-	-
<i>S. tequendamense</i> (Hampe) Mitt.	FOD	-	-	-
<i>S. warmingii</i> (Hampe) W.R. Buck*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Taxithelium</i> – 3/108				
<i>T. juruense</i> (Broth.) Broth.	FOD	-	-	-
<i>T. planum</i> (Brid.) Mitt.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>T. pluripunctatum</i> (Ren. & Card.) W.R. Buck	FOD, FES	-	-	-
<i>Trichosteleum</i> – 7/130				
<i>T. brachydictyon</i> (Besch.) A. Jaeger	FOD	-	-	-
<i>T. cyparissoides</i> (Hornsch.) R.S. Williams	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>T. glaziovii</i> W.R. Buck*	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>T. papillosum</i> (Hornsch.) A. Jaeger	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>T. sentosum</i> (Sull.) A. Jaeger	FOD, FES	-	-	-
<i>T. subdemissum</i> (Besch.) A. Jaeger	FOD	-	-	-
<i>T. sublaevigatum</i> Herzog*	FOD	-	-	-
<i>Wijkia</i> – 1/47				
<i>W. flagellifera</i> (Broth.) H.A. Crum	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
SPHAGNACEAE – 81/290				
<i>Sphagnum</i> – 81/290				
<i>S. aciphyllum</i> Müll. Hal.	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. acutirameum</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. aequalipunctatum</i> H.A. Crum*	FOM	-	-	-
<i>S. alegrense</i> Warnst.	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. amoenoides</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. amoenum</i> Warnst.*	FOD	-	-	-
<i>S. atroligneum</i> H.A. Crum*	FOM	-	-	-
<i>S. billbuckii</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. bocainense</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. brachybolax</i> Müll. Hal. ex Warnst.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. brasiliense</i> Warnst.*	FOD	-	-	-
<i>S. brevirameum</i> Hampe	FOD, FES	-	-	-
<i>S. buckianum</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. capillifolium</i> (Ehrhart) Hedw.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. carneum</i> Müll. Hal. & Warnst.*	FOD	-	-	-
<i>S. chi-chiense</i> H.A. Crum	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. columniforme</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. contortulum</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. costae</i> H.A. Crum & Pinheiro da Costa*	FOD	-	-	-
<i>S. crumii</i> Schaf.-Verw.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.	FOD, FOM, FED, RST	-	-	-
<i>S. cyclophyllum</i> Sull. & Lesq.	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. divisum</i> H.A. Crum	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. exile</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. exquisitum</i> H.A. Crum*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. frahmii</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. geraisense</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. globicephalum</i> Müll. Hal. ex Warnst.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. gracilescens</i> Müll. Hal.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. guanabarae</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. harleyi</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. homophyllum</i> H.A. Crum*	FOM	-	-	-
<i>S. imbricatum</i> Hornsch.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. itatiaiae</i> Müll. Hal. & Warnst.*	FOD	-	-	-
<i>S. laxulum</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. leonii</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. lindbergii</i> Schimp.	FOD	-	-	-
<i>S. longicosum</i> Müll. Hal. ex Warnst.	FOD	-	-	-
<i>S. longistolo</i> Müll. Hal.	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. luetzelburgii</i> H.K.G. Paul ex H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. magellanicum</i> Brid.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. meridense</i> (Hampe) Müll. Hal.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. microcuspidatum</i> H.A. Crum*	FOD, FED	-	-	-
<i>S. mirabile</i> Müll. Hal. & Warnst.*	FOD	-	-	-
<i>S. molle</i> Sull.	FOD	-	-	-
<i>S. mosenii</i> Warnst.*	FOD	-	-	-
<i>S. multiporosum</i> H.A. Crum*	FED	-	-	-
<i>S. obliquefibrosum</i> H.A. Crum*	FOM	-	-	-
<i>S. ornatum</i> H.A. Crum	FOD	-	-	-
<i>S. oxyphyllum</i> Warnst.	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. palustre</i> L.	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
<i>S. papillosum</i> Lindb.	FOD	-	-	-
<i>S. paranense</i> H.A. Crum	FOM	-	-	-
<i>S. parcoramosum</i> H.A. Crum*	FOM	-	-	-
<i>S. pendulirameum</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. perforatum</i> Warnst.	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. perichaetiale</i> Hampe	FOD, FOM, FED, FES, RST	-	-	-
<i>S. platyphylloides</i> Warnst.	FOD	-	-	-
<i>S. pluriporosum</i> H.A. Crum*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. pseudoramulinum</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. ramulinum</i> Warnst.*	FOD	-	-	-
<i>S. recurvum</i> P. Beauv.	FOD, FOM, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. roseum</i> Warnst.*	FOD	-	-	-
<i>S. rotundatum</i> Müll. Hal. & Warnst.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. sanguinale</i> Warnst.	FOD	-	-	-
<i>S. scorpioides</i> (Hampe) H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. sehnemii</i> H. A. Crum*	FOM	-	-	-
<i>S. septatoporosum</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. sparsum</i> Hampe	FOD, RST	-	-	-
<i>S. strictum</i> Sull.	FOD	-	-	-
<i>S. subhomophyllum</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. submedium</i> Warnst.*	FOD	-	-	-
<i>S. subsecundum</i> Nees	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. sucrei</i> H. A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. tabuleirensis</i> O. Yano & H.A. Crum*	FOD, RST	-	-	-
<i>S. tenellum</i> Ehrh. ex Hoffm.	FOD	-	-	-
<i>S. tenerum</i> Sull. & Lesq.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. triporosum</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
<i>S. turgens</i> Warnst.*	FOD	-	-	-
<i>S. umbrosum</i> Warnst.*	FOD	-	-	-
<i>S. vitalii</i> H.A. Crum*	FOD	-	-	-
SPLACHNACEAE – 4/73				
<i>Moseniella</i> – 1/2				
<i>M. brasiliensis</i> Broth.*	FOD	-	-	-
<i>Tayloria</i> – 1/41				
<i>T. arenaria</i> (Müll. Hal.) Broth.	FOD	-	-	-
<i>Tetraplodon</i> – 2/9				
<i>T. itatiaiae</i> Müll. Hal.*	FOD, FED	-	-	-
<i>T. tomentosus</i> Sehnem*	FOM	-	-	-
SPLACHNOBRYACEAE – 1/26				
<i>Splachnobryum</i> – 1/26				
<i>S. obtusum</i> (Brid.) Müll. Hal.	FOD, FED	-	-	-
STEREOPHYLLACEAE – 6/50				
<i>Entodontopsis</i> – 3/17				
<i>E. leucostega</i> (Brid.) W.R. Buck & Ireland	FOD, FES	-	-	-
<i>E. nitens</i> (Mitt.) W.R. Buck & Ireland	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>E. panamensis</i> (Bartr.) W.R. Buck & Ireland	FOD	-	-	-
<i>Eulacophyllum</i> – 1/1				
<i>E. cultelliforme</i> (Sull.) W.R. Buck & Ireland	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Pilosium</i> – 1/1				
<i>P. chlorophyllum</i> (Hornsch.) Müll. Hal.	FOD, FES	-	-	-
<i>Stereophyllum</i> – 1/23				
<i>S. radiculosum</i> (Hook.) Mitt.	FOD, FOM, RST	-	-	-
SYMPHYDONTACEAE – 1/95				
<i>Symphyodon</i> – 1/17				
<i>S. imbricatifolius</i> (Mitt.) S.P. Churchill	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
THUIDIACEAE – 15/139				
<i>Pelekium</i> – 5/3				
<i>P. involvens</i> (Hedw.) Touw	FOD	-	-	-
<i>P. minutulum</i> (Hedw.) Touw	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>P. scabrosulum</i> (Mitt.) Touw	FOD	-	-	-
<i>P. schistocalyx</i> (Müll. Hal.) Touw	FOD	-	-	-
<i>P. subpinnatum</i> (Broth.) Touw	FOD	-	-	-
<i>Thuidiopsis</i> – 1/7				
<i>T. furfurosa</i> (Hook f. & Wilson) M. Fleisch.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Thuidium</i> – 9/73				
<i>T. brasiliense</i> Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>T. delicatulum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	FOD, FES	-	-	-
<i>T. granulatum</i> (Hampe) A. Jaeger*	FOD	-	-	-
<i>T. patrum</i> Sehnem*	FOM	-	-	-
<i>T. pseudoprotensum</i> (Müll. Hal.) Mitt.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>T. serricola</i> (Müll. Hal.) Paris	FOM	-	-	-
<i>T. tamariscinum</i> (Hedw.) B.S.G.	FOD, FED	-	-	-
<i>T. tomentosum</i> Schimp. ex Besch.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>T. urceolatum</i> Lorentz	FOD, FOM, FED	-	-	-



Lista das Pteridófitas

Anemiaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ANEMIACEAE – 39/100				
Anemia – 39/100				
A. alfredi-rohrrii Brade*	FOD	-	-	-
A. aspera (Fée) Baker*	FOD	-	-	-
A. blechnoides Sm.*	FOD, FES	-	CR	ANEXO II
A. candidoi Brade	FED	-	-	-
A. collina Raddi	FES, AFL	-	-	-
A. dentata Gardner	FES	-	-	-
A. duartei Brade	FOD, FES	-	-	-
A. elegans (Gardner) C. Presl	FOD, FCA	-	-	-
A. espiritosantensis Brade*	FOD, FES	-	-	-
A. ferruginea Kunth	FOD, FES, FCA	-	-	-
A. flexuosa (Savigny) Sw.	FOD, FES	-	-	-
A. gardneri Hook.*	FOD, FES, FCA	-	EN	ANEXO II
A. glauca Gardner	FCA	-	-	-
A. gomesii Christ	FCA	-	-	-
A. hirsuta (L.) Sw.	FOD, FES, FED	-	-	-
A. hirta (L.) Sw.	FOD, FES	-	-	-
A. imbricata J.W. Sturm	FOD, FES, FCA	-	-	-
A. lanuginosa Brongn. ex J.W. Sturm	FES, FCA	-	-	-
A. luetzelburgii Rosenst.*	FOD, FES	-	-	-
A. mandioccana Raddi*	FOD, FES	-	-	-
A. oblongifolia (Cav.) Sw.	FOD, FES, FCA	-	-	-
A. organensis Rosenst.*	FOD, FCA	-	EN	ANEXO II
A. ouropretana Christ	FOD, FES	-	-	-
A. pallida Gardner	FES	-	-	-
A. pastinacaria Moritz ex Prantl	FOD, FES	-	-	-
A. phyllitidis (L.) Sw.	FOD, FES, FED	-	-	-
A. presliana Prantl	FOD, FCA	-	-	-
A. raddiana Link	FOD, FES	-	-	-
A. repens Raddi	FCA	-	-	-
A. retroflexa Brade*	FES	-	-	-
A. rotundifolia Schrad.	FES, FED	-	-	-
A. simplicior (Christ) Mickel*	FOD	-	-	-
A. spicantoides Mabb.*	FOD	-	-	-
A. tenella (Cav.) Sw.	FES, FED	-	-	-
A. tenera Pohl ex J.W. Sturm	FES	-	-	-
A. tomentosa (Savigny) Sw.	FOD, FES, FED	-	-	-

(*) Caráter endêmico do grupo taxonômico: gênero e espécie.

Os números que estão à frente de cada gênero e família representam o número de espécies ocorrentes na Floresta Atlântica e número total de espécies ocorrentes no mundo, respectivamente.

Vegetação: FOD – Floresta Ombrófila Densa/Aberta; FOM – Floresta Ombrófila Mista; FES – Floresta Estacional Semidecidual; FED – Floresta Estacional Decidual; FCA – Formações Campestres; AFL – Afloramentos Rochosos; RST – Restinga; MAN – Manguezal; RUD – Ruderal.

Categoria de Ameaça: CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; EX – Extinta; EW – Extinta na Natureza; ANEXO I – Ameaçada e ANEXO II – Dados Deficientes.

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. ulbrichtii</i> Rosenst.*	FOD	-	-	-
<i>A. villosa</i> Willd.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>A. warmingii</i> Prantl*	FOD, FES	-	-	-

Aspleniaceae

Lana da Silva Sylvestre

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ASPLENIACEAE – 58/654				
<i>Antigramma</i> – 3/4				
<i>A. balansae</i> (Baker) L. Sylvestre & P.G. Windisch*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. brasiliensis</i> (Sw.) T. Moore*	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. plantaginea</i> (Schr.) C. Presl*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>Asplenium</i> – 55/650				
<i>A. abscissum</i> Willd.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>A. alatum</i> Willd.	FOD	-	-	-
<i>A. auriculatum</i> Sw.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>A. auritum</i> Sw.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>A. austrobrasiliense</i> (Christ) Maxon*	FOD	-	-	-
<i>A. badinii</i> L. Sylvestre & P.G. Windisch*	FOD	-	-	-
<i>A. bradeanum</i> Handro*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>A. bradei</i> Rosenst.*	FOD	-	-	-
<i>A. campos-portoi</i> Brade*	FOD	-		
<i>A. cariocanum</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>A. castaneum</i> Schldtl. & Cham.	FOD	-	CR	ANEXO I
<i>A. cirrhatum</i> Rich. ex Willd.	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. claussenii</i> Hieron.	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. cristatum</i> Lam.	FOD, FES	-	-	-
<i>A. dimidiatum</i> Sw.	FES	-	-	-
<i>A. feei</i> Kunze ex Fée	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. flabellulatum</i> Kunze	FOD	-	-	-
<i>A. formosum</i> Willd.	FOD, FES	-	-	-
<i>A. gastonis</i> Fée*	FOD, FOM	-	EN	ANEXO II
<i>A. harpeodes</i> Kunze	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. inaequilaterale</i> Willd.	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. incurvatum</i> Fée*	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. kunzeanum</i> Klotzsch. ex Rosenst.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. lacinulatum</i> Schrad.	FOD	-	-	-
<i>A. laetum</i> Sw.	FOD, FES	-	-	-
<i>A. martianum</i> C. Chr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. monanthes</i> L.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. mourai</i> Hieron.*	FOD	-	-	-
<i>A. mucronatum</i> C. Presl*	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. muellerianum</i> Rosenst.*	FOD	-	-	-
<i>A. oligophyllum</i> Kaulf.	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. otites</i> Link	FOD, FES	-	-	-
<i>A. pediculariifolium</i> A. St.-Hil.	FES	-	-	-
<i>A. praemorsum</i> Sw.	FOD, FES	-	-	-
<i>A. pseudonitidum</i> Raddi*	FOD	-	-	-
<i>A. pteropus</i> Kaulf.	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. pulchellum</i> Raddi*	FOD	-	-	-
<i>A. pumilum</i> Sw.	FOD, FES	-	-	-
<i>A. raddianum</i> Gaudich.	FOD	-	-	-
<i>A. radicans</i> L.	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. regulare</i> Sw.*	FOD	-	-	-
<i>A. resiliens</i> Kunze	FOD	-	-	-
<i>A. scandicinum</i> Kaulf.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. schwackei</i> Christ*	FES	-	CR	ANEXO I
<i>A. sellowianum</i> (Hieron.) Hieron.	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. serra</i> Langsd. & Fisch.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>A. serratum</i> L.	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. squamosum</i> L.	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. stuebelianum</i> Hieron.	FOD, FES	-	-	-
<i>A. theciferum</i> (Kunth) Mett.	FOD	-	-	-
<i>A. triquetrum</i> N. Murak. & R.C. Moran	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. trunconum</i> F.B. Matos, Labiak & Sylvestre*	FOD	-	-	-
<i>A. ulbrichtii</i> Rosenst.	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. uniseriale</i> Raddi	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. wacketii</i> Rosenst.*	FOD	-	-	-

Blechnaceae

Vinícius Antônio de Oliveira Dittrich

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BLECHNACEAE – 27/202				
<i>Blechnum</i> – 26/200				
<i>B. andinum</i> (Baker) C. Chr.	FCA	-	CR	ANEXO I
<i>B. asplenioides</i> Sw.	FES	-	-	-
<i>B. australe</i> L.	FOM, FCA, RST	-	-	-
<i>B. austrobrasilianum</i> de la Sota	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>B. binervatum</i> (Poir.) C.V. Morton & Lellinger	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>B. brasiliense</i> Desv.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. cordatum</i> (Desv.) Hieron.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>B. divergens</i> (Kunze) Mett.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>B. glaziovii</i> Christ	FOD, FES	-	-	-
<i>B. gracile</i> Kaulf.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>B. laevigatum</i> Cav.	FOM, FES	-	-	-
<i>B. lanceola</i> Sw.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>B. lehmannii</i> Hieron.	FOD, FES	-	-	-
<i>B. occidentale</i> L.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>B. organense</i> Brade	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. penna-marina</i> (Poir.) Kuhn	FCA	-	-	-
<i>B. polypodioides</i> Raddi	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>B. proliferum</i> Rosenst.	FOD, FES	-	-	-
<i>B. pteropus</i> (Kunze) Mett.*	FOD	-	-	-
<i>B. sampaioanum</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. schomburgkii</i> (Klotzsch) C. Chr.	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>B. serrulatum</i> Rich.	FOD, FES, RST, FCA	-	-	-
<i>B. spannagelii</i> Rosenst.*	FOD, FOM, FCA	-	-	-
<i>B. sprucei</i> C. Chr.	FOD	-	CR	ANEXO I
<i>B. squamipes</i> (Hieron.) M. Kessler & A.R. Sm.	FOD, FOM	-	EN	ANEXO I
<i>B. usterianum</i> (Christ) C. Chr.	FCA	-	-	-
<i>Salpichlaena</i> – 1/2				
<i>S. volubilis</i> (Kaulf.) J. Sm.	FOD, FED	-	-	-

Culcitaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CULCITACEAE – 1/2				
<i>Culcita</i> – 1/2				
<i>C. conüifolia</i> (Hook.) Maxon	FCA	-	EN	ANEXO II

Cyatheaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CYATHEACEAE – 25/600				
Alsophila – 4/235				
A. capensis subsp. polypodioides (Sw.) Conant	FOD, FES	-	-	-
A. salvinii Hook.	FOD	-	-	-
A. setosa Kaulf.*	FOD, FES	-	-	-
A. sternbergii (Pohl ex Sternb.) D.S. Conant	FOD, FES	-	-	-
Cnemidaria – 1/25				
C. uleana (Samp.) R.M. Tryon	FOD, FES	-	-	-
Cyathea – 19/120				
C. abbreviata Fernandes*	FOD	-	-	-
C. atrocastanea Labiak & F.B. Matos*	FOD	-	-	-
C. atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin*	FOD, FES	-	-	-
C. axillaris (Fée) Lellingert *	FOD, FES	-	-	-
C. bipinnatifida (Baker) Domin	FOD	-	-	-
C. corcovadensis (Raddi) Domin	FOD, FES, FCA	-	-	-
C. delgadii Sternb.	FOD, FES, FCA	-	-	-
C. dichromatolepis (Fée) Domin*	FOD, FES	-	-	-
C. glaziovii (Fee) Domin*	FOD	-	-	-
C. hirsuta C. Presl*	FOD, FES	-	-	-
C. macrocarpa (C. Presl) Domin	FOD	-	-	-
C. microdonta (Desv.) Domin	FOD, FES, MAN	-	-	-
C. myriotricha (Baker) R.C. Moran & J. Prado	FOD, FES	-	-	-
C. phalerata Mart.	FOD, FES, FCA	-	-	-
C. poeppigii (Hook.) Domin	FOD, FES	-	-	-
C. praecincta (Kunze) Domin*	FOD	-	-	-
C. pungens (Willd.) Domin	FOD, FES	-	-	-
C. rufa (Fée) Lellingert*	FOD, FES	-	-	-
C. villosa Willd.	FOD, FES, FCA	-	-	-
Sphaeropteris – 1/110				
S. gardneri (Hook.) R.M. Tryon*	FOD, FOM, FES	-	-	-

Dennstaedtiaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
DENNSTAEDTIACEAE – 13/170				
<i>Blotiella</i> – 1/15				
<i>B. lindeniana</i> (Hook.) R.M. Tryon	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Dennstaedtia – 4/45				
D. cicutaria (Sw.) T. Moore	FOD, FES	-	-	-
D. cornuta (Kaulf.) Mett.	FOD	-	-	-
D. dissecta (Sw.) T. Moore	FOD, FES	-	-	-
D. globulifera (Poir.) Hieron.	FOD, FES, FED	-	-	-
Histiopteris – 1/1				
H. incisa (Thunb.) J.Sm.	FOD, FES, FCA	-	-	-
Hypolepis – 4/45				
H. aquilinaris (Fée) Christ	FOD, FES	-	-	-
H. mitis Kunze *	FOD, FOM	-	-	-
H. repens (L.) C. Presl	FOD, FES	-	-	-
H. stolonifera Fée*	FOD	-	-	-
Microlepia – 1/45				
M. speluncae (L.) T. Moore	FOD	-	-	-
Paesia – 1/12				
P. glandulosa (Sw.) Kuhn	FOD, FCA	-	-	-
Pteridium – 1/12				
P. arachnoideum (Kaulf.) Maxon	FOD, FES, FCA	-	-	-

Dicksoniaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
DICKSONIACEAE – 2/30				
<i>Dicksonia</i> – 1/20				
<i>D. sellowiana</i> (Hook.) Maxon	FOD, FES	-	EN	ANEXO I
<i>Lophosoria</i> – 1/3				
<i>L. quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	FOD, FES	-	-	-

Dryopteridaceae

Alexandre Salino, Thaís Elias Almeida & Luciana Cláudio Neves Melo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
DRYOPTERIDACEAE – 126/1700				
<i>Arachniodes</i> – 1/50				
<i>A. denticulata</i> (Sw.) Ching	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>Bolbitis</i> – 1/45				
<i>B. serratifolia</i> Schott	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Ctenitis – 15/150				
C. abyssi (Sehnem) Salino & Morais*	FOD, FCA	-	-	-
C. ampla (Willd.) Ching	FES	-	-	-
C. anniesii (Rosenst.) Copel.*	FOD	-	-	-
C. aspidioides (C. Presl) Copel.*	FOD, FES	-	-	-
C. bigarellae Schwartsb., Labiak & Salino*	FES	-	-	-
C. deflexa (Kaulf.) Copel.*	FOD	-	-	-
C. distans (Brack.) Ching*	FOD, FES	-	-	-
C. eriocalis Fée*	FOD, FES	-	-	-
C. falciculata (Raddi) Ching	FOD, FES	-	-	-
C. fenestralis (C. Chr.) Copel.*	FOD	-	-	-
C. flexuosa (Fée) Copel.*	FOD	-	-	-
C. laetevirens (Rosenst.) Salino & Morais*	FOD	-	-	-
C. nigrovenia (Christ) Copel.	FOD	-	-	-
C. pedicellata (Christ) Copel.	FOD	-	-	-
C. submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching	FOD, FES	-	-	-
Cyclodium – 2/10				
C. heterodon (Schrad.) T. Moore*	FOD, FES	-	-	-
C. meniscioides (Willd.) C. Presl	FOD, FES	-	-	-
Didymochlaena – 1/1				
D. truncatula (Sw.) J. Sm.	FOD, FES	-	-	-
Dryopteris – 2/225				
D. patula (Sw.) Underw.	FOD, FES, FOM	-	-	-
D. wallichiana (Spreng.) Hyl.	FOD, FOM	-	-	-
Elaphoglossum – 62/600				
E. acrocarpum (Mart.) T. Moore*	FES	-	-	-
E. actinotrichum (Mart.) T. Moore	FES, FOD	-	-	-
E. alpestre (Gardner) T. Moore*	FOD	-	-	-
E. ambiguum (Mett. ex Christ) Alston	FOD	-	-	-
E. amplissimum (Fée) Christ*	FOD	-	-	-
E. angustum (Fée) Christ*	FOD	-	-	-
E. apparicioi Brade*	FES	-	-	-
E. badinii Novelino	FES	-	-	-
E. bahiense Rosenst.*	FES	-	-	-
E. beaurepairei (Fée) Brade	FES, FOD	-	-	-
E. beckeri Brade	AFL	-	CR	ANEXO II
E. bellermanianum (Klotzsch) T. Moore	FES, FOD	-	-	-
E. burchellii (Baker) C. Chr.	FES, FOD	-	-	-
E. chrysolepis (Fée) Alston*	FOD	-	-	-
E. decoratum (Kunze) T. Moore	FES, FOD	-	-	-
E. didymoglossoides C. Chr.*	FOD	-	-	-
E. dutrae Brade*	FOD	-	-	-
E. edwalii Rosenst.	FOD	-	-	-
E. gardnerianum (Kunze ex Fée) T. Moore	FOD	-	-	-
E. gayanum (Fée) T. Moore	FES, FOD	-	-	-
E. gehrtii Sehnem*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>E. glabellum</i> J. Sm.	FES, FOD	-	-	-
<i>E. glaziovii</i> (Fée) Brade	FOD	-	-	-
<i>E. herminieri</i> (Bory ex Fée) T. Moore	FOD	-	-	-
<i>E. horridulum</i> (Kaulf.) J. Sm.	FOD	-	-	-
<i>E. huacsaro</i> (Rúiz) Christ.	FOD	-	-	-
<i>E. hybridum</i> (Bory) Brack.	FES, FOD	-	-	-
<i>E. hymenodistrum</i> (Fée) Brade	FES, FOD	-	-	-
<i>E. iguapense</i> Brade*	FOD, RST	-	-	-
<i>E. itaiyense</i> Rosenst.	FES, FOD	-	-	-
<i>E. jamesonii</i> (Hook. & Grev.) T. Moore	FCA	CR	-	-
<i>E. lagesianum</i> Rosent.*	FES, FOD	-	-	-
<i>E. langsdorffii</i> (Hook. & Grev.) T. Moore	FES, FOD	-	-	-
<i>E. liaisianum</i> (Glaz. ex Fée) Brade*	FCA	-	-	-
<i>E. lineare</i> (Fée) T. Moore	FOD	-	-	-
<i>E. lingua</i> (C. Presl) Brack.	FES, FOD	-	-	-
<i>E. longifolium</i> (Jacq.) J. Sm.	FES, FOD	-	-	-
<i>E. luridum</i> (Fée) Christ.	FES, FOD	-	-	-
<i>E. macahense</i> (Fée) Rosenst.*	FES, FOD	-	-	-
<i>E. nigrescens</i> (Hook.) T. Moore	FOD	-	-	-
<i>E. obliquatum</i> (Fée) Christ*	FOD	-	-	-
<i>E. omphalodes</i> (Fée) Brade*	FCA	-	-	-
<i>E. organense</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>E. pachydermum</i> (Fée) T. Moore	FES	-	-	-
<i>E. paulistanum</i> Rosenst.*	FOD	-	-	-
<i>E. peltatum</i> (Sw.) Urb.	FOD	-	-	-
<i>E. plumosum</i> (Fée) T. Moore	FES, FOD	-	-	-
<i>E. pteropus</i> C. Chr.	FES, FOD	-	-	-
<i>E. reitzii</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>E. scalpellum</i> (Mart.) T. Moore	FOD	-	-	-
<i>E. scolopendrifolium</i> (Raddi) J. Sm.	FES, FOD	-	-	-
<i>E. sehnemii</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>E. squamipes</i> (Hook.) T. Moore	FOD	-	-	-
<i>E. strictum</i> (Raddi) T. Moore	FOD	-	-	-
<i>E. tectum</i> (Willd.) T. Moore	FES, FOD	-	-	-
<i>E. tenax</i> Rosenst.	FOD	-	-	-
<i>E. tenuiculum</i> (Fée) T. Moore*	FES	-	-	-
<i>E. ulei</i> Christ	FOD	-	-	-
<i>E. vagans</i> (Mett.) Hieron.	FES, FOD	-	-	-
<i>E. villosum</i> (Sw.) J. Sm.	FOD	-	-	-
<i>E. viscidum</i> (Fée) Christ*	FOD, FCA	-	-	-
<i>E. wettsteinii</i> Christ*	FOD	-	-	-
<i>Lastreopsis</i> – 3/36				
<i>L. acuta</i> (Hook.) Tindale*	FES	-	-	-
<i>L. amplissima</i> (C. Presl) Tindale	FOD, FES	-	-	-
<i>L. effusa</i> (Sw.) Tindale	FES	-	-	-
<i>Lomagramma</i> – 1/1				
<i>L. guianensis</i> (Aubl.) Ching	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Megalastrum – 18/55				
M. abundans (Rosenst.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD, FES	-	-	-
M. adenopteris (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD	-	-	-
M. albidulum R.C. Moran, J. Prado & Labiak*	FOD	-	-	-
M. brevipubens R.C. Moran, J. Prado & Labiak *	FOD	-	-	-
M. canescens (Kunze ex Mett.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD	-	-	-
M. connexum (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD, FES	-	-	-
M. crenulans (Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD, FES, FOM	-	-	-
M. eugenii (Brade) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD, FES	-	-	-
M. grande (C. Presl) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD, FES	-	-	-
M. inaequale (Kaulf. ex Link) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD, FES	-	-	-
M. indusiatum R.C. Moran, J. Prado & Labiak*	FOD	-	-	-
M. littorale R.C. Moran, J. Prado & Labiak*	FOD	-	-	-
M. oreocharis (Sehnem) Ponce & Salino	FOD, FOM	-	-	-
M. organense R.C. Moran, J. Prado & Labiak*	FOD	-	-	-
M. retrorsum R.C. Moran, J. Prado & Labiak*	FOD	-	-	-
M. substrigosum R.C. Moran, J. Prado & Labiak*	FOD	-	-	-
M. umbrinum (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD, FES	-	-	-
M. wacketii (Rosenst. ex C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD	-	-	-
Olfersia – 1/1				
O. cervina (L.) Kunze	FOD, FES	-	-	-
Polybotrya – 6/35				
P. cylindrica Kaulf.*	FOD, FES	-	-	-
P. espiritosantensis Brade*	FOD	-	-	-
P. goyazensis Brade	FES	-	-	-
P. semipinnata Fée*	FOD	-	-	-
P. sorbifolia Kuhn	FOD	-	-	-
P. speciosa Schott*	FOD, FES	-	-	-
Polystichum – 4/200				
P. bradei Rosenst.*	FOD	-	EN	ANEXO II
P. montevidense (Spreng.) Rosenst.	FOD, FES	-	-	-
P. platyphyllum (Willd.) C. Presl	FES	-	-	-
P. rochaleanum Glaz.*	FCA	-	-	-
Rumohra – 3/6				
R. adiantiformis (G. Forst) Ching	FOD, FES, FOM, AFR, RST	-	-	-
R. quadrangularis (Fée) Brade*	FCA	-	-	-
R. turficola Senna*	FCA	-	-	-
Stigmatopteris – 6/23				
S. brevinervis (Fée) R.C. Moran*	FOD, FES	-	-	-
S. caudata (Raddi) C. Chr.*	FOD	-	-	-
S. heterocarpa (Fée) Rosenst.*	FOD	-	-	-
S. prionites (Kunze) C. Chr.*	FOD, FES	-	-	-
S. tyucana (Raddi) C. Chr.*	FOD, FES	-	-	-
S. ulei (Christ) Sehnem*	FOD	-	-	-

Equisetaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
EQUISETACEAE – 1/15				
<i>Equisetum</i> – 1/15				
<i>E. giganteum</i> L.	FES, FCA	-	-	-

Gleicheniaceae

Alexandre Salino, Thaís Elias Almeida & Marcela Maia Viana

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
GLEICHENIACEAE – 13/125				
<i>Dicranopteris</i> – 3/10				
<i>D. flexuosa</i> (Schrad.) Underw.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>D. nervosa</i> (Kaulf.) Maxon	FOD, FCA	-	-	-
<i>D. rufinervis</i> (Mart.) Ching	FOD, FES	-	-	-
<i>Gleichenella</i> – 1/1				
<i>G. pectinata</i> (Willd.) Ching	FOD, FES	-	-	-
<i>Sticherus</i> – 9/90				
<i>S. bifidus</i> (Willd.) Ching	FOD, FES	-	-	-
<i>S. decurrens</i> (Raddi) J. Gonzales	FOD	-	-	-
<i>S. ferrugineus</i> (Raddi) J. Gonzales	FES	-	-	-
<i>S. gracilis</i> (Mart.) Copel.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>S. lanosus</i> (Christ) J. Gonzales	FOD, FES	-	-	-
<i>S. lanuginosus</i> (Fée) Nakai	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>S. nigropaleaceus</i> (J.W. Sturm) J. Prado & Lellinger	FOD, FES	-	-	-
<i>S. pruinosus</i> (Mart.) Ching	FOD, FCA	-	-	-
<i>S. remotus</i> (Kaulf.) Chrysler	FOD	-	-	-

Hymenophyllaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HYMENOPHYLLACEAE – 50/600				
Abrodactium – 1/25				
A. rigidum (Sw.) Ebihara & Dubuisson	FOD, FES	-	-	-
Didymoglossum – 9/30				
D. angustifrons Fée	FOD	-	-	-
D. hymenoides (Hedw.) Copel.	FOD, FOM	-	-	-
D. kapplerianum (J.W. Sturm) Ebihara & Dubuisson	FOD	-	-	-
D. krausii (Hook. & Grev.) C. Presl	FOD, FES	-	-	-
D. nummularium Bosch.	FOD	-	-	-
D. ovale E. Fourn.	FOD	-	-	-
D. punctatum (Poir.) Desv.	FOD	-	-	-
D. pusillum (Sw.) Desv.	FOD	-	-	-
D. reptans (Sw.) C. Presl	FOD	-	-	-
Hymenophyllum – 21/250				
H. asplenoides (Sw.) Sw.	FOD, FES	-	-	-
H. caparaoense Brade*	FOD	-	-	-
H. caudiculatum Mart.	FOD, FES, FCA	-	-	-
H. crispum Kunth	FOD	-	-	-
H. elegans Spreng.	FOD, FES	-	-	-
H. fendlerianum J.W. Sturm	FOD	-	-	-
H. filmenofilicum Christenh. & Schwartsb.*	FOM	-	-	-
H. fragile (Hedw.) C.V. Morton	FOD, FES	-	-	-
H. fucoides (Sw.) Sw.	FOD	-	-	-
H. glaziovii Baker*	FOD	-	-	-
H. hirsutum (L.) Sw.	FOD	-	-	-
H. magellanicum Willd. ex Kunze	FOD	-	VU	ANEXO II
H. microcarpum Desv.	FOD	-	-	-
H. peltatum (Poir.) Desv.	FCA	-	EN	ANEXO II
H. plumosum Kaulf.	FOD, FES	-	-	-
H. polyanthos (Sw.) Sw.	FOD, FES, FCA	-	-	-
H. pulchellum Schltdl. & Cham.	FOD	-	-	-
H. rufum Fée*	FOD, FCA	-	-	-
H. sampaioanum Brade & Rosenst.*	FOD	-	VU	ANEXO II
H. silveirae Christ*	FOD	-	EN	ANEXO II
H. undulatum (Sw.) Sw.	FOD, FES, FCA	-	-	-
Polyphlebium – 4/15				
P. angustatum (Carmich.) Ebihara & Dubuisson	FOD, FES	-	-	-
P. diaphanum (Kunth.) Ebihara & Dubuisson	FOD, FES	-	-	-
P. hymenophylloides (Bosch.) Ebihara & Dubuisson	FOD	-	-	-
P. pyxidiferum (L.) Ebihara & Dubuisson	FOD	-	-	-
Trichomanes – 13/60				
T. accedens C. Presl	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>T. anadromum</i> Rosenst.	FOD	-	-	-
<i>T. arbuscula</i> Desv.	FOD	-	-	-
<i>T. crispum</i> L.	FOD	-	-	-
<i>T. cristatum</i> Kaulf.	FOD, FES	-	-	-
<i>T. elegans</i> Rich.	FOD, FES	-	-	-
<i>T. hostmannianum</i> (Klotzsch) Kunze	FOD	-	-	-
<i>T. lucens</i> Sw.	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>T. pedicellatum</i> Desv.	FOD	-	-	-
<i>T. pellucens</i> Kunze	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>T. pilosum</i> Raddi	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>T. pinnatum</i> Hedw.	FOD, FES	-	-	-
<i>T. polypodioides</i> L.	FOD, FES	-	-	-
<i>Vandenboschia</i> – 2/15				
<i>V. radicans</i> (Sw.) Copel.	FOD, FES	-	-	-
<i>V. rupestris</i> (Raddi) Ebihara & K. Iwats	FOD, FES	-	-	-

Isoetaceae

Alexandre Salino e Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ISOETACEAE – 11/200				
Isoetes – 11/200				
<i>I. bradei</i> Herter*	FCA	-	EX	ANEXO I
<i>I. brasiliensis</i> H.P. Fuchs*	FCA	-	-	-
<i>I. fusco-marginata</i> H.P. Fuchs*	FCA	-	-	-
<i>I. gigantea</i> U. Weber	FCA	-	CR	ANEXO II
<i>I. martii</i> A. Braun	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>I. organensis</i> U. Weber*	FCA	-	EN	ANEXO II
<i>I. ramboi</i> Herter*	FCA	-	-	-
<i>I. sehnemii</i> H.P. Fuchs*	FCA	-	-	-
<i>I. smithii</i> H.P. Fuchs*	FCA	-	-	-
<i>I. spannagelii</i> H.P. Fuchs*	FCA	-	-	-
<i>I. weberi</i> Herter*	FCA	-	-	-

Lindsaeaceae

Alexandre Salino, Thaís Elias Almeida & Diego Soares Lara

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LINDSAEACEAE – 13/200				
<i>Lindsaea</i> – 13/150				
<i>L. arcuata</i> Kunze	FOD, FES	-	-	-
<i>L. bifida</i> (Kaulf.) Mett. <i>ex</i> Kuhn*	FOD, FES	-	-	-
<i>L. botrychioides</i> A.St.-Hil.*	FOD, FES	-	-	-
<i>L. coarctata</i> K.U. Kramer	FOD	-	-	-
<i>L. divaricata</i> Klotzsch	FOD, FES	-	-	-
<i>L. filipendula</i> (Rosenst.) K.U. Kramer	FOD	-	-	-
<i>L. guianensis</i> (Aubl.) Dryand.	FOD	-	-	-
<i>L. lancea</i> (L.) Bedd.	FOD, FES	-	-	-
<i>L. macrophylla</i> Kaulf.	FOD	-	-	-
<i>L. ovoidea</i> Fée*	FOD	-	-	-
<i>L. quadrangularis</i> Raddi	FOD, FES	-	-	-
<i>L. stricta</i> (Sw.) Dryand.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>L. virescens</i> Sw.*	FOD, FES	-	-	-

Lomariopsidaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LOMARIOPSIDACEAE – 7/70				
<i>Lomariopsis</i> – 2/40				
<i>L. japurensis</i> (Mart.) J.Sm.	FOD	-	-	-
<i>L. marginata</i> (Schrad.) Kuhn	FOD, FES	-	-	-
<i>Nephrolepis</i> – 5/25				
<i>N. biserrata</i> (Sw.) Schott	FOD, FES	-	-	-
<i>N. cordifolia</i> (L.) C. Presl	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>N. pectinata</i> (Willd.) Schott	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>N. pendula</i> (Raddi) J.Sm.	FOD, FES	-	-	-
<i>N. rivularis</i> (Vahl) Mett. ex Krug	FOD, FES	-	-	-

Lycopodiaceae

Alexandre Salino, Thaís Elias Almeida & Diego Soares Lara

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LYCOPODIACEAE – 41/380				
<i>Huperzia</i> – 29/300				
<i>H. acerosa</i> (Sw.) Holub	FOD	-	-	-
<i>H. aqualupiana</i> (Spring) Rothm.	FOD	-	CR	ANEXO I
<i>H. badiniana</i> B. Øllg. & P.G Windisch*	FCA	-	-	-
<i>H. biformis</i> (Hook.) Holub*	FOD, FES	-	-	-
<i>H. christii</i> (Silveira) Holub*	FCA	-	-	-
<i>H. comans</i> (Nessel) B. Øllg. & P.G Windisch*	FOD	-	-	-
<i>H. deminuens</i> (Herter) B. Øllg.*	FCA	-	-	-
<i>H. erythrocaulon</i> (Fée) Holub*	FCA	-	-	-
<i>H. flexibilis</i> (Fée) B. Øllg.*	FOD, FES	-	-	-
<i>H. fontinaloides</i> (Spring) Trevis.*	FOD, FES	-	-	-
<i>H. friburgensis</i> (Nessel) B. Øllg. & P.G Windisch*	FOD	-	-	-
<i>H. hemleri</i> (Nessel) B. Øllg.*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>H. heterocarpon</i> (Fée) Holub*	FOD, FOM	-	-	-
<i>H. hexasticha</i> B. Øllg. & P.G Windisch	FOD, FOM	-	-	-
<i>H. intermedia</i> Trevis.	FCA	-	-	-
<i>H. loefgreniana</i> (Silveira) B. Øllg. & P.G Windisch*	FOD	-	-	-
<i>H. mandiocana</i> (Raddi) Trevis.	FOD	-	-	-
<i>H. martii</i> (Wawra) Holub	FOD	-	-	-
<i>H. mollicoma</i> (Spring) Holub	FOD	-	-	-
<i>H. nuda</i> (Nessel) B. Øllg. & P.G Windisch*	FCA	-	-	-
<i>H. pungentifolia</i> (Silveira) B. Øllg.	FCA	-	-	-
<i>H. quadrifariata</i> (Bory) Rothm.*	FOD	-	-	-
<i>H. reflexa</i> (Lam.) Trevis.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>H. regnellii</i> (Maxon) B. Øllg. & P.G Windisch*	FCA	-	EN	ANEXO II
<i>H. sellowiana</i> (Herter) B. Øllg.*	FOD	-	-	-
<i>H. serrata</i> (Thunb. ex Murray) Trevis.	FCA	-	-	-
<i>H. silveirae</i> (Nessel) B. Øllg. & P.G Windisch*	FOD	-	-	-
<i>H. taxifolia</i> (Sw.) Trevis.	FOD	-	-	-
<i>H. treitubensis</i> (Silveira) B. Øllg.	FCA	-	EN	ANEXO II
<i>Lycopodiella</i> – 8/40				
<i>L. alopecuroides</i> (L.) Cranfill	FCA	-	-	-
<i>L. bradei</i> (Herter) B. Øllg.*	FCA	-	CR	ANEXO II
<i>L. camporum</i> B. Øllg. & P.G Windisch	FCA	-	-	-
<i>L. carnosa</i> (Silveira) B. Øllg.	FCA	-	-	-
<i>L. caroliniana</i> (L.) Pic.Serm.	FCA	-	-	-
<i>L. cernua</i> (L.) Pic.Serm.	FOD, FES, FOM, FCA	-	-	-
<i>L. geometra</i> B. Øllg. & P.G Windisch	FCA	-	-	-
<i>L. pendulina</i> (Hook.) B. Øllg.	FOD, FCA	-	-	-
<i>Lycopodium</i> – 4/40				
<i>L. assurgens</i> Fée	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>L. clavatum</i> L.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>L. jussiaei</i> Poir.	FOD, FCA	-	EN	ANEXO II
<i>L. thyoides</i> Willd.	FCA	-	-	-

Lygodiaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LYGODIACEAE – 2/25				
<i>Lygodium</i> – 2/25				
<i>L. venustum</i> Sw.	FOD, FES	-	-	-
<i>L. volubile</i> Sw.	FOD, FES	-	-	-

Marattiaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MARATTIACEAE – 7/150				
<i>Danaea</i> – 5/50				
<i>D. bipinnata</i> H. Tuomisto	FOD, FES	-	-	-
<i>D. excurrentes</i> Rosenst.	FOD	-	-	-
<i>D. geniculata</i> Raddi	FOD, FES	-	-	-
<i>D. moritziana</i> C. Presl	FOD, FES	-	-	-
<i>D. sellowiana</i> C. Presl	FOD, FES	-	-	-
<i>Eupodium</i> – 1/2				
<i>E. kaulfussii</i> (J. Sm) J. Sm. *	FOD, FES	-	-	-
<i>Marattia</i> – 1/7				
<i>M. cicutifolia</i> Kaulf.*	FOD, FES	-	-	-

Marsileaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MARSILEACEAE – 6/70				
Marsilea – 4/64				
M. ancylopoda A. Braun	FCA	-	-	-
M. deflexa A. Braun	RST	-	-	-
M. minuta L.	FOD	-	-	-
M. polycarpa Hook. & Grev.	FED	-	-	-
Pilularia – 1/5				
P. americana A. Braun	FCA	-	-	-
Regnellidium – 1/1				
R. diphyllum Lindm.	FCA	-	VU	ANEXO II

Metaxyaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
METAXYACEAE – 1/2				
<i>Metaxya</i> – 1/2				
<i>M. rostrata</i> (Kunth) C. Presl	FOD	-	-	-

Oleandraceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OLEANDRACEAE – 2/40				
<i>Oleandra</i> – 2/40				
<i>O. articulata</i> (Sw.) C. Presl	FOD	-	-	-
<i>O. hirta</i> Brack.	FOD	-	-	-

Ophioglossaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OPHIOGLOSSACEAE – 6/80				
<i>Botrychium</i> – 1/60				
<i>B. virginianum</i> (L.) Sw.	FOD, FOM, FCA	-	VU	ANEXO II
<i>Ophioglossum</i> – 5/20				
<i>O. crotalophomides</i> Walter	FCA	-	-	-
<i>O. ellipticum</i> Hook. & Grev.	FCA	-	-	-
<i>O. nudicaule</i> L.f.	FCA	-	-	-
<i>O. palmatum</i> L.	FCA	-	-	-
<i>O. reticulatum</i> L.	FOD, FES, FCA	-	-	-

Osmundaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OSMUNDACEAE – 2/20				
<i>Osmunda</i> – 1/10				
<i>O. regalis</i> L.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>Osmundastrum</i> – 1/1				
<i>O. cinnamomeum</i> (L.) C. Presl	FOD, FES, FCA	-	-	-

Plagiogyriaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PLAGIOGYRIACEAE – 1/15				
<i>Plagiogyria</i> – 1/15				
<i>P. fialhoi</i> (Fée & Glaz.) Mett.	FOD, FCA	-	VU	ANEXO II

Polypodiaceae

Alexandre Salino, Thaís Elias Almeida & Marcela Maia Viana

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
POLYPODIACEAE – 112/1200				
Campyloneurum – 11/50				
C. acrocarpon Fée*	FES, FOD	-	-	-
C. aglaolepis (Alston) de la Sota	FOD, FES, FCA	-	-	-
C. austrobrasilianum (Alston) de la Sota	FOD, FES	-	-	-
C. centrobrasilianum Lellinger	FOD, FES	-	-	-
C. decurrens (Raddi) C. Presl	FOD, FES	-	-	-
C. fallax Fée*	FOD	-	-	-
C. magnificum T. Moore	FOD	-	-	-
C. minus Fée	FOD, FES	-	-	-
C. nitidum (Kaulf.) C. Presl	FOD, FES	-	-	-
C. rigidum J. Sm.*	FOD, FES	-	-	-
C. vulpinum (Lindm.) Ching	FOD	-	-	-
Ceradenia – 6/55				
C. albidula (Baker) L.E. Bishop*	FOD, FES	-	-	-
C. capillaris (Desv.) L.E. Bishop*	FOD	-	EN	ANEXO II
C. glaziovii (Baker) Labiak*	FOD	-	EN	ANEXO II
C. itatiaiensis Labiak & Condack	FOD	-	-	-
C. spixiana (Mart. ex Mett.) L.E. Bishop	FOD	-	-	-
C. warmingii (C. Chr.) Labiak*	FOD	-	CR	ANEXO I
Cochlidium – 3/16				
C. pumilum C. Chr.	FOD	-	-	-
C. punctatum (Raddi) L.E. Bishop	FOD, FES, FCA	-	-	-
C. serrulatum (Sw.) L.E. Bishop	FOD, FES, FCA	-	-	-
Grammitis – 2/15				
G. fluminensis Fée*	FOD	-	-	-
G. leptopoda (C.H. Wright) Copel.	FOD, FES	-	-	-
Lellingeria – 13/60				
L. apiculata (Kunze ex Klotzsch) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD, FES, FCA	-	-	-
L. brasiliensis (Rosenst.) Labiak*	FOD	-	-	-
L. brevistipes (Mett. ex Kuhn) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD, FES	-	-	-
L. depressa (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD	-	-	-
L. itatimensis (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD	-	EN	ANEXO II
L. limula (Christ) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD, FES	-	-	-
L. myosuroides (Sw.) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD	-	-	-
L. organensis (Gardner) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD	-	-	-
L. pumila Labiak*	FOD	-	-	-
L. schenckii (Hieron.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD	-	-	-
L. suspensa (L.) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD	-	-	-
L. tamandarei (Rosenst.) A.R. Sm. & R.C. Moran*	FOD	-	-	-
L. wittigiana (Fée & Glaz.) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Melpomene – 6/32				
M. albicans Lenhert	FOD	-	-	-
M. flabelliformis (Poir.) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD	-	-	-
M. melanostica (Kunze) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD, FES	-	-	-
M. moniliformis (Lag. ex Sw.) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD	-	-	-
M. peruviana (Desv.) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD	-	-	-
M. pilosissima (M. Martens & Galeotti) A.R. Sm. & R.C. Moran	FOD, FES, FCA	-	-	-
Microgramma – 11/30				
M. acatallela Alston	FOD	-		
M. crispata (Fée) R.M. Tryon & A.F. Tryon	FOD	-	EN	ANEXO II
M. geminata (Schrad.) A.F. Tryon & R.M. Tryon	FOD, RST	-	-	-
M. lindbergii (Kuhn) de la Sota	FOD, FES, FED	-	-	-
M. lycopodioides (L.) Copel.	FOD, FES	-	-	-
M. microsoroides Salino, T.E. Almeida & A.R. Sm.*	FOD	-	-	-
M. percussa (Cav.) de la Sota	FOD, FES, FCA	-	-	-
M. persicariifolia (Schrad.) C. Presl	FOD, FES	-	-	-
M. squamulosa (Kaulf.) de la Sota	FOD, FES, FCA	-	-	-
M. tecta (Kaulf.) Alston	FOD, FES	-	-	-
M. vaccinniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel.	FOD, FES, RST	-	-	-
Micropolypodium – 5/30				
M. achilleifolium (Kaulf.) Labiak & F.B. Matos*	FOD, FES	-	-	-
M. gradatum (Baker) Labiak & F.B. Matos	FOD, FES	-	-	-
M. nanum (Fée) A.R. Sm.*	FOD	-		
M. perpusillum (Maxon) A.R. Sm.*	FOD	-	EN	ANEXO II
M. setosum (Kaulf.) A.R. Sm.*	FOD	-	-	-
Niphidium – 2/10				
N. crassifolium (L.) Lellinger	FOD, FES, FCA	-	-	-
N. rufosquamatum Lellinger	FOD, FCA	-	-	-
Pecluma – 16/35				
P. camptophyllaria (Fée) M.G. Price	FOD, FES	-	-	-
P. chnoophora (Kunze) Salino & F.C. Assis	FOD, FES	-	-	-
P. dispersa (A.M. Evans) M.G. Price	FOD	-	-	-
P. filicula (Kaulf) M.G. Price	FOD, FES	-	-	-
P. imbeana (Brade) Salino*	FOD	-	CR	ANEXO II
P. insularis (Brade) Salino	FOD	-	CR	ANEXO II
P. macedoi (Brade) M. Kessler & A.R. Sm.	FOD	-	-	-
P. paradiseae (Langsd. & Fisch.) M.G. Price*	FOD	-	-	-
P. pectinatifolmis (Lindm.) M.G. Price*	FOD, FES	-	-	-
P. pilosa (A.M. Evans) M. Kessler & A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
P. plumula (Willd.) M.G. Price	FOD, FES	-	-	-
P. recurvata (Kaulf.) M.G. Price*	FOD, FES	-	-	-
P. robusta (Fée) M. Kessler & A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
P. sicca (Lindm.) M.G. Price*	FOD	-	-	-
P. singeri (de la Sota) M.G. Price*	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. trunconum (Lindm.) M.G. Price*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Phlebodium – 2/4				
P. areolatum (Willd.) J. Sm.	FOD, FES, FCA	-	-	-
P. decumanum (Willd.) J. Sm.	FOD, FES	-	-	-
Pleopeltis – 14/80				
P. alborufula (Brade) Salino*	FOD	-	-	-
P. astrolepis (Liebm.) E. Fourn.	FOD, FES	-	-	-
P. bradei (de la Sota) Salino*	AFL	-	-	-
P. desvauxii (Klotzsch) Salino	FOD	-	-	-
P. hirsutissima (Raddi) de la Sota	FOD, FES	-	-	-
P. lepidopteris (Langsd. & Fisch.) de la Sota	FOD, RST	-	-	-
P. macrocarpa (Willd.) Kaulf.	FOD, FES	-	-	-
P. minarum (Weath.) Salino	FOD, FES, AFL	-	-	-
P. monoides (Weath.) Salino*	FOD, FES	-	-	-
P. pleopeltidis (Fée) de la Sota*	FOD, FES	-	-	-
P. pleopeltifolia (Raddi) Alston	FOD, FES, FED	-	-	-
P. polypodioides (L.) E.G. Andrews & Windham	FOD, FES	-	-	-
P. squalida (Vell.) de la Sota	FOD, FES, FED	-	-	-
P. trinidadensis (Brade) Salino *	FCA	-	-	-
Polypodium – 1/30				
P. dulce Poir.	FOD	-	-	-
Serpocaulon – 12/43				
S. adnatum (Kunze ex Klotzsch) A.R. Sm.	FOD	-	-	-
S. catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.	FOD, FES, FCA	-	-	-
S. fraxinifolium (Jacq.) A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
S. giganteum (Desv.) A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
S. glandulosissimum (Brade) Labiak & J. Prado*	FOD, AFL	-	-	-
S. levigatum (Cav.) A.R. Sm.	FOD	-	-	-
S. latipes (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
S. meniscifolium (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
S. mexiae (Copel.) A.R. Sm.	AFL	-	-	-
S. sehnemii (Pic.Serm.) Labiak & J. Prado	FOD, FES	-	-	-
S. triseriale (Sw.) A.R. Sm.	FOD, FES, RST	-	-	-
S. vacillans (Link) A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
Terpsichore – 7/50				
T. alfarui (Donn. Sm.) A.R. Sm.	FOD	-	-	-
T. asplenifolia (L.) A.R. Sm.	FOD	-	-	-
T. chryseri (Copel.) A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
T. reclinata (Brack.) Labiak	FOD, FES	-	-	-
T. semihirsuta (Klotzsch) A.R. Sm.	FOD	-	CR	ANEXO I
T. senilis (Fée) A.R. Sm.	FOD	-	-	-
T. taxifolia (L.) A.R. Sm.	FOD	-	-	-
Zygophlebia – 1/10				
Z. longipilosa (C. Chr.) L.E. Bishop*	FOD	-	-	-

Psilotaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PSILOTACEAE – 1/12				
<i>Psilotum</i> – 1/2				
<i>P. nudum</i> (L.) P. Beauv.	FOD, FES, FCA	-	-	-

Pteridaceae

Alexandre Salino, Thaís Elias Almeida & Gustavo Heringer

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PTERIDACEAE – 133/950				
<i>Acrostichum</i> – 2/3				
<i>A. aureum</i> L.	RST, FCA	-	-	-
<i>A. danaeifolium</i> Langsd. & Fisch.	RST, FCA	-	-	-
<i>Adiantopsis</i> – 6/8				
<i>A. cheilanthoides</i> Senna*	FCA	-	-	-
<i>A. chlorophylla</i> (Sw.) Fée	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>A. occulta</i> Sehnem*	FOD	-	-	-
<i>A. perfasciculata</i> Sehnem	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>A. radiata</i> (L.) Fée	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>A. regularis</i> (Kunze) T. Moore	FOD, FES	-	-	-
<i>Adiantum</i> – 41/200				
<i>A. abscissum</i> Schrad.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>A. argutum</i> Splitg.	FES	-	-	-
<i>A. calcareum</i> Gardner	FED	-	-	-
<i>A. concinnum</i> Willd.	FES	-	-	-
<i>A. curvatum</i> Kaulf.	FES,FOD	-	-	-
<i>A. deflectens</i> Mart.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>A. digitatum</i> C. Presl ex Hook.	FES	-	-	-
<i>A. diogoanum</i> Glaz. ex Baker	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>A. diphyllum</i> (Fée) Maxon*	FOD	-	CR	ANEXO I
<i>A. discolor</i> J. Prado*	FOD, FES	-	CR	ANEXO II
<i>A. dolosum</i> Kunze	FOD, FES	-	-	-
<i>A. fruticosum</i> Poepp. ex Spreng.	FES	-	-	-
<i>A. glaucescens</i> Klotzsch	FOD, FES	-	-	-
<i>A. gracile</i> Fée	FOD, FES	-	-	-
<i>A. humile</i> Kunze	FES	-	-	-
<i>A. incertum</i> Lindm.	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. intermedium</i> Sw.	FES, FED	-	-	-
<i>A. latifolium</i> Lam.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>A. lorentzii</i> Hieron.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>A. lucidum</i> (Cav.) Sw.	FOD, FES	-	-	-
<i>A. macrophyllum</i> Sw.	FES	-	-	-
<i>A. mathewsianum</i> Kunze	FES	-	-	-
<i>A. mynssense</i> J. Prado*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. obliquum</i> Willd.	FES	-	-	-
<i>A. ornithopodium</i> C. Presl	FES	-	-	-
<i>A. papillosum</i> Handro*	FES	-	-	-
<i>A. pectinatum</i> Kunze ex Baker	FES, FED	-	-	-
<i>A. pentadactylon</i> Langsd. & Fisch.*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. petiolatum</i> Desv.	FES	-	-	-
<i>A. platyphyllum</i> Sw.	FES, FED	-	-	-
<i>A. poiretii</i> Wikstr.	FES	-	-	-
<i>A. pseudotinctum</i> Hieron.	FES	-	-	-
<i>A. pulverulentum</i> L.	FES	-	-	-
<i>A. raddianum</i> C. Presl	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>A. rhizophyllum</i> Schrad.	FES, FED	-	-	-
<i>A. serratodentatum</i> Willd.	FES, FED	-	-	-
<i>A. subcordatum</i> Sw.	FOD, FES	-	-	-
<i>A. terminatum</i> Kunze ex Miq.	FOD, FES	-	-	-
<i>A. tetragonum</i> Schrad.	FES, FED	-	EN	ANEXO II
<i>A. tetraphyllum</i> Willd.	FOD, FES	-	-	-
<i>A. windischii</i> J. Prado	FOD, FES	-	-	-
<i>Ananthacorus</i> – 1/1				
<i>A. angustifolius</i> (Sw.) Underw. & Maxon	FOD	-	-	-
<i>Anetium</i> – 1/1				
<i>A. citrifolium</i> (L.) Splitg.	FOD	-	-	-
<i>Anogramma</i> – 4/7				
<i>A. chaerophylla</i> (Desv.) Link	FOD, FES	-	-	-
<i>A. leptophylla</i> (L.) Link	FOD	-	-	-
<i>A. lorentzii</i> (Hieron.) Diels	FES	-	-	-
<i>A. osteniana</i> Dutra	FES	-	-	-
<i>Argyroschisma</i> – 1/20				
<i>A. nivea</i> (Poir.) Windham	FES	-	-	-
<i>Ceratopteris</i> – 2/4				
<i>C. pteridoides</i> (Hook.) Hieron.	FOD, FES	-	-	-
<i>C. thalictroides</i> (L.) Brongm.	FOD, FES	-	-	-
<i>Cheilanthes</i> – 8/150				
<i>C. dichotoma</i> Sw.	FOD	-	-	-
<i>C. incisa</i> Kunze ex Mett.*	FOD	-	CR	ANEXO I
<i>C. hieronymi</i> Herter	FES	-	-	-
<i>C. juergensii</i> Rosenst.	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>C. micropteris</i> Sw.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. myriophylla</i> Desv.	FOD	-	-	-
<i>C. regnelliana</i> Mett.*	AFL, FCA	-	-	-
<i>C. regularis</i> Mett.	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>Doryopteris</i> – 26/30				
<i>D. acutiloba</i> (Prantl) Diels*	FOD	-	-	-
<i>D. angustata</i> Sehnem	FOD	-	-	-
<i>D. collina</i> (Raddi) J. Sm.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>D. concolor</i> (Langsd. & Fisch.) Kuhn	FOD, FES	-	-	-
<i>D. crenulans</i> (Fée) Christ	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>D. itatiaiensis</i> (Fée) Christ*	FCA	-	EN	ANEXO II
<i>D. jequitinhonhensis</i> Salino*	FED	-	-	-
<i>D. juergensii</i> Rosenst.*	FOD	-	-	-
<i>D. leitei</i> R.M. Tryon	FOD	-	-	-
<i>D. lomariacea</i> Kaulf	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>D. lorentzii</i> (Hieron.) Diels	FOD, FCA	-	-	-
<i>D. majestosa</i> J.C. Yesilyurt	FOD, FES	-	-	-
<i>D. nobilis</i> (T. Moore) C. Chr.	FOD	-	-	-
<i>D. ornithopus</i> (Mett. ex Hook. & Baker) J. Sm.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>D. paradoxa</i> (Fée) Christ*	FOD, FED, FCA	-	EN	ANEXO II
<i>D. pentagona</i> Raddi	FOD, FES	-	-	-
<i>D. quinquelobata</i> (Fée) Diels*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>D. rediviva</i> Fée*	FOD, FES	-	-	-
<i>D. rosenstockii</i> Brade*	FCA	-	CR	ANEXO II
<i>D. rufa</i> Brade*	FCA	-	EN	ANEXO II
<i>D. sagittifolia</i> (Raddi) J. SM.	FOD, FES	-	-	-
<i>D. stierii</i> Rosenst.	FOD	-	-	-
<i>D. subsimplex</i> (Fée) Diels*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>D. tijucana</i> Brade & Rosenst.*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>D. triphylla</i> (Lam.) Christ	FOD	-	-	-
<i>D. varians</i> (Raddi) J. Sm.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>Eriosorus</i> – 8/26				
<i>E. areniticola</i> Schwatsb. & Labiak	AFL	-	-	-
<i>E. biardii</i> (Fée) A.F. Tryon*	FOD, FCA	-	EN	ANEXO II
<i>E. cheilanthoides</i> (Sw.) A.F. Tryon	FCA	-	CR	ANEXO II
<i>E. flexuosus</i> (Kunth) Copel.	FCA	-	EN	ANEXO I
<i>E. insignis</i> (Kuhn) A.F. Tryon*	FOD, FCA	-	VU	ANEXO II
<i>E. myriophyllus</i> (Sw.) Copel.	FOD, FCA	-	-	-
<i>E. rufescens</i> (Fée) A.F. Tryon	FCA	-	CR	ANEXO I
<i>E. sellowianus</i> (Kuhn) Copel.	FCA	-	-	-
<i>Hecistopteris</i> – 1/3				
<i>H. pumila</i> (Spreng.) J. Sm.	FOD	-	-	-
<i>Hemionitis</i> – 2/10				
<i>H. palmata</i> L.	FOD	-	-	-
<i>H. tomentosa</i> (Lam.) Raddi	FOD, FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Jamesonia – 1/22				
J. brasiliensis Christ	FCA	-	CR	ANEXO II
Pellaea – 1/35				
P. flavescens Fée*	FOD	-	-	-
Pityrogramma – 4/17				
P. calomelanos (L.) Link	FCA, FOD, FES, AFL	-	-	-
P. ebenea (L.) Proctor	AFL	-	-	-
P. tanarea (Cav.) Maxon	FOD, FCA	-	-	-
P. trifoliata (L.) R.M. Tryon	FOD, FES	-	-	-
Polytaenium – 3/9				
P. cajanense (Desv.) Benedict	FOD, FES	-	-	-
P. feei (W. Schaffn.) Maxon	FOD	-	-	-
P. lineatum (Sw.) J. Sm.	FOD, FES	-	-	-
Pteris – 17/250				
P. altissima Poir.	FOD, FES	-	-	-
P. angustata (Fée) C.V. Morton*	FOD, FES	-	-	-
P. biaurita L.	FOD, FES	-	-	-
P. brasiliensis Raddi	FOD, FES	-	-	-
P. congesta J. Prado*	FOD	-	CR	ANEXO II
P. decurrens C. Presl	FOD, FES	-	-	-
P. deflexa Link	FOD, FES	-	-	-
P. denticulata Sw.	FOD, FES	-	-	-
P. lechleri Mett.	FOD, FES	-	-	-
P. leptophylla Sw.*	FOD, FES	-	-	-
P. limae Brade*	FOD	-	EN	ANEXO II
P. plumula Desv.	FOD, FES	-	-	-
P. podophylla Sw.	FOD	-	-	-
P. propinqua J. Agardh	FOD, FES	-	-	-
P. pungens Willd.	FOD	-	-	-
P. schwackeana Christ*	FOD, FES	-	-	-
P. splendens Kaulf.*	FOD, FES	-	-	-
Radiovittaria – 2/8				
R. gardneriana (Fée) E.H. Crane	FOD, FES	-	-	-
R. stipitata (Kunze) E.H. Crane	FOD, FES	-	-	-
Vittaria – 2/6				
V. graminifolia Kaulf.	FOD, FOM, FES	-	-	-
V. lineata (L.) Sm.	FOD, FOM, FES	-	-	-

Saccolomataceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SACCOLOMATACEAE – 2/12				
<i>Saccoloma</i> – 2/12				
<i>S. elegans</i> Kaulf.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. inaequale</i> (Kunze) Mett.	FOD, FES	-	-	-

Salviniaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SALVINIACEAE – 6/17				
Azolla – 2/6				
A. caroliniana Willd.	FAQ	-	-	-
A. microphylla Kaulf.	FAQ	-	-	-
Salvinia – 4/11				
S. adnata Desv.	FAQ	-	-	-
S. auriculata Aubl.	FAQ	-	-	-
S. biloba Raddi	FAQ	-	-	-
S. minima Baker	FAQ	-	-	-

Schizaeaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SCHIZAEACEAE – 4/60				
Actinostachys – 2/20				
A. pennula (Sw.) Hook.	RST	-	-	-
A. subtrijuga (Mart.) C. Presl	FOD, RST	-	-	-
Schizaea – 2/40				
S. elegans (Vahl) Sw.	FOD, FES	-	-	-
S. fluminensis Miers	FOD, RST	-	-	-

Selaginellaceae

Alexandre Salino, Thaís Elias Almeida & Gustavo Heringer

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SELAGINELLACEAE – 22/700				
<i>Selaginella</i> – 22/700				
<i>S. bahiensis</i> Spring	FOD	-	-	-
<i>S. contigua</i> Baker*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. convoluta</i> (Arn.) Spring	FOD, FES, FED, AFL	-	-	-
<i>S. decomposita</i> Spring*	FOD, FCA	-	-	-
<i>S. erectifolia</i> Spring*	FOD, FCA	-	-	-
<i>S. erythropus</i> (Mart.) Spring	FES	-	-	-
<i>S. flexuosa</i> Spring	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>S. fragillima</i> Silveira	FOD, FES	-	-	-
<i>S. jungermannioides</i> (Gaudich.) Spring*	FOD	-	-	-
<i>S. macrostachya</i> (Spring) Spring*	FOD	-	-	-
<i>S. marginata</i> (Willd.) Spring	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>S. mendoncae</i> Hieron.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>S. microphylla</i> (Kunth) Spring	FOD, FES	-	-	-
<i>S. muscosa</i> Spring	FOD, FES	-	-	-
<i>S. palmiformis</i> Alston ex Crabbe & Jermy	FOD	-	-	-
<i>S. producta</i> Baker	FOD	-	-	-
<i>S. sellowii</i> Hieron.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. suavis</i> (Spring) Spring	FOD, FES	-	-	-
<i>S. sulcata</i> (Desv.) Spring	FOD, FES	-	-	-
<i>S. tenuissima</i> Fée	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>S. valida</i> Alston*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>S. vestiens</i> Baker*	FCA	-	-	-

Tectariaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
TECTARIACEAE – 7/220				
<i>Tectaria</i> – 4/200				
<i>T. buchtienii</i> (Rosenst.) Maxon	FOD, FES	-	-	-
<i>T. incisa</i> Cav.	FOD, FES	-	-	-
<i>T. pilosa</i> (Fée) R.C. Moran	FOD, FES	-	-	-
<i>T. vivipara</i> Jermy & T.G. Walker	FOD, FES	-	-	-
<i>Triplophyllum</i> – 3/20				
<i>T. boliviense</i> J. Prado & R.C. Moran	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>T. funestum</i> (Kunze) Holttum	FOD, FES	-	-	-
<i>T. hirsutum</i> (Holttum) J. Prado & R.C. Moran	FOD, FES	-	-	-

Thelypteridaceae

Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
THELYPTERIDACEAE – 78/950				
<i>Thelypteris</i> – 78/900				
<i>T. abbiattiae</i> C.F. Reed	FOM	-	-	-
<i>T. abrupta</i> (Desv.) Proctor	FOD	-	-	-
<i>T. amambayensis</i> (Christ) Ponce*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>T. angustifolia</i> (Willd.) Proctor	FES	-	-	-
<i>T. anoptera</i> (Kunze <i>ex</i> Kuhn) C.F. Reed*	FOD, FES	-	-	-
<i>T. araucariensis</i> Ponce*	FOD, FOM	-	-	-
<i>T. berroi</i> (C. Chr.) C.F. Reed	FES, FED	-	-	-
<i>T. biformata</i> (Rosenst.) R.M. Tryon	FES	-	-	-
<i>T. biolleyi</i> (Christ) Proctor	FOD	-	-	-
<i>T. burkartii</i> Abbiatti*	FOD, FES	-	-	-
<i>T. cheilanthoides</i> (Kunze) Proctor	FOD, FES	-	-	-
<i>T. chrysodioides</i> (Fée) C.V. Morton	FES	-	-	-
<i>T. concinna</i> (Willd.) Ching	FOD, FES	-	-	-
<i>T. conspersa</i> (Schrad.) A.R. Sm.	FES, FED	-	-	-
<i>T. cuneata</i> (C. Chr.) C.F. Reed*	FOD	-	-	-
<i>T. cutiataensis</i> (Brade) Salino*	FOD	-	-	-
<i>T. decurtata</i> (Link) de la Sota	FOD, FOM	-	-	-
<i>T. decussata</i> (L.) Proctor	FOD	-	-	-
<i>T. devolvens</i> (Baker) C.F. Reed	FOD, FES	-	-	-
<i>T. eriosora</i> (Fée) Ponce*	FOD, FCA	-	-	-
<i>T. gardneriana</i> (Baker) C.F. Reed	FOD, FES	-	-	-
<i>T. glaziovii</i> (Christ) C.F. Reed	FOD, FES	-	-	-
<i>T. grandis</i> A.R. Sm.	FES	-	-	-
<i>T. gymnosora</i> Ponce	FOD	-	-	-
<i>T. hatschbachii</i> A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
<i>T. heineri</i> (C. Chr.) C.F. Reed	FOD, FES	-	-	-
<i>T. hispidula</i> (Decne.) C.F. Reed	FES, FOD	-	-	-
<i>T. iguapensis</i> (C. Chr.) Salino*	FOD	-	-	-
<i>T. interrupta</i> (Willd.) K. Iwats	FOD, FES	-	-	-
<i>T. ireneae</i> (Brade) Lellinger*	FOD, FES	-	-	-
<i>T. jamesonii</i> (Hook.) R.M. Tryon	FES	-	-	-
<i>T. juergensii</i> (Rosenst.) C.F. Reed*	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>T. lepreurii</i> (Hook.) R.M. Tryon	FOD, FES	-	-	-
<i>T. littoralis</i> Salino*	FOD	-	-	-
<i>T. longifolia</i> (Desv.) R.M. Tryon	FOD, FES	-	-	-
<i>T. lugubris</i> (Mett.) R.M. Tryon & A.F. Tryon	FOD, FES	-	-	-
<i>T. macrophylla</i> (Kunze) C.V. Morton	FOD, FES	-	-	-
<i>T. maxoniana</i> A.R. Sm.	FOD, FES	-	-	-
<i>T. metteniana</i> Ching*	FOD, FES	-	-	-
<i>T. mexiae</i> (Copel.) Ching*	FES	-	-	-
<i>T. monosora</i> (C. Presl) Salino*	FOD, FES	-	-	-
<i>T. montana</i> Salino*	FOD, FES	-	-	-
<i>T. mosenii</i> (C. Chr.) C.F. Reed	FES	-	-	-
<i>T. multigemmifera</i> Salino	FES	-	-	-
<i>T. neglecta</i> (Brade) Lellinger*	FOD, FES	-	-	-
<i>T. novaeana</i> (Brade) Ponce*	FOD	-	CR	ANEXO I
<i>T. oligocarpa</i> (Willd.) Ching	FOD, FES	-	-	-
<i>T. opposita</i> (Vahl) Ching	FOD, FES	-	-	-
<i>T. pachyhachis</i> (Kunze ex Mett.) Ching	FOD, FES	-	-	-
<i>T. paranaensis</i> Salino*	FOD	-	-	-
<i>T. patens</i> (Sw.) Small	FOD, FES	-	-	-
<i>T. platypes</i> (Fée) Ponce*	FES	-	-	-
<i>T. pleiophylla</i> (Sehnem) Ponce*	FOD, FOM	-	-	-
<i>T. podotricha</i> (Sehnem) Ponce*	FOM	-	-	-
<i>T. poiteana</i> (Bory) Proctor	FOD, FES	-	-	-
<i>T. polypodioides</i> (Raddi) C.F. Reed*	FOD, FES	-	-	-
<i>T. ptarmica</i> (Mett.) C.F. Reed*	FOD	-	-	-
<i>T. raddii</i> (Rosenst.) Ponce*	FOD, FES	-	-	-
<i>T. recumbens</i> (Rosenst.) C.F. Reed*	FOD, FOM	-	-	-
<i>T. refracta</i> (Fisch. & C. Meyer ex Kunze) C.F. Reed*	FOD	-	-	-
<i>T. regnelliana</i> (C. Chr.) Ponce*	FES, FOD	-	-	-
<i>T. retusa</i> (Sw.) C.F. Reed*	FOD, FES	-	-	-
<i>T. riograndensis</i> (Lindm.) C.F. Reed	FES	-	-	-
<i>T. rioverdensis</i> (C. Chr.) Ponce*	FOD, FES	-	-	-
<i>T. rivularioides</i> (Fée) Abbiatti	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>T. salzmännii</i> (Fée) C.V. Morton	FES	-	-	-
<i>T. sancta-catharinae</i> (Rosenst.) Ponce*	FOD	-	-	-
<i>T. scabra</i> (C. Presl) Lellinger	FOD, FES	-	-	-
<i>T. schwackeana</i> (Christ) Salino*	FES	-	-	-
<i>T. semirii</i> Salino & Melo *	FES	-	-	-
<i>T. serrata</i> (Cav.) Alston	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>T. soridepressa</i> Salino & Dittrich	FES	-	-	-
<i>T. stierii</i> (Rosenst.) C.F. Reed*	FES	-	-	-
<i>T. tamandarei</i> (Rosenst.) Ponce	FOD	-	-	-
<i>T. tenerrima</i> (Fée) C.F. Reed*	FOD	-	-	-
<i>T. tetragona</i> (Sw.) Small	FES	-	-	-
<i>T. villosa</i> (Link) C.F. Reed*	FOD	-	-	-
<i>T. vivipara</i> (Raddi) C.F. Reed*	FOD	-	-	-

Woodsiaceae

Claudine Mynssen, Alexandre Salino & Thaís Elias Almeida

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
WOODSIACEAE – 21/700				
<i>Athyrium</i> – 1/100				
<i>A. filix-femina</i> (L.) Roth	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>Cystopteris</i> – 1/10				
<i>C. fragilis</i> (L.) Bernh.	FOD	-	-	-
<i>Diplazium</i> – 17/375				
<i>D. ambiguum</i> Raddi	FOD	-	-	-
<i>D. asplenioides</i> (Kunze) C. Presl	FOD, FES	-	-	-
<i>D. celtidifolium</i> Kunze	FOD	-	-	-
<i>D. cristatum</i> (Desr.) Alston	FOD, FES	-	-	-
<i>D. herbaceum</i> Fée	FOD	-	-	-
<i>D. lechleri</i> (Mett.) T. Moore	FOD	-	-	-
<i>D. leptocarpon</i> Fée*	FOD, FES	-	-	-
<i>D. lindbergii</i> (Mett.) Christ	FOD, FES	-	-	-
<i>D. longipes</i> Fée*	FOD	-	-	-
<i>D. mattogrossense</i> A. Sampaio*	FOD, FES	-	-	-
<i>D. mutilum</i> Kunze*	FOD, FES	-	-	-
<i>D. plantaginifolium</i> (L.) Urb.	FOD, FES	-	-	-
<i>D. riedelianum</i> (Bong. ex Kuhn) C. Chr.	FOD	-	-	-
<i>D. roemerianum</i> (Kunze) C. Presl	FOD	-	-	-
<i>D. rostratum</i> Fée	FOD	-	-	-
<i>D. tamandarei</i> Rosenst.*	FOD	-	-	-
<i>D. turgidum</i> Rosenst.*	FOD	-	-	-
<i>Hemidictyum</i> – 1/1				
<i>H. marginatum</i> (L.) C. Presl	FOD, FES	-	-	-
<i>Woodsia</i> – 1/35				
<i>W. montevidensis</i> (Spreng.) Hieron.	FCA	-	-	-



**Lista das
Gimnospermas e
Angiospermas**

Gimnospermas

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ARAUCARIACEAE – 1/32				
<i>Araucaria</i> – 1/18				
<i>A. angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze*	FOM	-	EN	ANEXO I
EPHEDRACEAE – 1/60				
<i>Ephedra</i> – 1/60				
<i>E. tweediana</i> Fisch. & C.A. Mey.	RST	-	VU	ANEXO I
PODOCARPACEAE – 2/ca. 125				
<i>Podocarpus</i> – 2/100				
<i>P. lambertii</i> Klotzsch ex Endl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. sellowii</i> Klotzsch	FOD, FES	-	-	-

(*) Caráter endêmico do grupo taxonômico: gênero e espécie.

Os números que estão à frente de cada gênero e família representam o número de espécies ocorrentes na Floresta Atlântica e número total de espécies ocorrentes no mundo, repectivamente.

Vegetação: FOD – Floresta Ombrófila Densa/Aberta; FOM – Floresta Ombrófila Mista; FES – Floresta Estacional Semidecidual; FED – Floresta Estacional Decidual; FCA – Formações Campestres; AFL – Afloramentos Rochosos; RST – Restinga; MAN – Manguezal; RUD – Ruderal.

Categoria de Ameaça: CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; EX – Extinta; EW – Extinta na Natureza; ANEXO I – Ameaçada e ANEXO II – Dados Deficientes.

Angiospermas

Acanthaceae

Cíntia Kameyama

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ACANTHACEAE – 143/3500				
Aphelandra – 33/175				
A. bahiensis (Nees) Wassh.*	FOD	-	-	-
A. blanchetiana (Nees) Hook.*	FOD	-	-	-
A. bradeana Rizzini*	FOD	-	-	-
A. chamissoniana Nees*	FOD	-	-	-
A. clausenii Wassh.*	FOD, FES	-	-	-
A. colorata (Vell.) Wassh.*	FOD	-	-	-
A. decorata (Nees) Wassh.*	FOD	-	-	-
A. espirito-santensis Profice & Wassh.*	FOD	-	-	-
A. gigantea (Rizzini) Profice*	FOD	-	-	-
A. grazieleae Profice*	FOD	-	-	-
A. harleyi Wassh.*	FOD	-	-	-
A. hirta (Klotzsch) Wassh.*	FOD	-	-	-
A. hymenobraceata Profice*	FOD	-	-	-
A. ignea (Schrader) Nees ex Steud.*	FES	-	-	-
A. liboniana Linden ex Hook.*	FOD	-	-	-
A. longiflora (Lindl.) Profice	FOD, FES	-	-	-
A. marginata Nees & Mart.*	FES	-	-	-
A. maximiliana (Nees) Benth.*	FOD	-	-	-
A. neesiana Wassh.*	FOD	-	-	-
A. nemoralis Nees*	FOD	-	-	-
A. nitida Nees & Mart.*	FOD	-	-	-
A. nuda Nees*	FOD	-	-	-
A. obtusifolia (Nees) Wassh.*	FOD	-	-	-
A. ornata (Nees) T.Anderson*	FOD	-	-	-
A. paulensis Wassh.*	FOD	-	-	-
A. phrynioides Lindau*	FOD	-	-	-
A. prismatica (Vell.) Hiern *	FOD	-	-	-
A. rigida Glaz. ex Mildbr.*	FOD	-	-	-
A. schottiana (Nees) Profice	FOD, FES	-	-	-
A. squarrosa Nees*	FOD, FES	-	-	-
A. stephanophysa Nees*	FOD	-	-	-
A. variegata Morel*	FOD	-	-	-
A. wasshausenii Profice*	FES	-	-	-
Chamaeranthemum – 2/4				
C. beyrichii Nees*	FOD	-	-	-

(*) Caráter endêmico do grupo taxonômico: gênero e espécie.

Os números que estão à frente de cada gênero e família representam o número de espécies ocorrentes na Floresta Atlântica e número total de espécies ocorrentes no mundo, respectivamente.

Vegetação: FOD – Floresta Ombrófila Densa/Aberta; FOM – Floresta Ombrófila Mista; FES – Floresta Estacional Semidecidual; FED – Floresta Estacional Decidual; FCA – Formações Campestres; AFL – Afloramentos Rochosos; RST – Restinga; MAN – Manguezal; RUD – Ruderal.

Categoria de Ameaça: CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; EX – Extinta; EW – Extinta na Natureza; ANEXO I – Ameaçada e ANEXO II – Dados Deficientes.

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. gaudichaudii</i> Nees*	FOD	-	-	-
<i>Clistax</i> – 1/2				
<i>C. brasiliensis</i> Mart.	FOD, FES	-	-	-
<i>Dicliptera</i> – 2/150				
<i>D. mucronifolia</i> Nees	FES	-	-	-
<i>D. squarrosa</i> Nees	FES	-	-	-
<i>Dyschoriste</i> – 3/50				
<i>D. hygrophiloides</i> (Nees) Kuntze	FCA	-	-	-
<i>D. lavandulacea</i> (Nees) Kuntze	FCA	-	-	-
<i>D. trichanthera</i> Kobuski	FES	-	-	-
<i>Elytraria</i> – 1/17				
<i>E. imbricata</i> (Vahl) Pers.	FES, FED FCA	-	-	-
<i>Herpetacanthus</i> – 4/10				
<i>H. longiflorus</i> Moric.*	FOD	-	-	-
<i>H. macahensis</i> Nees*	FOD	-	-	-
<i>H. melancholicus</i> Nees*	FOD	-	-	-
<i>H. rubiginosus</i> Nees*	FOD	-	-	-
<i>Hygrophila</i> – 1/25				
<i>H. costata</i> Nees	FOD, FES	-	-	-
<i>Justicia</i> – 34/600				
<i>J. axillaris</i> (Nees) Lindau	FCA	-	-	-
<i>J. beyrichii</i> (Nees) Lindau *	FOD	-	-	-
<i>J. brasiliiana</i> Roth	FOD, FES	-	-	-
<i>J. carnea</i> Lindl.	FOD, FES	-	-	-
<i>J. catharinensis</i> Lindau*	FOD	-	-	-
<i>J. clauseniana</i> (Nees) Profice*	FOD	-	-	-
<i>J. comata</i> (L.) Lam.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>J. congrua</i> (Nees ex Mart.) Lindau	FES	-	-	-
<i>J. cydoniifolia</i> (Nees ex Mart.) Lindau	FOD, FES	-	-	-
<i>J. cyrtantheriformis</i> (Rizzini) Profice*	FOD	-	-	-
<i>J. dasyclados</i> (Nees) Lindau	FOD, FES	-	-	-
<i>J. floribunda</i> (C.Koch) Wassh.	FOM, FES	-	-	-
<i>J. genuflexa</i> Nees & Mart.	FOD	-	-	-
<i>J. glaziovii</i> Lindau	FOD, FES	-	-	-
<i>J. goudotii</i> V.A.W.Graham	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>J. hatschbachii</i> (Rizzini) Wssh. & L.B.Sm.*	FOD, FES	-	-	-
<i>J. holochila</i> (Rizzini) Profice*	FOD	-	-	-
<i>J. involucrata</i> (Nees) Leonard*	FOD	-	-	-
<i>J. kleinii</i> Wssh. & L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>J. luschnathii</i> Lindau	FOD	-	-	-
<i>J. lythroides</i> (Nees) V.A.W.Graham	FOD, FES	-	-	-
<i>J. meyeniana</i> (Nees) Lindau*	FOD	-	-	-
<i>J. nervata</i> (Lindau) Profice*	FOD	-	-	-
<i>J. oblonga</i> (Nees) Lindau	FOD, FES	-	-	-
<i>J. plumbaginifolia</i> Jacq.*	FOD	-	-	-
<i>J. polita</i> (Nees) Profice*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>J. pygmaea</i> Lindau*	FOD	-	-	-
<i>J. reitzii</i> Leonard*	FCA	-	-	-
<i>J. scheidweileri</i> V.A.W.Graham*	FES	-	-	-
<i>J. schenckiana</i> Lindau*	FOD	-	-	-
<i>J. sebastianopolitana</i> Profice*	FOD	-	-	-
<i>J. symphyantha</i> (Nees ex Mart.) Lindau	?		-	-
<i>J. tijucensis</i> V.A.W.Graham	FOD	-	-	-
<i>J. yhuensis</i> Lindau	FOD	-	-	-
<i>Lepidagathis</i> – 5/115				
<i>L. alopecuroides</i> (Vahl.) Griseb.	FOD	-	-	-
<i>L. cuneiformis</i> Kameyama*	FOD	-	-	-
<i>L. laxifolia</i> (Nees) Kameyama*	FOD	-	-	-
<i>L. meridionalis</i> Kameyama*	FOD	-	-	-
<i>L. nemoralis</i> (Mart. ex Nees) Kameyama*	FOD	-	-	-
<i>Mendoncia</i> – 5/60				
<i>M. bahiensis</i> Profice*	FOD	-	-	-
<i>M. blanchetiana</i> Profice*	FOD	-	-	-
<i>M. mollis</i> Lindau	FOD, FES	-	-	-
<i>M. puberula</i> Mart.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. velloziana</i> Mart.	FOD, FES	-	-	-
<i>Odontonema</i> – 1/36				
<i>O. barlerioides</i> (Nees) Kuntze*	FOD	-	-	-
<i>Pachystachys</i> – 1/12				
<i>P. spicata</i> (Ruiz & Pav.) Wassh.	FOD	-	-	-
<i>Poikilanthus</i> – 1/6				
<i>P. flexuosus</i> (Nees) Lindau	FOD, FES	-	-	-
<i>Pseuderanthemum</i> – 4/60				
<i>P. exaequatum</i> (Nees) Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>P. heterophyllum</i> (Nees) Radlk.*	FOD, FES	-	-	-
<i>P. riedelianum</i> (Nees) Rizzini*	FOD	-	-	-
<i>P. verbenaceum</i> (Nees & Mart.) Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>Ruellia</i> – 18/150				
<i>R. affinis</i> (Nees) Lindau*	FOD, FES	-	-	-
<i>R. angustifolia</i> (Nees) Lindau	FES	-	-	-
<i>R. brevicaulis</i> (Nees) Lindau	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. brevifolia</i> (Pohl) Ezcurra	FOD, FES	-	-	-
<i>R. bulbifera</i> Lindau	FCA	-	-	-
<i>R. curviflora</i> Nees & Mart.*	FOD	-	-	-
<i>R. elegans</i> Poir.	FOD, FES	-	-	-
<i>R. epallocaulos</i> Leonard ex C.Ezcurra & Wassh.	FOD, FES	-	-	-
<i>R. erythropus</i> (Nees) Lindau	FES, FED	-	-	-
<i>R. geminiflora</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>R. kleinii</i> C.Ezcurra & Wassh.*	FOD	-	-	-
<i>R. macrantha</i> Mart. ex Nees	FES	-	-	-
<i>R. menthoides</i> (Nees) Hiern	FOD, FES	-	-	-
<i>R. multifolia</i> (Nees) Lindau	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>R. puri</i> (Nees) Mart. ex B.D.Jacks.	FES	-	-	-
<i>R. reitzii</i> Wassh. & L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>R. solitaria</i> Vell.*	FOD	-	-	-
<i>R. subsessilis</i> (Nees) Lindau*	FOD, FES	-	-	-
<i>Schaueria</i> – 4/8				
<i>S. calicotricha</i> (Link & Otto) Nees	FOD	-	-	-
<i>S. gonyostachya</i> Nees	FOD?	-	-	-
<i>S. lachnostachya</i> Nees*	FOD	-	-	-
<i>S. lophura</i> Nees	FOD	-	-	-
<i>Sebastianoschaueria</i> * – 1/1				
<i>S. oblongata</i> Nees*	FOD	-	-	-
<i>Staurogyne</i> – 19/140				
<i>S. alba</i> D.M.Braz & R.Monteiro*	FOD	-	-	-
<i>S. anigozanthus</i> (Nees) Kuntze	FES	-	-	-
<i>S. brachiata</i> (Hiern) Leonard *	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>S. elegans</i> (Nees) Kuntze	FES	-	VU	ANEXO II
<i>S. ericoides</i> Lindau*	FES	-	-	-
<i>S. euryphylla</i> E.Hossain*	FOD	-	-	-
<i>S. eustachya</i> Lindau*	FOD	-	-	-
<i>S. flava</i> D.M.Braz & R.Monteiro	FES	-	-	-
<i>S. hirsuta</i> (Nees) Kuntze	FCA	-	-	-
<i>S. itatiaiae</i> (Wawra) Leonard *	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>S. mandioccana</i> (Nees) Kuntze*	FOD	-	-	-
<i>S. minarum</i> (Nees) Kuntze*	FES	-	-	-
<i>S. parva</i> D.M.Braz & R.Monteiro*	FOD	-	-	-
<i>S. riedeliana</i> (Nees) Kuntze*	FOD	-	-	-
<i>S. rubescens</i> D.M.Braz & R.Monteiro*	FOD	-	-	-
<i>S. silvatica</i> Lindau ex D.M.Braz & R.Monteiro*	FOD	-	-	-
<i>S. vauthieriana</i> (Nees) Kuntze*	FES	-	EN	ANEXO II
<i>S. veronicifolia</i> (Nees) Kuntze*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>S. warmingiana</i> (Hiern) Leonard *	FES	-	CR	ANEXO I
<i>Stenandrium</i> – 2/25				
<i>S. mandioccanum</i> Nees	FOD, FES	-	-	-
<i>S. tenellum</i> Nees*	FOD	-	-	-
<i>Stenostephanus</i> – 1/6				
<i>S. lobeliiformis</i> Nees*	FOD	-	-	-

Achariaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ACHARIACEAE – 2/150				
<i>Carpotroche</i> – 1/11				
<i>C. brasiliensis</i> Endl.*	FOD, FES	-	-	-
<i>Kuhlmanniodendron</i> * – 1/1				
<i>K. apterocarpum</i> (Kuhlm.) Fiaschi & Groppo*	FOD	-	-	-

Achatocarpaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ACHATOCARPACEAE – 1/ca.11				
<i>Achatocarpus</i> – 1/ca.10				
<i>A. praecox</i> Griseb.	FES	-	-	-

Adoxaceae

Luciana H. Yoshino Kamino

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ADOXACEAE – 1/200				
<i>Sambucus</i> – 1/10				
<i>S. australis</i> Cham. & Schltdl.	FOM, FES, FED	-	-	-

Aizoaceae

Claudio Nicoletti Fraga

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
AIZOACEAE – 1/ca. 2500				
<i>Sesuvium</i> – 1/12				
<i>S. portulacastrum</i> (L.) L.	RST	-	-	-

Alismataceae

Flávio Dayrell Gontijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ALISMATACEAE – 17/53				
Echinodorus – 12/25				
E. aschersonianus Graebn.	FAQ	-	-	-
E. bolivianus (Rusby) Holm-Niels.	FAQ	-	-	-
E. glandulosus Rataj	FAQ	-	-	-
E. grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli	FAQ	-	-	-
E. lanceolatus Rataj	FAQ	-	-	-
E. longipetalus Micheli	FAQ	-	-	-
E. macrophyllus (Kunth) Mich.	FAQ	-	-	-
E. palifolius (Nees & Mart.) J.F.Macbr.	FAQ	-	-	-
E. paniculatus Micheli	FAQ	-	-	-
E. pubescens (Mart.) Seub. ex Warm.	FAQ	-	-	-
E. subulatus Griseb.	FAQ	-	-	-
E. uruguayensis Arechav.	FAQ	-	-	-
Helanthium – 1/3				
H. tenellus (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Buchenau	FAQ	-	-	-
Sagittaria – 4/25				
S. guayanensis Kunth	FAQ	-	-	-
S. lancifolia L.	FAQ	-	-	-
S. montevidensis Cham. & Schltdl.	FAQ	-	-	-
S. rhombifolia Cham.	FAQ	-	-	-

Alliaceae

Julie H. A. Dutilh

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ALLIACEAE – 19/795				
Nothoscordum – 19/35				
N. aparadense Ravenna*	FCA	-	-	-
N. cambarense Ravenna*	FCA	-	-	-
N. capivarinum Ravenna*	FCA	-	-	-
N. catharinense Ravenna*	FCA	-	-	-
N. clevelandicum Ravenna*	FCA	-	-	-
N. curvipes Ravenna*	FCA	-	-	-
N. exile Ravenna*	FCA	-	-	-
N. gibbatum Ravenna*	FCA	-	-	-
N. gracile (Aiton) Stearn	FCA	-	-	-
N. gracilipes Ravenna*	FCA	-	-	-
N. ibiramense Ravenna*	FCA	-	-	-
N. leptogynum Ravenna*	FCA	-	-	-
N. luteomajus Ravenna*	FCA	-	-	-
N. muscorum Ravenna*	FCA	-	-	-
N. nudicaule (Lehm.) Guagl.	FCA	-	-	-
N. nutans Ravenna*	FCA	-	-	-
N. portoalegrense Ravenna*	FCA	-	-	-
N. sengesianum Ravenna*	FCA	-	-	-
N. tibaginum Ravenna*	FCA	-	-	-

Alstroemeriaceae

Marta Camargo de Assis

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ALSTROEMERIACEAE – 24/190				
Alstroemeria – 23/100				
A. amabilis M.C.Assis*	FCA	-	VU	ANEXO II
A. apertiflora Baker*	FCA	-	VU	ANEXO II
A. capixaba M.C.Assis*	FES	-	CR	ANEXO I
A. calliantha M. C. Assis*	FOD	-	-	-
A. caryophyllaea Jacq.*	FOD, FES	-	-	-
A. cunha Vell.*	FOD, FES	-	-	-
A. foliosa Mart. ex Schult. & Schult.f.*	FES, AFL	-	-	-
A. fuscovinosa Ravenna*	FES	-	-	-
A. gardneri Baker	AFL	-	-	-
A. inodora Herb.*	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. isabelleana</i> Herb.	FCA	-	-	-
<i>A. longistaminea</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	FED	-		
<i>A. longistyla</i> Schenk	FCA	-	-	-
<i>A. malmeana</i> Kraenzl.	FCA	-	EN	ANEXO II
<i>A. ochracea</i> M.C.Assis	FES	-	-	-
<i>A. plantaginea</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	AFL	-	-	-
<i>A. psittacina</i> Lehm.	FES	-	-	-
<i>A. radula</i> Dusen*	FES	-	-	-
<i>A. sellowiana</i> Seub. ex Schenk*	FCA	-	-	-
<i>A. speciosa</i> M.C.Assis*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. stenophylla</i> M.C.Assis	AFL	-	-	-
<i>A. variegata</i> M.C.Assis*	AFL	-	VU	ANEXO II
<i>A. viridiflora</i> Warm.	FES	-	-	-
Bomarea – 1/214				
<i>B. edulis</i> (Tussac.) Herb.	FES	-	-	-

Amaranthaceae

Maria Salete Marchioretto

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
AMARANTHACEAE – 22/2000				
Alternanthera – 3/100				
A. brasiliana (L.) Kuntze	FOD	-	-	-
A. sessilis (L.) DC	FOD	-	-	-
A. tenella Colla	FOM	-	-	-
Celosia – 2/45				
C. corymbifera Didr.	FOD	-	-	-
C. grandifolia Moq.	FOD	-	-	-
Chamissoa – 2/2				
C. acuminata Mart.	FOM	-	-	-
C. altissima (Jacq.) Kunth	FES	-	-	-
Chenopodium – 2/100				
C. album L.	RUD	-	-	-
C. ambrosioides L.	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
Gomphrena – 3/120				
G. elegans Mart.	FES	-	-	-
G. scandens (R.E.Fr.) J.C.Siqueira	FCA	-	VU	ANEXO I
G. vaga Mart.	FCA	-	-	-
Hebanthe – 3/7				
H. eriantha Mart.	FOM	-	-	-
H. pulverulenta Mart.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>H. spicata</i> Mart.	FES	-	-	-
<i>Herbstia</i> – 1/1				
<i>H. brasiliana</i> (Moquin) Sohmer	FOM	-	-	-
<i>Iresine</i> – 1/80				
<i>I. diffusa</i> Humb. & Bonpl.	FOM	-	-	-
<i>Lecosia</i> * – 2/2				
<i>L. formicarum</i> Pedersen*	FOD	-	-	-
<i>L. oppositifolia</i> Pedersen*	FOD	-	CR	ANEXO I
<i>Pfaffia</i> – 3/30-40				
<i>P. glomerata</i> (Spreng.) Pedersen	FOM	-	-	-
<i>P. gnaphaloides</i> (L.f.) Mart.	FOD	-	-	-
<i>P. tuberosa</i> (Spreng.) Hicken	FOM	-	-	-

Amaryllidaceae

Julie H. A. Dutilh

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
AMARYLLIDACEAE – 40/227				
Crinum – 1/65				
C. americanum L.	RST, MAN, FOD	-	-	-
Eithea* – 1/1				
E. blumenavia (K.Koch & Bouché) Ravenna*	FOD	-	-	-
Griffinia – 14/20				
G. alba Preuss & Meerow*	FOD	-	-	-
G. arifolia Ravenna*	FOD	-	-	-
G. colatinensis Ravenna*	FOD	-	-	-
G. concinna (Mart.) Ravenna*	FES	-	-	-
G. espiritensis Ravenna*	FOD, FES	-	VU	ANEXO II
G. hyacinthina Ker-Gawler*	FOD	-	-	-
G. ilheusiana Ravenna*	FOD	-	-	-
G. intermedia Lindl.*	FOD	-	-	-
G. itambensis Ravenna*	FES	-	-	-
G. mucurina Ravenna*	FOD	-	-	-
G. ornata Moore*	FOD	-	-	-
G. parviflora Ker-Gawler*	FOD	-	VU	ANEXO II
G. paubrasilica Ravenna*	FOD	-	VU	ANEXO II
G. rochae Morel*	FOD	-	VU	ANEXO II
Habranthus – 1/30				
H. concinnus Ravenna*	FES	-	-	-
Hippeastrum – 15/60				
H. aulicum Herb.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>H. blossfeldiae</i> (Traub & Doran) van Scheepen*	RST, FES	-	-	-
<i>H. brasilianum</i> (Traub & J.L.Doran) Dutilh*	AFL	-	VU	ANEXO I
<i>H. breviflorum</i> Herb.*	FCA, FAQ	-	EN	ANEXO II
<i>H. calyptratum</i> Herb.*	FOD	-	-	-
<i>H. glaucescens</i> (Mart.) Herb.	FCA	-	-	-
<i>H. heuserianum</i> Karsten*	FOD	-	-	-
<i>H. lavrense</i> Ravenna*	AFL	-	-	-
<i>H. marumbiense</i> (Ravenna) Van Scheepen*	FOD	-	-	-
<i>H. papilio</i> (Ravenna) Van Scheepen*	FES	-	CR	ANEXO II
<i>H. psittacinum</i> Herb.*	FES	-	EN	ANEXO II
<i>H. puniceum</i> (Lam.) Kuntze	FCA, FES, FED, AFL	-	-	-
<i>H. reticulatum</i> Herb.*	RST, FES	-	-	-
<i>H. santacatarina</i> (Traub) Dutilh*	FCA	-	EN	ANEXO II
<i>H. striatum</i> (Lam.) Moore*	FOD, FES	-	-	-
Worsleya* – 1/1				
<i>W. rayneri</i> (Hook.) Traub. & Moldenke*	AFL	-	CR	ANEXO I
Zephyranthes – 7/50				
<i>Z. amoena</i> Ravenna*	FES	-	-	-
<i>Z. capivarina</i> Ravenna*	FES	-	-	-
<i>Z. flavissima</i> Ravenna*	FCA	-	-	-
<i>Z. gratissima</i> Ravenna*	FES	-	-	-
<i>Z. lagesiana</i> Ravenna*	FCA	-	-	-
<i>Z. paranaensis</i> Ravenna*	FCA	-	-	-
<i>Z. robusta</i> Baker	RST, FES	-	-	-

Anacardiaceae

Ary Teixeira de Oliveira-Filho

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ANACARDIACEAE – 23/116				
Anacardium – 1/15				
A. occidentale L.	FES, FCA, RST	-	-	-
Astronium – 4/14				
A. concinnum Schott ex Spreng.*	FOD, FES	-	-	-
A. fraxinifolium Schott ex Spreng.	FES, FED, FCA	-	-	-
A. graveolens Jacq.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
A. nelsonrosae Santin	FES, FCA	-	-	-
Cyrtocarpa – 1/6				
C. caatingae J.D.Mitch. & Daly	FES, FED, FCA	-	EN	ANEXO II
Lithraea – 2/10				
L. brasiliensis Marchand*	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>L. molleoides</i> (Vell.) Engl.	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>Myracrodruon</i> – 2/2				
<i>M. balansae</i> (Engl.) Santin	FES, FED, FCA	-	VU	ANEXO II
<i>M. urundeuva</i> M.Allemão	FES, FED, FCA	-	VU	ANEXO I
<i>Schinopsis</i> – 1/7				
<i>S. brasiliensis</i> Engl.	FES, FED, FCA	-	VU	ANEXO II
<i>Schinus</i> – 5/30				
<i>S. lentiscifolius</i> Marchand	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>S. molle</i> L.	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>S. pearcei</i> Engl.	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>S. polygamus</i> (Cav.) Cabrera	FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST-	-	-	-
<i>S. terebinthifolius</i> Raddi*	FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST-	-	-	-
<i>Spondias</i> – 4/11				
<i>S. macrocarpa</i> Engl.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. mombin</i> L.	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
<i>S. tuberosa</i> Arruda	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>S. venulosa</i> Mart. ex Engl.*	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>Tapirira</i> – 2/15				
<i>T. guianensis</i> Aubl.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
<i>T. obtusa</i> (Benth.) J.D.Mitch.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>Thyrsodium</i> – 1/6				
<i>T. spruceanum</i> Salzm. ex Benth.	FOD, FES	-	-	-

Annonaceae

Adriana Quintella Lobão, Paul J. M. Maas
& Renato de Mello-Silva

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ANNONACEAE – 86/2500				
<i>Anaxagorea</i> – 2/26				
<i>A. dolichocarpa</i> Sprague & Sandwith	FOD	-	-	-
<i>A. silvatica</i> R.E.Fr.*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>Annona</i> – 18/155				
<i>A. acutiflora</i> Mart.*	RST, FOD	-	-	-
<i>A. bahiensis</i> (Maas & Westra) H.Rainer*	FOD	-	-	-
<i>A. cacans</i> Warm.*	FOD	-	-	-
<i>A. dolabripetala</i> Raddi*	FOD	-	-	-
<i>A. emarginata</i> (Schltdl.) H.Rainer	FOD	-	-	-
<i>A. exsucca</i> DC.	FOD	-	-	-
<i>A. ferruginea</i> (R.E.Fr.) H.Rainer*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. glabra</i> L.*	MAN	-	-	-
<i>A. impressivenia</i> Saff. ex R.E.Fr.*	FOD	-	-	-
<i>A. maritima</i> (Záchia) H.Rainer*	FOD	-	-	-
<i>A. montana</i> Macfad.	FOD	-	-	-
<i>A. neosericea</i> H.Rainer*	FOD	-	-	-
<i>A. parviflora</i> (A.St.-Hil.) H.Rainer*	FOD	-	-	-
<i>A. pickelii</i> (Diels) H.Rainer*	FOD	-	-	-
<i>A. salzmannii</i> A.DC.*	FOD	-	-	-
<i>A. sylvatica</i> A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
<i>A. ubatubensis</i> (Maas & Westra) H.Rainer*	FOD	-	-	-
<i>A. xylopiifolia</i> A.St.-Hil. & Tul.*	FOD	-	-	-
<i>Bocagea</i> – 2/3				
<i>B. longepedunculata</i> Mart.	FOD	-	-	-
<i>B. viridis</i> A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
<i>Cymbopetalum</i> – 1/27				
<i>C. brasiliense</i> (Vell.) Benth. ex Baill.	FOD	-	-	-
<i>Duguetia</i> – 15/94				
<i>D. bahiensis</i> Maas*	FOD	-	-	-
<i>D. chrysocarpa</i> Maas*	FOD	-	-	-
<i>D. flagellaris</i> Huber	FOD	-	-	-
<i>D. lanceolata</i> A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
<i>D. magnolioidea</i> Maas*	RST	-	EN	ANEXO II
<i>D. microphylla</i> (R.E.Fr.) R.E.Fr.*	FOD	-	-	-
<i>D. moricandiana</i> Mart.*	RST	-	-	-
<i>D. pohliana</i> Mart.*	FOD	-	-	-
<i>D. restingae</i> Maas*	RST	-	CR	ANEXO II
<i>D. reticulata</i> Maas*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>D. riedeliana</i> R.E.Fr.*	RST	-	-	-
<i>D. salicifolia</i> R.E.Fr.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>D. scottmorii</i> Maas*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>D. sessilis</i> (Vell.) Maas*	RST	-	-	-
<i>D. sooretamae</i> Maas*	RST	-	VU	ANEXO II
<i>Guatteria</i> – 15/299				
<i>G. australis</i> A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
<i>G. campestris</i> R.E.Fr.	FOD	-	-	-
<i>G. candolleana</i> Schltldl.*	FOD, RST	-	-	-
<i>G. emarginata</i> Lobão et al.*	FOD	-	-	-
<i>G. ferruginea</i> A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
<i>G. latifolia</i> (Mart.) R.E.Fr.*	FOD	-	-	-
<i>G. macropus</i> Mart.*	FOD	-	-	-
<i>G. oligocarpa</i> Mart.*	FOD	-	-	-
<i>G. pogonopus</i> Mart.*	FOD	-	-	-
<i>G. pohliana</i> Schltldl.*	FOD	-	-	-
<i>G. schomburgkiana</i> Mart.	FOD	-	-	-
<i>G. sellowiana</i> Schltldl.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>G. stenocarpa</i> Lobão <i>et al.</i> *	FOD	-	-	-
<i>G. aff. tomentosa</i> Rusby	FOD	-	-	-
<i>G. villosissima</i> A.St.-Hil.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Hornschuchia</i> * – 10/10				
<i>H. alba</i> (A.St.-Hil.) R.E.Fr.*	RST	-	CR	ANEXO II
<i>H. bryotrophe</i> Nees*	FOD	-	-	-
<i>H. cauliflora</i> Maas & Setten*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>H. citriodora</i> D.M.Johnson*	FOD	-	-	-
<i>H. leptandra</i> D.M.Johnson*	FOD	-	-	-
<i>H. lianarum</i> D.M.Johnson*	FES	-	-	-
<i>H. myrtillus</i> Nees*	FOD	-	-	-
<i>H. obliqua</i> Maas & Setten*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>H. polyantha</i> Maas & Setten*	FOD	-	-	-
<i>H. santosii</i> D.M.Johnson*	FOD	-	-	-
<i>Malmea</i> – 1/14				
<i>M. obovata</i> R.E.Fr.*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>Oxandra</i> – 3/22				
<i>O. martiana</i> (Schltdl.) R.E.Fr.*	FOD	-	-	-
<i>O. nitida</i> R.E.Fr.*	FOD	-	-	-
<i>O. reticulata</i> Maas	FOD	-	-	-
<i>Porcelia</i> – 1/7				
<i>P. macrocarpa</i> (Warm.) R.E.Fr.*	FOD	-	-	-
<i>Pseudoxandra</i> – 2/22				
<i>P. bahiensis</i> Maas*	FOD	-	-	-
<i>P. spiritus-sancti</i> Maas*	FOD	-	-	-
<i>Trigynaea</i> – 2/8				
<i>T. axilliflora</i> D.M.Johnson & N.A.Murray*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>T. oblongifolia</i> Schltdl.*	FOD	-	-	-
<i>Unonopsis</i> – 6/50				
<i>U. aurantiaca</i> Maas & Westra*	FOD	-	-	-
<i>U. bahiensis</i> Maas & Orava*	FOD	-	-	-
<i>U. bauxitae</i> Maas <i>et al.</i> *	FOD	-	-	-
<i>U. renati</i> Maas & Westra*	FOD	-	-	-
<i>U. riedeliana</i> R.E.Fr.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>U. sanctae-teresae</i> Maas & Westra*	FOD	-	-	-
<i>Xylopia</i> – 8/150				
<i>X. brasiliensis</i> Spreng.*	FOD	-	-	-
<i>X. decorticans</i> D.M.Johnson & Lobão*	FOD	-	-	-
<i>X. frutescens</i> Aubl.*	FOD	-	-	-
<i>X. involucrata</i> M.C.Dias & Kinoshita*	FOD	-	-	-
<i>X. laevigata</i> (Mart.) R.E.Fr.	FOD	-	-	-
<i>X. langsdorffiana</i> A.St.-Hil. & Tul.*	FOD	-	-	-
<i>X. ochrantha</i> Mart.*	RST	-	-	-
<i>X. sericea</i> A.St.-Hil.	FOD	-	-	-

Apiaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
APIACEAE – 75/3540				
Apium – 2/25				
A. prostratum Labill.	FCA	-	-	-
A. sellowianum H.Wolff	FCA	-	-	-
Bowlesia – 1/15				
B. incana Ruiz & Pav.	FCA	-	-	-
Centella – 1/40				
C. asiatica (L.) Urb.	FCA	-	-	-
Cyclospermum –1/3				
C. leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson	FCA	-	-	-
Daucus – 1/22				
D. pusillus Michx.	FCA	-	-	-
Eryngium – 61/250				
E. aloifolium Mart. ex Urb.*	FCA	-	-	-
E. bracteosum (DC.) Griseb.	FCA	-	-	-
E. canaliculatum Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. ciliatum Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. corallinum Mathias & Constance*	FCA	-	-	-
E. coronatum Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
E. coronopifolium Decne.	FCA	-	-	-
E. decaisneanum Urb.	FCA	-	-	-
E. divaricatum Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
E. dusenii H.Wolff*	FES	-	-	-
E. ebracteatum Lam.	FCA	-	-	-
E. eburneum Decne.	FCA	-	-	-
E. echinatum Urb.	FCA	-	-	-
E. ekmanii H.Wolff*	FES	-	-	-
E. elegans Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. eriophorum Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. eurycephalum Malme	FCA	-	-	-
E. falcifolium Irgang*	FCA	-	-	-
E. flaccidum Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
E. floribundum Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. fluminense Urb.	FCA	-	-	-
E. foetidum L.	FCA	-	-	-
E. foliosum Scheele	FCA	-	-	-
E. glaziovianum Urb.*	FCA	-	-	-
E. goulartii Glaz. & Urb. ex Urb.*	FCA	-	-	-
E. hemisphaericum Urb.	FCA	-	-	-
E. horridum Malme	FCA	-	-	-
E. junceum Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
E. juncifolium (Urb.) Mathias & Constance	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>E. koehneanum</i> Urb.*	FCA	-	-	-
<i>E. lacustre</i> Pohl ex Urb.	FCA	-	-	-
<i>E. leptophyllum</i> Urb.	FCA	-	-	-
<i>E. luzulifolium</i> Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
<i>E. malmeanum</i> H.Wolff	FCA	-	-	-
<i>E. marginatum</i> Pohl ex Urb.	FCA	-	-	-
<i>E. megapotamicum</i> Malme	FCA	-	-	-
<i>E. nudicaule</i> Lam.	FCA	-	-	-
<i>E. nudum</i> Gill. & Hook.	FCA	-	-	-
<i>E. oligodon</i> Griseb.	FCA	-	-	-
<i>E. ombrophilum</i> Dusén & Wolff*	FOD	-	-	-
<i>E. pandanifolium</i> Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
<i>E. paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F.Delaroche	FCA	-	-	-
<i>E. paraguariense</i> Urb.	FCA	-	-	-
<i>E. pohlianum</i> Urb.	FCA	-	-	-
<i>E. pristis</i> Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
<i>E. proliferum</i> Brade*	FCA	-	-	-
<i>E. ramboanum</i> Mathias & Constance*	FCA	-	-	-
<i>E. raulinii</i> Mathias & Constance*	FCA	-	-	-
<i>E. regnellii</i> Malme	FCA	-	-	-
<i>E. reitzii</i> Mathias & Constance*	FCA	-	-	-
<i>E. rochei</i> Constance	FCA	-	-	-
<i>E. sanguisorba</i> Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
<i>E. schwackeanum</i> Urb. ex H.Wolff	FCA	-	-	-
<i>E. scirpinum</i> Cham.	FCA	-	-	-
<i>E. sellowii</i> H.Wolff	FCA	-	-	-
<i>E. serra</i> Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
<i>E. smithii</i> Mathias & Constance*	FCA	-	-	-
<i>E. stenophyllum</i> Urb.	FCA	-	-	-
<i>E. subinerme</i> (H.Wolff) Mathias & Constance	FCA	-	-	-
<i>E. urbanianum</i> H.Wolff*	FCA	-	-	-
<i>E. zosterifolium</i> H.Wolff*	FCA	-	-	-
Klotzschia – 3/3				
<i>K. brasiliensis</i> Cham.	FCA	-	-	-
<i>K. glaziovii</i> Urb.	FCA	-	-	-
<i>K. rhizophylla</i> Urb.	FCA	-	-	-
Lilaeopsis – 4/13				
<i>L. attenuata</i> (Hook. & Arn.) Fernald	FCA	-	-	-
<i>L. brasiliensis</i> (Glaz.) Affolter	?	-	-	-
<i>L. caroliniensis</i> J.M.Coult. & Rose	?	-	-	-
<i>L. minor</i> (A.W.Hill) Pérez-Mor.	FCA	-	-	-
Spananthe – 1/1				
<i>S. paniculata</i> Jacq.	FCA	-	-	-

Apocynaceae

Ingrid Koch & André Olmos Simões (*Apocynoideae*, *Rauvolfioideae*)

Alessandro Rapini & Jorge Fontella Pereira (*Asclepiadoideae*)

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
APOCYNACEAE – 323/4500				
Allamanda – 3/14				
A. cathartica L.	FES, FOD	-	-	-
A. doniana Müll.Arg.	AFL	-	-	-
A. schottii Pohl	FOD, FES	-	-	-
Araujia – 1/8				
A. sericifera Brot.	FOD, FOM, FED	-	-	-
Asclepias – 6/125				
A. aequicornu E.Fourn.	FCA	-	-	-
A. bracteolata E.Fourn.	RST, FCA	-	-	-
A. candida Vell.	FCA	-	-	-
A. curassavica L.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
A. langsdorffii E.Fourn.	FCA	-	-	-
A. mellodora A.St.-Hil.	FCA, RST	-	-	-
Aspidosperma – 16/43				
A. australe Müll.Arg.*	FES, FOD	-	-	-
A. camporum Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
A. compactinervium Kuhlman.*	FOD	-	-	-
A. cuspa (Kunth) S.F.Blake ex Pittier	FES	-	-	-
A. cylindrocarpon Müll.Arg.*	FES	-	-	-
A. discolor A.DC.	FES, FOD	-	-	-
A. illustre (Vell.) Kuhlman. & Pirajá*	FES, RST	-	-	-
A. olivaceum Müll.Arg.*	FES	-	-	-
A. parvifolium A.DC.*	FOD	-	-	-
A. polyneuron Müll.Arg.*	FES	-	-	-
A. quirandy Hassl.	FES	-	-	-
A. ramiflorum Müll.Arg.*	FES, FOD	-	-	-
A. riedelii Müll.Arg.*	FES, AFL	-	-	-
A. spruceanum Benth. ex Müll.Arg.	FES, FOD	-	-	-
A. subincanum Mart.	FES	-	-	-
A. thomasi Marc.-Ferr.*	FOD	-	-	-
Bahiella – 2/2				
B. blanchetii (A.DC.) J.F.Morales	FOD	-	-	-
B. infundibuliflora J.F.Morales*	FOD	-	-	-
Barjonia – 1/6				
B. erecta (Vell.) K.Schum.	FCA	-	-	-
Blepharodon – 5/25				
B. ampliflorum E.Fourn.	FCA	-	-	-
B. bicuspidatum E.Fourn.	FOM, FCA	-	-	-
B. lineare (Decne.) Decne.	FCA	-	-	-
B. nitidum (Vell.) J.F.Macbr.	FOM, FCA	-	-	-
B. reflexum Malme	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Condylocarpon – 1/7				
C. isthmicum (Vell.) A.DC.	FES, FOD	-	-	-
Couma – 1/15				
C. rigida Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
Cynanchum – 4/150				
C. brasiliense (Morillo) Liede & Meve*	?	-	-	-
C. caudiculatum Rapini*	FOM	-	-	-
C. montevidense Spreng.	FOM	-	-	-
C. roulinioides (E.Fourn.) Rapini	FOM	-	-	-
Ditassa – 32/100				
D. aequicymosa E.Fourn.	FOM	-	-	-
D. arianae Fontella & E.A.Schwarz	RST	-	VU	ANEXO I
D. banksii R.Br. ex Schult.*	RST, FOM	-	-	-
D. bicolor Decne.*	FOD	-	-	-
D. blanchetii Decne.*	RST	-	-	-
D. burchellii Hook. & Arn.	FOD, RST, FOM	-	-	-
D. conceptionis Fontella*	FOD, FOM	-	-	-
D. congesta E.Fourn.	FOD	-	-	-
D. crassifolia Decne.*	RST	-	-	-
D. duartei Fontella & T.U.P.Konno*	FOD	-	-	-
D. edmundoi Fontella & Valente*	FOM	-	-	-
D. gracilis Hand.-Mazz.*	FOM, FCA	-	-	-
D. hispida (Vell.) Fontella	FOM, FOD, RST	-	-	-
D. imbricata E.Fourn.*	FOD	-	-	-
D. laevis Mart.*	FCA	-	VU	ANEXO II
D. lenheirensis Silveira	FCA	-	-	-
D. leonii Fontella & T.U.P.Konno*	FCA	-	VU	ANEXO II
D. linearis Mart.*	FCA	-	-	-
D. longicaulis (E.Fourn.) Rapini	FOM	-	-	-
D. longisepala (Hua) Fontella & E.A.Schwarz*	FCA	-	-	-
D. maricaensis Fontella & E.A.Schwarz*	RST	-	EN	ANEXO I
D. mucronata Mart.	FOM	-	-	-
D. nitida Decne.*	FOM	-	-	-
D. obcordata Mart.	FOM	-	-	-
D. oberdanii Fontella & M.Alvarez*	FOD	-	-	-
D. oxyphylla Turcz.	FOM	-	-	-
D. pedunculata Malme*	FCA	-	-	-
D. pohliana E.Fourn.	FOM	-	-	-
D. retusa Mart.	FCA	-	-	-
D. subumbellata Malme*	FOD, RST	-	-	-
D. succedanea Rapini	FCA	-	-	-
D. tomentosa (Decne.) Fontella	FOD, FOM, FCA	-	-	-
Fischeria – 1/6				
F. stellata (Vell.) E.Fourn.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
Forsteronia – 11/46				
F. australis Müll.Arg.	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>F. cordata</i> (Müll.Arg.) Woodson	FOD, RST	-	-	-
<i>F. glabrescens</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>F. leptocarpa</i> (Hook. & Arn.) A.DC.*	FOD	-	-	-
<i>F. montana</i> Müll.Arg.*	FOD, RST	-	-	-
<i>F. pilosa</i> (Vell.) Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>F. pubescens</i> A.DC.	FES	-	-	-
<i>F. refracta</i> Müll.Arg.*	FES, FOD	-	-	-
<i>F. rufa</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>F. thyrsoides</i> (Vell.) Müll.Arg.*	FES	-	-	-
<i>F. vellosiana</i> (A.DC.) Woodson	FES	-	-	-
<i>Funastrum</i> – 1/17				
<i>F. clausum</i> (Jacq.) Schltr.	FOM, RST	-	-	-
<i>Geissospermum</i> – 1/5				
<i>G. laeve</i> (Vell.) Miers	FOD	-	-	-
<i>Gonolobus</i> – 3/145				
<i>G. dorothyanus</i> Fontella*	RST	-	EN	ANEXO I
<i>G. parviflorus</i> Decne.	FOD, FOM	-	-	-
<i>G. rostratus</i> (Vahl) R.Br. ex Schltr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Gyrostelma</i> – 2/2				
<i>G. bornmuelleri</i> Schltr. ex Malme*	FCA	-	-	-
<i>G. oxypetaloides</i> E.Fourn.	FCA	-	-	-
<i>Hemipogon</i> – 4/15				
<i>H. acerosus</i> Decne.	FCA	-	-	-
<i>H. carassensis</i> (Malme) Rapini	FCA	-	-	-
<i>H. hemipogonoides</i> (Malme) Rapini	FCA	-	-	-
<i>H. setaceus</i> Decne.	FCA	-	-	-
<i>Himatanthus</i> – 2/13				
<i>H. bracteatus</i> (A.DC.) Woodson	FOD	-	-	-
<i>H. drasticus</i> (Müll.Arg.) Woodson	FOD, RST	-	-	-
<i>Hypolobus</i> * – 1/1				
<i>H. infractus</i> E.Fourn.*	?	-	-	-
<i>Jobinia</i> – 6/12				
<i>J. connivens</i> (Hook. & Arn.) Malme	FOM, FOD, RST	-	-	-
<i>J. grandis</i> (Hand.-Mazz.) Fontella & Goes	FOD	-	-	-
<i>J. hatschbachii</i> Fontella & E.A.Schwarz	FOM	-	-	-
<i>J. lindbergii</i> E.Fourn.	FOD, FOM, FCA	-	-	-
<i>J. longicoronata</i> Goes & Fontella*	FOD	-	-	-
<i>J. paranaensis</i> Fontella & Valente*	FOD	-	-	-
<i>Kerbera</i> * – 1/1				
<i>K. eichleri</i> E.Fourn.*	?	-	-	-
<i>Lacmellea</i> – 2/22				
<i>L. bahiensis</i> J.F.Morales*	FOD	-	-	-
<i>L. pauciflora</i> (Kuhlm.) Markgr.	FOD	-	-	-
<i>Macoubea</i> – 2/2				
<i>M. guianensis</i> Aubl.	FOD	-	-	-
<i>M. sprucei</i> (Müll.Arg.) Markgr.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Macroditassa – 8/15				
M. adnata (E.Fourn.) Malme	FCA	-	-	-
M. grandiflora (E.Fourn.) Malme	FOD, FOM, RST	-	-	-
M. lagoensis (E.Fourn.) Malme	FOM	-	-	-
M. laurifolia (Decne.) Fontella	FOM	-	-	-
M. laxa (Malme) Fontella & de Lamare*	FOM	-	-	-
M. macrophylla Malme	FOM	-	-	-
M. marianae Fontella & M.V.Ferreira*	RST	-	-	-
M. morilloana Fontella & M.V.Ferreira*	FOM	-	-	-
Macroscepis – 1/19				
M. aurea E.Fourn.	FED	-	-	-
Malouetia – 1/25				
M. cestroides (Nees ex Mart.) Müll.Arg.	FOD	-	-	-
Mandevilla – 32/108				
M. atrovioleacea (Stadelm.) Woodson	FES, FCA, AFL	-	-	-
M. clandestina J.F.Morales	FES	-	-	-
M. coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	FOD	-	-	-
M. crassinoda (Gardner) Woodson*	FOD	-	-	-
M. duartei Markgr.*	AFL	-	-	-
M. emarginata (Vell.) C.Ezcurra	AFL, FES	-	-	-
M. fistulosa M.F.Sales et al.*	AFL	-	-	-
M. fragrans (Stadelm.) Woodson*	FOD, RST	-	-	-
M. funiformis (Vell.) K.Schum.	FOD, RST	-	-	-
M. grazielae M.F.Sales et al.*	AFL	-	-	-
M. guanabarica Casar. ex M.F.Sales et al.*	FOD, RST	-	-	-
M. harleyi M.F.Sales et al.*	AFL	-	-	-
M. hirsuta (A.Rich.) K.Schum.	FES	-	-	-
M. illustris (Vell.) Woodson	FES	-	-	-
M. immaculata Woodson*	FOD	-	-	-
M. lucida Woodson*	FOD	-	-	-
M. luetzelburgii Woodson*	AFL	-	-	-
M. martiana (Stadelm.) Woodson*	AFL, FES	-	-	-
M. moricandiana (A.DC.) Woodson	RST	-	-	-
M. pendula (Ule) Woodson*	FOD	-	-	-
M. pentlandiana (A.DC.) Woodson	RST	-	-	-
M. permixta Woodson*	FOD	-	-	-
M. pohliana (Stadelm.) A.H.Gentry	RST, FCA	-	-	-
M. scabra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K.Schum.	FCA, FES	-	-	-
M. sellowii (Müll.Arg.) Woodson*	FES, AFL	-	-	-
M. spigeliiflora (Stadelm.) Woodson	FES	-	-	-
M. splendens (Hook.f.) Woodson*	FES, FOD	-	-	-
M. tenuifolia (J.C.Mikan) Woodson	FCA, FES	-	-	-
M. urceolata Markgr.*	FES, FCA	-	-	-
M. urophylla (Hook.f.) Woodson	FOD	-	-	-
M. venulosa (Müll.Arg.) Woodson*	AFL	-	-	-
M. widgrenii C.Ezcurra	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Marsdenia – 12/300				
M. altissima (Jacq.) Dugand	FOM, FCA	-	-	-
M. amorinii Morillo*	RST	-	-	-
M. carvalhoi Morillo & Carnevali*	FOD	-	-	-
M. dorothyae Fontella & Morillo*	RST	-	-	-
M. glaziovii (E.Fourn.) Spellman & Morillo*	?	-	-	-
M. hilariana E.Fourn.	FOD, FOM, RST	-	-	-
M. loniceroides (Hook.) E.Fourn.*	FOD, RST, AFL	-	-	-
M. macrophylla (Humb. & Bonpl.) E.Fourn.	FOD	-	-	-
M. montana Malme	FOD	-	-	-
M. otoniense Fontella & Morillo*	FES	-	-	-
M. sessilifolia (E.Fourn.) Fontella*	FCA, AFL	-	-	-
M. suberosa (E.Fourn.) Malme	FOM	-	-	-
Matelea – 17/250				
M. bahiensis Morillo & Fontella*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
M. barrosiana Fontella*	FOD	-	-	-
M. capillacea (E.Fourn.) Fontella & E.A.Schwarz	FOD	-	-	-
M. denticulata (Vahl) Fontella & E.A.Schwarz	FOD, FOM	-	-	-
M. dusenii Morillo*	FOM	-	-	-
M. fournieri Morillo*	?	-	-	-
M. glaziovii (E.Fourn.) Morillo	FOD	-	-	-
M. hatschbachii (Fontella & Valente) Morillo*	?	-	-	-
M. marcoassisi Fontella*	FOD	-	VU	ANEXO I
M. maritima (Vell.) Fontella	FES, RST, FOM	-	-	-
M. orthosioides (E.Fourn.) Fontella	FOD	-	-	-
M. pedalis (E.Fourn.) Fontella & E.A.Schwarz	FOD	-	-	-
M. pyrrhotricha (Decne.) Fontella	FOD	-	-	-
M. quinquedentata (E.Fourn.) Morillo*	RST	-	-	-
M. reitzii Fontella*	FOM	-	-	-
M. riparia Morillo	FOD	-	-	-
M. santosii Morillo & Fontella*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
Mesechites – 1/10				
M. mansoanus (A.DC.) Woodson	FES	-	-	-
Minaria – 6/19				
M. abortiva (Silveira) Rapini	FCA	-	-	-
M. acerosa (Mart.) T.U.P.Konno & Rapini	FCA, AFL	-	-	-
M. cordata (Turcz.) T.U.P.Konno & Rapini	FCA	-	-	-
M. decussata (Mart.) T.U.P.Konno & Rapini	FCA, AFL, RST	-	-	-
M. micromeria (Decne.) T.U.P.Konno & Rapini	FCA	-	-	-
M. monocoronata (Rapini) T.U.P.Konno & Rapini*	FCA, AFL	-	-	-
Nautonia – 1/1				
N. nummularia Decne.	FCA	-	-	-
Odontadenia – 1/20				
O. gracilipes (Stadelm.) Woodson	FES	-	-	-
Orthosia – 15/40				
O. arenosa Decne.*	RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>O. congesta</i> Decne.	FOD, FOM	-	-	-
<i>O. dusenii</i> (Malme) Fontella*	FOD	-	-	-
<i>O. eichleri</i> E.Fourn.*	FOD	-	-	-
<i>O. guilleminiana</i> (Decne.) Liede & Meve	FOD, FOM	-	-	-
<i>O. hatschbachii</i> Fontella & Goes*	FOM	-	-	-
<i>O. itatiaiensis</i> Malme*	FOD	-	-	-
<i>O. latipes</i> (Decne.) Malme*	FOM	-	-	-
<i>O. loandensis</i> Fontella & Valente*	FOD	-	-	-
<i>O. multiflora</i> E.Fourn.*	FOM	-	-	-
<i>O. parviflora</i> (E.Fourn.) Liede & Meve	FOD	-	-	-
<i>O. scoparia</i> (Nutt.) Liede & Meve	FOD, FOM	-	-	-
<i>O. umbrosa</i> Decne.*	FOD	-	-	-
<i>O. urceolata</i> E.Fourn.	FOD, FOM	-	-	-
<i>O. virgata</i> (Poir.) E.Fourn.	FES	-	-	-
<i>Oxypetalum</i> – 69/130				
<i>O. alpinum</i> (Vell.) Fontella	RST, FOD, FCA, FES	-	-	-
<i>O. appendiculatum</i> Mart.	FCA, FES, FOM, FOD	-	-	-
<i>O. arachnoideum</i> E.Fourn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>O. arnnotianum</i> Buek	FCA, RST	-	-	-
<i>O. balansae</i> Malme	FES	-	-	-
<i>O. banksii</i> R.Br. ex Schult.	RST, FOM, FOD	-	-	-
<i>O. capitatum</i> Mart.	FCA	-	-	-
<i>O. charrua</i> T.Mey.*	FCA	-	-	-
<i>O. chodatianum</i> Malme	FCA	-	-	-
<i>O. coalitum</i> E.Fourn.	FCA	-	-	-
<i>O. commersonianum</i> (Decne.) Fontella & E.A.Schwarz	FCA	-	-	-
<i>O. confusum</i> Malme	FCA	-	-	-
<i>O. costae</i> Occhioni*	FOD	-	-	-
<i>O. crispum</i> Wight ex Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
<i>O. curtifolium</i> Malme	FCA	-	-	-
<i>O. dusenii</i> Malme*	FCA	-	-	-
<i>O. erectum</i> Mart.	FCA	-	-	-
<i>O. erianthum</i> Decne.	FOM	-	-	-
<i>O. erostre</i> E.Fourn.	FOM, FCA	-	-	-
<i>O. foliosum</i> Mart.	FCA	-	-	-
<i>O. glabrum</i> (Decne.) Malme	FCA	-	-	-
<i>O. glaziovianum</i> Loes.*	FOD	-	-	-
<i>O. glaziovii</i> (E.Fourn.) Fontella & Marquete*	FOM, FCA	-	-	-
<i>O. hoehnei</i> Malme*	FOM, FCA	-	-	-
<i>O. humile</i> (Morong) Hassl.	FCA	-	-	-
<i>O. incanum</i> E.Fourn.	FCA	-	-	-
<i>O. insigne</i> (Decne.) Malme*	FOD, FOM, FCA, RST	-	-	-
<i>O. jacobinae</i> Decne.	FOM, FCA	-	-	-
<i>O. joergensenii</i> T.Mey.	FCA	-	-	-
<i>O. kleinii</i> Fontella & Marquete*	FOD	-	-	-
<i>O. lanatum</i> Decne. ex E.Fourn.*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>O. leonii</i> Fontella*	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>O. lineare</i> Decne.	FCA	-	-	-
<i>O. lutescens</i> E.Fourn.*	FOM	-	-	-
<i>O. macrolepis</i> (Hook. & Arn.) Decne.	FOM	-	-	-
<i>O. malmei</i> Hoehne	FCA	-	-	-
<i>O. martii</i> E.Fourn.	FCA	-	-	-
<i>O. megalotamicum</i> Spreng.	FOM	-	-	-
<i>O. mexiae</i> Malme*	FOD, FES	-	-	-
<i>O. microphyllum</i> Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
<i>O. minarum</i> E.Fourn.*	FCA	-	-	-
<i>O. molle</i> Hook. & Arn.	FOM, FOD, FED	-	-	-
<i>O. montanum</i> Mart.	FCA	-	-	-
<i>O. morilloanum</i> Fontella*	FCA	-	-	-
<i>O. mosenii</i> (Malme) Malme	FCA, FOM	-	-	-
<i>O. muticum</i> E.Fourn.	FCA	-	-	-
<i>O. obtusifolium</i> Malme	FCA, FOM	-	-	-
<i>O. ostenii</i> Malme	FOM	-	-	-
<i>O. pachyglossum</i> Decne.	FCA, FOM	-	-	-
<i>O. pachygynum</i> Decne.	FCA	-	-	-
<i>O. pannosum</i> Decne.	FCA, FES, FOM, FOD	-	-	-
<i>O. parviflorum</i> (Decne.) Decne.	FCA	-	-	-
<i>O. patulum</i> E.Fourn.	FCA	-	-	-
<i>O. pedicellatum</i> Decne.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>O. pilosum</i> Gardner*	FOD, FOM	-	-	-
<i>O. polyanthum</i> (Hoehne) Rapini	FCA	-	-	-
<i>O. rariflorum</i> Malme*	FOM, FCA	-	-	-
<i>O. regnellii</i> (Malme) Malme*	FOD, FOM	-	-	-
<i>O. reitzii</i> Fontella & Marquete*	FOD	-	-	-
<i>O. schottii</i> E.Fourn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>O. solanoides</i> Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
<i>O. stipatum</i> Malme	FCA?	-	-	-
<i>O. strictum</i> Mart.	FCA	-	-	-
<i>O. sublanatum</i> Malme	FCA, FOD, FOM	-	-	-
<i>O. suboppositum</i> Malme	FCA	-	-	-
<i>O. tomentosum</i> Wight ex Hook. & Arn.*	RST	-	-	-
<i>O. tubatum</i> Malme*	FCA, RST, FOD, FOM	-	-	-
<i>O. warmingii</i> (E.Fourn.) Fontella & Marquete	FCA	-	-	-
<i>O. wightianum</i> Hook. & Arn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Peltastes</i> – 1/5				
<i>P. peltatus</i> (Vell.) Woodson	FOD, FES	-	-	-
<i>Peplonia</i> – 6/6				
<i>P. asteria</i> (Vell.) Fontella & E.A.Schwarz*	RST	-	-	-
<i>P. axillaris</i> (Vell.) Fontella & Rapini*	RST, FOM, FOD	-	-	-
<i>P. bradeana</i> (Fontella & E.A.Schwarz) Fontella & Rapini*	FOM	-	-	-
<i>P. hatschbachii</i> (Fontella & E.Lam.) Fontella & Rapini*	FOD	-	-	-
<i>P. organensis</i> (E.Fourn.) Fontella & Rapini	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. riedelii</i> (E.Fourn.) Fontella & Rapini*	FOD	-	-	-
<i>Petalostelma</i> – 1/10				
<i>P. calcaratum</i> (Decne.) Fontella	FOM, FES	-	-	-
<i>Prestonia</i> – 14/60				
<i>P. acutifolia</i> (Benth. ex Müll.Arg.) K.Schum.	FES	-	-	-
<i>P. bahiensis</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>P. calycina</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>P. coalita</i> (Vell.) Woodson	FES	-	-	-
<i>P. denticulata</i> (Vell.) Woodson*	FOD	-	-	-
<i>P. didyma</i> (Vell.) Woodson	FOD	-	-	-
<i>P. dusenii</i> (Malme) Woodson	FOD	-	-	-
<i>P. hassleri</i> Woodson	FES	-	-	-
<i>P. lindmanii</i> (Malme) Hoehne	FES	-	-	-
<i>P. perplexa</i> Woodson	FOD	-	-	-
<i>P. riedelii</i> (Müll.Arg.) Woodson	FES	-	-	-
<i>P. solanifolia</i> (Müll.Arg.) Markgr.	FES	-	-	-
<i>P. tomentosa</i> R.Br.	FES, RST	-	-	-
<i>P. trifida</i> (Poepp.) Woodson*	FOD	-	-	-
<i>Pseudibatia</i> – 1/1				
<i>P. suberosa</i> Malme	FCA	-	-	-
<i>Rauvolfia</i> – 8/80				
<i>R. atlantica</i> Emygdio*	FOD	-	-	-
<i>R. bahiensis</i> A.DC.*	FOD, RST	-	-	-
<i>R. capixabae</i> I.Koch & Kin.-Gouv.*	RST	-	-	-
<i>R. grandiflora</i> Mart.*	FOD, RST	-	-	-
<i>R. mattfeldiana</i> Markgr.	FES, RST	-	-	-
<i>R. moricandii</i> A.DC.*	FES	-	-	-
<i>R. pruinosifolia</i> I.Koch & Kin.-Gouv.*	FES	-	-	-
<i>R. sellowii</i> Müll.Arg.*	FES	-	-	-
<i>Rhabdadenia</i> – 1/4				
<i>R. pohlii</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>Schistogyne</i> – 2/8				
<i>S. decaisneana</i> H.Karst.	FCA	-	-	-
<i>S. sylvestris</i> Hook. & Arn.	FOM	-	-	-
<i>Schubertia</i> – 2/5				
<i>S. grandiflora</i> Mart.	FOM	-	-	-
<i>S. multiflora</i> Mart.	FES	-	-	-
<i>Secondatia</i> – 1/7				
<i>S. densiflora</i> A.DC.	FES, CE	-	-	-
<i>Skytanthus</i> – 1/3				
<i>S. hancorniiifolius</i> (A.DC.) Miers	FOD, RST	-	-	-
<i>Tabernaemontana</i> – 6/110				
<i>T. catharinensis</i> A.DC.	FES	-	-	-
<i>T. flavicans</i> Willd. ex Roem. & Schult.	FOD, FES	-	-	-
<i>T. hystrix</i> Steud.	FOD, FES	-	-	-
<i>T. laeta</i> Mart.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>T. salzmännii</i> A.DC.*	FOD	-	-	-
<i>T. solanifolia</i> A.DC.	FES	-	-	-
<i>Tassadia</i> – 3/24				
<i>T. berteriana</i> (Spreng.) D.W.Stevens	FOM, FES	-	-	-
<i>T. obovata</i> Decne.	FOD	-	-	-
<i>T. propinqua</i> Decne.	FOD, FES, FOM, RST	-	-	-
<i>Temnadenia</i> – 2/4				
<i>T. odorifera</i> (Vell.) J.F.Morales*	FOD, RST	-	-	-
<i>T. violacea</i> (Vell.) Miers	FES	-	-	-
<i>Widgrenia</i> – 1/1				
<i>W. corymbosa</i> Malme	FCA	-	-	-

Apodanthaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
APODANTHACEAE – 5/25				
<i>Apodanthes</i> – 2/7				
<i>A. caseariae</i> Poit.	FOD	-	-	-
<i>A. minarum</i> Vattimo-Gil	FOD	-	-	-
<i>Pilostyles</i> – 3/12				
<i>P. ingae</i> (H.Karst.) Hook.f.	FOD	-	-	-
<i>P. stawiarskii</i> Vattimo-Gil	FOD	-	-	-
<i>P. ulei</i> Solms	FOD	-	-	-

Aquifoliaceae

Milton Groppo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
AQUIFOLIACEAE – 32/> 500				
<i>Ilex</i> – 32/> 500				
<i>I. affinis</i> Gardner	FES	-	-	-
<i>I. biserrulata</i> Loes.	FOD?	-	-	-
<i>I. blanchetii</i> Loes.*	RST	-	-	-
<i>I. brasiliensis</i> (Spreng.) Loes.	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>I. brevicuspis</i> Reissek*	FOD, FOM	-	-	-
<i>I. buxifolia</i> Gardner*	AFL	-	-	-
<i>I. cerasifolia</i> Reissek	FES	-	-	-
<i>I. cognata</i> Reissek*	?	-	-	-
<i>I. congonhinha</i> Loes.*	AFL	-	-	-
<i>I. conocarpa</i> Reissek	AFL	-	-	-
<i>I. dumosa</i> Reissek	FOD, FOM, FCA, AFL, RST	-	-	-
<i>I. euryiformis</i> Reissek*	AFL	-	-	-
<i>I. floribunda</i> Reissek ex Maxim.*	RST	-	-	-
<i>I. friburgensis</i> Loes.*	AFL	-	-	-
<i>I. glazioviana</i> Loes.*	AFL	-	-	-
<i>I. grandis</i> Reissek	FOD	-	-	-
<i>I. integerrima</i> (Vell.) Reissek*	AFL, FCA, FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>I. longipetiolata</i> Loes.*	RST?	-	-	-
<i>I. loranthoides</i> Mart. ex Reissek*	AFL	-	VU	ANEXO II
<i>I. lundii</i> Warm.	AFL	-	-	-
<i>I. microdonta</i> Reissek*	FOD, FOM	-	-	-
<i>I. nummularia</i> Reissek	AFL, FCA	-	-	-
<i>I. oligoneura</i> Loes.	AFL	-	-	-
<i>I. organensis</i> Loes.*	AFL	-	-	-
<i>I. paraguariensis</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM	-	-	-
<i>I. psammophila</i> Mart. ex Reissek*	RST	-	-	-
<i>I. pseudobuxus</i> Reissek*	FOD, AFL, RST	-	-	-
<i>I. sapotifolia</i> Reissek	FOD	-	-	-
<i>I. schwackeana</i> Loes.*	FOM	-	-	-
<i>I. taubertiana</i> Loes.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>I. theezans</i> Mart. ex Reissek	FOD, FOM, FCA, AFL, RST	-	-	-
<i>I. virgata</i> Loes.*	AFL?, FOM?	-	-	-

Araceae

Marcus Alberto Nadruz Coelho, Cássia Mônica Sakuragui, Eduardo Gomes Gonçalves, Livia Temponi & Rodrigo Teófilo Valadares

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ARACEAE – 165/4.025				
<i>Anthurium</i> – 70/ca. 1000				
<i>A. acutum</i> N.E.Br.*	FOD	-	-	-
<i>A. ameliae</i> Nadruz & Catharino*	FOD	-	-	-
<i>A. augustinum</i> K.Koch & Lauche*	FOD	-	-	-
<i>A. bellum</i> Schott*	RST, FOD	-	-	-
<i>A. binotii</i> Linden*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. bocainense</i> Catharino & Nadruz*	FOD	-	-	-
<i>A. boudetii</i> Nadruz*	FOD	-	-	-
<i>A. brachypodium</i> G.Barroso*	FOD	-	-	-
<i>A. brageae</i> Nadruz*	FOD	-	-	-
<i>A. bromelicola</i> Mayo & L.P.Felix*	RST	-	-	-
<i>A. cleistanthum</i> G.Barroso*	RST, FOD	-	-	-
<i>A. comtum</i> Schott*	FOD	-	-	-
<i>A. coriaceum</i> G.Don*	FOD	-	-	-
<i>A. eichleri</i> Engl.*	FOD, AFL	-	-	-
<i>A. fontellanus</i> Nadruz & Leoni*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>A. fragae</i> Nadruz*	FOD	-	-	-
<i>A. galeottii</i> K.Koch*	FOD	-	-	-
<i>A. gaudichaudianum</i> Kunth*	FOD	-	-	-
<i>A. geitnerianum</i> A.Regel*	FOD	-	-	-
<i>A. gladiifolium</i> Schott*	FOD	-	-	-
<i>A. gomesianum</i> Nadruz*	FOD	-	-	-
<i>A. harrisii</i> (Graham) Endl.*	RST, FOD	-	-	-
<i>A. hoehnei</i> K.Krause*	FOD	-	-	-
<i>A. ianthinopodium</i> (Schott ex Engl.) Nadruz & Mayo*	FOD	-	-	-
<i>A. inconspicuum</i> N.E.Br.*	FOD	-	-	-
<i>A. intermedium</i> Kunth*	FOD, FED	-	-	-
<i>A. itanhaense</i> Engl.*	RST, FOD	-	-	-
<i>A. jilekii</i> Schott*	FOD	-	-	-
<i>A. jureianum</i> Catharino & Olaio*	FOD	-	-	-
<i>A. langsdorffii</i> Schott*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>A. laucheanum</i> K.Koch*	FOD	-	-	-
<i>A. leonii</i> E.G.Gonç.*	FES	-	-	-
<i>A. lhotzkyanum</i> Schott*	FOD	-	-	-
<i>A. loefgrenii</i> Engl.*	RST, FOD	-	-	-
<i>A. longicuspidatum</i> Engl.*	FOD	-	-	-
<i>A. longifolium</i> (Hoffmanns.) G.Don*	FOD	-	-	-
<i>A. longipes</i> N.E.Br.	RST	-	-	-
<i>A. lucidum</i> Kunth*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>A. lucioi</i> Nadruz*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. luschnathianum</i> Kunth*	RST, FOD	-	VU	ANEXO I
<i>A. mareense</i> K.Krause*	FOD	-	-	-
<i>A. maricense</i> Nadruz & Mayo*	RST	-	-	-
<i>A. maximilianii</i> Schott*	FOD	-	-	-
<i>A. megapetiolum</i> E.G.Gonç.*	FES	-	-	-
<i>A. microphyllum</i> (Raf.) G.Don*	FOD	-	-	-
<i>A. minarum</i> Sakur. & Mayo	FOD, FES	-	-	-
<i>A. miquelianum</i> C.Koch & Augustin*	FOD	-	-	-
<i>A. mourae</i> Engl.*	FES	-	-	-
<i>A. nitidulum</i> Engl.*	FOD	-	-	-
<i>A. organense</i> Engl.*	FOD	-	-	-
<i>A. parasiticum</i> (Vell.) Stelfeld*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. parvum</i> N.E.Br.*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. pentaphyllum</i> (Aubl.) G.Don	RST, FOD, FES	-	-	-
<i>A. petrophilum</i> K.Krause	FED	-	-	-
<i>A. pilonense</i> Reitz*	FOD	-	-	-
<i>A. radicans</i> K.Koch & Haage*	FOD	-	-	-
<i>A. regnellianum</i> Engl.*	FOD	-	-	-
<i>A. santaritensis</i> Nadruz & Croat*	FES	-	-	-
<i>A. scandens</i> (Aubl.) Engl.*	RST, FOD, FED, FES	-	-	-
<i>A. sellowianum</i> Kunth*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. simonii</i> Nadruz*	FOD	-	-	-
<i>A. sinuatum</i> Benth. ex Schott	FED, FES	-	-	-
<i>A. solitarium</i> Schott*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. sucrei</i> G.Barroso*	FOD	-	-	-
<i>A. undatum</i> Schott*	FES	-	-	-
<i>A. unense</i> Catharino & Nadruz*	FOD	-	-	-
<i>A. urvilleanum</i> Schott*	RST, FOD	-	-	-
<i>A. validinervium</i> Engl.*	RST, FOD	-	-	-
<i>A. victorii</i> Nadruz & Catharino*	FOD	-	-	-
<i>A. xanthophylloides</i> G.Barroso*	FOD	-	-	-
Asterostigma – 10/10				
<i>A. colubrinum</i> Schott*	FES, FOD	-	-	-
<i>A. concinnum</i> Schott*	FES, FOD	-	-	-
<i>A. cryptostylum</i> Bogner	FES	-	-	-
<i>A. cubense</i> (A.Rich.) K.Krause ex Bogner*	FOD	-	-	-
<i>A. lividum</i> (Lodd.) Engl.*	FOD	-	-	-
<i>A. lombardii</i> E.G.Gonç.*	FES, FOD	-	-	-
<i>A. luschnathianum</i> Schott*	FES, FOD	-	-	-
<i>A. reticulatum</i> E.G.Gonç.*	FOM	-	-	-
<i>A. riedelianum</i> (Schott) Kuntze*	FOD	-	-	-
<i>A. tweedianum</i> Schott*	FOD, FOM	-	-	-
Caladium – 2/12				
<i>C. bicolor</i> (Aiton) Vent.	FES, FOD	-	-	-
<i>C. striatipes</i> (Kunth & C.D.Bouché) Schott	FES	-	-	-
Dracontioides* – 1/1				
<i>D. desciscens</i> (Schott) Engl. *	FED, FOD	-	-	-
Heteropsis – 3/19				
<i>H. oblongifolia</i> Kunth	RST, FOD, FES	-	-	-
<i>H. rigidifolia</i> Engl.*	FOD	-	-	-
<i>H. salicifolia</i> Kunth*	FES, FOD	-	-	-
Lemna – 3/12				
<i>L. aequinoctialis</i> Welw.	FOD, FAQ	-	-	-
<i>L. minuta</i> Kunth	FOM, FAQ	-	-	-
<i>L. valdiviana</i> Phil.	FOD, FAQ	-	-	-
Mangonia – 1/2				
<i>M. tweediana</i> Schott	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Monstera – 3/ca. 40				
M. adansonii Schott	RST, FOD, FES	-	-	-
M. obliqua Miq.	FOD	-	-	-
M. praetermissa E.G.Gonç. & Temponi*	FOD	-	-	-
Montrichardia – 1/2				
M. linifera (Arruda) Schott	RST, MAN, FOD, FAQ	-	-	-
Philodendron – 53/ca. 500				
P. acutatum Schott	FOD, FCA, AFL	-	-	-
P. adamantinum Mart.	AFL	-	-	-
P. aemulum Schott*	FOD	-	-	-
P. alternans (Vell.) Schott*	FOD	-	-	-
P. altomacaense Nadruz & Mayo*	FOD	-	-	-
P. appendiculatum Nadruz & Mayo*	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. bipennifolium Schott*	FOD, RST	-	-	-
P. bipinnatifidum Schott	FOM, FES, FCA, FOD	-	-	-
P. biribiriense Sakur. & Mayo	AFL	-	-	-
P. blanchetianum Schott*	FOD, AFL	-	-	-
P. brasiliense Engl.	FCA	-	-	-
P. cipoense Sakur. & Mayo	AFL	-	-	-
P. corcovadense Kunth*	RST	-	-	-
P. cordatum Schott*	FOD, FOM, RST	-	-	-
P. crassinervium Lindl.*	FOD, FOM, FES, AFL	-	-	-
P. curvilobum Schott*	FOD	-	-	-
P. dardanianum Mayo	FCA	-	-	-
P. edmundoi G.Barroso*	FOD, FOM	-	-	-
P. eximium Schott*	FOD	-	-	-
P. fragrantissimum (Hook.) G.Don	FOD	-	-	-
P. fragile Nadruz & Mayo*	FOD	-	VU	ANEXO I
P. glaziovii Hook.f.*	FOD, AFL	-	-	-
P. hastatum K.Koch & Sello*	FOD	-	-	-
P. hatschbachii Nadruz & Mayo*	FOD	-	-	-
P. hederaceum (Jacq.) Schott	RST	-	-	-
P. inops Schott*	FOD	-	-	-
P. kautskyi G.S.Bunting	FOD	-	-	-
P. leal-costae Mayo & G.Barroso	AFL	-	-	-
P. loefgrenii Engl.*	FOM, FES	-	-	-
P. longilaminatum Schott*	RST, FOD	-	-	-
P. martianum Engl.*	FOD, FOM	-	-	-
P. millerianum Nadruz & Sakur.*	FOD	-	-	-
P. minarum Engl.	AFL	-	-	-
P. missionum (Hauman) Hauman*	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. obliquifolium Engl.*	FOD, FOM	-	-	-
P. ochrostemon Schott*	FOD	-	-	-
P. ornatum Schott*	FOD	-	-	-
P. paludicola E.G.Gonç. & Salviani*	FOD	-	-	-
P. pedatum (Hook.) Kunth*	FOD, FOM, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. propinquum</i> Schott*	FOD	-	-	-
<i>P. recurvifolium</i> Schott	FOD	-	-	-
<i>P. renauxii</i> Reitz*	FOD	-	-	-
<i>P. rhizomatosum</i> Sakur. & Mayo	AFL	-	-	-
<i>P. roseopetiolatum</i> Nadruz & Mayo*	FOD	-	-	-
<i>P. rudgeanum</i> Schott	FOD, FES	-	-	-
<i>P. simonianum</i> Sakur.*	FOD	-	-	-
<i>P. speciosum</i> Schott ex Endl.*	FOD	-	-	-
<i>P. spirictus-sancti</i> G.S.Bunting*	FOD	-	CR	ANEXO I
<i>P. stenolobum</i> E.G.Gonç.*	FOD	-	-	-
<i>P. surinamense</i> (Miq.) Engl.	FOD	-	-	-
<i>P. tenuispadix</i> E.G.Gonç.	FOD	-	-	-
<i>P. vargealtense</i> Sakur.*	FOD	-	-	-
<i>P. williamsii</i> Hook.f.*	FOD	-	-	-
<i>Pistia</i> – 1/1				
<i>P. stratiotes</i> Link	FOD, FES	-	-	-
<i>Rhodospatha</i> – 2/ca. 75				
<i>R. latifolia</i> Poepp.	FOD, FED, FES	-	-	-
<i>R. oblongata</i> Poepp.	FOD, FED, FES	-	-	-
<i>Spathicarpa</i> – 1/5				
<i>S. hastifolia</i> Hook.	FES, FOM	-	-	-
<i>Spirodela</i> – 1/3				
<i>S. intermedia</i> W.Koch	FOD, FOM, FAQ	-	-	-
<i>Stenospermation</i> – 1/ca. 60				
<i>S. ulei</i> K.Krause	FOD, FAQ	-	-	-
<i>Syngonium</i> – 1/36				
<i>S. podophyllum</i> Schott	FES, FOD, FED	-	-	-
<i>Taccarum</i> – 2/5				
<i>T. peregrinum</i> (Schott) Engl.	FOM	-	-	-
<i>T. warmingii</i> Engler.	FES	-	-	-
<i>Urospatha</i> – 1/ca. 10				
<i>U. loefgreniana</i> Engl.	FED,	-	-	-
<i>Wolffiella</i> – 1/10				
<i>W. neotropica</i> Landolt	FOD, FAQ	-	-	-
<i>Xanthosoma</i> – 4/57				
<i>X. maximiliani</i> Schott	FOD, FES	-	-	-
<i>X. platylobum</i> Schott	FOM	-	-	-
<i>X. riedelianum</i> (Schott) Schott*	?	-	-	-
<i>X. sagittifolium</i> Liebm.*	FOD	-	-	-
<i>Zomicarpa</i> * – 3/3				
<i>Z. pythonium</i> (Mart.) Schott*	FOD	-	-	-
<i>Z. riedelianum</i> Schott*	FOD	-	-	-
<i>Z. steigeriana</i> Maxim. ex Schott*	FOD	-	-	-

Araliaceae

Pedro Fiaschi & Marcela Firens da Silveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ARALIACEAE – 44/1800				
Aralia – 1/75				
A. warmingiana (Marchal) J.Wen	FES	-	-	-
Dendropanax – 13/100				
D. amorimii Fiaschi*	FOD	-	-	-
D. australis Fiaschi & Jung-Mend.*	FOD	-	-	-
D. bahiensis Fiaschi*	FOD	-	-	-
D. brasiliensis (Seem.) Frodin*	FOD	-	-	-
D. caudatus Fiaschi*	FOD	-	-	-
D. cuneatus (DC.) Decne. & Planch.	FES	-	-	-
D. denticulatus Fiaschi*	FOD	-	-	-
D. exilis (Toledo) Jung-Mend.*	FOD	-	-	-
D. geniculatus Fiaschi*	FES	-	-	-
D. langsdorffii (Marchal) Frodin*	FOD	-	-	-
D. monogynus (Vell.) Seem.*	FOD	-	-	-
D. nebulosus Fiaschi & Jung-Mend.*	FOD	-	-	-
D. trilobus (Gardner) Seem.*	FOD	-	-	-
Hydrocotyle – 15/150				
H. barbarossa Cham. & Schltdl.*	FOD, FOM	-	-	-
H. bonariensis Lam.	FOM, FES, FED, RST	-	-	-
H. bowlesioides Mathias & Constance	FOM, FED	-	-	-
H. callicephala (Cham.) Urb.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
H. exigua (Urb.) Malme*	FOD, FOM, FES	-	-	-
H. hirta R.Br. ex A.Rich.*	FOM	-	-	-
H. itatiaiensis Brade*	FOM, FOD	-	-	-
H. langsdorffii DC.*	FOM, FOD	-	-	-
H. leucocephala Cham. & Schltdl.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
H. pusilla A.Rich.	FOD, FOM, FES	-	-	-
H. quinqueloba Ruiz & Pav.	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
H. ranunculoides L.f.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
H. sibthorpioides Lam.*	FOD	-	-	-
H. ulei H.Wolff*	FOD	-	-	-
H. verticillata Thunb.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
Oreopanax – 2/100				
O. capitatus (Jacq.) Decne. & Planch.	FOD	-	-	-
O. fulvus Marchal*	FOD	-	-	-
Schefflera – 13/800				
S. angustissima (Marchal) Frodin*	FOD, RST	-	-	-
S. aurata Fiaschi*	RST	-	VU	ANEXO II
S. calva (Cham.) Frodin & Fiaschi	FOD, FES	-	-	-
S. capixaba Fiaschi*	FOD	-	-	-
S. grandigemma Fiaschi*	FOD	-	-	-
S. kollmannii Fiaschi*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. longipetiolata</i> (Pohl ex DC.) Frodin & Fiaschi*	FOD	-	-	-
<i>S. morototoni</i> (Aubl.) Maguire <i>et al.</i>	FOD, FES	-	-	-
<i>S. racemifera</i> Fiaschi & Frodin*	FOD	-	-	-
<i>S. ruschiana</i> Fiaschi & Pirani*	FOD	-	-	-
<i>S. selloi</i> (Marchal) Frodin & Fiaschi*	RST	-	-	-
<i>S. succinea</i> Frodin & Fiaschi*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>S. varisiana</i> Frodin	FOD	-	-	-

Arecaceae

Hélio Boudet Fernandes & Amauri Cesar Marcato

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ARECACEAE – 58/2.361				
<i>Acrocomia</i> – 1/2				
<i>A. aculeata</i> (Jacq.) Lodd. <i>ex</i> Mart.	FES, FCA	-	-	-
<i>Allagoptera</i> – 2/4				
<i>A. arenaria</i> (Gomes) Kuntze *	RST, AFL	-	VU	ANEXO II
<i>A. brevicalyx</i> M.Moraes*	RST	-	VU	ANEXO II
<i>Astrocaryum</i> – 1/50				
<i>A. aculeatissimum</i> (Schott) Burret	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Attalea</i> – 7/29				
<i>A. brejinhoensis</i> Glassman	FES	-	-	-
<i>A. dubia</i> (Mart.) Burret*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. funifera</i> Mart. <i>ex</i> Spreng*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
<i>A. humilis</i> Mart. <i>ex</i> Spreng*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>A. oleifera</i> Barb.Rodr*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>A. pindobassu</i> Bondar*	FES	-	-	-
<i>A. salvadorensis</i> Glassman*	FOD	-	-	-
<i>Bactris</i> – 13/240				
<i>B. acanthocarpa</i> Mart.	FOD	-	-	-
<i>B. bahiensis</i> Noblick*	FOD, RST	-	-	-
<i>B. caryotifolia</i> Mart.*	FOD, RST	-	-	-
<i>B. ferruginea</i> Burret*	FOD	-	-	-
<i>B. glassmanii</i> Medeiros-Costa & Noblick*	FOD, RST	-	-	-
<i>B. hatschbachii</i> Noblick*	FOD, RST	-	EN	ANEXO I
<i>B. hirta</i> Mart.	FOD	-	-	-
<i>B. horridispatha</i> Noblick*	FOD, RST	-	-	-
<i>B. pickelli</i> Burret*	FOD	VU	VU	ANEXO II
<i>B. setosa</i> Mart.*	FOD, RST	-	-	-
<i>B. soeiroana</i> Noblick*	RST	-	-	-
<i>B. timbuiensis</i> Boudet Fernandes*	FOD	-	VU	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. vulgaris</i> Barb.Rodr.*	FOD, RST	-	-	-
<i>Butia</i> – 5/8				
<i>B. campicola</i> (Barb.Rodr.) Noblick*	FCA	-	CR	ANEXO II
<i>B. capitata</i> (Mart.) Becc.	RST	-	-	-
<i>B. eriospatha</i> (Mart. ex Drude) Becc.*	FCA, FOM	VU	VU	ANEXO I
<i>B. marmorii</i> Noblick*	FCA	-	-	-
<i>B. microspadix</i> Burret	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>Desmoncus</i> – 2/7				
<i>D. orthacanthos</i> Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>D. polyacanthos</i> Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Euterpe</i> – 2/8				
<i>E. edulis</i> Mart.	FOD, FES, RST, FOM	-	EN	ANEXO I
<i>E. espiritosantensis</i> Boudet Fernandes*	FOD	-	-	-
<i>Geonoma</i> – 10/75				
<i>G. blanchetiana</i> H.Wendl.*	FOD	-	-	-
<i>G. elegans</i> Mart.*	FOD	-	-	-
<i>G. fiscellaria</i> Mart. ex Drude*	FOD	-	-	-
<i>G. gamiova</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>G. pauciflora</i> Mart.*	FOD	-	-	-
<i>G. pohliana</i> Mart.*	FOD	-	-	-
<i>G. rodeiensis</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>G. rubescens</i> Wendl. ex Drude*	FOD	-	-	-
<i>G. schottiana</i> Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>G. wittigiana</i> Glaz. ex Drude*	FOD	-	-	-
<i>Lytocaryum</i> * – 3/3				
<i>L. hoehnei</i> (Burret) Toledo*	FOD	-	-	-
<i>L. insigne</i> (Drude) Toledo*	FOD	-	-	-
<i>L. weddelianum</i> (H.Wendl.) Toledo*	FOD	-	-	-
<i>Polyandrococos</i> * – 1/1				
<i>P. caudescens</i> (Mart.) Barb.Rodr.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Scheelea</i> – 1/?				
<i>S. phalerata</i> (Mart. ex Spreng.) Burret	FES, FCA	-	-	-
<i>Syagrus</i> – 9/30				
<i>S. botryophora</i> (Mart.) Mart.*	FOD	-	-	-
<i>S. coronata</i> (Mart.) Becc.	RST, FOD	-	-	-
<i>S. macrocarpa</i> Barb.Rodr.*	FES, FOD	EN	EN	ANEXO II
<i>S. oleracea</i> (Mart.) Becc.	FES	-	-	-
<i>S. picrophylla</i> Barb.Rodr.*	FOD, FES, AFL, RST	-	VU	ANEXO II
<i>S. pseudococos</i> (Raddi) Glassman *	FOD, FES, AFL, RST	-	-	-
<i>S. romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	FOD, FES, AFL, RST	-	-	-
<i>S. ruschiana</i> (Bondar) Glassman *	AFL, FES	-	VU	ANEXO II
<i>S. schizophylla</i> (Mart.) Glassman *	RST	-	-	-
<i>Trithrinax</i> – 1/3				
<i>T. brasiliensis</i> Mart.	FOM	-	VU	ANEXO II

Aristolochiaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ARISTOLOCHIACEAE – 49/ca. 600				
Aristolochia – 49/ca. 500				
A. arcuata Mast.	FOD, FES, FCA	-	-	-
A. bahiensis F.González*	FOD	-	-	-
A. birostris Duch.*	FOD, FES, RST	-	-	-
A. cauliflora Ule	FOD	-	-	-
A. chamissonis (Klotzsch) Duch.	FOD, FES	-	-	-
A. cymbifera Mart. & Zucc.*	FOD, FES, RST	-	-	-
A. cynanchifolia Mart. & Zucc.*	FOD	-	-	-
A. elegans Mast.	FOD, FES	-	-	-
A. eriantha Mart. & Zucc.*	FOD	-	-	-
A. esperanzae Kuntze	FES	-	-	-
A. fimbriata Cham. & Schltdl.	FES	-	-	-
A. giberti Hook.	FES	-	-	-
A. gigantea Mart. & Zucc.	FES	-	-	-
A. grandiflora Sw.*	FOD	-	-	-
A. hispida Pohl ex Duch.*	FOD	-	-	-
A. hypoglaucha Kuhlm.*	FOD	-	-	-
A. labiata Willd.	FOD, FES, FCA	-	-	-
A. leuconeura Linden*	FOD	-	-	-
A. limae Hoehne*	FOD, FES	-	-	-
A. lindneri A.Berger	FOD	-	-	-
A. lingulata Ule	FOD, FES	-	-	-
A. loefgrenii Hoehne	FOD, FES	-	-	-
A. longispathulata F.González*	FOD	-	-	-
A. macroura Gomes	FOD, FES, RST	-	-	-
A. marianensis Ahumada*	FES	-	-	-
A. maxima Jacq.	FOD	-	-	-
A. melastoma Silva Manso ex Duch.*	FOD, FES	-	-	-
A. mishuyacensis O.C.Schmidt	FOD	-	-	-
A. mossii S.Moore	FOD, FES	-	-	-
A. nevesarmondiana Hoehne*	FOD, FES	-	-	-
A. nummularifolia Kunth	FOD, FCA	-	-	-
A. odora Steud.*	FOD	-	-	-
A. odoratissima L.	FOD, FES	-	-	-
A. papillaris Mast.	FOD	-	-	-
A. paulistana Hoehne*	FOD, RST	-	-	-
A. pilosa Kunth	FOD	-	-	-
A. pistolochia L.*	FOD	-	-	-
A. pohliana Duch.	FOD, FES	-	-	-
A. pubescens (Klotzsch) Klotzsch*	FOD, FES, RST	-	-	-
A. raja Mart. & Zucc.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. ridicula</i> N.E.Br.	FOD, FES	-	-	-
<i>A. ringens</i> Link & Otto*	FOD	-	-	-
<i>A. robertii</i> Ahumada*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. sessilifolia</i> (Klotzsch) Duch.	FOD, FCA	-	-	-
<i>A. tamnifolia</i> (Klotzsch) Duch.*	FOD	-	-	-
<i>A. triangularis</i> Cham. & Schldtl.*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. trilobata</i> L.*	FOD	-	-	-
<i>A. urbaniana</i> Taub.	FES	-	-	-
<i>A. wendeliana</i> Hoehne*	FOD	-	-	-

Asteraceae

Aristônio Magalhães Teles (Coordenador), Benoit Loeuille,
Eric Koiti Okiyama Hattori, Gustavo Heiden, Hortensia Pousada Bautista,
Larissa Grokoviski, Mara Rejane Ritter, Mariana Machado Saavedra,
Nádia Roque, Polyana Noronha Soares, Rafael Augusto Xavier Borges
& Renata Moura de Liro

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ASTERACEAE – 910/23.000				
<i>Acanthospermum</i> – 1/5-6				
<i>A. australe</i> (Loefl.) Kuntze	FCA, AFL	-	-	-
<i>Acanthostyles</i> – 1/1				
<i>A. buniifolius</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>Achyrocline</i> – 6/32				
<i>A. alata</i> DC.	FCA	-	-	-
<i>A. albicans</i> Griseb.	FCA	-	-	-
<i>A. arrojadoana</i> Mattf.	FCA	-	-	-
<i>A. flaccida</i> (Weinm.) DC.	RST	-	-	-
<i>A. macella</i> Deble & Marchiori	FCA	-	-	-
<i>A. satureioides</i> DC.	FCA	-	-	-
<i>Acmella</i> – 10/30				
<i>A. alpestris</i> (Griseb.) R.K.Jansen	FCA	-	-	-
<i>A. bellidioides</i> (Sm.) R.K.Jansen	FCA, AFL	-	-	-
<i>A. brachyglossa</i> Cass.	FOD, FCA, RUD	-	-	-
<i>A. ciliata</i> (Kunth) Cass.	FES	-	-	-
<i>A. decumbens</i> (Sm.) R.K.Jansen	FCA	-	-	-
<i>A. grisea</i> (Chodat) R.K.Jansen	FCA, AFL	-	-	-
<i>A. leptophylla</i> (DC.) R.K.Jansen	FOM, FCA	-	-	-
<i>A. pusilla</i> (Hook. & Arn.) R.K.Jansen	FCA, RST	-	-	-
<i>A. serratifolia</i> R.K.Jansen	FOM, FCA	-	-	-
<i>A. uliginosa</i> (Sw.) Cass.	RST, FAQ	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Adenostemma – 4/26				
A. brasilianum (Pers.) Cass.	FES	-	-	-
A. involucratum R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
A. swartzii Cass.*	FOM	-	-	-
A. verbesina (L.) Kuntze	FOM	-	-	-
Ageratum – 3/40				
A. conyzoides L.	FOD	-	-	-
A. fastigiatum (Gardner) R.M.King & H.Rob.	FOD	-	-	-
A. melissifolium DC.*	FOD	-	-	-
Albertinia – 1/1				
A. brasiliensis Spreng.	FOD, RST, AFL	-	-	-
Ambrosia – 3/30				
A. artemisiifolia L.	RST	-	-	-
A. microcephala DC.	FES, RST	-	-	-
A. tenuifolia Spreng.	RST	-	-	-
Apopyros – 1/2				
A. corymbosus (Hook. & Arn.) G.L.Nesom	FCA	-	-	-
Aspilula – 16/125				
A. clauseniana Baker	FES	-	-	-
A. cupulata Baker	FCA	-	-	-
A. foliacea Baker	FCA	-	-	-
A. fruticosa Baker	FCA	-	-	-
A. hirsuta (Gardn.) Benth. ex Jacks. & Hook.f.	FCA	-	-	-
A. hispidula Baker	?	-	-	-
A. itabaianensis J.U.M.Santos*	FCA	-	-	-
A. martii Baker	?	-	-	-
A. montevidensis (Spreng.) Kuntze	FCA	-	-	-
A. pascalioides Griseb.	?	-	-	-
A. procumbens Baker	?	-	CR	ANEXO I
A. ramosissima (Gardn.) H.Rob.	?	-	-	-
A. reflexa (Sch.Bip. ex Baker) Baker	FCA	-	-	-
A. setosa Griseb.	FCA	-	-	-
A. subalpestris Baker	FCA	-	-	-
A. subpetiolata Baker	?	-	-	-
Asteropsis – 1/1				
A. megapotamica (Spreng.) Marchesi et al.	FCA	-	-	-
Austrocritonia* – 4/4				
A. angulicaulis (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.*	FOD, FCA, FES	-	-	-
A. rosea (Gardner) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
A. taunayana (Glaz. ex B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.*	FCA, AFL	-	-	-
A. velutina (Gardner) R.M.King & H.Rob.*	FOD, FCA, FES	-	-	-
Austroeupatorium – 10/13				
A. apensis (Chodat) R.M.King & H.Rob. *	FOD	-	-	-
A. entreriense (Hieron.) R.M.King & H.Rob.*	FOD	-	-	-
A. inulifolium (Kunth.) R.M.King & H.Rob.	FOD, FED, RST	-	-	-
A. laete-virens (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.*	FOD, FCA, FES, FOM	-	-	-
A. morii R.M.King & H.Rob.*	FES, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. neglectum</i> (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.*	FCA, FOM	-	-	-
<i>A. petrophilum</i> (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
<i>A. picturatum</i> (Mart.) R.M.King & H.Rob.	FOM, FED	-	-	-
<i>A. rosmarinaceum</i> (Cabrera & Vittet) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
<i>A. silphiifolium</i> (Mart.) R.M.King & H.Rob.	FES, FOD	-	-	-
Ayapana – 1/16				
<i>A. amygdalina</i> (Lam.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
Baccharis – 113/ca. 360				
<i>B. aliena</i> (Spreng.) Joch.Müll.	FCA, AFL, RST	-	-	-
<i>B. amambayensis</i> Zardini & Soria*	FES, FCA, FED	-	-	-
<i>B. angusticeps</i> Dusén ex Malme*	FCA	-	-	-
<i>B. anomala</i> DC.*	FOD, FOM, FES, RST, FED	-	-	-
<i>B. aphylla</i> (Vell.) DC.	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. arassatubensis</i> Malag. & Hatschb. ex G.Barroso*	FCA	-	-	-
<i>B. articulata</i> (Lam.) Pers.	FOM, FCA, AFL, FED	-	-	-
<i>B. axillaris</i> DC.*	FOM, FCA	-	-	-
<i>B. bifrons</i> Baker*	FED, RST	-	-	-
<i>B. brevifolia</i> DC.	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. breviseta</i> DC.	FCA, FED	-	-	-
<i>B. calvescens</i> DC.	FOD, FOM, FES, FCA, AFL, RST-	-	-	-
<i>B. camporum</i> DC.	FCA, FED	-	-	-
<i>B. caprariifolia</i> DC.	FCA, AFL, FED	-	-	-
<i>B. ciliata</i> Gardner*	AFL	-	-	-
<i>B. cinerea</i> DC.*	FES, FOD	-	-	-
<i>B. cognata</i> DC.	FCA, AFL, FED	-	-	-
<i>B. conyzoides</i> (Less.) DC.*	FOD	-	-	-
<i>B. coridifolia</i> DC.	FCA, AFL, FED	-	-	-
<i>B. coronata</i> Giuliano*	FCA	-	-	-
<i>B. crispa</i> Spreng.	FCA, AFL, RST, FED	-	-	-
<i>B. cultrata</i> Baker	FCA, RST	-	-	-
<i>B. curitybensis</i> Heering*	FCA, AFL, FOM	-	-	-
<i>B. deblei</i> A.S.Oliveira & Marchiori*	FCA	-	-	-
<i>B. dentata</i> (Vell.) G.Barroso	FCA, AFL, FOD, FED	-	-	-
<i>B. dracunculifolia</i> DC.	FCA, AFL, FOD, FOM, FES, RST, FED	-	-	-
<i>B. dubia</i> Deble & A.S.Oliveira*	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. elaeagnoides</i> Steud. ex Baker*	FCA, AFL, FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>B. erigeroides</i> DC.	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. erioclada</i> DC.*	FCA, FOM	-	-	-
<i>B. gibertii</i> Baker	RST	-	-	-
<i>B. glaziovii</i> Baker*	FOD, FCA, FES, FOM	-	-	-
<i>B. gracilis</i> DC.	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. grandimucronata</i> Malag.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. helichrysoides</i> DC.	FCA, AFL, FED	-	-	-
<i>B. hirta</i> DC.	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. hypericifolia</i> Baker	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. illinita</i> DC.	FCA, FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. incisa</i> Hook. & Arn.	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. intermixta</i> Gardner	FCA, AFL, FES	-	-	-
<i>B. isabelae</i> Soria & Zardini*	FCA, AFL, FED	-	-	-
<i>B. itatiaiae</i> Wawra	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. jocheniana</i> G.Heiden & L.Macias*	FES, FOM, AFL	-	-	-
<i>B. lateralis</i> Baker*	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. leptcephala</i> Baker	FCA, AFL, FED	-	-	-
<i>B. leucocephala</i> Dusén*	FOM, FCA	-	-	-
<i>B. leucopappa</i> DC.	FCA, AFL,	-	-	-
<i>B. ligustrina</i> DC.	FCA, AFL, FES	-	-	-
<i>B. linearifolia</i> (Lam.) Pers.	FCA, AFL, FED	-	-	-
<i>B. longoattenuata</i> A.S.Oliveira	RST, FES	-	-	-
<i>B. lychnophora</i> Gardner	FCA, FES	-	-	-
<i>B. lymanii</i> G.Barroso*	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. macrophylla</i> Dusén*	FCA	-	-	-
<i>B. macroptera</i> D.J.N.Hind	FCA	-	CR	ANEXO II
<i>B. malmei</i> Joch.Müll.	FOD, FES	-	-	-
<i>B. maxima</i> Baker*	FCA	-	-	-
<i>B. medullosa</i> DC.	FCA, AFL, FED	-	-	-
<i>B. megapotamica</i> Spreng.	FCA	-	-	-
<i>B. mesoneura</i> DC.*	AFL	-	-	-
<i>B. microcephala</i> (Less.) DC.	FCA, RST, FED	-	-	-
<i>B. microdonta</i> DC.	FCA, AFL, FES, FED	-	-	-
<i>B. milleflora</i> (Less.) DC.*	FCA	-	-	-
<i>B. muelleri</i> Baker*	FCA, RST	-	-	-
<i>B. myricifolia</i> DC.	FCA	-	-	-
<i>B. myriocephala</i> DC.	FCA, AFL, FOM, FOD, FES, RST, FED	-	-	-
<i>B. nebulae</i> Malag. & Hatschb. ex A.S.Oliveira*	FOD, FCA	-	-	-
<i>B. nummularia</i> Heering ex Malme*	FOM, FCA	-	-	-
<i>B. oblongifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	FCA, FOD, FES, AFL	-	-	-
<i>B. ochracea</i> Spreng.	FCA, RST	-	-	-
<i>B. opuntioides</i> Mart. ex Baker*	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. oreophila</i> Malme*	FCA, FOD, FES	-	-	-
<i>B. organensis</i> Baker*	FCA, FOD, FOM	-	-	-
<i>B. oxydonta</i> DC.*	FOD, FES, FOM, FED	-	-	-
<i>B. palustris</i> Heering*	FCA	-	-	-
<i>B. parvidentata</i> Malag.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. pauciflosculosa</i> DC.*	FCA, FOM	-	-	-
<i>B. pentodonta</i> Malme	FCA, FED	-	-	-
<i>B. pentziifolia</i> Sch.Bip ex Baker	FCA	-	-	-
<i>B. petraea</i> Heering	FCA, FED	-	-	-
<i>B. phyllicifolia</i> DC.	FCA, RST	-	-	-
<i>B. platypoda</i> DC.	FCA, FES, AFL	-	-	-
<i>B. pseudomyriocephala</i> Malag.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. pseudovaccinioides</i> Malag.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. pseudovillosa</i> Malag. & J.E.Vidal*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. psiadioides</i> (Less.) Joch.Müll.	FCA, RST, AFL	-	-	-
<i>B. punctulata</i> DC.	FCA, AFL, FES, FOD, FOM, FED-	-	-	-
<i>B. radicans</i> DC.	FCA, RST	-	-	-
<i>B. ramboi</i> G.Heiden & L.Macias*	FCA, RST	-	-	-
<i>B. regnellii</i> Sch.Bip ex Baker*	FCA	-	-	-
<i>B. reticularia</i> DC.	FCA, AFL, FES, RST	-	-	-
<i>B. retusa</i> DC.	FCA, FED	-	-	-
<i>B. riograndensis</i> Malag. & J.E.Vidal	FCA, AFL, RST	-	-	-
<i>B. rufidula</i> (Spreng.) Joch.Müll.*	FCA, FES, FOD	-	-	-
<i>B. sagittalis</i> (Less.) DC.	FCA, RST, FED	-	-	-
<i>B. schultzei</i> Baker	FCA, FOD, AFL	-	-	-
<i>B. selloi</i> Baker*	FCA, FOM	-	-	-
<i>B. semiserrata</i> DC.*	FCA, FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>B. serrulata</i> (Lam.) Pers.	FCA, FOD, FOM, FES, RST, AFL-	-	-	-
<i>B. sessiliflora</i> Vahl	FCA, FED	-	-	-
<i>B. singularis</i> (Vell.) G.Barroso*	FCA, RST, FOD	-	-	-
<i>B. spicata</i> (Lam.) Baill.	FCA, RST, FED	-	-	-
<i>B. stenocephala</i> Baker	FCA	-	-	-
<i>B. stylosa</i> Gardner*	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. subdentata</i> DC.	FCA, FED	-	-	-
<i>B. tarchonanthoides</i> DC.	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. tridentata</i> Vahl	FCA, AFL, FED	-	-	-
<i>B. trinervis</i> (Lam.) Pers.	FCA, FES, FOM, FOD, RST, AFL, FED	-	-	-
<i>B. uleana</i> Malag.*	FCA	-	-	-
<i>B. uncinella</i> DC.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>B. usterii</i> Heering	FCA, RST	-	-	-
<i>B. vincifolia</i> Baker*	FOM, FCA	-	-	-
<i>B. vulneraria</i> Baker	FCA, FES, RST, FED	-	-	-
<i>B. wagenitzii</i> (F.H.Hellw.) Joch.Müll.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>Bahianthus</i> * – 1/1				
<i>B. viscosus</i> (Spreng.) R.M.King & H.Rob.*	RST	-	-	-
<i>Barnadesia</i> – 1/19				
<i>B. caryophylla</i> (Vell.) S.F.Blake	FCA, FES	-	-	-
<i>Barrosoa</i> – 7/9				
<i>B. apiculata</i> (Gardner) R.M.King & H.Rob. *	RST, FCA, AFL, FOD	-	-	-
<i>B. atlantica</i> R.M.King & H.Rob.*	RST, FES	-	-	-
<i>B. betoniciformis</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	RST, FCA,	-	-	-
<i>B. cabrerai</i> (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
<i>B. candolleana</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>B. organensis</i> (Gardner) R.M.King & H.Rob.	FCA, FOD, AFL	-	-	-
<i>B. ramboi</i> (Cabrera) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
<i>Bejaranoa</i> – 2/2				
<i>B. balansae</i> (Hieron.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>B. semistriata</i> (Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA, FES	-	-	-
<i>Bidens</i> – 12/280				
<i>B. alba</i> (L.) DC.	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. bipinnata</i> L.	FOD	-	-	-
<i>B. gardneri</i> Baker	FES	-	-	-
<i>B. laevis</i> (L.) Britton <i>et al.</i> *	FCA	-	-	-
<i>B. pilosa</i> L.	FOM	-	-	-
<i>B. pinnata</i> Noronha	?	-	-	-
<i>B. riparia</i> Kunth	?	-	-	-
<i>B. rubiflora</i> Kunth	?	-	-	-
<i>B. segetum</i> Mart. <i>ex</i> Colla	FOD	-	-	-
<i>B. squarrosa</i> Kunth	?	-	-	-
<i>B. subalternans</i> DC.	RST	-	-	-
<i>B. urophylla</i> Sherff	FES	-	-	-
<i>Calea</i> – 25/125				
<i>C. acaulis</i> Baker	FCA	-	-	-
<i>C. angusta</i> S.F.Blake	RST	-	-	-
<i>C. asclepiifolia</i> Hassl.	FCA	-	-	-
<i>C. belemii</i> H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>C. candolleana</i> (Gardner) Baker	FCA, RST	-	-	-
<i>C. clauseniana</i> Baker	FCA	-	-	-
<i>C. clematidea</i> Baker	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>C. cuneifolia</i> Baker	FCA	-	-	-
<i>C. cymosa</i> Less.	FCA	-	-	-
<i>C. divergens</i> Baker	FCA	-	-	-
<i>C. fruticosa</i> (Gardner) Urbatsch	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. gentianoides</i> DC.	FCA	-	-	-
<i>C. hispida</i> Baker	FCA	-	-	-
<i>C. ilienii</i> Malme	FCA	-	-	-
<i>C. lemmatioides</i> Baker	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. myrtifolia</i> Baker	FCA	-	-	-
<i>C. nitida</i> Less.	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. phyllolepis</i> Baker	FCA	-	-	-
<i>C. pilosa</i> Baker	FCA	-	-	-
<i>C. pinnatifida</i> (R.Br.) Less.	AFL	-	-	-
<i>C. platylepis</i> Sch.Bip.	FCA	-	-	-
<i>C. rotundifolia</i> (Less.) Baker	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. serrata</i> Less.	FOM, FES, FED	-	-	-
<i>C. sessiliflora</i> Less.	FOM, FCA	-	-	-
<i>C. wedellioides</i> (Baker) S.F.Blake*	AFL	-	-	-
<i>Calyplocarpus</i> – 1/2				
<i>C. biaristatus</i> (DC.) H.Rob.	FOM, FED	-	-	-
<i>Campovassouria</i> – 1/1				
<i>C. cruciata</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob.	FOM	-	-	-
<i>Campuloclinium</i> – 7/14				
<i>C. burchellii</i> (Baker) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
<i>C. chlorolepis</i> (Baker) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
<i>C. macrocephalum</i> (Mart. <i>ex</i> Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>C. parvulum</i> (Glaziou <i>ex</i> B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. purpurascens</i> (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>C. riedelii</i> (Baker) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
<i>C. tubaraoense</i> (Hieron.) R.M.King & H.Rob.*	FOD, RST	-	-	-
<i>Centratherum</i> – 2/3				
<i>C. punctulatum</i> Cass.	FOD, RST	-	-	-
<i>C. violaceum</i> (Schrank) Gleason	RST	-	-	-
<i>Cephalopappus</i> – 1/1				
<i>C. sonchifolius</i> Nees & Mart.	FOD	-	-	-
<i>Chacoa</i> – 1/1				
<i>C. pseudoprasitfolia</i> (Hassl.) R.M.King & H.Rob.	FED	-	-	-
<i>Chaptalia</i> – 8/60				
<i>C. cordifolia</i> (Baker) Cabrera	FOD	-	-	-
<i>C. hermogenis</i> M.D.Moraes*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>C. integerrima</i> (Vell.) Burkart	FCA, RST, AFL	-	-	-
<i>C. mandonii</i> (Sch.Bip.) Burkart	FCA	-	-	-
<i>C. nutans</i> (L.) Polak.	RUD	-	-	-
<i>C. piloselloides</i> (Vahl) Baker	FCA	-	-	-
<i>C. runcinata</i> Kunth	FCA, FOD	-	-	-
<i>C. sinuata</i> (Less.) Baker	FOD, FCA	-	-	-
<i>Chevreulia</i> – 2/6				
<i>C. acuminata</i> Less.	FOM, FCA, AFL	-	-	-
<i>C. sarmentosa</i> (Pers.) S.F.Blake	FCA, AFL	-	-	-
<i>Chionolaena</i> – 6/18				
<i>C. arbuscula</i> DC.	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. capitata</i> (Baker) S.E.Freire	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. glomerata</i> Baker	?	-	-	-
<i>C. isabellae</i> Baker*	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. lychnophorioides</i> Sch.Bip.	FCA, AFL	-	VU	ANEXO II
<i>C. wittigiana</i> Baker	?	-	-	-
<i>Chresta</i> – 1/12				
<i>C. souzae</i> H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>Chromolaena</i> – 28/165				
<i>C. ascendens</i> (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. congesta</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. cylindrocephala</i> (Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. elliptica</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>C. hirsuta</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA, RST	-	-	-
<i>C. ivifolia</i> (L.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>C. kleinii</i> (Cabrera) R.M.King & H.Rob.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. laevigata</i> (Lam.) R.M.King & H.Rob.	FOD, FOM,	-	-	-
<i>C. maximilianii</i> (Schr. ex DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>C. minasgeraesensis</i> (Hieron.) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
<i>C. morii</i> R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>C. multiflosculosa</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. odorata</i> (L.) R.M.King & H.Rob.	FCA, RST	-	-	-
<i>C. oinopolepis</i> (Malme) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. oxylepis</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. palmaris</i> (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. pedalis</i> (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. pedunculosa</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	RST	-	-	-
<i>C. punctulata</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	RST	-	-	-
<i>C. rhinanthacea</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
<i>C. squalida</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA, RST	-	-	-
<i>C. squarrosula</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
<i>C. stachyophylla</i> (Spreng.) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. tecta</i> (Gardner) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>C. ulei</i> (Hieron.) R.M.King & H.Rob.*	RST	-	-	-
<i>C. umbelliformis</i> (Dusén ex Malme) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. verbenacea</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>C. xylorhiza</i> (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>Chrysolaena</i> – 7/9				
<i>C. flexuosa</i> (Sims) H.Rob.*	FCA, AFL, RST	-	-	-
<i>C. guaranitica</i> Dematt.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. lithospermifolia</i> (Hieron.) H.Rob.*	FCA, AFL, RST	-	-	-
<i>C. oligophylla</i> (Vell.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. platensis</i> (Spreng.) H.Rob.	FCA, RST	-	-	-
<i>C. propinqua</i> (Hieron.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. verbascifolia</i> (Less.) H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>Clibadium</i> – 1/24				
<i>C. armanii</i> (Balb.) Sch.Bip. ex O.E.Schulz	FCA	-	-	-
<i>Conocliniopsis</i> – 1/1				
<i>C. prasiifolia</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	RST	-	-	-
<i>Conyza</i> – 10/60-100				
<i>C. blakei</i> (Cabrera) Cabrera	FCA, RST, FED	-	-	-
<i>C. bonariensis</i> (L.) Cronquist	AFL, FCA, RST, FOD, FES, FED	-	-	-
<i>C. catharinensis</i> Cabrera*	FCA	-	-	-
<i>C. glandulitecta</i> Cabrera*	FCA, FED	-	-	-
<i>C. macrophylla</i> Spreng.*	FCA	-	-	-
<i>C. monorchis</i> (Griseb.) Cabrera	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. primulifolia</i> (Lam.) Cuatr. & Lourteig	FCA, FOM, FOD, FES, FED	-	-	-
<i>C. reitziana</i> Cabrera*	FCA	-	-	-
<i>C. retirensis</i> Cabrera*	FCA, RST	-	-	-
<i>C. sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker	FCA, FED	-	-	-
<i>Criscia</i> – 1/1				
<i>C. stricta</i> (Spreng.) Katinas	FOM, FCA	-	-	-
<i>Critoniopsis</i> – 2/76				
<i>C. quinqueflora</i> (Less.) H.Rob.	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. stellata</i> (Spreng.) H.Rob.	FOD	-	-	-
<i>Cyrtocymura</i> – 2/6				
<i>C. mattsos-silvae</i> (H.Rob.) H.Rob.	FOD, RST	-	-	-
<i>C. scorpioides</i> (Lam.) Pers.	FOD, FOM, FES, FCA, AFL, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Dasyanthina – 1/2				
D. serrata (Less.) H.Rob.	RST	-	-	-
Dasycondylus – 1/8				
D. debeauxii (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	FOD	-	-	-
Dasyphyllum – 20/40				
D. brasiliense (Spreng.) Cabrera	FOD, FES	-	-	-
D. candolleanum (Gardner) Cabrera	FES, AFL	-	-	-
D. cryptocephalum (Baker) Cabrera*	FOD, FCA	-	-	-
D. flagellare (Casar.) Cabrera	FCA, FOD	-	-	-
D. floribundum (Gardner) Cabrera	?	-	-	-
D. fodinarum (Gardner) Cabrera*	FOD, FCA	-	-	-
D. lanceolatum (Less.) Cabrera*	FOD	-	-	-
D. latifolium (Gardner) Cabrera	?	-	-	-
D. leptacanthum (Gardner) Cabrera	FOD	-	-	-
D. maria-lianae Zardini & Soria*	?	-	-	-
D. orthacanthum (DC.) Cabrera	FOD	-	-	-
D. spinescens (Less.) Cabrera*	FOD	-	-	-
D. sprengelianum (Gardner) Cabrera	FES, FCA	-	-	-
D. synacanthum (Baker) Cabrera	FOD	-	-	-
D. tomentosum (Spreng.) Cabrera	FOD	-	-	-
D. trichophyllum (Baker) Cabrera	?	-	-	-
D. vagans (Gardner) Cabrera	FCA, FOD	-	-	-
D. varians (Gardner) Cabrera	?	-	-	-
D. velutinum (Baker) Cabrera	FOD, FCA	-	-	-
D. vepreculatum (D.Don) Cabrera	?	-	-	-
Delilia – 1/2				
D. biflora (L.) Kuntze	FES	-	-	-
Dendrophorbium – 9/75				
D. brachycodon (Baker) C.Jeffrey*	FCA	-	-	-
D. bradei (Cabrera) C.Jeffrey*	FCA	-	-	-
D. catharinense (Dusén ex Cabrera) C.Jeffrey*	FED	-	CR	ANEXO II
D. fastigiaticephalum (Cabrera) C.Jeffrey*	FCA	-	-	-
D. fruticosum (Vell.) C.Jeffrey*	FCA	-	-	-
D. glaziovii (Baker) C.Jeffrey*	FOD	-	-	-
D. limosum C.Jeffrey*	FOD	-	-	-
D. pellucidinerve (Sch.Bip. ex Baker) C. Jeffrey*	FCA	-	-	-
D. restingae A.Teles et al. *	RST	-	-	-
Diacranthera* – 3/3				
D. crenata (Mart.) R.M.King & H.Rob.*	RST, FOD	-	-	-
D. hebeclinia H.Rob.*	FOD, FCA	-	-	-
D. ulei R.M.King & H.Rob.*	FOD, FCA	-	-	-
Disynaphia – 12/16				
D. senecionidea (Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
D. achillea (Chodat) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
D. calyculata (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	RST	-	-	-
D. ericoides (DC.) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>D. filifolia</i> (Hassl.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>D. ligulifolia</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>D. littoralis</i> (Cabrera) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
<i>D. multicrenulata</i> (Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA, FOM	-	-	-
<i>D. radula</i> (Chod.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>D. senecionidea</i> (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>D. spathulata</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>D. variolata</i> (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>Elephantopus</i> – 3/12				
<i>E. hirtiflorus</i> DC.	FOM, RST	-	-	-
<i>E. mollis</i> Kunth	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. scaber</i> L.	FCA	-	-	-
<i>Enydra</i> – 4/10				
<i>E. anagallis</i> Gardner	RST	-	-	-
<i>E. fluctuans</i> Lour.	RST	-	-	-
<i>E. rivularis</i> Gardner	FCA	-	-	-
<i>E. sessilis</i> (Sw.) DC.	FCA, RST	-	-	-
<i>Epaltes</i> – 1/14				
<i>E. brasiliensis</i> DC.	FCA, RST	-	-	-
<i>Eremanthus</i> – 4/25				
<i>E. capitatus</i> (Spreng.) MacLeish	FCA, RST	-	-	-
<i>E. crotonoides</i> (DC.) Sch.Bip.	AFL, FCA, FOD	-	-	-
<i>E. erythropappus</i> (DC.) MacLeish	AFL, FCA, FOD, RST	-	-	-
<i>E. incanus</i> (Less.) Less.	AFL, FCA	-	-	-
<i>Facelis</i> – 1/4				
<i>F. retusa</i> (Lam.) Sch.Bip.	FCA, RST	-	-	-
<i>Fleischmannia</i> – 5/95				
<i>F. dissolvens</i> (Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>F. laxa</i> (Gardner) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>F. laxicephala</i> (Cabrera) R.M.King & H.Rob.*	FOD	-	-	-
<i>F. microstemon</i> (Cass.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>F. remotifolia</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	FOD, FCA	-	-	-
<i>Galinsoga</i> – 2/17				
<i>G. ciliata</i> (Raf.) S.F.Blake	FCA	-	-	-
<i>G. parvifolia</i> Cav.	FOM, FCA	-	-	-
<i>Gamochaeta</i> – 7/50-80				
<i>G. americana</i> (Mill.) Wedd.	FCA, AFL	-	-	-
<i>G. calviceps</i> (Fernald) Cabrera	FCA	-	-	-
<i>G. falcata</i> (Lam.) Cabrera	FCA	-	-	-
<i>G. filaginea</i> (DC.) Cabrera	FCA, RST	-	-	-
<i>G. hiemalis</i> (Rizzini) Cabrera	?	-	-	-
<i>G. pennsylvanica</i> (Willd.) Cabrera	FCA	-	-	-
<i>G. purpurea</i> (L.) Cabrera	FCA	-	-	-
<i>Gnaphalium</i> – 2/ca. 80				
<i>G. cheiranthifolium</i> Lam.	FCA	-	-	-
<i>G. gaudichaudianum</i> DC.	FOD, FOM, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Gochnatia – 14/ca. 60				
G. argyrea (Dusén ex Malme) Cabrera*	FCA	-	-	-
G. barrosii Cabrera	FCA	-	-	-
G. blanchetiana (DC.) Cabrera	AFL	-	-	-
G. floribunda Cabrera	FCA	-	-	-
G. haumaniana Cabrera	FCA	-	-	-
G. mollissima (Malme) Cabrera	FOD	-	-	-
G. orbiculata (Malme) Cabrera	FCA	-	VU	ANEXO II
G. paniculata (Less.) Cabrera	FCA, FOD	-	-	-
G. polymorpha (Less.) Cabrera	FCA, FOD	-	-	-
G. pulchra Cabrera	FCA, FOD	-	-	-
G. ramboi Cabrera	FCA	-	-	-
G. rotundifolia Less.	FCA	-	-	-
G. sordida (Less.) Cabrera	FOD	-	-	-
G. velutina (Bong.) Cabrera	FCA	-	-	-
Gorceixia – 1/1				
G. decurrens Baker	?	-	-	-
Graphistylis* – 9/9				
G. argyrotricha (Dusén) B.Nord.*	FCA	-	-	-
G. cuneifolia (Dusén) B.Nord.*	FCA	-	-	-
G. dichroa (Bong.) D.J.N.Hind*	FCA	-	-	-
G. itatiaiae (Dusén) B.Nord.*	FCA	-	-	-
G. oreophila (Dusén) B.Nord.*	FCA	-	-	-
G. organensis (Casar.) B.Nord.*	FCA	-	-	-
G. riopretensis A.Teles & B.Nord.*	FCA	-	-	-
G. serrana (Zardini) B.Nord.*	FCA	-	-	-
G. toledoii (Cabrera) B.Nord.*	FCA	-	-	-
Grazielia – 10/11				
G. alpestris (Gardner) R.L.Esteves	FOM, FCA	-	-	-
G. anethifolia (DC.) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
G. coriacea (Scheele) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
G. dimorpholepis (Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
G. gaudichaudiana (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
G. intermedia (DC.) R.M.King & H.Rob.	FOM, FCA	-	-	-
G. multifida (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
G. nummularia (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
G. schultzei R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
G. serrata (Spreng.) R.M.King & H.Rob.	FOM, FCA	-	-	-
Grindelia – 1/ca. 70				
G. scorzonifolia Hook. & Arn.	FCA, FED	-	-	-
Gyptidium – 1/2				
G. trichobasis (Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
Gyptis – 5/7				
G. crassipes (Hieron.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
G. lanigera (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
G. pinnatifida Cass.	FCA, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>G. tanacetifolia</i> Cass.	FCA, AFL	-	-	-
<i>G. vernonioides</i> (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
<i>Hatschbachiella</i> – 2/2				
<i>H. polyclada</i> (Dusén ex Malme) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>H. tweediana</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FOM, FCA, AFL	-	-	-
<i>Hebeclinium</i> – 1/20				
<i>H. macrophyllum</i> (L.) DC.	FOD	-	-	-
<i>Helenium</i> – 1/30				
<i>H. alternifolium</i> Cabrera	FCA	-	-	-
<i>Heterocondylus</i> – 11/13				
<i>H. alatus</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob.	FCA, FES, RST, FOD, AFL	-	-	-
<i>H. amphidictyus</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>H. grandis</i> (Sch.Bip.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>H. itacolumiensis</i> (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
<i>H. jaraguensis</i> (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.*	FCA, FOD	-	-	-
<i>H. leptolepis</i> (Baker) R.M.King & H.Rob.*	FCA	-	-	-
<i>H. pandurifolius</i> (Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>H. pumilus</i> (Gardner) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>H. reitzii</i> R.M.King & H.Rob. *	FCA, AFL	-	-	-
<i>H. vauthierianus</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	FOM, FCA	-	-	-
<i>H. vitalbae</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	FOD, FES, FOM, AFL	-	-	-
<i>Hieracium</i> – 3/ca. 90				
<i>H. commersonii</i> Monnier	FCA	-	-	-
<i>H. ignatianum</i> Baker	FCA, AFL	-	-	-
<i>H. urvillei</i> Sch.Bip.	FCA, AFL	-	-	-
<i>Holocheilus</i> – 5/7				
<i>H. brasiliensis</i> (L.) Cabrera	FCA, AFL	-	-	-
<i>H. hieracioides</i> (D.Don) Cabrera	?	-	-	-
<i>H. illustris</i> (Vell.) Cabrera	FCA	-	-	-
<i>H. pinnatifidus</i> (Less.) Cabrera	FOD, FOM, FCA	-	-	-
<i>H. schultzii</i> (Cabrera) Cabrera	FCA	-	-	-
<i>Hypochaeris</i> – 5/ca. 50				
<i>H. albiflora</i> (Kuntze) Azevedo-Gonçalves & Matzenbacher*?		-	-	-
<i>H. brasiliensis</i> (Hook. & Arn.) Baker	FCA	-	-	-
<i>H. catharinensis</i> Cabrera*	FCA, AFL	-	-	-
<i>H. gardneri</i> Baker	FCA, AFL	-	-	-
<i>H. lutea</i> (Sch.Bip.) Cabrera	FCA, BRE*	-	-	-
<i>Hysterionica</i> – 2/7				
<i>H. pinnatiloba</i> Matzenb. & Sobral*	AFL	-	CR	ANEXO II
<i>H. pinnatisecta</i> Matzenb. & Sobral*	AFL	-	CR	ANEXO I
<i>Ichthyothere</i> – 3/20				
<i>I. mollis</i> Baker	FCA	-	-	-
<i>I. rufa</i> Gardner	FCA	-	-	-
<i>I. terminalis</i> (Spreng.) Blake	FOD	-	-	-
<i>Inulopsis</i> – 2/4				
<i>I. scaposa</i> (DC.) O.Hoffm.	FCA, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>I. stenophylla</i> Dusén*	FCA	-	-	-
<i>Jungia</i> – 2/ca. 32				
<i>J. floribunda</i> Less.	FOM, FED	-	-	-
<i>J. sellowii</i> Less.	FCA, AFL	-	-	-
<i>Kaunia</i> – 1/14				
<i>K. rufescens</i> (Lund. ex DC.) R.M.King & H.Rob.	FOD	-	-	-
<i>Koanophyllon</i> – 7/ca. 120				
<i>K. baccharifolium</i> (Gardner) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
<i>K. conglobatum</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>K. consanguineum</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	RST	-	-	-
<i>K. lobatifolium</i> (Cabrera) R.M.King & H.Rob.*	FOD	-	-	-
<i>K. simillimum</i> (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>K. thysanolepis</i> (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>K. tinctorium</i> Arruda	FOD	-	-	-
<i>Lepidaploa</i> – 20/ca. 130				
<i>L. alvimii</i> (H.Rob.) H.Rob.	FOD, RST	-	-	-
<i>L. araripensis</i> (Gardner) H.Rob.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>L. argyrotricha</i> (Sch.Bip. ex Baker) H.Rob.	FOD, FES	-	-	-
<i>L. balansae</i> (Hieron.) H.Rob.	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. chalybaea</i> (Mart. ex DC.) H.Rob.	FED, RST	-	-	-
<i>L. chamissonis</i> (Less.) H.Rob.*	FOD, RST	-	-	-
<i>L. eriolepis</i> (Gardner) H.Rob.	FOM, FCA, AFL	-	-	-
<i>L. macahensis</i> (Glaz. ex G.Barroso) H.Rob.	FOD	-	-	-
<i>L. mucronifolia</i> (DC.) H.Rob.	RST	-	-	-
<i>L. muricata</i> (DC.) H.Rob.	RST	-	-	-
<i>L. obtusifolia</i> (Less.) H.Rob.	RST	-	-	-
<i>L. persicea</i> (H.Rob.) H.Rob.	RST	-	-	-
<i>L. persicifolia</i> (Desf.) H.Rob.	RST	-	-	-
<i>L. reflexa</i> (Gardner) H.Rob.	FED	-	-	-
<i>L. remotiflora</i> (Rich.) H.Rob.	FOD, RST	-	-	-
<i>L. rufogrisea</i> (A.St.-Hil.) H.Rob.	RST	-	-	-
<i>L. salzmännii</i> (DC.) H.Rob.	FED, FES	-	-	-
<i>L. sororia</i> (DC.) H.Rob.	FOD, FCA, RST	-	-	-
<i>L. subsquarrosa</i> (DC.) H.Rob.	FOD, RST	-	-	-
<i>L. vauthieriana</i> (DC.) H.Rob.	FES	-	-	-
<i>Leptostelma</i> – 4/6				
<i>L. camposportoi</i> (Cabrera) A.Teles & Sobral*	FCA, AFL	-	-	-
<i>L. catharinensis</i> (Cabrera) A.Teles & Sobral*	FCA, AFL	-	-	-
<i>L. maxima</i> D.Don	FCA, AFL, RST, FOM, FOD, FED-	-	-	-
<i>L. tweediei</i> (Hook. & Arn.) D.J.N.Hind & G.L.Nesom	FCA, AFL, FED	-	-	-
<i>Lessingianthus</i> – 18/ca. 102				
<i>L. brevifolius</i> (Less.) H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>L. cataractarum</i> (Hieron.) H.Rob.	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. decumbens</i> (Gardner) H.Rob.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>L. exiguus</i> (Cabrera) H.Rob.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>L. glabratus</i> (Less.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>L. hypochaeris</i> (DC.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>L. ibitipocensis</i> R.Borges & Dematt.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>L. lorentzii</i> (Hieron.) H.Rob.*	FCA	-	-	-
<i>L. macrophyllus</i> (Less.) H.Rob.	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. mollissimus</i> (D.Don ex Hook. & Arn.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>L. niederleinii</i> (Hieron.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>L. plantaginodes</i> (Kuntze) H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>L. polyphyllus</i> (Sch.Bip. ex Baker) H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>L. reitzianus</i> (Cabrera) H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>L. rubricaulis</i> (Humb. & Bonpl.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>L. sellowii</i> (Less.) H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>L. simplex</i> (Less.) H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>L. ulei</i> (Hieron.) H.Rob.	RST	-	-	-
<i>Litothamnus</i> * – 3/3				
<i>L. ellipticus</i> R.M.King & H.Rob. *	RST	-	-	-
<i>L. nitidus</i> (DC.) W.C.Holmes*	RST	-	-	-
<i>L. saundersiae</i> B.L.Turner*	RST	-	-	-
<i>Lourteigia</i> – 1/ca. 11				
<i>L. ballotifolia</i> (Kunth) R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
<i>Lucilia</i> – 5/11				
<i>L. acutifolia</i> (Poir.) Cass.	FCA, AFL, RST	-	-	-
<i>L. ferruginea</i> Baker*	FCA, AFL	-	-	-
<i>L. flagelliformis</i> Weddell	FCA	-	-	-
<i>L. linearifolia</i> Baker	FCA, AFL	-	-	-
<i>L. nitens</i> Less.	FCA, AFL, RST	-	-	-
<i>Macropodina</i> – 3/3				
<i>M. blumenavii</i> (Hieron.) R.M.King & H.Rob.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>M. bradei</i> R.M.King & H.Rob.*	FCA, FOD	-	-	-
<i>M. reitzii</i> R.M.King & H.Rob.	FOM	-	-	-
<i>Malmeanthus</i> – 1/3				
<i>M. subintegerrimus</i> (Malme) R.M.King & H.Rob.	FOM	-	-	-
<i>Melampodium</i> – 1/40				
<i>M. divaricatum</i> (Rich.) DC.	RST	-	-	-
<i>Melanthera</i> – 1/20				
<i>M. latifolia</i> (Gardner) Cabrera	FOM	-	-	-
<i>Mikania</i> – 122/ca. 400				
<i>M. acuminata</i> DC.	FOD, FCA	-	-	-
<i>M. additicia</i> B.L.Rob.	?	-	-	-
<i>M. alexandrae</i> G.Barroso	FOD	-	-	-
<i>M. argyriae</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>M. barrosoana</i> G.Barroso	?	-	-	-
<i>M. belemii</i> R.M.King & H.Rob.*	FOD	-	-	-
<i>M. biformis</i> DC.	?	-	-	-
<i>M. bradei</i> B.L.Rob.	?	-	-	-
<i>M. brunnescens</i> B.L.Rob.	?	-	-	-
<i>M. buddleiifolia</i> DC.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. burchellii</i> Baker*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. cabreræ</i> G.Barroso	?	-	-	-
<i>M. campanulata</i> Gardner*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. camporum</i> B.L.Rob.	?	-	-	-
<i>M. campos-portoana</i> G.Barroso	FOD	-	-	-
<i>M. capricornii</i> B.L.Rob.	FES, FCA	-	VU	ANEXO II
<i>M. cardiophylla</i> B.L.Rob.	?	-	-	-
<i>M. casarettoi</i> B.L.Rob.	FOD	-	-	-
<i>M. chlorolepis</i> Baker	FOD, FED	-	-	-
<i>M. citriodora</i> W.C.Holmes	?	-	-	-
<i>M. clematidifolia</i> Dusén*	FOD	-	-	-
<i>M. coarctata</i> Gardner	?	-	-	-
<i>M. conferta</i> Gardner*	FOD	-	-	-
<i>M. confertissima</i> Sch.Bip.	FOD	-	-	-
<i>M. cordifolia</i> (L.f.) Willd.	FOD	-	-	-
<i>M. cynanchifolia</i> Hook. & Arn. ex B.L.Rob.	FOD	-	-	-
<i>M. decumbens</i> Malme	FOM, FCA	-	-	-
<i>M. diversifolia</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>M. duckei</i> G.Barroso	?	-	-	-
<i>M. dusenii</i> B.L.Rob.	FED	-	-	-
<i>M. erioclada</i> DC.	?	-	-	-
<i>M. eriostrepta</i> B.L.Rob.	?	-	-	-
<i>M. firmula</i> Baker	?	-	-	-
<i>M. fulva</i> Baker	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>M. glaziovii</i> Baker	?	-	-	-
<i>M. glomerata</i> Spreng.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>M. guilleminii</i> B.L.Rob.	?	-	-	-
<i>M. hastato-cordata</i> Malme*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. hastifolia</i> Baker	?	-	-	-
<i>M. hemisphaerica</i> Sch.Bip ex Baker	FOD	-	-	-
<i>M. hirsutissima</i> DC.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>M. hoehnei</i> B.L.Rob.*	FOD	-	-	-
<i>M. hoffmanniana</i> Dusén*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. inordinata</i> R.M.King & H.Rob.*	FOD, RST	-	-	-
<i>M. involucrata</i> Hook. & Arn.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>M. kleiniana</i> Cabrera*	FCA	-	-	-
<i>M. kubitzkii</i> R.M.King & H.Rob.	?	-	-	-
<i>M. laevigata</i> Sch.Bip. ex Baker*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>M. lanuginosa</i> DC.	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. lasiandrae</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>M. latisquama</i> Cabrera*	FOD	-	-	-
<i>M. leiolaena</i> DC.	?	-	-	-
<i>M. leptotricha</i> Baker	?	-	-	-
<i>M. ligustrifolia</i> DC.	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. lindbergii</i> Baker*	FOD	-	-	-
<i>M. lindleyana</i> DC.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. linearifolia</i> DC.	?	-	-	-
<i>M. longipes</i> Baker	?	-	-	-
<i>M. lundiana</i> DC.	FOD	-	-	-
<i>M. mattos-silvae</i> R.M.King & H.Rob.*	FOD	-	-	-
<i>M. micrantha</i> Kunth	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>M. microdonta</i> DC.	?	-	-	-
<i>M. microlepis</i> Baker*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. microphylla</i> Sch.Bip.	?	-	-	-
<i>M. microptera</i> DC.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. morii</i> R.M.King & H.Rob.*	FOD, RST	-	-	-
<i>M. mosenii</i> Malme	?	-	EN	ANEXO II
<i>M. myriocephala</i> DC.	?	-	-	-
<i>M. neurocaula</i> DC.	?	-	-	-
<i>M. nodulosa</i> Sch.Bip.	?	-	-	-
<i>M. nummularia</i> DC.	?	-	-	-
<i>M. oblongifolia</i> DC.*	FOM	-	-	-
<i>M. obsoleta</i> (Vell.) G.Barroso*	FOD	-	-	-
<i>M. obtusata</i> DC.	?	-	-	-
<i>M. officinalis</i> Mart.	FOM	-	-	-
<i>M. oliveirae</i> R.Esteves & Capel	?	-	-	-
<i>M. oreophila</i> Ritter & Miotto *	FOM	-	-	-
<i>M. orleansensis</i> Hieron.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. pacei</i> W.C.Holmes	?	-	-	-
<i>M. pachychaeta</i> (Baker) G.Barroso	?	-	-	-
<i>M. paniculata</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>M. paranahybensis</i> G.Barroso	?	-	-	-
<i>M. paranensis</i> Dusén*	FOM	-	-	-
<i>M. parodii</i> Cabrera	FOD, FES	-	-	-
<i>M. parvifolia</i> Baker	?	-	-	-
<i>M. phaeoclados</i> Mart.	?	-	-	-
<i>M. pinnatiloba</i> DC.	FCA, AFL	-	-	-
<i>M. populifolia</i> Gardner	?	-	-	-
<i>M. pseudohoffmanniana</i> G.Barroso	FOM	-	-	-
<i>M. ramosissima</i> Gardner	?	-	-	-
<i>M. retifolia</i> Sch.Bip.	?	-	-	-
<i>M. reynoldsii</i> W.C.Holmes	?	-	-	-
<i>M. rothii</i> G.Barroso	?	-	-	-
<i>M. rotundifolia</i> G.Barroso	?	-	-	-
<i>M. rufescens</i> Sch.Bip.*	FOD	-	-	-
<i>M. salicifolia</i> Hassl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. salzmanniifolia</i> DC.	?	-	-	-
<i>M. santosii</i> R.M.King & H.Rob.*	FOD	-	-	-
<i>M. scabrida</i> Baker	?	-	-	-
<i>M. schenckii</i> Hieron.	?	-	-	-
<i>M. sericea</i> Hook. & Arn.*	FOD	-	-	-
<i>M. sessilifolia</i> DC.	FCA, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. setigera</i> Sch.Bip.	?	-	-	-
<i>M. smaragdina</i> Dusén ex Malme *	FOM	-	-	-
<i>M. stenomeres</i> B.L.Rob.	?	-	-	-
<i>M. stipulacea</i> Willd.	FOM	-	-	-
<i>M. stylosa</i> Gardner	?	-	-	-
<i>M. subverticillata</i> Baker	?	-	-	-
<i>M. sulcata</i> (Hook. & Arn.) B.L.Rob.	?	-	-	-
<i>M. ternata</i> (Vell.) B.L.Rob.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>M. ternifolia</i> DC.	FCA, AFL	-	-	-
<i>M. testudinaria</i> DC.	?	-	-	-
<i>M. triangularis</i> Baker*	FOD	-	-	-
<i>M. trinervis</i> Hook. & Arn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. ulei</i> Hieron.*	FOD	-	-	-
<i>M. variifolia</i> Hieron.*	FOD	-	-	-
<i>M. vauthieriana</i> Baker	FOD	-	-	-
<i>M. viminea</i> DC.*	FES	-	-	-
<i>M. virgata</i> B.L.Rob.	?	-	-	-
<i>M. vismifolia</i> DC.	?	-	-	-
<i>M. vitifolia</i> DC.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>M. warmingii</i> Sch.Bip.	?	-	-	-
<i>Moquinia</i> – 1/1				
<i>M. racemosa</i> (Spreng.) DC.	FES, FCA	-	-	-
<i>Mutisia</i> – 3/ca. 62				
<i>M. campanulata</i> Less.	FES, RST	-	-	-
<i>M. coccinea</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. speciosa</i> Aiton ex Hook.	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>Neja</i> – 2/6				
<i>N. filiformis</i> (Spreng.) Nees	FCA, AFL	-	-	-
<i>N. pinifolia</i> (Poir.) G.L.Nesom	FCA, AFL	-	-	-
<i>Neocabreria</i> – 3/5				
<i>N. catharinensis</i> (Cabrera) R.M.King & H.Rob.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>N. malacophylla</i> (Klatt) R.M.King & H.Rob.	FOM, FED	-	-	-
<i>N. serrulata</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>Noticastrum</i> – 7/19				
<i>N. calvatum</i> (Baker) Cuatrec.	FCA, RST, FOM	-	-	-
<i>N. decumbens</i> (Baker) Cuatrec.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>N. diffusum</i> (Pers.) Cabrera	FCA	-	-	-
<i>N. gnaphalioides</i> (Baker) Cuatrec.	FCA, FED	-	-	-
<i>N. hatschbachii</i> Zardini*	FCA, RST	-	VU	ANEXO II
<i>N. malmei</i> Zardini*	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>N. psammophilum</i> (Klatt) Cuatrec.*	RST	-	VU	ANEXO II
<i>Ophryosporus</i> – 10/37				
<i>O. axilliflorus</i> (Griseb.) Hieron.	FOD, FCA	-	-	-
<i>O. burkartii</i> Cabrera*	FOD	-	-	-
<i>O. charua</i> (Griseb.) Hieron.	FOD, FCA	-	-	-
<i>O. freyreysii</i> (Thunb.) Baker	FOD, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>O. laxiflorus</i> Baker	FCA	-	-	-
<i>O. lorentzii</i> Hieron.	FOD, FCA	-	-	-
<i>O. macrodon</i> Griseb.	FCA	-	-	-
<i>O. organensis</i> Cabrera*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>O. piqueroides</i> (DC.) Benth. ex Baker	FCA, FOD	-	-	-
<i>O. regnellii</i> Baker	FCA, FOD	-	-	-
<i>Orthopappus</i> – 1/1				
<i>O. angustifolius</i> (Sw.) Gleason	FCA, RST	-	-	-
<i>Pamphalea</i> – 2/9				
<i>P. bupleurifolia</i> Less.	FCA, AFL	-	VU	ANEXO II
<i>P. cardaminifolia</i> Less.	FCA, AFL	-	-	-
<i>Pectis</i> – 2/ca. 85				
<i>P. brevipedunculata</i> (Gardner) Sch.Bip.	FCA, RUD	-	-	-
<i>P. rigida</i> Baker*	FCA	-	-	-
<i>Pentacalia</i> – 2/ca. 200				
<i>P. desiderabilis</i> (Vell) Cuatrec.*	FCA	-	-	-
<i>P. tropicalis</i> (Cabrera) C.Jeffrey*	FCA	-	-	-
<i>Perezia</i> – 1/ca. 32				
<i>P. cubataensis</i> Less.	FCA	-	-	-
<i>Picrosia</i> – 2/2				
<i>P. cabreriana</i> A.G.Schulz	?	-	-	-
<i>P. longifolia</i> D.Don	FES, FCA, RST	-	-	-
<i>Piptocarpha</i> – 23/43				
<i>P. angustifolia</i> Dusén ex Malme*	FOM	-	-	-
<i>P. axillaris</i> (Less.) Baker*	FOM, FOD	-	-	-
<i>P. brasiliensis</i> Cass.*	FOD	-	-	-
<i>P. densifolia</i> Dusén ex G.Lom.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>P. isotricha</i> (DC.) Cabrera & Vittet	FOD	-	-	-
<i>P. leprosa</i> (Less.) Baker	FOD	-	-	-
<i>P. lucida</i> (Spreng.) Benn. ex Baker*	FOD	-	-	-
<i>P. lundiana</i> (Less.) Baker*	FOD	-	-	-
<i>P. macropoda</i> (DC.) Baker	FOD	-	-	-
<i>P. notata</i> (Less.) Baker*	FOD	-	-	-
<i>P. oblonga</i> (Gardner) Baker	FOD	-	-	-
<i>P. organensis</i> Cabrera*	FOD	-	-	-
<i>P. pyriformis</i> (DC.) Baker*	FOD	-	-	-
<i>P. quadrangularis</i> (Vell.) Baker*	FOD	-	-	-
<i>P. ramboi</i> G.Lon.Sm.*	FOM	-	-	-
<i>P. ramiflora</i> (Spreng.) Baker*	FOD	-	-	-
<i>P. regnellii</i> (Sch.Bip.) Cabrera*	FOM	-	-	-
<i>P. reitzii</i> Cabrera*	FOD	-	-	-
<i>P. riedelii</i> (Sch.Bip.) Baker*	FOD	-	-	-
<i>P. robusta</i> G.Barroso*	FOD	-	-	-
<i>P. sellowii</i> (Sch.Bip.) Baker*	FES	-	-	-
<i>P. tomentosa</i> Baker	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. verticillata</i> (Vell.) G.Lon.Sm. ex H.Rob.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Pluchea – 4/ca. 80				
P. laxiflora Hook. & Arn. ex Baker*	FOD, FOM, RST	-	-	-
P. oblongifolia DC.	FCA	-	-	-
P. sagittalis (Lam.) Cabrera	RST	-	-	-
P. suaveolens (Vell.) Kuntze	FOD, FCA	-	-	-
Podocoma – 6/ca. 9				
P. asperima Dusén ex Malme*	FCA	-	-	-
P. bellidifolia Baker	FCA, FED	-	-	-
P. hieraciifolia (Poir.) Cass.	FCA, FED	-	-	-
P. hirsuta (Hook. & Arn.) Baker	FCA	-	-	-
P. notobellidiastrum (Griseb.) G.L.Nesom	FOD, AFL, FCA, FOM, FED	-	-	-
P. rivularis (Gardner) G.L.Nesom*	FOD	-	-	-
Polymnia – 2/3				
P. connata (Spreng.) S.F.Blake	FOM	-	-	-
P. silphioides DC.	FCA	-	-	-
Porophyllum – 3/30				
P. lanceolatum DC.	FCA	-	-	-
P. obscurum (Spreng.) DC.	FCA	-	-	-
P. ruderae (Jacq.) Cass.	FCA, RUD	-	-	-
Praxelis – 5/14				
P. clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob.	FOM, RST	-	-	-
P. grandiflora (DC.) Sch.Bip	FCA	-	-	-
P. missiona (Malme) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
P. pauciflora (Kunth) R.M.King & H.Rob.	FCA, RST	-	-	-
P. sanctopaulensis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-
Pseudobrickellia – 1/2				
P. angustissima (Spreng. ex Baker) R.M.King & H.Rob.	FCA, FES	-	-	-
Pseudogynoxys – 1/14				
P. cabreriae H.Rob. & Cuatrec.	FOD	-	-	-
Pterocaulon – 11/18				
P. alopecuroides (Lam.) DC.	FES, FCA, RST	-	-	-
P. angustifolium DC.	FCA, RST	-	-	-
P. balansae Chodat	FOD, FCA	-	-	-
P. cordobense Kuntze	?	-	-	-
P. interruptum DC.*	FES	-	-	-
P. lanatum Kuntze	FCA, RST	-	-	-
P. lorentzii Malme	FCA	-	-	-
P. polystachyum DC.	?	-	-	-
P. rugosum (Vahl) Malme	FCA	-	-	-
P. subvirgatum Malme	FCA	-	-	-
P. virgatum (L.) DC.	FES, FCA, RST	-	-	-
Radlkoferotoma – 1/3				
R. cistifolium (Less.) Kuntze*	FCA	-	-	-
Raulinoreitzia – 3/3				
R. crenulata (Spreng.) R.M.King & H.Rob.	FOM, FCA, AFL	-	-	-
R. leptophlebia (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	FOM, FES, FCA	-	-	-
R. tremula (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Rolandra – 1/1				
R. argentea Rottb.	FOD, FCA	-	-	-
Scherya* – 1/1				
S. bahiensis R.M.King & H.Rob. *	FCA	-	-	-
Schkuhria – 1/6				
S. pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.	FCA	-	-	-
Schlechtendalia – 1/1				
S. luzulifolia Less.	?	-	VU	ANEXO II
Senecio – 27/ca. 1250				
S. adamantinus Bong.	FCA	-	-	-
S. albus J.N.Nakaj. & A.Teles*	FCA	-	-	-
S. almasensis Mattf.*	FCA	-	EN	ANEXO II
S. brasiliensis (Spreng.) Less.	FCA	-	-	-
S. caparaensis Cabrera*	FCA	-	CR	ANEXO I
S. clausenii Decne.*	FCA	-	-	-
S. colpodes Bong.*	FCA	-	-	-
S. dumetorum Gardner*	FCA	-	-	-
S. erisithalifolius Sch.Bip. ex Baker	FCA	-	-	-
S. graciellae Cabrera*	FCA	-	-	-
S. grandis Gardner*	FOM	-	-	-
S. harleyi D.J.N.Hind*	FCA	-	-	-
S. hatschbachii Cabrera*	FCA	-	CR	ANEXO II
S. hemmendorffii Malme*	FOM	-	-	-
S. icoglossus DC.	FCA	-	-	-
S. juergensii Mattf.	FCA	-	-	-
S. linearilobus Bong.	FCA	-	-	-
S. macrotis Baker*	FCA	-	-	-
S. malacophyllus Dusén*	FCA	-	-	-
S. nemoralis Dusén*	FCA	-	-	-
S. oleosus Vell.*	FCA	-	-	-
S. pohlii Sch.Bip. ex Baker	FCa	-	-	-
S. pseudostigophlebius Cabrera*	FCA	-	-	-
S. pulcher Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
S. ramentaceus Baker*	FCA	-	-	-
S. regis H.Rob.*	FCA	-	-	-
S. rossianus Mattf.*	FCA	-	-	-
Solidago – 1/ca. 100				
S. chilensis Meyen	FCA, AFL, RST, FED	-	-	-
Sommerfeltia – 1/2				
S. spinulosa (Spreng.) Less.	FCA, RST	-	-	-
Sparganophora – 1/1				
S. sparganophorum (L.) Kuntze	FOD, FOM	-	-	-
Sphagneticola – 1/4				
S. brachycarpa (Baker) Pruski	?	-	-	-
Stenachaenium – 2/5				
S. campestre Baker	FCA, AFL	-	-	-
S. riedelii Baker	FOM, FED, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Stenocephalum – 1/5				
S. megapotamicum (Spreng.) Sch.Bip	FOM, FCA, AFL	-	-	-
Stenocline – 2/3				
S. chionaea DC.	FCA	-	-	-
S. gardneri Baker	?	-	-	-
Stevia – 31/230				
S. alternifolia Hieron.	?	-	EN	ANEXO II
S. catharinensis Cabrera	FCA	-	-	-
S. cinerascens Sch.Bip ex Baker	FCA	-	-	-
S. claussenii Sch.Bip ex Baker	FCA, AFL	-	-	-
S. collina Gardner	FCA	-	-	-
S. commixta B.L.Rob.	FCA	-	-	-
S. crenulata Baker	?	-	-	-
S. decussata Baker	FCA	-	-	-
S. entrerriensis Hieron. ex Arechav.	FCA	-	-	-
S. gardneriana Baker	FCA	-	-	-
S. heptachaeta DC.	FCA	-	-	-
S. hypericifolia Hieron.	FCA	-	-	-
S. hyptifolia Gardner	?	-	-	-
S. leptophylla Sch.Bip ex Baker	FCA, AFL	-	CR	ANEXO II
S. linearifolia DC.	FCA, AFL	-	-	-
S. lucida Lag.	FCA	-	-	-
S. lundiana DC.	FCA	-	-	-
S. menthifolia Sch.Bip ex Baker	FCA	-	-	-
S. multiaristata Spreng.	FCA	-	-	-
S. myriadenia Sch.Bip ex Baker	FCA	-	-	-
S. oligocephala DC.	FCA	-	-	-
S. ophryophylla B.L.Rob.	FCA	-	-	-
S. organensis Gardner*	FCA	-	CR	ANEXO II
S. parvifolia Hassl.	FCA	-	-	-
S. pohliana Baker	FCA	-	-	-
S. rebaudiana Bertoni	FCA	-	-	-
S. satureiifolia (Lam.) Sch.Bip.	FCA	-	-	-
S. selloi (Spreng.) Sch.Bip. ex Baker	FCA	-	-	-
S. tenuis Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
S. urticifolia Thunb.	?	-	-	-
S. veronicae DC.	FCA	-	-	-
Steyermarkina – 3/4				
S. dispalata (Gardner) R.M.King & H.Rob.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
S. duseii (Malme) R.M.King & H.Rob. *	FOD, FOM	-	-	-
S. pyrifolia (DC.) R.M.King & H.Rob.	FOD, FES, FOM	-	-	-
Stiffia – 5/8				
S. chrysantha Baker*	FOD	-	-	-
S. fruticosa (Vell.) D.J.N.Hind & Semir*	FOD	-	VU	ANEXO II
S. hatschbachii H.Robinson*	FOD	-	-	-
S. parviflora (Leandro) D.Don	FCA, FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. racemosa</i> H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>Stilpnopappus</i> – 1/20				
<i>S. cearensis</i> Huber*	RST	-	VU	ANEXO II
<i>Symphyopappus</i> – 9/11				
<i>S. angustifolius</i> Cabrera	FCA, AFL	-	-	-
<i>S. casarettoi</i> B.L.Rob.*	FCA, RST	-	EN	ANEXO II
<i>S. compressus</i> (Gardner) B.L.Rob.	FOM, FCA	-	-	-
<i>S. cuneatus</i> (DC.) Sch.Bip. ex Baker	FCA, AFL	-	-	-
<i>S. decussatus</i> Turcz.	FCA	-	-	-
<i>S. itaiyensis</i> (Hieron.) R.M.King & H.Rob.	FOD, FOM, FCA	-	-	-
<i>S. lymansmithii</i> B.L.Rob.*	FOD, FOM,	-	EN	ANEXO II
<i>S. reitzii</i> (Cabrera) R.M.King & H.Rob.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>S. reticulatus</i> Baker	FCA, AFL	-	-	-
<i>Symphyotrichum</i> – 2/ca. 96				
<i>S. regnellii</i> (Baker) G.L.Nesom	FCA, AFL	-	-	-
<i>S. squamatum</i> (Spreng.) G.L.Nesom	FCA, FED	-	-	-
<i>Synedrella</i> – 1/1				
<i>S. nodiflora</i> (L.) Gaertn.	?	-	-	-
<i>Tilesia</i> – 1/3				
<i>T. baccata</i> (L.) Pruski	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
<i>Trichocline</i> – 5/21				
<i>T. catharinensis</i> Cabrera*	FCA	-	-	-
<i>T. linearifolia</i> Malme*	FCA	-	-	-
<i>T. macrocephala</i> Less.*	FCA	-	-	-
<i>T. nervosa</i> Less.*	FCA	-	-	-
<i>T. speciosa</i> Less.	FCA	-	-	-
<i>Trichogonia</i> – 6/30				
<i>T. attenuata</i> G.Barroso	FCA	-	-	-
<i>T. crenulata</i> (Gardner) D.J.N.Hind	FCA	-	-	-
<i>T. hirtiflora</i> (DC.) Sch.Bip. ex Baker	FCA	-	-	-
<i>T. rhodotricha</i> Malme	FCA	-	-	-
<i>T. salviifolia</i> Gardner	FCA, FOD	-	-	-
<i>T. villosa</i> (Spreng.) Sch.Bip. ex Baker	FCA, FOD	-	-	-
<i>Trichogoniopsis</i> * – 4/4				
<i>T. adenantha</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.*	FOD	-	-	-
<i>T. grazielae</i> Soares Nunes*	RST	-	-	-
<i>T. morii</i> R.M.King & H.Rob.*	RST	-	-	-
<i>T. podocarpa</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.*	RST	-	-	-
<i>Trixis</i> – 9/50-60				
<i>T. antimenorrhoea</i> (Schrunk) Kuntze	FES, FOD	-	-	-
<i>T. glaziovii</i> Baker*	FCA	-	-	-
<i>T. lessingii</i> DC.	FCA	-	-	-
<i>T. nobilis</i> (Vell.) Katinas	FCA	-	-	-
<i>T. praestans</i> (Vell.) Cabrera	FCA, FOD	-	-	-
<i>T. spicata</i> Gardner	FCA	-	-	-
<i>T. thyrsoides</i> Dusén ex Malme*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>T. vauthieri</i> DC.	AFL, FCA	-	-	-
<i>T. verbascifolia</i> S.F.Blake	FOD	-	-	-
<i>Urolepis</i> – 1/1				
<i>U. hecatantha</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Verbesina</i> – 6/ca. 300				
<i>V. diversifolia</i> DC.	FOM, FES	-	-	-
<i>V. encelioides</i> (Cav.) Benth. & Hook.f. ex A.Gray	RST	-	-	-
<i>V. floribunda</i> Gardner	FOD	-	-	-
<i>V. glabrata</i> Hook. & Arn.	FOD, FOM	-	-	-
<i>V. guianensis</i> Baker	FOD	-	-	-
<i>V. macrophylla</i> (Cass.) S.F.Blake	FED, FES, RST	-	-	-
<i>Vernonanthura</i> – 19/ca. 65				
<i>V. beyrichii</i> (Less.) H. Rob	FES, RST	-	-	-
<i>V. catharinensis</i> (Cabrera) H.Rob.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>V. chamaedrys</i> (Less.) H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>V. crassa</i> (Vell.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>V. diffusa</i> (Less.) H.Rob.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>V. discolor</i> (Spreng.) H.Rob.	FOD, FOM	-	-	-
<i>V. ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	FES, RST	-	-	-
<i>V. lorentensis</i> (Hieron.) H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>V. lucida</i> (Less.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>V. mucronulata</i> (Less.) H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>V. nudiflora</i> (Less.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>V. oligactoides</i> (Less.) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>V. oligolepis</i> (Sch.Bip) H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
<i>V. petiolaris</i> (DC.) H.Rob.	FOD, FOM	-	-	-
<i>V. phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>V. puberula</i> (Less.) H.Rob.	FOD, RST	-	-	-
<i>V. tweediana</i> (Baker) H.Rob.	FOD, FOM, FCA	-	-	-
<i>V. vinhae</i> (H.Rob.) H.Rob.*	FOD	-	-	-
<i>V. westiniana</i> (Less.) H.Rob.	FCA	-	-	-
<i>Viguiera</i> – 14/ca. 140				
<i>V. amphychlora</i> S.F.Blake	?	-	-	-
<i>V. anchusifolia</i> (DC.) Baker	FOD, FOM	-	-	-
<i>V. aspilioides</i> Baker*	FCA	-	VU	ANEXO I
<i>V. bakeriana</i> S.F.Blake	FCA, AFL	-	-	-
<i>V. linearifolia</i> Chodat	FCA, AFL	-	CR	ANEXO II
<i>V. macrorrhiza</i> Baker	FCA	-	-	-
<i>V. nudibasilaris</i> S.F.Blake	FES, FCA	-	-	-
<i>V. nudicaulis</i> Baker	FCA	-	-	-
<i>V. paranensis</i> (Malme) J.U.M.Santos	FCA, AFL	-	CR	ANEXO I
<i>V. pilosa</i> Baker	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>V. robusta</i> Gardner	FCA	-	-	-
<i>V. squalida</i> Moore	FCA	-	-	-
<i>V. trichophylla</i> Dusén	FCA	-	-	-
<i>V. tuberosa</i> Benth. & Hook.f.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Vittetia – 1/2				
V. orbiculata (DC.) R.M.King & H.Rob.	FCA, AFL	-	-	-
Wedelia – 7/ca. 110				
W. alagoensis Baker	FED, FCA	-	-	-
W. brasiliensis (Baker) S.F.Blake	FOD	-	-	-
W. kerrii Hassl.	FOM	-	-	-
W. paludosa DC.	FES, FCA, RST	-	-	-
W. pilosa (Baker) Hassl.	FOD, RST	-	-	-
W. subvelutina DC.	FOM, FCA	-	-	-
W. villosa Gardner	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
Wunderlichia – 3/5				
W. azulensis Maguire & G.Barroso*	AFL	-	CR	ANEXO II
W. insignis Baill.*	AFL	-	-	-
W. mirabilis Riedel ex Baker	FCA, AFL	-	-	-

Balanophoraceae

Marcelo Ferreira de Vasconcelos

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BALANOPHORACEAE – 7/ca. 50				
<i>Helosis</i> – 1/1				
<i>H. cayennensis</i> (Sw.) Spreng.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Langsdorffia</i> – 1/3				
<i>L. hypogaea</i> Mart.	FOD, FES, FCA, AFL	-	-	-
<i>Lathrophytum</i> – 1/1				
<i>L. peckoltii</i> Eichler	FOD, FES	-	-	-
<i>Lophophytum</i> – 2/4				
<i>L. leandri</i> Eichler*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>L. mirabile</i> Schott & Endl.	FOD, FES	-	-	-
<i>Scybalium</i> – 2/4				
<i>S. fungiforme</i> Schott & Endl.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. glaziovii</i> Eichler*	FOD, FES	-	-	-

Basellaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BASELLACEAE – 2/19				
<i>Anredera</i> – 2/11				
<i>A. cordifolia</i> (Ten.) Steenis	FOD, FES	-	-	-
<i>A. tucumanensis</i> (Lillo & Hauman) Sperling	FOD	-	-	-

Bataceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BATACEAE – 1/2				
<i>Batis</i> – 1/2				
<i>B. maritima</i> L.	MAN	-	-	-

Begoniaceae

Eliane de Lima Jacques

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BEGONIACEAE – 179/ca. 1400				
Begonia – 179/1400				
B. acetosa Vell.	FOD	-	-	-
B. acida Vell.	FOD	-	-	-
B. aconitifolia A.DC.*	FOD	-	-	-
B. admirabilis Brade*	FOD	-	-	-
B. aguabrancensis L.Kollmann*	FOD	-	-	-
B. albidula Brade*	FOD, FCA	-	VU	ANEXO II
B. altamiroi Brade*	FOD	-	VU	ANEXO II
B. angraensis Brade*	FOD	-	-	-
B. angularis Raddi*	FOD	-	-	-
B. angulata Vell.*	FOD	-	-	-
B. apparicioi Brade*	FOD	-	-	-
B. arborescens Raddi*	FOD	-	-	-
B. bahiensis A.DC.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. barkleyana</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>B. besleriifolia</i> Schott*	FOD, FES	-	-	-
<i>B. bidentata</i> Raddi*	FOD	-	-	-
<i>B. biguassuensis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. bonitoensis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. boraceiensis</i> Handro*	FOD	-	-	-
<i>B. bradei</i> Irmsch.*	FOD	-	-	-
<i>B. brevilobata</i> Irmsch.*	FOD	-	-	-
<i>B. cacaucicola</i> L.B.Sm. ex S.F.Sm & Wassh.	FOD	-	-	-
<i>B. calvescens</i> (Brade ex L.B.Sm. & R.C.Sm.) E.L.Jacques & Mamede*	FOD, AFL	-	-	-
<i>B. camposportoana</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. capanemae</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. caparaensis</i> E.L.Jacques & L.Kollmann*	FOD	-	-	-
<i>B. caraguatatubensis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. catharinensis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. cerasiphylla</i> L.B.Sm. & Wassh.	FOD	-	-	-
<i>B. coccinea</i> Hook.*	FOD	-	-	-
<i>B. collaris</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. concinna</i> Schott*	FOD	-	-	-
<i>B. convolvulacea</i> (Klotzsch) A.DC. *	FOD	-	-	-
<i>B. cordata</i> Vell.	FOD	-	-	-
<i>B. cornitepala</i> Irmsch.*	FOD	-	-	-
<i>B. crispula</i> Brade*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>B. cucullata</i> Willd.	FOD	-	-	-
<i>B. curtii</i> L.B.Sm. & B.G.Schub. *	FOD	-	-	-
<i>B. declinata</i> Vell. *	FOD	-	-	-
<i>B. densifolia</i> Irmsch.*	FOD	-	-	-
<i>B. dentatiloba</i> A.DC. *	FOD	-	-	-
<i>B. depauperata</i> Schott*	FOD	-	-	-
<i>B. descoleana</i> L.B.Sm. & B.G.Schub.	FOD, FES	-	-	-
<i>B. dietrichiana</i> Irmsch.*	FOD	-	-	-
<i>B. digitata</i> Raddi	FOD	-	-	-
<i>B. echinosepala</i> Regel*	FOD	-	-	-
<i>B. edmundoi</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. egregia</i> N.E.Br.	FOD	-	-	-
<i>B. epibaterium</i> Mart. ex A.DC. *	FOD	-	-	-
<i>B. epipsila</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. erecta</i> Vell.	FOD	-	-	-
<i>B. espiritosantensis</i> E.L.Jacques & Mamede*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>B. euryphylla</i> L.B.Sm. ex S.F.Sm & Wassh.	FOD	-	-	-
<i>B. fabulosa</i> L.B.Sm. & Wassh.	FOD	-	-	-
<i>B. fagifolia</i> Otto & A.Dietr. *	FOD	-	-	-
<i>B. fernandocostae</i> Irmsch. *	FOD	-	-	-
<i>B. fischeri</i> Schrank	FOD, RST	-	-	-
<i>B. fluminensis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. friburgensis</i> Brade*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. fruticosa</i> (Klotzsch) A.DC. *	FOD	-	-	-
<i>B. fulvosetulosa</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. fuscocaulis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. gardneri</i> A.DC. *	FOD	-	-	-
<i>B. garuvae</i> L.B.Sm. & R.C.Sm.	FOD	-	-	-
<i>B. gehrtii</i> Irmsch.	FOD	-	-	-
<i>B. hammoniae</i> Irmsch.*	FOD	-	-	-
<i>B. handroi</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. herbacea</i> Vell. *	FOD	-	-	-
<i>B. heringeri</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. herteri</i> Irmsch. *	FOD	-	-	-
<i>B. hilariana</i> A.DC.*	FOD	-	-	-
<i>B. hirtella</i> Link	FOD, RST	-	-	-
<i>B. hispida</i> Schott*	FOD	-	-	-
<i>B. hoehneana</i> Irmsch.*	FOD	-	-	-
<i>B. hookeriana</i> Gardner*	FOD	-	-	-
<i>B. hugelii</i> (Klotzsch) A.DC. *	FOD	-	-	-
<i>B. ibitiocensis</i> E.L.Jacques & Mamede*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>B. incisoserrata</i> A.DC. *	FOD	-	-	-
<i>B. inconspicua</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. insularis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. integerrima</i> Spreng.*	FOD	-	-	-
<i>B. isopterocarpa</i> Irmsch. *	FOD	-	-	-
<i>B. itaguassuensis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. itatiaiensis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. itatinensis</i> Irmsch. ex Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. itupavensis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. jocelinoi</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. juliana</i> Loefgr. & Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>B. jurei</i> Gomes da Silva & Mamede*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>B. konderreisiana</i> L.B.Sm & R.C.Sm. *	FOD	-	-	-
<i>B. kuhlmannii</i> Brade*	FOD, AFL	-	-	-
<i>B. lanceolata</i> Vell. *	FOD	-	-	-
<i>B. lanstykii</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. larorum</i> L.B.Sm. & Wassh.*	FOD	-	-	-
<i>B. lealii</i> Brade	FOD	-	-	-
<i>B. lindmanii</i> Brade	FES	-	-	-
<i>B. lineolata</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. lobata</i> Schott	FOD	-	-	-
<i>B. longibarbata</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. lossiae</i> L.Kollmann*	FOD	-	-	-
<i>B. lubbersii</i> E.Morren*	FOD	-	-	-
<i>B. lunaris</i> E.L.Jacques*	FOD	-	-	-
<i>B. luxurians</i> Scheidw.	FOD	-	-	-
<i>B. maculata</i> Raddi	FOD, RST	-	-	-
<i>B. magdalenensis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. mattosilvae</i> L.B.Sm. ex S.F.Sm & Wassh.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. membranacea</i> A.DC.	FOD	-	-	-
<i>B. moysesii</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. misteriosa</i> L.Kollmann & A.P.Fontana*	FOD	-	-	-
<i>B. neglecta</i> A.DC.	FOD	-	-	-
<i>B. neocomensium</i> A.DC.	FOD	-	-	-
<i>B. novalombardiensis</i> L.Kollmann*	FOD	-	-	-
<i>B. nuda</i> Irmsch.*	FOD	-	-	-
<i>B. obscura</i> Brade	FOD	-	-	-
<i>B. occhionii</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. odetiantha</i> Handro*	FOD	-	-	-
<i>B. olsoniae</i> L.B.Sm. & B.G.Schub. *	FOD	-	-	-
<i>B. organensis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. paleata</i> Schott ex A.DC. *	FOD	-	-	-
<i>B. paranaensis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. parilis</i> Irmsch. *	FOD	-	-	-
<i>B. parvifolia</i> Schott*	FOD	-	-	-
<i>B. parvistipulata</i> Irmsch. *	FOD	-	-	-
<i>B. paulensis</i> A.DC.*	FOD	-	-	-
<i>B. peltifolia</i> Schott	FOD	-	-	-
<i>B. pentaphylla</i> Walp.	FOD	-	-	-
<i>B. perdusenii</i> Brade	FOD	-	-	-
<i>B. peristegia</i> Stapf	FOD	-	-	-
<i>B. pernambucensis</i> Brade	FOD	-	-	-
<i>B. peruibensis</i> Handro*	FOD	-	-	-
<i>B. pickelii</i> Irmsch.*	FOD	-	-	-
<i>B. pilgeriana</i> Irmsch*	FOD	-	-	-
<i>B. pinheironis</i> L.B.Sm. ex S.F.Sm & Wassh.	FOD	-	-	-
<i>B. piresiana</i> Handro*	FOD	-	-	-
<i>B. platanifolia</i> Schott	FOD	-	-	-
<i>B. pluvialis</i> L.B.Sm. ex S.F.Sm & Wassh.	FOD	-	-	-
<i>B. polyandra</i> Irmsch.*	FOD	-	-	-
<i>B. polygonifolia</i> A.DC. *	FOD	-	-	-
<i>B. princeps</i> A.DC. *	FOD	-	-	-
<i>B. pseudolubbersii</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. pulchella</i> Raddi*	FOD	-	-	-
<i>B. radicans</i> Vell. *	FOD	-	-	-
<i>B. ramentacea</i> Paxton*	FOD	-	-	-
<i>B. reniformis</i> Dryand.	FOD	-	-	-
<i>B. riedelii</i> A.DC.*	FOD	-	-	-
<i>B. rotunda</i> Vell.	FOD	-	-	-
<i>B. rubropilosa</i> A.DC.*	FOD	-	-	-
<i>B. rufosericea</i> Toledo*	FOD	-	-	-
<i>B. rupium</i> Irmsch. *	FOD	-	-	-
<i>B. ruschii</i> L.Kollmann*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>B. russelliana</i> L.B.Sm. ex S.F.Sm & Wassh.	FOD	-	-	-
<i>B. salesopolensis</i> Gomes da Silva & Mamede*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. sanguinea</i> Raddi*	FOD	-	-	-
<i>B. santoslimae</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. saxicola</i> A.DC.	FOD	-	-	-
<i>B. saxifraga</i> A.DC.	FOD	-	-	-
<i>B. scharffii</i> Hook.*	FOD	-	-	-
<i>B. semidigitata</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. semperflorens</i> Link & Otto	FOD	-	-	-
<i>B. serranegrae</i> L.B.Sm. ex S.F.Sm & Wassh.	FOD	-	-	-
<i>B. smilacina</i> A.DC. *	FOD	-	-	-
<i>B. solananthera</i> A.DC. *	FOD	-	-	-
<i>B. solitudinis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. spinibarbis</i> Irmsch.*	FOD	-	-	-
<i>B. squamipes</i> Irmsch.*	FOD	-	-	-
<i>B. stenolepis</i> L.B.Sm. & R.C.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>B. stenophylla</i> A.DC.	FOD	-	-	-
<i>B. subacida</i> Irmsch.*	FOD	-	-	-
<i>B. subvillosa</i> Klotzsch	FOD, FES	-	-	-
<i>B. sylvatica</i> Meisn. ex A.DC. *	FOD	-	-	-
<i>B. toledoana</i> Handro*	FOD	-	-	-
<i>B. tomentosa</i> Schott*	FOD	-	-	-
<i>B. ulmifolia</i> Willd.	FOD, FES	-	-	-
<i>B. undulata</i> Schott	FOD, RST	-	-	-
<i>B. valdensium</i> A.DC. *	FOD	-	-	-
<i>B. velloziana</i> Walp. *	FOD	-	-	-
<i>B. venosa</i> Skankex Hook.*	FOD	-	-	-
<i>B. vicina</i> Irmsch.*	FOD	-	-	-
<i>B. windischii</i> L.B.Sm. ex S.F.Sm & Wassh.	FOD	-	-	-

Berberidaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BERBERIDACEAE – 4/650				
<i>Berberis</i> – 4/600				
<i>B. camposportoi</i> Brade*	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>B. glazioviana</i> Brade*	FCA	-	-	-
<i>B. kleinii</i> Mattos*	FOM	-	VU	ANEXO II
<i>B. laurina</i> Billb.	FOM, FCA	-	-	-

Bignoniaceae

Lúcia G. Lohmann & Dayane Tarabay

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BIGNONIACEAE – 199/827				
Adenocalymma – 30/79				
A. apparicianum J.C.Gomes	FOD	-	-	-
A. bracteatum (Cham.) DC.	FOM, FES	-	-	-
A. bracteolatum DC.	FES	-	-	-
A. bullatum Bureau & K.Schum.*	FES	-	-	-
A. comosum (Cham.) DC.	RST, FOD	-	-	-
A. coriaceum A.DC.	FOD	-	-	-
A. cymbalum (Cham.) Bureau & K.Schum.	FOD	-	-	-
A. divaricatum Miers	FOD	-	-	-
A. dusenii Kraenzl.*	FOD	-	-	-
A. hatschbachii A.H.Gentry	FOD	-	-	-
A. hirtum (Mart. ex DC.) Bureau & K.Schum.	FOD	-	-	-
A. hypostictum Bureau & K.Schum.	FOD	-	-	-
A. imperatoris-maximiliani (Wawra) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
A. involucratum (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
A. marginatum DC.	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. neoflavidum L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
A. nodosum (Silva Manso) L.G.Lohmann	FES	-	-	-
A. paulistarum Bureau & K.Schum.*	FES	-	-	-
A. pedunculatum (Vell.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-
A. peregrinum (Miers) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. pubescens (Spreng.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-
A. reticulatum Bureau & K.Schum.	FOD	-	-	-
A. salmoneum J.C.Gomes*	FOD	-	-	-
A. scansile Miers	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. subsessilifolium DC.*	FOD	-	-	-
A. subspicatum A.H.Gentry	FOD	-	-	-
A. ternatum (Vell.) Mello ex Bureau & K.Schum.*	FOD	-	-	-
A. trichocladum (DC.) L.G.Lohmann	FES	-	-	-
A. trifoliatum (Vell.) L.C.Larroche	FOD	-	-	-
A. ubatubense Assis & Semir*	FOD	CR	CR	ANEXO I
Amphilophium – 12/43				
A. bauhinioides (Bureau ex Baill.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
A. bracteatum (Cham.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
A. crucigerum (L.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
A. cynanchoides (DC.) L.G.Lohmann	FES	-	-	-
A. dolichoides (Cham.) L.G.Lohmann*	FOD, FOM	-	-	-
A. elongatum (Vahl) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-
A. falcatum (DC.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
A. frutescens (DC.) L.G.Lohmann*	FOD	-	-	-
A. glaziovii Bureau & K.Schum.	FOD, FOM	-	-	-
A. mansoanum (DC.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. paniculatum</i> (L.) Kunth	FOD, FES	-	-	-
<i>A. scabriusculum</i> (Mart. ex DC.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>Anemopaegma</i> – 19/45				
<i>A. acutifolium</i> DC.	FOD, FES	-	-	-
<i>A. album</i> Mart. ex DC.	FCA	-	-	-
<i>A. arvense</i> (Vell.) Stellfeld ex de Souza	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>A. chamberlaynii</i> (Sims) Bureau & K.Schum.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>A. citrinum</i> Mart. ex DC.	FOD	-	-	-
<i>A. flavum</i> Morong	FES	-	-	-
<i>A. floridum</i> Mart. ex DC.	FOD	-	-	-
<i>A. glaucum</i> Mart. ex DC.	FOD, FES	-	-	-
<i>A. goyazense</i> K.Schum.	FOD	-	-	-
<i>A. gracile</i> Bureau & K.Schum.	FOD	-	-	-
<i>A. hilarianum</i> Bureau & K.Schum.*	FOD	-	-	-
<i>A. laeve</i> DC.	FOD	-	-	-
<i>A. longipetiolatum</i> Sprague	FES	-	-	-
<i>A. pabstii</i> A.H.Gentry	FOD	-	-	-
<i>A. parkeri</i> Sprague	FOD	-	-	-
<i>A. prostratum</i> DC.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>A. scabriusculum</i> Mart. ex DC.	FCA	-	-	-
<i>A. setilobum</i> A.H.Gentry	FOD	-	-	-
<i>A. velutinum</i> Mart. ex DC.	FOD, FES	-	-	-
<i>Bignonia</i> – 11/28				
<i>B. binata</i> Thunb.	FOD, FES	-	-	-
<i>B. callistegioides</i> Cham.	FES, FED	-	-	-
<i>B. campanulata</i> Cham.	FOD	-	-	-
<i>B. convolvuloides</i> (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>B. corymbosa</i> (Vent.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>B. costata</i> (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann*	FOD	-	-	-
<i>B. decora</i> (S.Moore) L.G.Lohmann	FES	-	-	-
<i>B. priurei</i> DC.	FOD	-	-	-
<i>B. ramentacea</i> (Mart. ex DC.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>B. sciuripabula</i> (K.Schum.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>B. uleana</i> (Kraenzl.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>Callichlamys</i> – 1/1				
<i>C. latifolia</i> (Rich.) K.Schum.	FOD	-	-	-
<i>Cuspidaria</i> – 10/16				
<i>C. argentea</i> (Wawra) Sandwith	FOD	-	-	-
<i>C. convoluta</i> (Vell.) A.H.Gentry	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>C. floribunda</i> (DC.) A.H.Gentry	FOD	-	-	-
<i>C. lachnaea</i> (Bureau) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>C. lateriflora</i> (Mart.) DC.	FOD, FES	-	-	-
<i>C. multiflora</i> DC.	FOD	-	-	-
<i>C. octoptera</i> A.H.Gentry	FOD	-	-	-
<i>C. puberula</i> Mart. ex DC.	FOD	-	-	-
<i>C. pulchra</i> (Cham.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. sceptrum</i> (Cham.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-
<i>Cybistax</i> – 1/1				
<i>C. antisiphilica</i> (Mart.) Mart.	FOD	-	-	-
<i>Dolichandra</i> – 7/8				
<i>D. chodatii</i> (Hassl.) L.G.Lohmann	FES	-	-	-
<i>D. cynanchoides</i> Cham.	FES	-	-	-
<i>D. dentata</i> (K.Schum.) L.G.Lohmann	FES, FOM	-	-	-
<i>D. quadrivalvis</i> (Jacq.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>D. uncata</i> (Andrews) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>D. unguiculata</i> (Vell.) L.G.Lohmann*	FOD	-	-	-
<i>D. unguis-cati</i> (L.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>Fridericia</i> – 34/69				
<i>F. bahiensis</i> (Schauer) Sandwith & Moldenke	FOD	-	-	-
<i>F. caudigera</i> (S.Moore) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>F. celastroides</i> (Bureau ex K.Schum.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>F. chica</i> (Bonpl.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>F. cinerea</i> (Bureau ex K.Schum.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>F. clausenii</i> (A.DC.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>F. conjugata</i> (Vell.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>F. corallina</i> (Jacq.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>F. corchoroides</i> (Cham.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>F. craterophora</i> (DC.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-
<i>F. cuneifolia</i> (DC.) Sandwith	FOD	-	-	-
<i>F. dispar</i> (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>F. elegans</i> (Vell.) L.G.Lohmann*	FOD	-	-	-
<i>F. erubescens</i> (DC.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>F. fagoides</i> (Cham.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-
<i>F. florida</i> (DC.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-
<i>F. formosa</i> (Bureau) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>F. leucopogon</i> (Cham.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>F. limae</i> (A.H.Gentry) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>F. mutabilis</i> (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>F. parviflora</i> (Mart. ex DC.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>F. patellifera</i> (Schltdl.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>F. platyphylla</i> (Cham.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>F. poeppigii</i> (DC.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>F. pubescens</i> (L.) L.G.Lohmann	FOD, FOM	-	-	-
<i>F. pulchella</i> (Cham.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>F. rego</i> (Vell.) L.G.Lohmann*	FOD, RST	-	-	-
<i>F. samydoides</i> (Cham.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>F. speciosa</i> Mart.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
<i>F. subincana</i> (Mart.) L.G.Lohmann*	FOD, RST	-	-	-
<i>F. subverticillata</i> (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
<i>F. trachyphylla</i> (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann*	FOD	-	-	-
<i>F. triplinervia</i> (Mart. ex DC.) L.G.Lohmann	FOD, FES	-	-	-
<i>F. tynanthoides</i> (A.H.Gentry) L.G.Lohmann*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Handroanthus – 13/30				
H. albus (Cham.) Mattos	FOD, FOM	-	-	-
H. arianae (A.H.Gentry) S.Grose*	FOD	-	VU	ANEXO II
H. bureavii (Sandwith) S.Grose	FOD	-	-	-
H. chrysotrichus (Mart.ex.DC.) Mattos	RST	-	-	-
H. cristatus (A.H.Gentry) S.Grose	FOD	-	EN	ANEXO II
H. heptaphyllus (Vell.) Mattos	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
H. ochraceus (Cham.) Mattos	FOD, FOM	-	-	-
H. pedicellatus (Bureau ex K.Schum.) Mattos	FOD	-	-	-
H. pulcherrimus (Sandwith) S.Grose	RST	-	-	-
H. riodocensis (A.H.Gentry) S.Grose	FOD	-	VU	ANEXO II
H. serratifolius (Vahl) S.Grose	FOD, FES	-	-	-
H. umbellatus (Sond.) Mattos	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
H. vellosi (Toledo) Mattos	FOD	-	-	-
Jacaranda – 11/48				
J. bracteata Bureau & K.Schum.	RST	-	-	-
J. crassifolia Morawetz*	FOD	EN	EN	ANEXO I
J. grandifoliolata A.H.Gentry*	RST	VU	VU	ANEXO II
J. jasminoides (Thunb.) Sandwith	FOD	-	-	-
J. macrantha Cham.	FOD	-	-	-
J. micrantha Cham.	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
J. microcalyx A.H.Gentry	FOD	VU	VU	ANEXO II
J. montana Morawetz*	FOD	-	-	-
J. obovata Cham.*	RST	-	-	-
J. puberula Cham.	FOD, FOM, FES	-	-	-
J. subalpina Morawetz*	FOD	VU	VU	ANEXO I
Lundia – 8/13				
L. cordata (Vell.) DC.	FOD, RST	-	-	-
L. corymbifera (Vahl) Sandwith	FOD	-	-	-
L. damazii DC.*	FOD	-	-	-
L. gardneri Sandwith	FOD	-	-	-
L. glazioviana Kraenzl.	FOD	-	-	-
L. neolonga L.G.Lohmann*	FOD	-	-	-
L. obliqua Sond.	FOD	-	-	-
L. virginalis DC.	FOD	-	-	-
Manaosella – 1/1				
M. cordifolia (DC.) A.H.Gentry	FOD	-	-	-
Mansoa – 7/12				
M. angustidens (DC.) Bureau & K.Schum.	RST	-	-	-
M. difficilis (Cham.) Bureau & K.Schum.	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. glaziovii Bureau & K.Schum.	FOD	-	-	-
M. hirsuta DC.	FOD	-	-	-
M. hymenaea (DC.) A.H.Gentry	FOD	-	-	-
M. lanceolata (DC.) A.H.Gentry*	FOD	-	-	-
M. onohualcoides A.H.Gentry*	FOD	-	-	-
Martinella – 1/2				
M. obovata (Kunth) Bureau & K.Schum	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Neojobertia – 2/2				
N. candolleana (Mart. ex DC.) Bureau & K.Schum.	FOD	-	-	-
N. mirabilis (Sandwith) L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
Paratecoma* – 1/1				
P. peroba (Record) Kuhlman.*	FOD	-	-	-
Perianthomega – 1/1				
P. vellozoi Bureau	FOD	-	-	-
Pleonotoma – 6/15				
P. albiflora (Salzm. ex DC.) A.H.Gentry	FOD	-	-	-
P. fluminensis (Vell.) A.H.Gentry	FES	-	-	-
P. melioides (S.Moore) A.H.Gentry	FOD	-	-	-
P. pavettiflora Sandwith	FES	-	-	-
P. stichadenia K.Schum.	FOD	-	-	-
P. tetraquetra (Cham.) Bureau	FOD, FES	-	-	-
Pyrostegia – 1/2				
P. venusta (Ker Gawl.) Miers	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
Sparattosperma – 1/2				
S. leucanthum (Vell.) K.Schum.	FOD	-	-	-
Stizophyllum – 2/3				
S. perforatum (Cham.) Miers	FOD, FES	-	-	-
S. riparium (Kunth) Sandwith	FOD	-	-	-
Tabebuia – 4/67				
T. cassinoides (Lam.) DC.	FOD	VU	VU	ANEXO II
T. elliptica (DC.) Sandwith*	RST	-	-	-
T. obtusifolia (Cham.) Bureau	FOD	VU	VU	ANEXO II
T. stenocalyx Sprague & Stapf	FOD	-	-	-
Tanaecium – 5/16				
T. cyrtanthum (Mart. ex DC.) Bureau & K.Schum.	FES	-	-	-
T. duckei A.Samp.	FOD	-	-	-
T. neobrasiliensis L.G.Lohmann	FOD	-	-	-
T. pyramidatum (Rich.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
T. selloi (Spreng.) L.G.Lohmann	FOD, FOM, FED, FES	-	-	-
Tynanthus – 5/15				
T. cognatus (Cham.) Miers	FOD, FES	-	-	-
T. elegans Miers*	FOD, FES	-	-	-
T. fasciculatus (Vell.) Miers	FOD, FES, FCA	-	-	-
T. labiatus (Cham.) Miers*	FOD	-	-	-
T. micranthus Mello ex K.Schum.	FOM, FES	-	-	-
Xylophragma – 4/6				
X. harleyi (A.H.Gentry ex M.M.Silva & L.P.Queiroz) L.G.Lohmann	FOD		-	-
X. heterocalyx (Bureau & K.Schum.) A.H.Gentry	FOD	-	-	-
X. myrianthum (Cham.) Sprague	FOD, FOM, FES	-	-	-
X. pratense (Bureau & K.Schum.) Sprague	FES	-	-	-
Zeyheria – 1/2				
Z. tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl.	FOD	-	-	-

Bixaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BIXACEAE – 3/23				
<i>Bixa</i> – 2/5				
<i>B. arborea</i> Huber	FOD, FES	-	-	-
<i>B. orellana</i> L.	FOD, FES	-	-	-
<i>Cochlospermum</i> – 1/13				
<i>C. vitifolium</i> (Willd.) Spreng.	FOD, FES	-	-	-

Bonnetiaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BONNETIACEAE – 1/35				
<i>Bonnetia</i> – 1/30				
<i>B. stricta</i> (Nees) Nees & Mart.	RST	-	-	-

Boraginaceae

Elsie Franklin Guimarães & Erika von Sohsten Medeiros

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BORAGINACEAE – 4/1.600				
Moritzia – 2/6				
M. ciliata (Cham.) DC.	FCA	-	-	-
M. dusenii I.M.Johnst.*	FOM, FCA	-	-	-
Thaumatocaryon – 2/4				
T. dasyanthum (Cham.) I.M.Johnst.*	FCA	-	-	-
T. tetraquetrum (Cham.) I.M.Johnst.	FOD	-	-	-

Brassicaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BRASSICACEAE – 21/3250				
<i>Brassica</i> – 2/35				
<i>B. juncea</i> (L.) Czern. & Cosson	FCA, RUD	-	-	-
<i>B. rapa</i> L.	FCA, RUD	-	-	-
<i>Cakile</i> – 1/7				
<i>C. maritima</i> Scop.	FCA, RUD	-	-	-
<i>Capsella</i> – 1/5				
<i>C. bursapastoris</i> (L.) Medik.	FCA, RUD	-	-	-
<i>Cardamine</i> – 3/200				
<i>C. africana</i> L.	FCA, RUD	-	-	-
<i>C. bonariensis</i> Pers.	FCA, RUD	-	-	-
<i>C. chenopodiifolia</i> Pers.	FCA, RUD	-	-	-
<i>Coronopus</i> – 1/10				
<i>C. didymus</i> (L.) Sm.	FCA, RUD	-	-	-
<i>Lepidium</i> – 2/140				
<i>L. aletes</i> J.F.Macbr.	FCA, RUD	-	-	-
<i>L. bonariense</i> L.	FCA, RUD	-	-	-
<i>Raphanus</i> – 2/3				
<i>R. raphanistrum</i> L.	FCA, RUD	-	-	-
<i>R. sativus</i> L.	FCA, RUD	-	-	-
<i>Rapistrum</i> – 1/2				
<i>R. rugosum</i> (L.) All.	FCA, RUD	-	-	-
<i>Rorippa</i> – 6/80				
<i>R. bonariensis</i> (Poir.) Mackloskie	FCA, RUD	-	-	-
<i>R. clandestina</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	FCA, RUD	-	-	-
<i>R. dubia</i> (Pers.) Hara	FCA, RUD	-	-	-
<i>R. hilariana</i> (Walp.) Cabrera	FCA, RUD	-	-	-
<i>R. nasturtiumaquaticum</i> (L.) Hayek	FCA, RUD	-	-	-
<i>R. palustris</i> (L.) Besser	FCA, RUD	-	-	-
<i>Sisymbrium</i> – 2/90				
<i>S. altissimum</i> L.	FCA, RUD	-	-	-
<i>S. irio</i> L.	FCA, RUD	-	-	-

Bromeliaceae

Gustavo Martinelli, Cláudia Magalhães Vieira, Paula Leitman,
Andrea Ferreira da Costa & Rafaela Campostrini Forzza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BROMELIACEAE – 816/3.172				
<i>Acanthostachys</i> – 2/2				
<i>A. pitcairnioides</i> (Mez) Rauh & Barthlott	?	-	-	-
<i>A. strobilacea</i> (Schult. & Schult.f.) Klotzsch	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Aechmea</i> – 136/254				
<i>A. alba</i> Mez*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. alopecurus</i> Mez*	FOD, FES, FED	-	CR	ANEXO II
<i>A. amicornum</i> B.R.Silva & H.Luther*	RST	-	EN	ANEXO II
<i>A. amorinii</i> Leme*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. ampla</i> L.B.Sm.*	RST	-	-	-
<i>A. andersoniana</i> Leme & H.Luther*	FOD	-	-	-
<i>A. andersonii</i> H.Luther & Leme*	RST	-	-	-
<i>A. apocalypticum</i> Reitz*	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. aquilega</i> (Salisb.) Griseb.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>A. araneosa</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>A. atrovittata</i> Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
<i>A. azurea</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>A. bambusoides</i> L.B.Sm. & Reitz*	FES	-	-	-
<i>A. bicolor</i> L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. blanchetiana</i> (Baker) L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. blumenavii</i> Reitz*	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. bocainensis</i> E.Pereira & Leme*	FOD	-	-	-
<i>A. bromeliifolia</i> (Rudge) Baker	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>A. bruggeri</i> Leme*	FES	-	-	-
<i>A. burle-marxii</i> E.Pereira*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. caesia</i> E.Morren <i>ex</i> Baker*	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. calyculata</i> (E.Morren) Baker	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
<i>A. canaliculata</i> Leme & H.Luther*	FOD	-	-	-
<i>A. candida</i> E.Morren <i>ex</i> Baker*	FOD	-	-	-
<i>A. capixabae</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>A. cariocae</i> L.B.Sm.*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>A. carvalhoi</i> E.Pereira & Leme*	FOD	-	-	-
<i>A. castanea</i> L.B.Sm.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>A. castelnavii</i> Baker	FOD	-	-	-
<i>A. catendensis</i> J.A.Siqueira & Leme*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. caudata</i> Lindm.	FOD, RST, AFL	-	-	-
<i>A. cephaloides</i> J.A.Siqueira & Leme*	FOD	-	-	-
<i>A. chrysocoma</i> Baker*	FOD	-	-	-
<i>A. coelestis</i> (K.Koch) E.Morren	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. comata</i> (Gaudich.) Baker*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. conifera</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. constantinii</i> (Mez) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>A. correia-araujo</i> E.Pereira & Moutinho*	FOD	-	-	-
<i>A. curranii</i> (L.B.Sm.) L.B.Sm. & M.A.Spencer*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. cylindrata</i> Lindm.*	FOD, RST, MAN	-	-	-
<i>A. dealbata</i> E.Morren ex Baker*	RST	-	-	-
<i>A. depressa</i> L.B.Sm.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>A. digitata</i> L.B.Sm. & R.W.Read*	FOD	-	-	-
<i>A. discordiae</i> Leme*	RST	-	-	-
<i>A. disjuncta</i> (L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
<i>A. distichantha</i> Lem.	FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL, FCA	-	-	-
<i>A. echinata</i> (Leme) Leme*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>A. emmerichiae</i> Leme*	FES	-	-	-
<i>A. entringeri</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>A. eurycorymbus</i> Harms*	FES, RST	-	CR	ANEXO I
<i>A. farinosa</i> (Regel) L.B.Sm.	FOD, RST, FES	-	-	-
<i>A. fasciata</i> (Lindl.) Baker*	FOD	-	-	-
<i>A. flavorosa</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>A. floribunda</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. fosteriana</i> L.B.Sm.*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>A. fraudulosa</i> Mez*	FOD	-	-	-
<i>A. froesii</i> (L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. fulgens</i> Brongn.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>A. gamosepala</i> Wittm.	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>A. glandulosa</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>A. gracilis</i> Lindm.*	FOD, FOM, RST	-	VU	ANEXO II
<i>A. graziae</i> Martinelli & Leme*	FOD	-	-	-
<i>A. guainumbiorum</i> J.A.Siqueira & Leme*	FCA	-	-	-
<i>A. guarapariensis</i> E.Pereira & Leme*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. guaratubensis</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>A. gurkeniana</i> E.Pereira & Moutinho*	RST	-	-	-
<i>A. gustavoi</i> J.A.Siqueira & Leme*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>A. hostilis</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>A. incompta</i> Leme & H.Luther*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. kertesziae</i> Reitz	FOD, RST, AFL	-	-	-
<i>A. kleinii</i> Reitz*	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. lactifera</i> Leme & J.A.Siqueira*	RST	-	-	-
<i>A. laevigata</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>A. lamarchei</i> Mez	FOD, FES	-	-	-
<i>A. lanata</i> (L.B.Sm.) L.B.Sm. & M.A.Spencer*	FOD	-	-	-
<i>A. leonard-kentiana</i> H.Luther & Leme*	FOD	-	-	-
<i>A. leppardii</i> Philcox*	FOD	-	-	-
<i>A. leptantha</i> (Harms) Leme & J.A.Siqueira	FOD, FES	-	-	-
<i>A. leucolepis</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>A. linharesiorum</i> Leme*	FES	-	-	-
<i>A. lymanii</i> W.Weber*	FOD	-	-	-
<i>A. maasii</i> Gouda & W.Till*	FOD, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. macrochlamys</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>A. marauensis</i> Leme*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. marginalis</i> Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>A. mertensii</i> (G.Meyer) Schult. & Schult.f.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>A. miniata</i> Beer	FOD, RST	-	-	-
<i>A. mira</i> Leme & H.Luther*	RST	-	-	-
<i>A. mollis</i> L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. mulfordii</i> L.B.Sm.*	RST	-	-	-
<i>A. multiflora</i> L.B.Sm.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>A. muricata</i> (Arruda) L.B.Sm.*	FOD, FES, RST	-	EN	ANEXO I
<i>A. mutica</i> L.B.Sm.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>A. nudicaulis</i> (L.) Griseb.	FOD, FOM, FES, FCA, RST, AFL -	-	-	-
<i>A. organensis</i> Wawra*	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>A. orlandiana</i> L.B.Sm.*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>A. ornata</i> Baker*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>A. paradoxa</i> (Leme) Leme*	FOD	-	-	-
<i>A. patentissima</i> (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker*	FOD, FES, RST, MAN	-	-	-
<i>A. pectinata</i> Baker*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. pedicellata</i> Leme & H.Luther*	FOD	-	-	-
<i>A. perforata</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>A. pernambucensis</i> J.A.Siqueira & Leme*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. phanerophlebia</i> Baker*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. pimenti-velosoi</i> Reitz*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. pineliana</i> (Brong. ex Planch.) Baker*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>A. podantha</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>A. prava</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>A. pseudonudicaulis</i> Leme*	FES	-	-	-
<i>A. purpureo-rosea</i> (Hook.) Wawra*	FOD	-	-	-
<i>A. racinae</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>A. ramosa</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>A. ramusculosa</i> Leme*	RST	-	-	-
<i>A. recurvata</i> (Klotzsch) L.B.Sm.	FOD, FOM, AFL	-	-	-
<i>A. roberto-seidelii</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>A. rubrolilacina</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>A. saxicola</i> L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. serragrandensis</i> Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
<i>A. sphaerocephala</i> Baker*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
<i>A. squarrosa</i> Baker*	FES	-	-	-
<i>A. sucreana</i> Martinelli & C.Vieira*	RST	-	-	-
<i>A. sulbahianensis</i> Leme, Amorim & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
<i>A. tentaculifera</i> Leme, Amorim & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
<i>A. tomentosa</i> Mez*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>A. triangularis</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>A. triticina</i> Mez*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. turbinocalyx</i> Mez*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. vanhoutteana</i> (Van Houtte) Mez*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. victoriana</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>A. viridostigma</i> Leme & H.Luther*	FOD	-	-	-
<i>A. warasii</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>A. weberi</i> (E.Pereira & Leme) Leme*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. weilbachii</i> F.Didr.*	FOD	-	-	-
<i>A. werdermannii</i> Harms*	FES	-	CR	ANEXO I
<i>A. winkleri</i> Reitz*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>A. wittmackiana</i> (Regel) Mez*	FOD	-	-	-
Alcantarea – 21/23				
<i>A. benzingii</i> Leme*	AFL	-	CR	ANEXO II
<i>A. brasiliana</i> (L.B.Sm.) J.R.Grant*	AFL	-	-	-
<i>A. burle-marxii</i> (Leme) J.R.Grant*	AFL	-	-	-
<i>A. distractila</i> Leme & C.C.Paula	AFL	-	-	-
<i>A. edmundoi</i> (Leme) J.R.Grant*	AFL	-	-	-
<i>A. extensa</i> (L.B.Sm.) J.R.Grant*	AFL	-	-	-
<i>A. farneyi</i> (Martinelli & A.Costa) J.R.Grant*	AFL, FCA	-	VU	ANEXO II
<i>A. geniculata</i> (Wawra) J.R.Grant*	AFL, FCA	-	VU	ANEXO II
<i>A. glaziouana</i> (Leme) J.R.Grant*	AFL	-	VU	ANEXO II
<i>A. heloisae</i> J.R.Grant*	AFL	-	-	-
<i>A. imperialis</i> (Carriere) Harms*	AFL, FCA	-	EN	ANEXO II
<i>A. lurida</i> Leme	AFL	-	-	-
<i>A. nahoumii</i> (Leme) J.R.Grant	AFL	-	VU	ANEXO II
<i>A. neavaresii</i> (Leme) J.R.Grant*	AFL, FCA	-	VU	ANEXO II
<i>A. odorata</i> (Leme) J.R.Grant*	AFL	-	-	-
<i>A. patriae</i> Versieux & Wand.*	AFL	-	-	-
<i>A. regina</i> (Vell.) Harms*	AFL	-	-	-
<i>A. roberto-kautskyi</i> Leme*	AFL	-	-	-
<i>A. tortuosa</i> Versieux & Wand.*	AFL	-	-	-
<i>A. turgida</i> Versieux & Wand.	AFL	-	-	-
<i>A. vinicolor</i> (Pereira & Reitz) J.R.Grant*	AFL	-	-	-
Ananas – 3/7				
<i>A. ananassoides</i> (Baker) L.B.Sm.	FOD, FES	-	-	-
<i>A. bracteatus</i> (Lindl.) Schult. & Schult.f.	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
<i>A. fritzmulleri</i> Camargo*	FOD, RST	-	-	-
Araeococcus – 5/9				
<i>A. chlorocarpus</i> (Wawra) Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
<i>A. montanus</i> Leme*	FOD, FES	-	VU	ANEXO II
<i>A. nigropurpureus</i> Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
<i>A. parviflorus</i> (Mart.ex.Schult. & Schult.f.) Lindm.*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
<i>A. sessiliflorus</i> Leme & J.A.Siqueira*	FOD, FES	-	-	-
Billbergia – 34/63				
<i>B. alfonsioannis</i> Reitz*	FOD, FOM, FES, AFL	-	-	-
<i>B. amoena</i> (Lodd.) Lindl.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>B. bradeana</i> L.B.Sm.*	FOD, AFL	-	-	-
<i>B. brasiliensis</i> L.B.Sm.*	FOD, AFL	-	-	-
<i>B. castelensis</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. chlorantha</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>B. distachia</i> (Vell.) Mez	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>B. elegans</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	FES, FCA	-	-	-
<i>B. euphemiae</i> E.Morren	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>B. horrida</i> Regel*	FOD, FES	-	-	-
<i>B. iridifolia</i> (Nees & Mart.) Lindl.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>B. kautskyana</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>B. laxiflora</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>B. leptopoda</i> L.B.Sm.*	FOD, FES	-	-	-
<i>B. lietzei</i> E.Morren*	FOD	-	-	-
<i>B. lymanii</i> E.Pereira & Leme*	FOD, FES	-	-	-
<i>B. macracantha</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>B. macrocalyx</i> Hook.*	FES	-	-	-
<i>B. magnifica</i> Mez	FOD	-	-	-
<i>B. meyeri</i> Mez	FES	-	-	-
<i>B. minarum</i> L.B.Sm.	FOD, FES	-	-	-
<i>B. morelii</i> Brongn.*	FOD	-	-	-
<i>B. nana</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>B. nutans</i> H.H.Wendl. ex Regel	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. pohliana</i> Mez*	FES	-	-	-
<i>B. porteana</i> Brongn. ex Beer	FES, FOD	-	-	-
<i>B. pyramidalis</i> (Sims) Lindl.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>B. reichardtii</i> Wawra	FES	-	-	-
<i>B. sanderiana</i> E.Morren*	FOD	-	-	-
<i>B. saundersii</i> Bull*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>B. seidelii</i> L.B.Sm. & Reitz*	FOD	-	-	-
<i>B. tweediana</i> Baker*	FOD, FES, RST, AFL	-	-	-
<i>B. vittata</i> Brongn.	FOD, FES	-	-	-
<i>B. zebrina</i> (Herb.) Lindl.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
Bromelia – 6/56				
<i>B. antiacantha</i> Bertol.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>B. balansae</i> Mez	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>B. binotii</i> E.Morren ex Mez*	FOD	-	-	-
<i>B. karatas</i> L.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>B. lagopus</i> Mez	FOD	-	-	-
<i>B. regnellii</i> Mez	FES	-	-	-
Canistropsis* – 11/11				
<i>C. albiflora</i> (L.B.Sm.) H.Luther & Leme*	FOD, RST	-	-	-
<i>C. billbergioides</i> (Schult. & Schult.f.) Leme*	FOD, RST	-	-	-
<i>C. burchellii</i> (Baker) Leme*	FOD	-	-	-
<i>C. correia-araujo</i> (E.Pereira & Leme) Leme*	FOD	-	-	-
<i>C. elata</i> (E.Pereira & Leme) Leme*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>C. exigua</i> (E.Pereira & Leme) Leme*	FOD	-	-	-
<i>C. marceloi</i> (E.Pereira & Moutinho) Leme*	FOD	-	-	-
<i>C. microps</i> (E.Morren ex Mez) Leme*	FOD, RST	-	-	-
<i>C. pulcherrima</i> (E.Pereira) Leme*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. seidelii</i> (L.B.Sm. & Reitz) Leme*	FOD	-	-	-
<i>C. simulans</i> (E.Pereira & Leme) Leme*	FOD	-	-	-
<i>Canistrum</i> * – 14/14				
<i>C. alagoanum</i> Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>C. aurantiacum</i> E.Morren*	FOD, FES, RST	-	EN	ANEXO II
<i>C. auratum</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>C. camacaense</i> Martinelli & Leme*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>C. flavipetalum</i> Wand. *	FES	-	-	-
<i>C. fosterianum</i> L.B.Sm. *	FOD, RST	-	CR	ANEXO I
<i>C. guzmanoides</i> Leme*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>C. improcerum</i> Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
<i>C. lanigerum</i> H.Luther & Leme*	RST	-	-	-
<i>C. montanum</i> Leme*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>C. pickelii</i> (A.Lima & L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira*	FOD, FES, AFL	-	EN	ANEXO II
<i>C. sandrae</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>C. seidelianum</i> W.Weber*	FOD	-	-	-
<i>C. triangulare</i> L.B.Sm. & Reitz*	FOD	-	-	-
<i>Catopsis</i> – 2/18				
<i>C. berteroniana</i> (Schult. & Schult.f.) Mez	FOD, FES, RST, MAN	-	-	-
<i>C. sessiliflora</i> (Ruiz & Pav.) Mez	FOD, RST	-	-	-
<i>Cryptanthus</i> – 54/66				
<i>C. acaulis</i> (Lindl.) Beer*	FOD, RST, AFL	-	-	-
<i>C. alagoanus</i> Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
<i>C. beuckeri</i> E.Morren*	FOD, RST	-	-	-
<i>C. bibarrensensis</i> Leme*	FED	-	-	-
<i>C. bivittatus</i> (Hook.) Regel	FOD	-	-	-
<i>C. bromelioides</i> Otto & A.Dietr.*	FOD, RST, AFL	-	-	-
<i>C. burle-marxii</i> Leme*	RST	-	VU	ANEXO I
<i>C. capitatus</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>C. caracensis</i> Leme & E.Gross*	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>C. caulescens</i> I.Ramírez*	FOD	-	-	-
<i>C. colnagoi</i> Rauh & Leme	FES	-	-	-
<i>C. coriaceus</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>C. correia-araujoii</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>C. delicatus</i> Leme*	FES	-	-	-
<i>C. diana</i> Leme*	FES	-	-	-
<i>C. dorothyae</i> Leme*	RST	-	-	-
<i>C. exaltatus</i> H.Luther*	FOD	-	-	-
<i>C. felixii</i> J.A.Siqueira & Leme*	FES	-	-	-
<i>C. fernseeoides</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>C. fosterianus</i> L.B.Sm.*	FES	-	EW	ANEXO I
<i>C. giganteus</i> Leme & A.P.Fontana*	FES	-	-	-
<i>C. glaziovii</i> Mez*	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>C. grazieleae</i> H.Luther*	FOD	-	-	-
<i>C. incrassatus</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>C. latifolius</i> Leme*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. leuzingeriae</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>C. lutherianus</i> I.Ramírez*	FOD	-	-	-
<i>C. lyman-smithii</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>C. marginatus</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>C. maritimus</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>C. microglazioui</i> I.Ramírez*	FOD	-	-	-
<i>C. minarum</i> L.B.Sm.*	?	-	-	-
<i>C. odoratissimus</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>C. osiris</i> W.Weber	?	-	-	-
<i>C. pickelii</i> L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
<i>C. praetextus</i> E.Morren & Baker*	FOD	-	-	-
<i>C. pseudoglazioui</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>C. pseudopetirolatus</i> Philcox*	RST	-	-	-
<i>C. pseudoscaposus</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>C. reisii</i> Leme*	FES	-	-	-
<i>C. reptans</i> Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
<i>C. roberto-kautskyi</i> Leme	FOD	-	-	-
<i>C. ruthae</i> Philcox	FOD, RST	-	-	-
<i>C. sanctaluciae</i> Leme & L.Kollmann	FOD	-	-	-
<i>C. scaposus</i> E.Pereira	FOD	-	-	-
<i>C. schwackeanus</i> Mez	FCA	-	-	-
<i>C. seidelianus</i> W.Weber	?	-	-	-
<i>C. sergipensis</i> I.Ramírez	RST	-	-	-
<i>C. sinuosus</i> L.B.Sm.	RST, AFL	-	-	-
<i>C. teretifolius</i> Leme	RST	-	-	-
<i>C. ubaiensis</i> I.Ramírez	FOD	-	-	-
<i>C. vexatus</i> Leme	FOD	-	-	-
<i>C. whitmanii</i> Leme	FOD	-	-	-
<i>C. zonatus</i> (Visiani) Beer	FOD, FES	-	CR	ANEXO II
<i>Dyckia</i> – 35/130				
<i>D. agudensis</i> Irgang & Sobral*	AFL	-	VU	ANEXO I
<i>D. argentea</i> Mez	FCA, AFL	-	-	-
<i>D. bracteata</i> (Wittm.) Mez	FCA, AFL	-	-	-
<i>D. brevifolia</i> Baker*	AFL	-	-	-
<i>D. cabreriae</i> L.B.Sm. & Reitz*	FCA, AFL	-	EN	ANEXO I
<i>D. choristaminea</i> Mez	AFL	-	EN	ANEXO II
<i>D. cinerea</i> Mez*	FCA, AFL	-	-	-
<i>D. commixta</i> Hassl.	FCA	-	-	-
<i>D. consimilis</i> Mez	FCA	-	-	-
<i>D. crocea</i> L.B.Sm.	FCA	-	-	-
<i>D. delicata</i> Larocca & Sobral*	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>D. densiflora</i> Schult. & Schult.f.	FCA	-	-	-
<i>D. distachya</i> Hassl.	AFL	-	CR	ANEXO I
<i>D. dusenii</i> L.B.Sm.	AFL	-	-	-
<i>D. encholirioides</i> (Gaudich.) Mez*	RST, AFL	-	-	-
<i>D. fosteriana</i> L.B.Sm.	FCA, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>D. frigida</i> Hook.f.	FCA	-	-	-
<i>D. hatschbachii</i> L.B.Sm.*	RST	-	VU	ANEXO I
<i>D. ibiramensis</i> Reitz*	AFL	-	CR	ANEXO I
<i>D. irmgardiae</i> L.B.Sm.	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>D. leptostachya</i> Baker	FCA	-	-	-
<i>D. maritima</i> Baker*	RST, AFL	-	-	-
<i>D. martinellii</i> B.R.Silva & Forzza*	AFL	-	-	-
<i>D. microcalyx</i> Baker	AFL	-	-	-
<i>D. minarum</i> Mez	FCA, AFL	-	-	-
<i>D. monticola</i> L.B.Sm. & Reitz*	FCA, AFL	-	-	-
<i>D. pernambucana</i> L.B.Sm.	FCA, AFL	-	-	-
<i>D. pseudococcinea</i> L.B.Sm.*	RST	-	CR	ANEXO II
<i>D. reitzii</i> L.B.Sm.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>D. remotiflora</i> Otto & A.Dietr.	FCA, AFL	-	-	-
<i>D. saxatilis</i> Mez	FCA	-	-	-
<i>D. schwackeana</i> Mez	FCA	-	-	-
<i>D. selloa</i> (K.Koch) Baker*	FCA	-	-	-
<i>D. trichostachya</i> Baker	AFL	-	-	-
<i>D. tuberosa</i> (Vell.) Beer	FCA, AFL	-	-	-
<i>Edmundoa</i> * – 3/3				
<i>E. ambigua</i> (Wand. & Leme) Leme*	FOD	-	-	-
<i>E. lindenii</i> (Regel) Leme*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>E. perplexa</i> (L.B.Sm.) Leme*	FOD	-	-	-
<i>Eduandrea</i> * – 1/1				
<i>E. selloana</i> (Baker) Leme <i>et al.</i> *	FES	-	-	-
<i>Encholirium</i> – 2/23				
<i>E. gracile</i> L.B.Sm.*	AFL	-	EN	ANEXO II
<i>E. horridum</i> L.B.Sm.*	AFL	-	EN	ANEXO II
<i>Fernseea</i> * – 2/2				
<i>F. bocainensis</i> E.Pereira & Moutinho*	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>F. itatiaiae</i> (Wawra) Baker*	FCA	-	EN	ANEXO I
<i>Guzmania</i> – 3/200				
<i>G. lingulata</i> (L.) Mez	FOD, RST	-	-	-
<i>G. monostachia</i> (L.) Rusby <i>ex</i> Mez	FOD, FES	-	EN	ANEXO I
<i>G. sanguinea</i> (André) André <i>ex</i> Mez	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>Hohenbergia</i> – 24/56				
<i>H. augusta</i> (Vell.) Morren*	FOD, RST	-	-	-
<i>H. belemii</i> L.B.Sm. & R.W.Read*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
<i>H. blanchetii</i> (Baker) E.Morren <i>ex</i> Mez*	FOD, RST	-	-	-
<i>H. brachycephala</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>H. burle-marxii</i> Leme & W.Till*	?	-	-	-
<i>H. castellanosi</i> L.B.Sm & R.W.Read*	RST	-	CR	ANEXO I
<i>H. catingae</i> Ule	RST, FES ?, AFL?	-	-	-
<i>H. conquistensis</i> Leme	?	-	-	-
<i>H. correa-araujo</i> E.Pereira & Moutinho*	FOD, FED ?	-	CR	ANEXO I
<i>H. flava</i> Leme & C.C.Paula*	FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>H. hatschbachii</i> Leme*	RST	-	-	-
<i>H. horrida</i> Harms*	FES, FCA, AFL?	-	-	-
<i>H. itamarajuensis</i> Leme & Baracho*	FOD	-	-	-
<i>H. lanata</i> E.Pereira & Moutinho*	FED ?	-	-	-
<i>H. lemei</i> H.Luther & K.Norton*	FOD	-	-	-
<i>H. littoralis</i> L.B.Sm.*	RST	-	CR	ANEXO I
<i>H. minor</i> L.B.Sm.*	FOD, FED ?	-	-	-
<i>H. pabstii</i> L.B.Sm. & R.W.Read*	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>H. ramageana</i> Mez*	FOD, FES ?	-	-	-
<i>H. ridleyi</i> (Baker) Mez*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>H. rosea</i> L.B.Sm. & R.W.Read	FES	-	-	-
<i>H. salzmännii</i> (Baker) E.Morren ex Mez*	FOD, RST	-	-	-
<i>H. stellata</i> Schult. & Schult.f.	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
<i>H. utriculosa</i> Ule	AFL	-	-	-
<i>Lymania</i> * – 9/9				
<i>L. alvimii</i> (L.B.Sm. & R.W.Read) R.W.Read*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>L. azurea</i> Leme*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>L. brachycaulis</i> (E.Morren ex Baker) L.F.Sousa*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>L. corallina</i> (Brong. ex Beer) R.W.Read*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
<i>L. globosa</i> Leme*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
<i>L. languida</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>L. marantoides</i> (L.B.Sm.) R.W.Read*	FOD	-	-	-
<i>L. smithii</i> R.W.Read*	FOD, RST	-	-	-
<i>L. spiculata</i> Leme & Forzza*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>Neoregelia</i> – 97/112				
<i>N. abendrothae</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>N. ampullacea</i> (E.Morren) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>N. angustibracteolata</i> E.Pereira & Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. angustifolia</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>N. atroviridifolia</i> W.Weber	?	-	-	-
<i>N. azevedoi</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. binotii</i> (Antoine) L.B.Sm.*	FOD	-	EW	ANEXO I
<i>N. bragarum</i> (E.Pereira & L.B.Sm.) Leme*	FOD, FCA	-	-	-
<i>N. brevifolia</i> L.B.Sm. & Reitz*	FOD	-	-	-
<i>N. brigadeirensis</i> C.C.Paula & leme*	FES	-	-	-
<i>N. brownii</i> Leme*	FES	-	VU	ANEXO II
<i>N. burle-marxii</i> R.W.Read*	?	-	VU	ANEXO II
<i>N. camorimiana</i> E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
<i>N. capixaba</i> E.Pereira & Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. carcharodon</i> (Baker) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>N. carinata</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. carolinae</i> (Beer) L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
<i>N. chlorosticta</i> (Baker) L.B.Sm.*	FOD, FES	-	-	-
<i>N. coimbrae</i> E.Pereira & Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. compacta</i> (Mez) L.B.Sm.*	FOD, RST	-	EN	ANEXO II
<i>N. concentrica</i> (Vell.) L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>N. coriacea</i> (Antoine) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>N. correia-araujoi</i> E.Pereira & I.A.Penna*	?	-	-	-
<i>N. crispata</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. cruenta</i> (R.Graham) L.B.Sm.*	RST, AFL, MAN	-	VU	ANEXO II
<i>N. cyanea</i> (Beer) L.B.Sm.*	FES	-	-	-
<i>N. diversifolia</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>N. doeringiana</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>N. dungsiana</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>N. eltoniana</i> W.Weber*	RST	-	-	-
<i>N. farinosa</i> (Ule) L.B.Sm.*	FOD, FES	-	-	-
<i>N. fluminensis</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>N. fosteriana</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>N. gavionensis</i> Martinelli & Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. gigas</i> Leme & L.Kollmann*	FOD	-	-	-
<i>N. guttata</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. hoehneana</i> L.B.Sm.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>N. ibitipocensis</i> (Leme) Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. indecora</i> (Mez) L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
<i>N. inexpectata</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. johannis</i> (Carriere) L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
<i>N. kautskyi</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>N. kerryi</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. kuhlmannii</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>N. lactea</i> H.Luther & Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. laevis</i> (Mez) L.B.Sm.*	FOD, RST	-	-	-
<i>N. leprosa</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>N. leucophloea</i> (Baker) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>N. lilliputiana</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>N. lillyae</i> W.Weber	?	-	-	-
<i>N. longipedicellata</i> Leme*	FCA	-	-	-
<i>N. longisepala</i> E.Pereira & I.A.Penna*	FOD, RST	-	-	-
<i>N. lymaniana</i> R.Braga & D.Sucre*	FOD, FES	-	-	-
<i>N. macahensis</i> (Ule) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>N. macrosepala</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>N. maculata</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>N. macwilliamsii</i> L.B.Sm.*	RST	-	-	-
<i>N. magdalenae</i> L.B.Sm. & Reitz*	FOD, FCA	-	-	-
<i>N. marmorata</i> (Baker) L.B.Sm.*	FOD, RST, AFL	-	-	-
<i>N. martinellii</i> W.Weber*	FOD	-	-	-
<i>N. melanodonta</i> L.B.Sm.*	?	-	-	-
<i>N. menescalii</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. nevaesii</i> Leme & H.Luther*	FOD	-	-	-
<i>N. nivea</i> Leme	?	-	-	-
<i>N. odorata</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. olens</i> (Hook.f.) L.B.Sm.	?	-	-	-
<i>N. oligantha</i> L.B.Sm.*	FES, FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>N. pascoaliana</i> L.B.Sm.*	RST, MAN	-	EN	ANEXO II
<i>N. pauciflora</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>N. paulistana</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>N. pernambucana</i> Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>N. petropolitana</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. pineliana</i> (Lem.) L.B.Sm.	?	-	-	-
<i>N. pontualii</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. princeps</i> (Baker) L.B.Sm.	FOD	-	-	-
<i>N. punctatissima</i> (Ruschi) Ruschi*	FOD	-	-	-
<i>N. richteri</i> W.Weber	?	-	-	-
<i>N. roethii</i> W.Weber*	?	-	-	-
<i>N. rubrifolia</i> Ruschi*	FOD	-	-	-
<i>N. rubrovittata</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. ruschii</i> Leme & B.R.Silva*	FOD	-	-	-
<i>N. sanguinea</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. sapiatibensis</i> E.Pereira & I.A.Perna*	FOD, RST	-	-	-
<i>N. sarmentosa</i> (Regel) L.B.Sm.*	FOD, FES, RST, AFL	-	-	-
<i>N. schubertii</i> Roth	?	-	-	-
<i>N. seideliana</i> L.B.Sm. & Reitz*	FOD	-	-	-
<i>N. silvomontana</i> Leme & J.A.Siqueira*	FOD	-	-	-
<i>N. simulans</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>N. smithii</i> W.Weber	?	-	-	-
<i>N. spectabilis</i> (T.Moore) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>N. tenebrosa</i> Leme*	FOD, FCA	-	-	-
<i>N. tigrina</i> (Ruschi) Ruschi*	FOD	-	-	-
<i>N. tristis</i> (Beer) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>N. uleana</i> L.B.Sm.	?	-	-	-
<i>N. wilsoniana</i> M.B.Foster*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>N. zaslavskyi</i> E.Pereira & Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. zonata</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>Nidularium</i> * – 45/45				
<i>N. albiflorum</i> (L.B.Sm.) Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. altimontanum</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. alvimii</i> W.Weber*	?	-	-	-
<i>N. amazonicum</i> (Baker) Linden & E.Morren ex Lindm. *	FOD, FOM	-	-	-
<i>N. amorimii</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. angustibracteatum</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. angustifolium</i> Ule*	FOD	-	-	-
<i>N. antioineanum</i> Wawra*	FOD	-	-	-
<i>N. apiculatum</i> L.B.Sm. *	FOD	-	-	-
<i>N. atalaiaense</i> E.Pereira & Leme*	FOD, RST, AFL	-	VU	ANEXO II
<i>N. azureum</i> (L.B.Sm.) Leme*	FES	-	CR	ANEXO II
<i>N. bicolor</i> (E.Pereira) Leme*	FOD, FES	-	-	-
<i>N. bocainense</i> Leme*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>N. campo-alegrense</i> Leme*	FOD, FOM	-	-	-
<i>N. campos-portoi</i> (L.B.Sm.) Wand. & B.A.Moreira*	FOD, RST, MAN	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>N. cariacicaense</i> (W.Weber) Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. catarinense</i> Leme*	FOM	-	-	-
<i>N. corallinum</i> (Leme) Leme*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>N. espiritosantense</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. ferdinando-coburgii</i> Wawra*	FOD	-	-	-
<i>N. ferrugineum</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. fradense</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. fulgens</i> Lem. *	FOD	-	-	-
<i>N. innocentii</i> Lem.*	FOD, RST	-	-	-
<i>N. itatiaiae</i> L.B.Sm. *	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>N. jonesianum</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. kautskyanum</i> Leme*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>N. krisgreeniae</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. linehamii</i> Leme*	FOM	-	-	-
<i>N. longiflorum</i> Ule*	FOD, FES	-	-	-
<i>N. mangaratibense</i> Leme*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>N. marigoi</i> Leme*	FOD, FES	-	-	-
<i>N. meeanum</i> Leme <i>et al.</i> *	FOD	-	-	-
<i>N. minutum</i> Mez*	FOD	-	-	-
<i>N. organense</i> Lem*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>N. pinguabense</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. procerum</i> Lindm. *	FOD, RST, MAN	-	-	-
<i>N. purpureum</i> Beer*	FOD, FES	-	-	-
<i>N. rosulatum</i> Ule*	RST	-	EN	ANEXO II
<i>N. rubens</i> Mez*	FOD	-	-	-
<i>N. rutilans</i> E.Morren*	FOD	-	-	-
<i>N. scheremetiewii</i> Regel*	FOD	-	-	-
<i>N. serratum</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>N. utriculosum</i> Ule*	FOD, RST	-	EW	ANEXO I
<i>N. viridipetalum</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>Orthophytum</i> – 32/51				
<i>O. alvimii</i> W.Weber	?	-	-	-
<i>O. atalaiense</i> J.A.Siqueira & Leme*	AFL	-	-	-
<i>O. benzingii</i> Leme & H.Luther*	AFL	-	-	-
<i>O. boudetianum</i> Leme & L.Kollmann	AFL	-	-	-
<i>O. braunii</i> Leme*	AFL	-	-	-
<i>O. compactum</i> L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
<i>O. disjunctum</i> L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
<i>O. duartei</i> L.B.Sm.*	AFL	-	EN	ANEXO II
<i>O. estevesii</i> (Rauh) Leme*	AFL	-	-	-
<i>O. falconii</i> Leme*	FES	-	-	-
<i>O. foliosum</i> L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
<i>O. fosterianum</i> L.B.Sm.*	AFL	-	VU	ANEXO II
<i>O. glabrum</i> (Mez) Mez	AFL	-	-	-
<i>O. grossiorum</i> Leme & C.C.Paula*	AFL	-	EN	ANEXO II
<i>O. gurkenii</i> Hutchison*	?	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>O. horridum</i> Leme*	AFL	-	-	-
<i>O. itambense</i> Versieux & Leme*	FCA	-	-	-
<i>O. jabrense</i> G.S.Baracho & J.A.Siqueira*	AFL	-	-	-
<i>O. lanuginosum</i> Leme & C.C.Paula*	AFL	-	-	-
<i>O. leprosum</i> (Mez) Mez*	FES, FED, AFL	-	-	-
<i>O. lucidum</i> Leme & H.Luther	AFL	-	-	-
<i>O. magalhaesii</i> L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
<i>O. maracasense</i> L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
<i>O. pseudovagans</i> Leme & L.Kollmann	FES	-	-	-
<i>O. rubrum</i> L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
<i>O. sanctum</i> L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
<i>O. saxicolum</i> Ule	AFL	-	-	-
<i>O. striatifolium</i> Leme & L.Kollmann	AFL	-	-	-
<i>O. sucrei</i> H.Luther	AFL	-	-	-
<i>O. triunfense</i> J.A.Siqueira & Leme*	AFL	-	-	-
<i>O. vagans</i> M.B.Foster*	?	-	-	-
<i>O. zanonii</i> Leme*	AFL	-	-	-
<i>Pitcairnia</i> – 16/350				
<i>P. albiflos</i> Herb.*	AFL	-	CR	ANEXO II
<i>P. azouryi</i> Martinelli & Forzza*	AFL	-	-	-
<i>P. burle-marxii</i> R.Braga & Sucre*	AFL	-	-	-
<i>P. carinata</i> Mez*	AFL	-	-	-
<i>P. corcovadensis</i> Wawra*	FOD	-	-	-
<i>P. curvidens</i> L.B.Sm. & R.W.Read	FCA	-	-	-
<i>P. decidua</i> L.B.Sm.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>P. encholirioides</i> L.B.Sm.*	AFL	-	CR	ANEXO II
<i>P. flammea</i> Lindl.	FOD, FOM, FES, FCA, AFL	-	-	-
<i>P. glaziovii</i> Baker*	FCA, AFL	-	CR	ANEXO II
<i>P. insularis</i> Tatagiba & R.J.V.Alves*	FOD	-	-	-
<i>P. lanuginosa</i> Ruiz & Pav.	FCA	-	-	-
<i>P. limae</i> L.B.Sm.*	AFL	-	CR	ANEXO II
<i>P. norte-fluminensis</i> Leme*	AFL	-	-	-
<i>P. staminea</i> Lodd.*	AFL	-	-	-
<i>P. wendtii</i> Tatagiba & B.R.Silva*	FOD	-	-	-
<i>Portea</i> * – 8/8				
<i>P. alatisepala</i> Philcox*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
<i>P. filifera</i> L.B.Sm. *	FOD	-	-	-
<i>P. fosteriana</i> L.B.Sm. *	FOD	-	-	-
<i>P. grandiflora</i> Philcox*	FES, RST	-	VU	ANEXO I
<i>P. kermesina</i> K.Koch*	RST	-	CR	ANEXO I
<i>P. nana</i> Leme & H.Luther*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>P. petropolitana</i> (Wawra) Mez*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>P. silveirae</i> Mez*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Pseudananas</i> – 1/1				
<i>P. sagenarius</i> (Arruda) Camargo	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
<i>Quesnelia</i> * – 19/19				
<i>Q. alvimii</i> Leme*	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>Q. arvensis</i> (Vell.) Mez*	FOD, RST, MAN	-	-	-
<i>Q. augusto-coburgii</i> Wawra*	FOD	-	-	-
<i>Q. clavata</i> Amorim & Leme*	FOD	-	-	-
<i>Q. dubia</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>Q. edmundoi</i> L.B.Sm. *	FOD	-	-	-
<i>Q. humilis</i> Mez*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>Q. imbricata</i> L.B.Sm. *	FCA, AFL, FOD	-	-	-
<i>Q. indecora</i> Mez*	FES	-	-	-
<i>Q. kautsky</i> C.Vieira*	FOD, FES	-	-	-
<i>Q. koltesii</i> Amorim & Leme*	FOD	-	-	-
<i>Q. lateralis</i> Wawra*	FOD	-	-	-
<i>Q. liboniana</i> (De Jongle) Mez*	FOD, FES	-	-	-
<i>Q. marmorata</i> (Lem.) R.W.Read*	FOD, RST, MAN	-	-	-
<i>Q. quesneliana</i> (Brongn.) L.B.Sm. *	FOD, FES, RST, MAN	-	-	-
<i>Q. seideliana</i> L.B.Sm. *	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>Q. strobilispica</i> Wawra*	FOD	-	-	-
<i>Q. testudo</i> Lindm. *	FOD, RST	-	-	-
<i>Q. violacea</i> Wand. & S.L.Proença*	FOD	-	-	-
<i>Racinaea</i> – 3/61				
<i>R. aerisicola</i> (Mez) M.A.Spencer & L.B.Sm.*	FOD, FES	-	-	-
<i>R. domingos-martinsis</i> (Rauh) J.R.Grant*	FOD	-	-	-
<i>R. spiculosa</i> (Griseb.) M.A.Spencer & L.B.Sm.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Ronnbergia</i> – 4/14				
<i>R. brasiliensis</i> E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
<i>R. carvalhoi</i> Martinelli & Leme*	FOD	-	-	-
<i>R. neoregelioides</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>R. silvana</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>Tillandsia</i> – 53/560				
<i>T. aeranthos</i> (Loisel.) L.B.Sm.	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>T. afonsoana</i> T.Strehl	FES	-	VU	ANEXO I
<i>T. araujei</i> Mez*	AFL	-	-	-
<i>T. arequidae</i> (André) André ex Mez	?	-	-	-
<i>T. bergeri</i> Mez	FES	-	-	-
<i>T. brachyphylla</i> Baker*	AFL	-	CR	ANEXO II
<i>T. bulbosa</i> Hook.f.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>T. carminea</i> W.Till*	AFL	-	-	-
<i>T. catimbauensis</i> Leme et al. *	FES	-	-	-
<i>T. chapeuensis</i> Rauh	FES, AFL	-	-	-
<i>T. crocata</i> (E.Morren) Baker	AFL	-	-	-
<i>T. didisticha</i> (E.Morren) Baker	FES, AFL	-	-	-
<i>T. dura</i> Baker*	FOD, AFL	-	-	-
<i>T. eltoniana</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>T. gardneri</i> Lindl.	FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL, MAN	-	-	-
<i>T. geminiflora</i> Brongn.	FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL, MAN	-	-	-
<i>T. globosa</i> Wawra	FOD, FES, RST, MAN	-	-	-
<i>T. grazieleae</i> D.Sucre & R.Braga*	AFL	-	CR	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>T. heubergeri</i> Ehlers*	FOD, AFL	-	VU	ANEXO II
<i>T. itaubensis</i> T.Strehl	FES	-	VU	ANEXO II
<i>T. jonesii</i> T.Strehl	FES	-	-	-
<i>T. juncea</i> (Ruiz & Pav.) Poir.	FOD, FES, AFL	-	-	-
<i>T. kautskyi</i> E.Pereira*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>T. kegeliana</i> Mez	FOD, FES	-	-	-
<i>T. leonamiana</i> E.Pereira	AFL	-	-	-
<i>T. linearis</i> Vell.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>T. loliacea</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	FOD, FES, FED, AFL	-	-	-
<i>T. lorentziana</i> Griseb.	AFL	-	-	-
<i>T. mallemonitii</i> Glaz. ex Mez	FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL, MAN	-	-	-
<i>T. montana</i> Reitz*	FOD	-	-	-
<i>T. neglecta</i> E.Pereira*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
<i>T. nuptialis</i> R.Braga & D.Sucre*	AFL	-	-	-
<i>T. organensis</i> Ehlers*	AFL	-	-	-
<i>T. paraensis</i> Mez	FOD, RST	-	-	-
<i>T. pohliana</i> Mez	FES, FED	-	-	-
<i>T. polystachia</i> (L.) L.	FOD, FES, FED, RST, AFL	-	-	-
<i>T. pruinosa</i> Sw.*	FOD, RST	-	-	-
<i>T. reclinata</i> E.Pereira & Martinelli*	AFL	-	VU	ANEXO II
<i>T. recurvata</i> (L.) L.	FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL -	-	-	-
<i>T. recurvifolia</i> Hook.*	AFL	-	-	-
<i>T. rodenardii</i> T.Strehl	FES	-	-	-
<i>T. roseiflora</i> Ehlers & W.Weber*	FOD	-	-	-
<i>T. segregata</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>T. seideliana</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>T. sprengeliana</i> Klotzsch ex Mez*	FOD, RST	-	-	-
<i>T. streptocarpa</i> Baker	AFL	-	-	-
<i>T. stricta</i> Sol.	FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL, MAN	-	-	-
<i>T. sucrei</i> E.Pereira*	AFL	-	CR	ANEXO II
<i>T. tenuifolia</i> L.	FOD, FOM, FES, FED, AFL, RST -	-	-	-
<i>T. toropiensis</i> Rauh	?	-	-	-
<i>T. tricholepis</i> Baker	FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL -	-	-	-
<i>T. usneoides</i> (L.) L.	FOD, FOM, FES, FED, RST, MAN	-	-	-
<i>T. xiphoides</i> Ker-Gawler	AFL	-	-	-
Vriesea – 165/250				
<i>V. agostiniana</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>V. altimontana</i> E.Pereira & Martinelli*	FCA, AFL	-	CR	ANEXO II
<i>V. altodaserrae</i> L.B.Sm.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>V. altomacaensis</i> A.Costa*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>V. amadoi</i> Leme*	AFL	-	-	-
<i>V. amethystina</i> E.Morren*	FOD,	-	VU	ANEXO II
<i>V. apparicana</i> E.Pereira & Reitz*	AFL	-	-	-
<i>V. arachnoidea</i> A.Costa*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>V. atra</i> Mez*	FOD, AFL, FCA	-	-	-
<i>V. atrococcinea</i> Rauh*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>V. atropurpurea</i> Silveira	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>V. barbosae</i> J.A.Siqueira & Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. barilletii</i> E.Morren	?	-	-	-
<i>V. belloii</i> Leme*	AFL	-	-	-
<i>V. biguassuensis</i> Reitz*	FOD, FOM	-	-	-
<i>V. billbergioides</i> E.Morren <i>ex</i> Mez*	FOD, FES	-	-	-
<i>V. bituminosa</i> Wawra*	FOD, FES, FCA, AFL	-	VU	ANEXO II
<i>V. blackburniana</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. bleherae</i> Roth & W.Weber*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>V. botafogensis</i> Mez*	AFL	-	CR	ANEXO II
<i>V. brassicoides</i> (Baker) Mez*	AFL	-	CR	ANEXO II
<i>V. breviscapa</i> (E.Pereira & I.A.Penna) Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. brusquensis</i> Reitz*	FOD, RST	-	-	-
<i>V. cacuminis</i> L.B.Sm.*	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>V. calimaniensis</i> Leme & W.Till*	FOD	-	-	-
<i>V. capixabae</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. carinata</i> Wawra*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>V. cearensis</i> L.B.Sm.*	FES	-	CR	ANEXO I
<i>V. clauseniana</i> (Baker) Mez*	FCA	-	-	-
<i>V. colnagoi</i> E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
<i>V. corcovadensis</i> (Britten) Mez*	FOD, RST	-	-	-
<i>V. correa-araujo</i> E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
<i>V. costae</i> B.R.Silva & Leme*	AFL	-	CR	ANEXO II
<i>V. crassa</i> Mez	FCA,	-	-	-
<i>V. croceana</i> Leme & G.K.Brown*	AFL	-	-	-
<i>V. debilis</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. declinata</i> Leme*	FOD, FOM	-	-	-
<i>V. delicatula</i> L.B.Sm.*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>V. dictyographa</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. drepanocarpa</i> (Baker) Mez*	FOD	-	-	-
<i>V. duvaliana</i> E.Morren*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
<i>V. eltoniana</i> E.Pereira*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>V. ensiformis</i> (Vell.) Beer*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>V. erythrodactylon</i> E.Morren*	FOD, RST	-	-	-
<i>V. fenestralis</i> Linden & André*	FOD	-	-	-
<i>V. fidelensis</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. flammea</i> L.B.Sm.*	FOD, RST, AFL	-	-	-
<i>V. flava</i> A.Costa <i>et al.</i> *	FOD	-	-	-
<i>V. fluminensis</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>V. fontellana</i> Leme & G.K.Brown*	AFL	-	-	-
<i>V. fontourae</i> B.R.Silva*	FOD	-	-	-
<i>V. fosteriana</i> L.B.Sm.*	FOD, AFL	-	CR	ANEXO II
<i>V. fradensis</i> A.Costa*	FOD	-	-	-
<i>V. freicanecana</i> J.A.Siqueira & Leme*	AFL	-	-	-
<i>V. friburgensis</i> Mez	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
<i>V. funebris</i> L.B.Sm.*	AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>V. garlippiana</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. gastiniana</i> Leme & G.K.Brown*	AFL	-	-	-
<i>V. gigantea</i> Gaudich.*	FOD, FOM, FES, FED, RST,	-	-	-
<i>V. goniorachis</i> (Baker) Mez*	AFL	-	CR	ANEXO II
<i>V. gracilior</i> (L.B.Sm.) Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. gradata</i> (Baker) Mez*	FOD, FES	-	-	-
<i>V. grandiflora</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. guttata</i> Linden & André*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>V. harrylutheri</i> Leme & G.K.Brown*	AFL	-	-	-
<i>V. heterostachys</i> (Baker) L.B.Sm.*	FOD, FES	-	-	-
<i>V. hieroglyphica</i> (Carriere) E.Morren*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>V. hoehneana</i> L.B.Sm.*	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>V. hydrophora</i> Ule*	FOD	-	-	-
<i>V. incurvata</i> Gaudich.*	FOD, RST	-	-	-
<i>V. inflata</i> (Wawra) Wawra*	FOD	-	-	-
<i>V. interrogatoria</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>V. itatiaiae</i> Wawra*	FCA, FOD	-	-	-
<i>V. jonesiana</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. jonghei</i> (K.Koch) E.Morren	FOD, RST	-	-	-
<i>V. joyae</i> E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
<i>V. kautskyana</i> E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
<i>V. lancifolia</i> (Baker) L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
<i>V. languida</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>V. leptantha</i> Harms*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>V. lidicensis</i> Reitz*	FOD	-	-	-
<i>V. limae</i> L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
<i>V. linharesiae</i> Leme & J.A.Siqueira*	FES, FED	-	-	-
<i>V. longicaulis</i> (Baker) Mez*	FOD, FES	-	-	-
<i>V. longiscapa</i> Ule*	FOD, RST	-	-	-
<i>V. longistaminea</i> C.C.Paula & leme*	FCA	-	CR	ANEXO II
<i>V. lubbersii</i> (Baker) E.Morren*	FOD, FES	-	-	-
<i>V. menescalii</i> E.Pereira & Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. michaelii</i> W.Weber	?	-	-	-
<i>V. minarum</i> L.B.Sm.	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>V. minor</i> (L.B.Sm.) Leme	FCA	-	-	-
<i>V. minuta</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. modesta</i> Mez*	FOD	-	-	-
<i>V. mollis</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. monacorum</i> L.B.Sm.	FCA	-	-	-
<i>V. morrenii</i> Wawra*	FOD	-	-	-
<i>V. muelleri</i> Mez*	FOD, RST	-	-	-
<i>V. neoglutinosa</i> Mez*	RST, AFL	-	-	-
<i>V. noblickii</i> Martinelli & Leme*	FOD, FED	-	-	-
<i>V. oleosa</i> Leme	FOD	-	-	-
<i>V. pabstii</i> McWilliams & L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>V. paradoxa</i> Mez	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>V. paraibica</i> Wawra*	FOD	-	-	-
<i>V. paratiensis</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>V. pardalina</i> Mez	FOD, FCA	-	-	-
<i>V. parviflora</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>V. parvula</i> Rauh	?	-	-	-
<i>V. pastuchoffiana</i> Glaz. ex Mez*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>V. pauciflora</i> Mez*	FOD, FES	-	-	-
<i>V. pauperrima</i> E.Pereira*	FOD, RST, FES	-	-	-
<i>V. penduliflora</i> L.B.Sm.*	FOD, FCA	-	EN	ANEXO II
<i>V. pereirae</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>V. philippocoburgii</i> Wawra*	FOD, FOM, RST, FCA	-	-	-
<i>V. pinottii</i> Reitz*	FOD, RST	-	-	-
<i>V. platynema</i> Gaudich.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>V. platzmannii</i> E.Morren*	FOD, RST	-	-	-
<i>V. plurifolia</i> Leme*	AFL	-	-	-
<i>V. poenulata</i> (Baker) E.Morren ex Mez*	FOD	-	-	-
<i>V. procera</i> (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm.	FOD, FES, FED, RST, AFL, MAN-	-	-	-
<i>V. pseudoatra</i> Leme*	AFL	-	-	-
<i>V. psittacina</i> (Hook.) Lindl.	FOD, FES, RST	-	VU	ANEXO II
<i>V. punctulata</i> E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
<i>V. racinae</i> L.B.Sm.*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>V. rafaelii</i> Leme*	FES	-	-	-
<i>V. rastrensis</i> Leme*	FOD, FCA	-	-	-
<i>V. rectifolia</i> Rauh*	FES	-	-	-
<i>V. recurvata</i> Gaudich.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>V. regnellii</i> Mez*	FOD, FES	-	-	-
<i>V. reitzii</i> Leme & A.Costa*	FOM	-	-	-
<i>V. repandostachys</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. revoluta</i> B.R.Silva*	FOD	-	-	-
<i>V. rhodostachys</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>V. roberto-seidelii</i> W.Weber*	FOD	-	-	-
<i>V. rodigasiana</i> E.Morren*	FOD, RST, MAN	-	-	-
<i>V. roethii</i> W.Weber*	FOD	-	-	-
<i>V. rubyae</i> E.Pereira*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>V. ruschii</i> L.B.Sm.*	FOD, FES	-	-	-
<i>V. saundersii</i> (Carriere) E.Morren ex Mez*	AFL	-	CR	ANEXO II
<i>V. saxicola</i> L.B.Sm.	FCA	-	-	-
<i>V. sazimae</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. scalaris</i> E.Morren	FOD, FES	-	-	-
<i>V. sceptrum</i> Mez	FOD, FES	-	-	-
<i>V. schunkii</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. schwackeana</i> Mez*	FOD, FES	-	-	-
<i>V. secundiflora</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>V. seideliana</i> W.Weber*	FOD	-	-	-
<i>V. serrana</i> E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
<i>V. silvana</i> Leme*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>V. simplex</i> (Vell.) Beer	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>V. sparsiflora</i> L.B.Sm.*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>V. sucrei</i> L.B.Sm. & R.W.Read*	FOD, RST	-	CR	ANEXO II
<i>V. taritubensis</i> E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
<i>V. thyrsioidea</i> Mez*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>V. tijucana</i> E.Pereira*	FOD	-	-	-
<i>V. triangularis</i> Reitz*	FOD	-	-	-
<i>V. triligulata</i> Mez*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>V. unilateralis</i> (Baker) Mez*	FOD	-	-	-
<i>V. vagans</i> (L.B.Sm.) L.B.Sm.	FOD, RST	-	-	-
<i>V. vellozicola</i> Leme & J.A.Siqueira*	AFL	-	-	-
<i>V. vidalii</i> L.B.Sm. & Handro*	FCA, AFL	-	VU	ANEXO II
<i>V. vulpinoidea</i> L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>V. warmingii</i> E.Morren*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>V. wawraea</i> Antoine*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>V. weberi</i> E.Pereira & I.A.Penna*	FOD	-	-	-
<i>V. zonata</i> Leme & J.A.Siqueira*	AFL	-	-	-
<i>Wittrockia</i> * – 6/6				
<i>W. cyathiformis</i> (Vell.) Leme*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>W. gigantea</i> (Baker) Leme*	FOD	-	-	-
<i>W. paulistana</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>W. spiralipetala</i> Leme*	FOD	-	-	-
<i>W. superba</i> Lindm. *	FOD, AFL	-	-	-
<i>W. tenuisepala</i> (Leme) Leme*	FOD, FES	-	-	-

Burmanniaceae

Paul J. M. Maas & Hiltje Maas - van de Kamer

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BURMANNIACEAE – 13/98				
Apteria – 1/1				
A. aphylla (Nutt.) Barnh. ex Small	FOD, FES, FOM, RST	-	-	-
Burmattia – 7/60				
B. alba Mart.	FCA, FAQ	-	-	-
B. aprica (Malme) Jonker*	FOD, FCA	-	-	-
B. australis Malme	FCA, FOD, AFL	-	-	-
B. bicolor Mart.	FCA, FAQ	-	-	-
B. capitata (Walter ex J.F.Gmel.) Mart	RST, FCA, FAQ	-	-	-
B. flava Mart.	AFL, FCA, FAQ	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. tenera</i> (Malme) Jonker	FCA, FES	-	-	-
<i>Campylosiphon</i> – 1/1				
<i>C. purpurascens</i> Benth.	FOD	-	-	-
<i>Cymbocarpa</i> – 1/3				
<i>C. refracta</i> Miers	FOD, FES	-	-	-
<i>Dictyostega</i> – 1/1				
<i>D. orobanchoides</i> (Hook.) Miers	FOD	-	-	-
<i>Gymnosiphon</i> – 1/25				
<i>G. divaricatus</i> (Benth.) Benth. & Hook.f.	FOD	-	-	-
<i>Miersiella</i> – 1/1				
<i>M. umbellata</i> (Miers) Urb.	FOD	-	-	-

Burseraceae

Douglas C. Daly

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
BURSERACEAE – 17/ca.550				
<i>Crepidospermum</i> – 1/8				
<i>C. atlanticum</i> Daly*	FOD, FES	-	-	-
<i>Protium</i> – 11/150				
<i>P. aracouchini</i> (Aubl.) Marchand	FOD	-	-	-
<i>P. bahianum</i> Daly*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>P. brasiliense</i> (Spreng.) Engl.	FOD, RST, FES	-	-	-
<i>P. glaziovii</i> Swart*	FOD	-	-	-
<i>P. heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>P. icariba</i> (DC.) Marchand*	FOD, RST	-	-	-
<i>P. kleinii</i> Cuatrec.*	FOD	-	-	-
<i>P. spruceanum</i> (Benth.) Engl.	FES	-	-	-
<i>P. tenuifolium</i> (Engl.) Engl.	FOD	-	-	-
<i>P. warmingianum</i> Marchand	FOD, FES	-	-	-
<i>P. widgrenii</i> Engl.*	FOD, FES	-	-	-
<i>Tetragastris</i> – 3/9				
<i>T. breviacuminata</i> Swart*	FOD	-	-	-
<i>T. catuaba</i> Soares da Cunha*	FOD	-	-	-
<i>T. occhionii</i> (Rizzini) Daly*	RST	-	VU	ANEXO II
<i>Trattinnickia</i> – 2/16				
<i>T. ferruginea</i> Kuhlm.*	FES	-	CR	ANEXO I
<i>T. mensalis</i> Daly*	FOD, FES	-	EN	ANEXO I

Cabombaceae

Marco Otávio Pivari

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CABOMBACEAE – 3/7				
<i>Cabomba</i> – 3/5				
<i>C. aquatica</i> Aubl.	FAQ	-	-	-
<i>C. caroliniana</i> A.Gray	FAQ	-	-	-
<i>C. furcata</i> Schult. & Schult.f.	FAQ	-	-	-

Cactaceae

Daniela Zappi

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CACTACEAE – 89/1.500				
<i>Arthrocereus</i> – 2/4				
<i>A. glaziovii</i> (K.Schum.) N.P.Taylor & Zappi*	FCA	EN	EN	ANEXO II
<i>A. melanurus</i> (K.Schum.) L.Diers <i>et al.</i>	FCA	VU	VU	ANEXO II
<i>Brasiliopuntia</i> – 1/1				
<i>B. brasiliensis</i> (Willd.) A.Berger	FES, FED, AFL, RST	-	-	-
<i>Cereus</i> – 3/21				
<i>C. fernambucensis</i> (K.Schum.) Barthlott*	AFL	-	-	-
<i>C. hildmannianus</i> K.Schum.	FES, FED, AFL	-	-	-
<i>C. insularis</i> Hemsl.*	AFL, RST	-	-	-
<i>Cipocereus</i> – 2/6				
<i>C. laniflorus</i> N.P.Taylor & Zappi*	FCA, AFL	EN	EN	ANEXO I
<i>C. minensis</i> (Werd.) F.Ritter	FCA, AFL	-	EN	ANEXO II
<i>Coleocephalocereus</i> – 4/8				
<i>C. braunii</i> Diers & Est.-Pereira*	AFL	-	-	-
<i>C. buxbaumianus</i> Buin.*	AFL	-	-	-
<i>C. fluminensis</i> (Miq.) Backeb.*	AFL, RST	-	-	-
<i>C. pluricostatus</i> Buin. & Bred.*	AFL	-	-	-
<i>Epiphyllum</i> – 1/12				
<i>E. phyllanthus</i> (L.) Haw.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>Frailea</i> – 2/11				
<i>F. castanea</i> Backeb.	FCA, AFL	-	-	-
<i>F. curvispina</i> Buin. & Bred.	FCA, AFL	-	-	-
<i>Gymnocalycium</i> – 2/42				
<i>G. denudatum</i> (Link & Otto) Mitt.	FCA, AFL	-	-	-
<i>G. horstii</i> Buin.	FCA, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Hatiora * – 6/6				
H. cylindrica Britton & Rose*	FOD	-	VU	ANEXO II
H. epiphylloides (Campos Porto & Werd.) Buxbaum*	FOM	-	-	-
H. gaertneri (Regel) Barthlott*	FOM	-	-	-
H. herminiae (Campos Porto & Castellanos) Barthlott*	FOM	-	-	-
H. rosea (Lagerh.) Barthlott*	FOM	-	VU	ANEXO II
H. salicornioides (Haw.) Britton & Rose *	FOD, FOM, FES, AFL	-	-	-
Hylocereus – 1/14				
H. setaceus (Salm-Dyck) Ralf Bauer	RST, AFL, FED	-	-	-
Lepismium – 4/6				
L. cruciforme (Vell.) Miq.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
L. houlettianum (Lem.) Barthlott*	FOD, FOM	-	-	-
L. lumbricoides (Lem.) Barthlott	FOM, FES, FED	-	-	-
L. warmingianum (K.Schum.) Barthlott	FOM, FES, FED	-	-	-
Melocactus – 1/35				
M. violaceus Pfeiff.*	RST	VU	VU	ANEXO II
Opuntia – 1/60				
O. monacantha Haw.	RST, FCA	-	-	-
Parodia – 12/52				
P. alacriportana Backeb. & Voll.	AFL	-	-	-
P. carambeiensis Buin. & Bred.*	AFL	-	-	-
P. crassigibba (F.Ritter) N.P.Taylor*	?	-	-	-
P. erinacea (Haw.) N.P.Taylor	AFL	-	-	-
P. fusca (F.Ritter) Hofacker & Braun	FCA, AFL	-	-	-
P. haselbergii (Rumpl.) F.Brandt	?	-	-	-
P. horstii (F.Ritter) N.P.Taylor	AFL	-	-	-
P. leninghausii (K.Schum.) F.Brandt	FCA, AFL	-	-	-
P. linkii (Lehm.) Kies.	?	-	-	-
P. magnifica (Rigger) F.Brandt*	FCA, AFL	-	-	-
P. ottonis (Lehm.) N.P.Taylor	FCA, AFL	-	-	-
P. scopa (Spreng.) N.P.Taylor	FCA, AFL	-	-	-
Pereskia – 2/16				
P. aculeata Mill.	FOD, FOM, FES, FED, AFL, RST -	-	-	-
P. grandifolia Haw.	FOD, FOM, FES, AFL	-	-	-
Pilosocereus – 5/39				
P. arrabidae (Lem.) Byles & Rowley*	RST	-	-	-
P. aurisetus (Werd.) Byles & Rowley	FCA, AFL	-	-	-
P. brasiliensis (Britton & Rose) Backeb.*	RST, AFL	-	VU	ANEXO I
P. catingicola (Guerke) Byles & Rowley	RST, FED	-	-	-
P. ulei (K.Schum.) Byles & Rowley*	RST, AFL	-	-	-
Praecereus – 1/2				
P. euchlorus (F.A.C.Weber) N.P.Taylor	AFL, FCA	-	-	-
Pseudoacanthocereus – 1/2				
P. brasiliensis (Britton & Rose) F.Ritter	AFL	VU	VU	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Rhipsalis – 32/35				
R. agudoensis N.P.Taylor*	FOD	-	-	-
R. baccifera (J.M.Muell.) Stearn	FOM, FES	-	-	-
R. burchellii Britton & Rose*	FOM	-	-	-
R. campos-portoana Loefgr.*	FOM, FOD	-	-	-
R. cereoides (Backeb. & Voll) Backeb.*	AFL	VU	V U	ANEXO I
R. cereuscula Haw.	FOM, FES	-	-	-
R. clavata F.A.C.Weber*	FOM, FES	-	-	-
R. crispata (Haw.) Pfeiffer*	FOD, FES, RST	VU	VU	ANEXO II
R. dissimilis (G.Lindb.) K.Schum.*	FES, FCA, AFL	-	-	-
R. elliptica G.Lindb. ex K.Schum.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. ewaldiana Barthlott & N.P.Taylor*	FOD, FOM	-	-	-
R. floccosa (Lagerh.) Britton & Rose	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. grandiflora Haw.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. hoelleri Barthlott & N.P.Taylor*	FOD, FOM	-	-	-
R. juengeri Barthlott & N.P.Taylor*	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. lindbergiana K.Schum.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. mesembryanthemoides Haw.*	FOD, AFL	-	-	-
R. neves-armondii K.Schum.*	FOD, FOM	-	-	-
R. oblonga Loefgr.*	FOD, FOM	-	-	-
R. olivifera N.P.Taylor & Zappi*	FOD, FOM	-	-	-
R. ormindoi N.P.Taylor & Zappi*	FOD, FOM	-	-	-
R. pacheco-leonis Loefgr.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. pachyptera Pfeiff.*	FOD, FOM	-	-	-
R. paradoxa (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm-Dyck*	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. pentaptera A.Dietr.*	FOD, AFL	-	-	-
R. pilocarpa Loefgr.*	FOM, FES	VU	VU	ANEXO II
R. pulchra Loefgr.*	FOM	-	-	-
R. puniceo-discus G.Lindb.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. russellii Britton & Rose	FOD, FOM, AFL, FCA	VU	-	-
R. sulcata F.A.C.Weber*	FOD, FOM	-	-	-
R. teres (Vell.) Steud.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
R. trigona Pfeiff.*	FOM, FES	-	-	-
Schlumbergera* – 6/6				
S. kautskyi (Horobin & McMillan) N.P.Taylor *	FOM	EN	EN	ANEXO II
S. microsphaerica (K.Schum.) Hoevel *	FOM, AFL, FCA	-	-	-
S. opuntioides (Loefgr. & ') D.Hunt. *	FOM, FCA	-	-	-
S. orssichiana Barthlott & McMillan *	FOD	-	-	-
S. russelliana (Hook.) Britton & Rose *	FOM	-	-	-
S. truncata (Haw.) Moran *	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II

Calceolariaceae

Vinícius Castro Souza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CALCEOLARIACEAE – 1/250				
<i>Calceolaria</i> – 1/250				
<i>C. tripartita</i> Ruiz & Pav.	FOD, FES	-	-	

Calyceraceae

Rafaella Cardoso Ribeiro

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CALYCERACEAE – 4/ca. 60				
<i>Acicarpa</i> – 3/5				
<i>A. procumbens</i> Less.	RST	-	-	-
<i>A. spathulata</i> R.Br.*	RST	-	-	-
<i>A. tribuloides</i> A.Juss.	FCA, RST	-	-	-
<i>Boopis</i> – 1/13				
<i>B. bupleuroides</i> (Less.) C.A.Müll.	FCA	-	-	-

Campanulaceae

Ana Odete Santos Vieira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CAMPANULACEAE – 14/2.300				
<i>Centropogon</i> – 1/231				
<i>C. cornutus</i> (L.) Druce	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Lobelia</i> – 5/400				
<i>L. exaltata</i> Pohl*	FAQ	-	-	-
<i>L. fistulosa</i> Vell.*	FAQ, FCA	-	-	-
<i>L. hilaireana</i> (Kanitz) E.Wimm.*	FCA, FES	-	VU	ANEXO II
<i>L. langeana</i> Dusén*	FOD	-	-	-
<i>L. santos-limae</i> Brade	FES	-	CR	ANEXO II
<i>L. thapsioidea</i> Schott*	FAQ, FCA	-	-	-
<i>Siphocampylus</i> – 8/223				
<i>S. convolvulaceus</i> (Cham.) G.Don *	FOD	-	-	-
<i>S. duploserratus</i> Pohl*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. fluminensis</i> (Vell.) E.Wimm.*	FOD	-	-	-
<i>S. lauroanus</i> Handro & M.Kuhlmann.*	FOD	-	-	-
<i>S. longepedunculatus</i> Pohl*	FOD, FCA	-	-	-
<i>S. sulfureus</i> E.Wimm*	FAQ	-	-	-
<i>S. umbellatus</i> (Kunth) G.Don*	FAQ	-	-	-
<i>S. westinianus</i> (Thunb.) Pohl*	FOD, FCA	-	-	-

Canellaceae

Rafaella Cardoso Ribeiro

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CANELLACEAE – 4/ca. 20				
<i>Cinnamodendron</i> – 4/9				
<i>C. axillare</i> (Nees & Mart.) Endl. ex Walpers*	FOD	-	-	-
<i>C. dinisii</i> Schwacke *	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. occhionianum</i> F.Barros & J.Salazar*	FOD	-	-	-
<i>C. sampaioanum</i> Occhioni*	FOD	-	-	-

Cannabaceae

Maria Salete Marchioreto

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CANNABACEAE – 4/170				
<i>Celtis</i> –2/70				
<i>C. ehrenbergiana</i> (Klotzsch) Liebm.	FOM	-	-	-
<i>C. iguanea</i> (Jacq.) Sarg.	FOD	-	-	-
<i>Phyllostylon</i> – 1/2				
<i>P. brasiliense</i> Capan. ex Benth. & Hook.f.	FOD	-	-	-
<i>Trema</i> – 1/ca. 10				
<i>T. micrantha</i> (L.) Blume	FES	-	-	-

Cannaceae

João Marcelo Alvarenga Braga

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CANNACEAE – 8/ca. 20				
Canna – 8/ca. 20				
C. coccinea Mill.	FES	-	-	-
C. glauca L.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
C. indica L.	FOD, FOM, FES, FED, AFL, RST-		-	-
C. paniculata Ruiz & Pav.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. patens (Aiton) Roscoe	FOM	-	-	-
C. pedunculata Sims*	FOD	-	-	-
C. speciosa Roscoe ex Sims	FOM	-	-	-
C. stenantha N.Tanaka*	FES	-	-	-

Capparaceae

Maria Bernadete Costa-e-Silva e Juliana Souza Marques

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CAPPARACEAE – 07/480				
<i>Capparis</i> – 6/250				
<i>C. brasiliana</i> DC.	FOM, RST	-	-	-
<i>C. flexuosa</i> (L.) L.	FES, RST	-	-	-
<i>C. frondosa</i> Jacq.	FES, RST	-	-	-
<i>C. hastata</i> Jacq.	FES, RST	-	-	-
<i>C. lineata</i> Dombey ex Pers.	RST, FED	-	-	-
<i>C. nectararia</i> Vell.	FOD	-	-	-
<i>Crateva</i> – 1/8				
<i>C. tapia</i> L.	RST, FED	-	-	-

Cardiopteridaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CARDIOPTERIDACEAE – 3/50				
<i>Citronella</i> – 3/25				
<i>C. engleriana</i> (Loes.) R.A.Howard*	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. gongonha</i> (Mart.) R.A.Horward	FOD, FES	-	-	-
<i>C. paniculata</i> (Mart.) R.A.Horward*	FOD, FES	-	-	-

Caricaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CARICACEAE – 3/35				
<i>Jacaratia</i> – 2/5				
<i>J. heptaphylla</i> (Vell.) A.DC.	FES	-	-	-
<i>J. spinosa</i> (Aubl.) A.DC.	FES	-	-	-
<i>Vasconcellea</i> – 1/21				
<i>V. quercifolia</i> A.St.-Hil.	FOM, FES	-	-	-
<i>V. pulchra</i> (V.Badillo) V.Badillo	FES	-	-	-

Caryocaraceae

Luciana H. Yoshino Kamino

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CARYOCARACEAE – 3/23				
<i>Anthodiscus</i> – 1/8				
<i>A. amazonicus</i> Gleason & A.C.Sm.	FOD	-	-	-
<i>Caryocar</i> – 2/15				
<i>C. brasiliense</i> Cambess.	FES	-	-	-
<i>C. edule</i> Casar.*	FOD	-	-	-

Caryophyllaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CARYOPHYLLACEAE – 32/2300				
Cardionema – 2/6				
C. ramosissimum (Weinm.) A.Nelson & J.F.Macbr.	FCA	-	-	-
C. rosetta (Cambess.) A.Nelson & J.F.Macbr.	FCA	-	-	-
Cerastium – 9/100				
C. brachypodum (Engelm. ex A.Gray) B.L.Rob.	FCA	-	-	-
C. catharinense L.B.Sm. & Downs	FCA	-	-	-
C. commersonianum Séringe	FCA	-	-	-
C. dichrotrichum Fenzl ex Rohrb.	FCA	-	-	-
C. glomeratum Thuill.	FCA	-	-	-
C. humifusum Cambess.	FCA	-	-	-
C. mollissimum Poir.	FCA	-	-	-
C. rivulare Cambess.	FCA	-	-	-
C. rivulariastrum Möschl & Pedersen	FCA	-	-	-
Drymaria – 1/48				
D. cordata (L.) Willd.	FCA, RUD	-	-	-
Paronychia – 8/110				
P. brasiliana DC.	FCA	-	-	-
P. camphorosmoides Cambess.	FCA	-	-	-
P. chilensis DC.	FCA	-	-	-
P. communis Cambess.	FCA	-	-	-
P. fasciculata Chaudhri*	FCA	-	-	-
P. paranensis Chaudhri*	FCA	-	-	-
P. revoluta C.E.Carneiro & Furlan*	FCA	-	-	-
P. setigera (Gillies ex Hook. & Arn.) F.Herm.	FCA	-	-	-
Polycarpaea – 1/50				
P. corymbosa (L.) Lam.	FCA, RUD	-	-	-
Polycarpon – 1/16				
P. apurense Kunth	FCA, RUD	-	-	-
Sagina – 2/20				
S. chilensis Naudin	FCA, RUD	-	-	-
S. humifusa (Cambess.) Fenzl ex Rohrb.	FCA, RUD	-	-	-
Spergula – 6/6				
S. grandis Pers.	FCA	-	-	-
S. laevis (Cambess.) D.Dietr.	FCA	-	-	-
S. platensis (Cambess.) Shinnars	FCA	-	-	-
S. ramosa (Cambess.) D.Dietr.	FCA	-	-	-
S. salina (J.Presl & C.Presl) D.Dietr.	FCA	-	-	-
S. villosa Pers.	FCA	-	-	-
Stellaria – 2/150				
S. media (L.) Vill.	FCA	-	-	-
S. parva Pedersen	FCA	-	-	-

Celastraceae

Julio Antonio Lombardi & Milton Groppo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CELASTRACEAE – 61/98				
Anthodon – 1/1				
A. decussatum Ruiz & Pav.	FES, FOD, FOM	-	-	-
Celastrus – 1/31				
C. liebmanii Standl.	FES, FOD	-	-	-
Cheiloclinium – 5/12				
C. anomalum Miers	FOM	-	-	-
C. belizense (Standl.) A.C.Sm.	FOM	-	-	-
C. cognatum (Miers) A.C.Sm.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. gleasonianum (A.C.Sm.) A.C.Sm.	FOD	-	-	-
C. serratum (Cambess.) A.C.Sm.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
Elachyptera – 2/8				
E. festiva (Miers) A.C.Sm.	FOM, FES	-	-	-
E. micrantha (Cambess.) A.C.Sm.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Hippocratea – 1/3				
H. volubilis L.	FOM, FOD, FES, RST	-	-	-
Maytenus – 28/ca. 200				
M. aquifolia Mart.	FES, FOD	-	-	-
M. ardisiifolia Reissek*	FOD	-	-	-
M. basidentata Reissek*	FOD	-	VU	ANEXO II
M. boaria Molina	FOD, FOM	-	-	-
M. brasiliensis Mart.*	FES, FOD	-	-	-
M. cassineformis Reissek*	FES, FOD	-	-	-
M. cestrifolia Reissek	FOD	-	-	-
M. communis Reissek*	FES, FOD	-	-	-
M. dasyclada Mart.*	FOD, FOM	-	-	-
M. distichophylla Mart. ex Reissek*	FOD	-	-	-
M. erythroxyla Reissek	FOD	-	-	-
M. evonymoides Reissek	FES, FOD	-	-	-
M. floribunda Reissek	FES, FED	-	-	-
M. glaucescens Reissek*	FOD, FOM	-	-	-
M. gonoclada Mart.	FES, FOD, FOM	-	-	-
M. ilicifolia Mart. ex Reissek	FES, FOD, FOM	-	-	-
M. imbricata Reissek	AFL	-	-	-
M. longifolia Reissek ex Loes.*	FOD	-	-	-
M. macrophylla Mart.*	FOD	-	-	-
M. obtusifolia Mart.*	FOD	-	-	-
M. officinalis Mabb.	FES, FOD, FOM	-	-	-
M. patens Reissek	FES, FOD	-	-	-
M. robusta Reissek	FES, FOD	-	-	-
M. salicifolia Reissek	FES, FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. samydidiformis</i> Reissek*	FOD	-	-	-
<i>M. schumanniana</i> Loes.*	FOD	-	-	-
<i>M. subalata</i> Reissek*	FOD	-	-	-
<i>M. urbaniana</i> Loes.	AFL	-	-	-
<i>Peritassa</i> – 7/19				
<i>P. calypsoides</i> (Cambess.) A.C.Sm.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. flaviflora</i> A.C.Sm.*	FES, FOD, FOM	-	-	-
<i>P. hatschbachii</i> Lombardi*	FES, FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>P. laevigata</i> (Hoffmanns. ex Link) A.C.Sm.	FOD, RST	-	-	-
<i>P. longifolia</i> Lombardi*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
<i>P. mexiae</i> A.C.Sm.*	FES, FOM, FOD	-	-	-
<i>P. sadleri</i> Lombardi*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
<i>Plenckia</i> – 1/4				
<i>P. populnea</i> Reissek	FES, FCA	-	-	-
<i>Prionostemma</i> – 1/5				
<i>P. aspera</i> (Lam.) Miers	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Pristimera</i> – 2/25				
<i>P. celastroides</i> (Kunth) A.C.Sm.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. nervosa</i> (Miers) A.C.Sm.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Salacia</i> – 6/> 200				
<i>S. arborea</i> (Schrunk) Peyr.*	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>S. elliptica</i> (Mart. ex Schult.) G.Don	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>S. grandifolia</i> (Mart. ex Schult.) G.Don*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. mosenii</i> A.C.Sm.*	RST	-	VU	ANEXO I
<i>S. multiflora</i> (Lam.) DC.	FOM	-	-	-
<i>S. nemorosa</i> Lombardi*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Semialarium</i> – 1/2				
<i>S. paniculatum</i> (Mart. ex Schult.) N.Hallé	FES, FOM	-	-	-
<i>Tontelea</i> – 9/17				
<i>T. corcovadensis</i> (Glaz.) A.C.Sm.*	FOM, FES	-	-	-
<i>T. fluminensis</i> (Peyr.) A.C.Sm.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>T. lanceolata</i> (Miers) A.C.Sm.*	FOD, FOM	-	EN	ANEXO II
<i>T. laxiflora</i> (Benth.) A.C.Sm.	FOM	-	-	-
<i>T. leptophylla</i> A.C.Sm.*	FOM, FES	-	-	-
<i>T. martiana</i> (Miers) A.C.Sm.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>T. mauritioides</i> (A.C.Sm.) A.C.Sm.	FOD	-	-	-
<i>T. miersii</i> (Peyr.) A.C.Sm.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>T. tenuicula</i> (Miers) A.C.Sm.	FOD, FOM, FES	-	-	-

Ceratophyllaceae

Marco Otávio Pivari

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CERATOPHYLLACEAE – 1/3				
<i>Ceratophyllum</i> – 1/3				
<i>C. demersum</i> L.	FAQ	-	-	-

Chloranthaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CHLORANTHACEAE – 1/75				
<i>Hedyosmum</i> – 1/45				
<i>H. brasiliense</i> Miq.	FOD, FES	-	-	-

Chrysobalanaceae

Elsie Franklin Guimarães & Erika von Sohsten Medeiros

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CHRYSOBALANACEAE – 65/500				
Chrysobalanus – 1/31				
C. icaco L.	RST	-	-	-
Couepia – 17/70				
C. belemii Prance*	FOD	-	-	-
C. bondarii Prance*	FOD	-	-	-
C. carautae Prance*	FOD	-	-	-
C. coarctata Prance*	RST	-	-	-
C. impressa Prance*	FOD	-	-	-
C. insignis Fritsch*	FOD	-	-	-
C. leitaofilhoi Prance*	FOD	-	-	-
C. longipetiolata Prance*	FOD	-	-	-
C. meridionalis Prance*	FOD	-	-	-
C. monteclarensis Prance*	FOD, FES	-	CR	ANEXO II
C. ovalifolia (Schott) Benth.*	RST, FOD	-	-	-
C. parvifolia Prance*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. pernambucensis</i> Prance	FOD	-	-	-
<i>C. rufa</i> Ducke	FOD.FES	-	-	-
<i>C. schottii</i> Fritsch	RST	VU	-	-
<i>C. uiti</i> (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook.f.	FOD,FES, FED, FCA	-	-	-
<i>C. venosa</i> Prance	FOD, FES	-	-	-
<i>Exellodendron</i> – 1/5				
<i>E. gracile</i> (Kuhl.) Prance*	FOD, FES	-	-	-
<i>Hirtella</i> – 17/78				
<i>H. angustifolia</i> Schott ex Spreng.	FOD	-	-	-
<i>H. bahiensis</i> Prance	FOD	-	-	-
<i>H. barrosoi</i> Prance*	FOD	-	-	-
<i>H. ciliata</i> Mart. & Zucc.	FOD, FCA, FES, FED	-	-	-
<i>H. corymbosa</i> Cham. & Schltdl.	FOD, FCA	-	-	-
<i>H. floribunda</i> Cham. & Schltdl.	FOD, FCA, FES	-	-	-
<i>H. glandulosa</i> Spreng.	FES, FED	-	-	-
<i>H. glaziovii</i> Taub.	FOD	-	-	-
<i>H. gracilipes</i> (Hook.f.) Prance	FOD, FES,FED	-	-	-
<i>H. hebeclada</i> Moric. ex DC.	FES	-	-	-
<i>H. insignis</i> Briq. ex Prance	FOD	-	-	-
<i>H. martiana</i> Hook.f.	FES, FED	-	-	-
<i>H. parviunguis</i> Prance*	FOD	-	-	-
<i>H. racemosa</i> Lam.	FOD	-	-	-
<i>H. santosii</i> Prance*	FOD	-	-	-
<i>H. sprucei</i> Benth. ex Hook.f.	FOD	-	-	-
<i>H. triandra</i> Sw.	FOD	-	-	-
<i>Licania</i> – 24/296				
<i>L. apetala</i> (E.Meyer) Fritsch	FOD, FCA	-	-	-
<i>L. arianae</i> Prance*	FOD	-	-	-
<i>L. bahiensis</i> Prance*	FOD	-	-	-
<i>L. belemii</i> Prance*	FES	-	-	-
<i>L. cymosa</i> Fritsch	FOD	-	-	-
<i>L. glazioviana</i> Warm.*	RST, FOD	-	-	-
<i>L. heteromorpha</i> Benth.	FOD	-	-	-
<i>L. hoehnei</i> Pilg.	RST, FES	-	-	-
<i>L. hypoleuca</i> Benth.	RST, FOD	-	-	-
<i>L. indurata</i> Pilg.*	FOD	-	-	-
<i>L. kunthiana</i> Hook.f.	FES	-	-	-
<i>L. lamentanda</i> Prance*	FOD	-	-	-
<i>L. littoralis</i> Warm.	RST, FOD	-	-	-
<i>L. micrantha</i> Miq.	FOD	-	-	-
<i>L. naviculistipula</i> Prance*	FOD	-	-	-
<i>L. nitida</i> Hook.f.	FOD	-	-	-
<i>L. octandra</i> (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze	FES, FED	-	-	-
<i>L. riedelii</i> Prance*	FOD, FES	-	-	-
<i>L. salzmännii</i> (Hook.f.) Fritsch*	FOD	-	-	-
<i>L. santosii</i> Prance*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>L. silvatica</i> Prance*	FOD	-	-	-
<i>L. spicata</i> Hook.f.*	FES	-	-	-
<i>L. tomentosa</i> (Benth.) Fritsch	RST, FES	-	-	-
<i>L. turbinata</i> Benth.*	RST, FOD	-	-	-
Parinari – 5/145				
<i>P. alvimii</i> Prance*	FOD	-	-	-
<i>P. brasiliensis</i> (Schott) Hook.f.	FOD	-	-	-
<i>P. excelsa</i> Sabine	FES	-	-	-
<i>P. leontopithecii</i> Prance*	FOD	-	-	-
<i>P. littoralis</i> Prance*	RST, FOD	-	-	-

Cistaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CISTACEAE – 1/175				
<i>Helianthemum</i> – 1/80-100				
<i>H. brasiliense</i> (Lam.) Pers.	FCA	-	-	-

Cleomaceae

Maria Bernadete Costa-e-Silva e Juliana Souza Marques

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CLEOMACEAE – 12/300				
<i>Cleome</i> – 10/250				
<i>C. aculeata</i> L.	RST, FES	-	-	-
<i>C. dendroidea</i> Schult.f.	RST, FES	-	-	-
<i>C. diffusa</i> Banks ex DC.	RST	-	-	-
<i>C. hassleriana</i> Chodat	RST, FOD	-	-	-
<i>C. horrida</i> Mart. ex Roem. & Schult.	RST, FOD	-	-	-
<i>C. parviflora</i> Kunth	RST, FOD			
<i>C. rosea</i> Vahl ex DC.	RST, FOD	-	-	-
<i>C. serrata</i> Jacq.	FES	-	-	-
<i>C. spinosa</i> Jacq.	RST, FES, FED	-	-	-
<i>C. viridiflora</i> Schreb.	FOD	-	-	-
<i>Dactylaena</i> – 2/6				
<i>D. micrantha</i> Schreb. ex Schult.f.	FES	-	-	-
<i>D. microphylla</i> Eichler	RST	-	-	-

Clethraceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CLETHRACEAE – 2/80				
<i>Clethra</i> – 2/64				
<i>C. scabra</i> Pers.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. uleana</i> Sleumer*	FOD	-	-	-

Clusiaceae

Volker Bittrich

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CLUSIACEAE – 57/ca. 1000				
<i>Calophyllum</i> – 1/200				
<i>C. brasiliense</i> Cambess.	FOD, FOM, FES, MAN, RST	-	-	-
<i>Caraipa</i> - 1/30				
<i>C. densifolia</i> Mart.	FOD	-	-	-
<i>Clusia</i> – 18/300				
<i>C. aemygdioi</i> A.Gomes da Silva & B.Weinberg*	FOD	-	-	-
<i>C. criuva</i> Cambess.	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
<i>C. dardanoi</i> G.Mariz*	AFL, FOD	-	-	-
<i>C. fluminensis</i> Planch. & Triana*	FOD, RST	-	-	-
<i>C. fragrans</i> Gardner*	AFL, FCA	-	-	-
<i>C. hilariana</i> Schltdl.	FOD, RST	-	-	-
<i>C. immersa</i> C.Vieira*	AFL, FOD	-	-	-
<i>C. lanceolata</i> Cambess.*	FOD, RST	-	-	-
<i>C. melchiorii</i> Gleason	FOD, FCA	-	-	-
<i>C. nemorosa</i> G.Mey.	FCA, FOD, RST	-	-	-
<i>C. organensis</i> Planch. & Triana*	AFL, FOD, RST	-	-	-
<i>C. palmicida</i> L.C.Rich. ex Planch. & Triana	FOD	-	-	-
<i>C. panapanari</i> (Aubl.) Choisy	FOD, FCA	-	-	-
<i>C. paralicola</i> G.Mariz*	FOD	-	-	-
<i>C. pernambucensis</i> G.Mariz*	FOD	-	-	-
<i>C. rosea</i> Jacq.	FOD, RST	-	-	-
<i>C. sellowiana</i> Schltdl.*	RST	-	-	-
<i>C. stuartiana</i> C.Vieira & A.Gomes da Silva*	FOD	-	-	-
<i>Garcinia</i> – 4/260				
<i>G. brasiliensis</i> Mart.	FOD, RST	-	-	-
<i>G. calypttrata</i> (Schltdl.) Planch. & Triana*	FOD	-	-	-
<i>G. gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	FES, FOD, RST	-	-	-
<i>G. macrophylla</i> Mart.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Kielmeyera – 25/50		-	-	-
K. albopunctata Saddi*	FOD, RST	-	-	-
K. altissima Saddi*	FOD	-	-	-
K. argentea Choisy*	RST	-	-	-
K. bifaria Saddi	FCA, FOD	-	-	-
K. coriacea Mart. & Zucc.	FCA	-	-	-
K. decipiens Saddi*	FOD	-	-	-
K. divergens Saddi*	FOD	-	-	-
K. elata Saddi*	RST	-	-	-
K. excelsa Cambess.*	FOD	-	-	-
K. gracilis Wawra*	FOD	-	-	-
K. grandiflora (Wawra) Saddi	FCA	-	-	-
K. insignis Cambess.*	FOD	-	-	-
K. itacarensis Saddi*	RST	-	-	-
K. lathrophyton Saddi	FCA, FES, FOD	-	-	-
K. marauensis Saddi*	RST	-	-	-
K. membranacea Casar.*	FOD, RST	-	-	-
K. neglecta Saddi*	FOD, RST	-	-	-
K. occhioniana Saddi*	FOD	-	-	-
K. pumila Pohl	FCA	-	-	-
K. regalis Saddi	FCA	-	-	-
K. reticulata Saddi*	RST	-	-	-
K. rufotomentosa Saddi*	FOD	-	-	-
K. rugosa Choisy*	RST	-	-	-
K. rupestris A.P.Duarte*	AFL	-	-	-
K. sigillata Saddi*	FOD	-	-	-
Symphonia – 1/23				
S. globulifera L.f.	FOD, RST	-	-	-
Tovomitopsis – 5/30				
T. bahiensis Engl.*	FOD	-	-	-
T. brasiliensis (Mart.) Walp.	FOD	-	-	-
T. brevistaminea Engl.	FOD	-	-	-
T. leucantha (Schltdl.) Planch. & Triana*	FOD	-	-	-
T. mangle G.Mariz*	FOD	-	-	-
Tovomitopsis – 2/2				
T. paniculata (Spreng.) Planch. & Triana	FES FOD	-	-	-
T. saldanhae Engl.*	FOD	-	-	-

Combretaceae

Nilda Marquete Ferreira da Silva

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
COMBRETACEAE – 28/500				
<i>Buchenavia</i> – 6/20				
<i>B. hoehniana</i> N.Mattos	FOD	-	-	-
<i>B. iguaratensis</i> N.Mattos*	FOD	VU	VU	ANEXO II
<i>B. kleinii</i> Exell	FOD, RST	-	-	-
<i>B. pabstii</i> Marquete & C.Valente*	FOD, FES	EN	EN	ANEXO I
<i>B. rabelloana</i> Mattos	FOD	EN	VU	ANEXO I
<i>B. tetraphylla</i> (Aubl.) R.A.Howard	FES, FOD, RST	-	-	-
<i>Combretum</i> – 10/255				
<i>C. argenteum</i> Bertol.	RST, FOD	-	-	-
<i>C. assimile</i> Eichler	FOD	-	-	-
<i>C. duarteum</i> Cambess.	FED, FES	-	-	-
<i>C. fruticosum</i> (Loefl.) Stuntz	RST, FED, MAN, FOD	-	-	-
<i>C. gracile</i> Schott	FOD	-	-	-
<i>C. lanceolatum</i> Pohl ex Eichler	FOD, RST	-	-	-
<i>C. laxum</i> Jacq.	RST, FOD,	-	-	-
<i>C. leprosum</i> Mart.	RST ?	-	-	-
<i>C. mellifluum</i> Eichler	FOD	-	-	-
<i>C. pisonioides</i> Taub.	FOD	-	-	-
<i>Conocarpus</i> – 1/1				
<i>C. erectus</i> L.	RST, MAN	-	-	-
<i>Laguncularia</i> – 1/1				
<i>L. racemosa</i> (L.) C.F.Gaertn.	MAN	-	-	-
<i>Terminalia</i> – 10/190				
<i>T. acuminata</i> (Allemão) Eichler*	FOD	EW	EW	ANEXO I
<i>T. australis</i> Cambess.	FES	-	-	-
<i>T. camuxa</i> Pickel	FOD	-	-	-
<i>T. glabrescens</i> Mart.	FOD, FES	-	-	-
<i>T. januariensis</i> DC.	FOD	-	-	-
<i>T. kuhlmannii</i> Alwan & Stace*	FOD	VU	VU	ANEXO II
<i>T. mameluco</i> Pickel	FOD	-	-	-
<i>T. reitzii</i> Exell	FOD	VU	EN	ANEXO II
<i>T. triflora</i> (Griseb.) Lillo	FED, FES	-	-	-
<i>T. uleana</i> Engl. ex Alwan & Stace	FOD	-	-	-

Commelinaceae

Lidyenne Yuriko Saleme Aona

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
COMMELINACEAE – 18/655				
<i>Dichorisandra</i> – 15/54				
<i>D. acaulis</i> Cogn.*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>D. albomarginata</i> Linden ex Regel*	FOD, FES	-	-	-
<i>D. fluminensis</i> Brade*	RST	-	-	-
<i>D. gaudichaudiana</i> Kunth*	FOD, RST	-	-	-
<i>D. glaziovii</i> Taub.*	FCA, AFL	-	VU	ANEXO II
<i>D. hirtella</i> (Nees & Mart.) Mart. ex Schult. f.*	FOD	-	-	-
<i>D. interrupta</i> Mart. ex Schult. f.*	FOD, AFL	-	-	-
<i>D. leucophthalmos</i> Hook.*	FOD, FES	-	VU	ANEXO II
<i>D. neglecta</i> Brade*	RST	-	-	-
<i>D. oxypetala</i> Hook.*	FOD	-	-	-
<i>D. paranaensis</i> D.Corrêa da Maia et al.*	FOD, FES	-	-	-
<i>D. penduliflora</i> Kunth*	FOD	-	-	-
<i>D. puberula</i> Nees & Mart.*	FOD	-	-	-
<i>D. pubescens</i> Mart. ex Schult.f*	FOD, FES	-	-	-
<i>D. thyrsiflora</i> J.C.Mikan*	RST	-	-	-
<i>Siderasis</i> – 1/3				
<i>S. fuscata</i> (Lodd.) H.E.Moore*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>Tradescantia</i> – 2/70				
<i>T. blossfeldiana</i> Mildbr.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>T. umbraculifera</i> Hand.-Mazz.*	FOD	-	-	-

Connaraceae

Enrique Forero & Luciana H. Yoshino Kamino

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CONNARACEAE – 27/300-350				
<i>Bernardinia</i> * – 1/1				
<i>B. fluminensis</i> (Gardner) Planch.*	FCA	-	-	-
<i>Connarus</i> – 12/80				
<i>C. beyrichii</i> Planch.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. blanchetii</i> Planch.*	RST, FOD	-	-	-
<i>C. cuneifolius</i> Baker*	FOD	-	-	-
<i>C. deterrentus</i> Planch.	FOD, FCA	-	-	-
<i>C. marginatus</i> Planch.*	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. nodosus</i> Baker*	RST, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. ovatifolius</i> (Mart.) G.Schellenb.*	RST	-	-	-
<i>C. portosegurensis</i> Forero*	FOD	-	-	-
<i>C. regnellii</i> G.Schellenb.*	FES, FOD	-	-	-
<i>C. rostratus</i> (Vell.) L.B.Sm.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. subpeltatus</i> G.Schellenb.*	FOD	-	-	-
<i>C. xylocarpus</i> Vidal <i>et al.</i> *	FOD	-	-	-
Rourea – 14/70				
<i>R. bahiensis</i> Forero*	FOD	-	-	-
<i>R. blanchetiana</i> (Progel) Kuhlman.*	FOD	-	-	-
<i>R. carvalhoi</i> Forero <i>et al.</i> *	FCA	-	-	-
<i>R. cnestidifolia</i> G.Schellenb.*	RST, FOD	-	-	-
<i>R. discolor</i> Baker	FOD, FCA	-	-	-
<i>R. gardneriana</i> Planch.*	FOD	-	-	-
<i>R. glabra</i> Kunth	FOD, FCA, RST	-	-	-
<i>R. glazioui</i> G.Schellenb.*	FOD	-	-	-
<i>R. gracilis</i> G.Schellenb.*	FOD, RST	-	-	-
<i>R. luizalbertoi</i> Forero <i>et al.</i> *	FOD	-	-	-
<i>R. macrocalyx</i> Carbonó <i>et al.</i> *	FCA, RST	-	-	-
<i>R. pseudogardneriana</i> Forero <i>et al.</i> *	FCA, FOD	-	-	-
<i>R. pseudospadicea</i> G.Schellenb.*	FES	-	VU	ANEXO I
<i>R. tenuis</i> G.Schellenb.*	FCA, FOD	-	-	-

Convolvaceae

Rosângela Simão-Bianchini

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CONVOLVULACEAE – 136/ca. 1700				
Aniseia – 1/5				
A. martinicensis (Jacq.) Choisy	FOD	-	-	-
Bonamia – 3/45				
B. agrostopolis (Vell.) Hallier f.*	FES	-	-	-
B. burchellii (Choisy) Hallier f.*	FES, RST, FOD	-	-	-
B. maripoides Hallier f.	FOD	-	-	-
Convolvulus – 2/ca. 250				
C. crenatifolius Ruiz & Pav.*	FOD	-	-	-
C. hasslerianus (Chodat) O'Donell	FES	-	-	-
Cuscuta – 6/ca. 150				
C. boliviana Yunck.	FOM	-	-	-
C. globosa Ridley	FOD	-	-	-
C. obtusiflora Kunth*	FOD	-	-	-
C. parviflora Engelm.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. platyloba</i> Progel*	FOM	-	-	-
<i>C. racemosa</i> Mart.	FOD	-	-	-
<i>Dichondra</i> – 4/12				
<i>D. carolinensis</i> Michx.	FCA	-	-	-
<i>D. macrocalyx</i> Meisn.	FOD, FCA	-	-	-
<i>D. parvifolia</i> Meisn.*	FOD	-	-	-
<i>D. sericea</i> Sw.	FOD	-	-	-
<i>Evolvulus</i> – 28/100				
<i>E. argyreus</i> Choisy	FED	-	-	-
<i>E. aurigenus</i> Mart.	FCA	-	-	-
<i>E. barbatus</i> Meisn.	FCA	-	-	-
<i>E. chrysotrichos</i> Meisn.*	FOD	-	-	-
<i>E. cordatus</i> Moric.*	FES	-	-	-
<i>E. cressoides</i> Mart.	FCA	-	-	-
<i>E. diosmoides</i> Mart.*	RST	-	-	-
<i>E. elegans</i> Moric.	FCA	-	-	-
<i>E. ericifolius</i> Sch.Bip.	FOD	-	-	-
<i>E. frankenioides</i> Moric.	FCA	-	-	-
<i>E. fuscus</i> Meisn.	FES	-	-	-
<i>E. genistoides</i> Ooststr.	RST	-	-	-
<i>E. glomeratus</i> Nees & Mart.	FES, FCA	-	-	-
<i>E. latifolius</i> Ker Gawl.	FES, FOD	-	-	-
<i>E. linarioides</i> Meisn.	FCA	-	-	-
<i>E. linoides</i> Moric.	FED	-	-	-
<i>E. macroblepharis</i> Mart.	FCA, FOM	-	-	-
<i>E. maximiliani</i> Mart.*	RST	-	-	-
<i>E. nummularius</i> (L.) L.	FOD	-	-	-
<i>E. pohlii</i> Meisn.	FCA	-	-	-
<i>E. pterocaulon</i> Moric.	FCA, FES	-	-	-
<i>E. pusillus</i> Choisy*	RST, FOD	-	-	-
<i>E. riedelii</i> Meisn.	FCA	-	-	-
<i>E. sericeus</i> Sw.	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>E. serpylloides</i> Meisn.*	FCA	-	-	-
<i>E. stellariifolius</i> Ooststr.*	FCA	-	-	-
<i>E. tenuis</i> Mart. ex Choisy	FOD	-	-	-
<i>E. thymiflorus</i> Choisy*	RST	-	-	-
<i>Ipomoea</i> – 54/ca. 500				
<i>I. acutisepala</i> O'Donell	FOM, FCA	-	-	-
<i>I. alba</i> L.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>I. aprica</i> House	FCA	-	-	-
<i>I. argentea</i> Meisn.	FCA	-	-	-
<i>I. aristolochiifolia</i> G.Don	FOD, FES	-	-	-
<i>I. asarifolia</i> (Desr.) Roem. & Schult.	RST	-	-	-
<i>I. bahiensis</i> Willd. ex Roem. & Schult.	FOD, RST	-	-	-
<i>I. batatoides</i> Choisy	FOD, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>I. bonariensis</i> Hook.	FOD, FES	-	-	-
<i>I. cairica</i> (L.) Sw.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>I. campestris</i> Meisn.	FCA	-	-	-
<i>I. carnea</i> Jacq.	FOD, RST, FOM	-	-	-
<i>I. chondrosepala</i> Hallier f.*	FES	-	-	-
<i>I. daturiflora</i> Meisn.*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>I. delphinoides</i> Choisy	FCA	-	-	-
<i>I. echinocalyx</i> Meisn.	FES	-	-	-
<i>I. eriocalyx</i> Meisn.*	FOD	-	-	-
<i>I. fimbriosepala</i> Choisy	FOD, RST	-	-	-
<i>I. gigantea</i> Choisy	FCA	-	-	-
<i>I. grandifolia</i> (Dammer) O'Donell	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>I. guaranitica</i> Chodat & Hassl.	FOM	-	-	-
<i>I. hederifolia</i> L.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>I. hirsutissima</i> Gardner	FES, FCA	-	-	-
<i>I. imperati</i> (Vahl) Griseb.*	RST	-	-	-
<i>I. incarnata</i> (Vahl) Choisy	RST	-	-	-
<i>I. indica</i> (Burm. f.) Merr.	FOM, FOD, FES	-	-	-
<i>I. indivisa</i> (Vell.) Hallier f.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>I. kunthiana</i> Meisn.	FCA	-	-	-
<i>I. malvaeoides</i> Meisn.	FCA	-	-	-
<i>I. megapotamica</i> Choisy*	FOD	-	-	-
<i>I. nil</i> (L.) Roth	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>I. pes-caprae</i> (L.) R.Br.*	RST	-	-	-
<i>I. phyllomega</i> (Vell.) House	FOD	-	-	-
<i>I. pintoii</i> O'Donell	FED	-	-	-
<i>I. piurensis</i> O'Donell	FOD	-	-	-
<i>I. procumbens</i> Mart. ex Choisy	FCA, FES	-	-	-
<i>I. procurrens</i> Meisn.	FES, FCA	-	-	-
<i>I. purpurea</i> (L.) Roth	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>I. quamoclit</i> L.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>I. ramosissima</i> (Poir.) Choisy	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>I. regnellii</i> Meisn.	FOD	-	-	-
<i>I. rosea</i> Choisy	FED	-	-	-
<i>I. rubens</i> Choisy*	FOD	-	-	-
<i>I. saopaulista</i> O'Donell	FOD, FES	-	-	-
<i>I. sericophylla</i> Meisn.	FOD	-	-	-
<i>I. setifera</i> Poir.	FES	-	-	-
<i>I. setosa</i> Ker Gawl.	FOD, FES	-	-	-
<i>I. subalata</i> Hassl.	FOD	-	-	-
<i>I. subincana</i> (Choisy) Meisn.	FED	-	-	-
<i>I. subrevoluta</i> Choisy	FES	-	-	-
<i>I. syringifolia</i> Meisn.	FOD, FES	-	-	-
<i>I. tiliacea</i> (Willd.) Choisy	FOD, RST	-	-	-
<i>I. triloba</i> L.	FOD, FES, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>I. tubata</i> Nees	FES	-	-	-
<i>Jacquemontia</i> – 23/ca. 100				
<i>J. bahiensis</i> O'Donell	FOD	-	-	-
<i>J. blanchetii</i> Moric.	FOD, FES	-	-	-
<i>J. bracteosa</i> Meisn.	FOD	-	-	-
<i>J. ciliata</i> Sandwith	FOD, FES	-	-	-
<i>J. densiflora</i> (Meisn.) Hallier f.	FOD	-	-	-
<i>J. evolvuloides</i> (Moric.) Meisn.	FES	-	-	-
<i>J. ferruginea</i> Choisy*	FOD, FES	-	-	-
<i>J. glaucescens</i> Choisy*	FOD	-	-	-
<i>J. gracillima</i> (Choisy) Hallier f.	FOD	-	-	-
<i>J. grandiflora</i> Meisn.*	FES	-	-	-
<i>J. heterantha</i> (Nees & Mart.) Hallier f.*	FOD	-	-	-
<i>J. holosericea</i> (Weinm.) O'Donell*	RST, FOD	-	-	-
<i>J. lasiocladus</i> (Choisy) O'Donell	FCA	-	-	-
<i>J. martii</i> Choisy	FOD	-	-	-
<i>J. montana</i> (Moric.) Meisn.	FOD, FES	-	-	-
<i>J. mucronifera</i> (Choisy) Hallier f.	FOD	-	-	-
<i>J. rufa</i> (Choisy) Hallier f.	FOD	-	-	-
<i>J. sphaerostigma</i> (Cav.) Rusby	FOD, FES	-	-	-
<i>J. spiciflora</i> (Choisy) Hallier. f.	FES, FCA	-	-	-
<i>J. tamnifolia</i> (L.) Griseb.	FES, FOD, RST	-	-	-
<i>J. uleana</i> Hallier f.*	RST	-	-	-
<i>J. unilateralis</i> (Roem. & Schult.) O'Donell	FOM, RST	-	-	-
<i>J. velutina</i> Choisy	FOD, FOM	-	-	-
<i>Merremia</i> – 9/60				
<i>M. aegyptia</i> (L.) Urb.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. cissoides</i> (Lam.) Hallier f.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>M. contorquens</i> (Choisy) Hallier f.	FCA	-	-	-
<i>M. digitata</i> (Spreng.) Hallier f.	FCA	-	-	-
<i>M. dissecta</i> (Jacq.) Hallier f.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>M. macrocalyx</i> (Ruiz & Pav.) O'Donell	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. tomentosa</i> (Choisy) Hallier f.	FCA	-	-	-
<i>M. tuberosa</i> (L.) Rendle	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. umbellata</i> (L.) Hallier f.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>Odonellia</i> – 1/2				
<i>O. eriocephala</i> (Moric.) K.R. Robertson	FOD	-	-	-
<i>Operculina</i> – 3/ca. 20				
<i>O. alata</i> (Ham.) Urb.	FOD, FES	-	-	-
<i>O. macrocarpa</i> (L.) Urb.	FOD, FES	-	-	-
<i>O. sericantha</i> (Miq.) Ooststr.	FOD	-	-	-
<i>Turbina</i> – 2/12				
<i>T. cordata</i> (Choisy) Austin & Staples	FES	-	-	-
<i>T. corymbosa</i> (L.) Raf.	FOD	-	-	-

Cordiaceae

Elsie Franklin Guimarães e Erika von Sohsten Medeiros

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CORDIACEAE – 40/445				
Cordia – 29/320				
C. aberrans I.M.Johnst.	RST	-	-	-
C. acutifolia Fresen.	?	-	-	-
C. alliodora (Ruiz & Pav.) Oken	FES	-	-	-
C. americana L.	FES, FED	-	-	-
C. anabaptista Cham.	FOD	-	-	-
C. candida Vell.	FES	-	-	-
C. corchorifolia A.DC.	?	-	-	-
C. dichotoma G.Forst.	FOD, FOM	-	-	-
C. ecalyculata Vell.*	FOD, FES	-	-	-
C. gardneri I.M.Johnst.	?	-	-	-
C. glabrata Cham.	FES, FED	-	-	-
C. glazioviana (Taub.) Gottschling & J.S.Mill.	FOD	-	-	-
C. hatschbachii J.S.Mill.	FOD, FES	-	-	-
C. incognita Gottschling & J.S.Mill.	FED	-	-	-
C. latiloba I.M.Johnst.*	FOD	-	-	-
C. magnoliifolia Cham.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. nodosa Lam.	FOD, FES	-	-	-
C. ochracea DC.	FOD, RST	-	-	-
C. rufescens A.DC.	FOD, FES	-	-	-
C. sagotii I.M.Johnst.	FOD	-	-	-
C. sellowiana Cham.	FOD	-	-	-
C. sericalyx A.DC.	FOD	-	-	-
C. silvestris Fresen.*	FOD	-	-	-
C. superba Cham.	FOD, FES	-	-	-
C. taguayensis Vell.	FOD	-	-	-
C. toqueve Aubl.	FOD	-	-	-
C. trachyphylla Cham.	FOD, FCA	-	-	-
C. trichoclada DC.	FOD, FES	-	-	-
C. trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.	FES, FED	-	-	-
Varronia – 11/90				
V. curassavica Jacq.	FOD	-	-	-
V. discolor Cham.	FOD, RST	-	-	-
V. guaranitica (Chodat & Hassl.) J.S.Mill.	?	-	-	-
V. guazumifolia Desv.	FOD	-	-	-
V. leucomalla Taub.*	FOD	-	-	-
V. longifolia A.DC.*	FOD	-	-	-
V. multispicata Cham.	FOD	-	-	-
V. paucidentata Fresen.	FOD	-	-	-
V. poliophylla Fresen.*	FOD	-	-	-
V. polycephala (Lam.) I.M.Johnst.	FOD, RUD	-	-	-
V. urticifolia (Cham.) J.S.Mill.	FOD	-	-	-

Costaceae

João Marcelo Alvarenga Braga

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
COSTACEAE –5/ca. 80				
<i>Chamaecostus</i> – 2/7				
<i>C. cuspidatus</i> (Nees & Mart.) C.Specht & D.W.Stev.	FOD, FES	-	EN	ANEXO I
<i>C. subsessilis</i> (Nees & Mart.) C.Specht & D.W.Stev.	FOD, FES	-	-	-
<i>Costus</i> – 3/ca. 55				
<i>C. arabicus</i> L.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>C. scaber</i> Ruiz & Pav.	FOD, FES	-	-	-
<i>C. spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	FOD, FES, RST	-	-	-

Crassulaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CRASSULACEAE – 3/1370				
<i>Crassula</i> – 1/195				
<i>C. peduncularis</i> (Sm.) Meigen	FCA, RST	-	-	-
<i>Kalanchoe</i> – 2/145				
<i>K. delagoensis</i> Eckl. & Zeyh.	FCA, RST, RUD	-	-	-
<i>K. pinnata</i> (Lam.) Pers.	FCA, RST, RUD	-	-	-

Cucurbitaceae

Vera Lúcia Gomes Klein & Jarênio Rafael Ozeas de Santana

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CUCURBITACEAE – 80/ca. 850				
Apodanthera – 9/15				
A. argentea Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
A. catharinensis Mart.Crov.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. congestiflora Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
A. fasciculata Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
A. glaziovii Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
A. hatschbachii C.Jeffrey*	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. laciniosa</i> Cogn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>A. sagittifolia</i> (Griseb.) Mart.Crov.	FOM, FES	-	-	-
<i>A. ulei</i> (Cogn.) Mart.Crov.*	FOM, FES	-	-	-
<i>Cayaponia</i> – 27/60				
<i>C. alarici</i> M.L.Porto*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. bonariensis</i> (Mill.) Mart.Crov.	FOM, FES	-	-	-
<i>C. cabocla</i> Mart.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. cogniauxiana</i> Gomes-Klein*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. diversifolia</i> (Cogn.) Cogn.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>C. espelina</i> (Silva Manso) Cogn.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>C. floribunda</i> (Cogn.) Cogn.*	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>C. fluminensis</i> (Vell.) Cogn.*	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>C. glandulosa</i> (Poepp. & Endl.) Cogn.	FES, FED	-	-	-
<i>C. jenmanii</i> C.Jeffrey	FOD, FES	-	-	-
<i>C. latiloba</i> (Cogn.) Gomes-Klein*	FOD	-	-	-
<i>C. longifolia</i> Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. martiana</i> (Cogn.) Cogn.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>C. membranacea</i> Gomes-Klein*	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. nitida</i> Gomes-Klein*	FOD	-	-	-
<i>C. palmata</i> Cogn.*	FOM, FES	-	-	-
<i>C. pedata</i> Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. petiolulata</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>C. pilosa</i> (Vell.) Cogn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. podantha</i> Cogn.	FOM, FES, FED	-	-	-
<i>C. tayuya</i> (Vell.) Cogn.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>C. ternata</i> (Vell.) Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. trifoliolata</i> (Cogn.) Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. trilobata</i> (Cogn.) Cogn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. tubulosa</i> Cogn.	FOD	-	-	-
<i>C. villosissima</i> Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. weddellii</i> (Naudin) Gomes-Klein	FES, FED	-	-	-
<i>Ceratosanthes</i> – 4/4				
<i>C. hilariana</i> Cogn.	FES, FED	-	-	-
<i>C. multiloba</i> Cogn.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>C. tomentosa</i> Cogn.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>C. warmingii</i> Cogn.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Cyclanthera</i> – 8/25				
<i>C. brasiliensis</i> Cogn.*	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>C. eichleri</i> Cogn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. elegans</i> Cogn.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>C. kuhlmanniana</i> Toledo*	FOD	-	-	-
<i>C. pedata</i> (L.) Schrad.	FES	-	-	-
<i>C. tenuisepala</i> Cogn.	FOM	-	-	-
<i>C. ternuifolia</i> Cogn.*	FOM	-	-	-
<i>C. trigonoloba</i> Toledo*	FOD, FES	-	-	-
<i>Echinopepon</i> – 1/18				

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>E. racemosus</i> (Steud.) C.Jeffrey	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Fevillea</i> – 3/7				
<i>F. bahiensis</i> G.Robinson & Wunderlin*	FOD	-	-	-
<i>F. passiflora</i> Vell.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>F. trilobata</i> L.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Gurania</i> – 7/35				
<i>G. acuminata</i> Cogn.	FOD	-	-	-
<i>G. malacophylla</i> Barb.Rodr.	FOD, FES	-	-	-
<i>G. multiflora</i> (Miq.) Cogn.	FOD, FES	-	-	-
<i>G. ovata</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>G. speciosa</i> (Poepp. & Endl.) Cogn.	FOD	-	-	-
<i>G. subumbellata</i> (Miq.) Cogn.	FOD	-	-	-
<i>G. tricuspidata</i> Cogn.	FOD	-	-	-
<i>Lagenaria</i> – 2/6				
<i>L. siceraria</i> (Molina) Standl.	FOD, FES	-	-	-
<i>L. sphaerica</i> (Sond.) Naud.	FOD	-	-	-
<i>Luffa</i> – 2/7				
<i>L. cylindrica</i> (L.) Roem.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>L. operculata</i> (L.) Cogn.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Melancium</i> – 1/1				
<i>M. campestre</i> Naudin	FES	-	-	-
<i>Melothria</i> – 5/10				
<i>M. cucumis</i> Vell.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. hirsuta</i> Cogn.	FES	-	-	-
<i>M. pendula</i> L.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. uliginosa</i> Cogn.	FOM, FES	-	-	-
<i>M. warmingii</i> Cogn.	FOD, FES	-	-	-
<i>Melothrianthus</i> – 1/1				
<i>M. smilacifolius</i> (Cogn.) Mart.Crov.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>Momordica</i> – 1/47				
<i>M. charantia</i> L.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Psiguria</i> – 1/12				
<i>P. ternata</i> (M.Roem.) C.Jeffrey	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Rytidostylis</i> – 1/5				
<i>R. amazonica</i> (Mart. ex Cogn.) Kuntze	FOD	-	-	-
<i>Sicydium</i> – 1/6				
<i>S. gracile</i> Cogn.	FOD, FES	-	-	-
<i>Sicyos</i> – 1/40				
<i>S. polyacanthos</i> Cogn.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Siolmatra</i> – 1/2				
<i>S. brasiliensis</i> (Cogn.) Baill.	FES, FED	-	-	-
<i>Wilbrandia</i> – 4/4				
<i>W. ebracteata</i> Cogn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>W. hibiscoides</i> Silva Manso	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>W. longisepala</i> Cogn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>W. verticillata</i> (Vell.) Cogn.	FOD, FES	-	-	-

Cunoniaceae

Carmen Sílvia Zickel

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CUNONIACEAE – 9/350				
<i>Lamanonia</i> – 4/5				
<i>L. brasiliensis</i> Zickel & Leitão Filho	FES	-	-	-
<i>L. chabertii</i> (Pamp.) L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
<i>L. cuneata</i> (Cambess.) Kuntze*	FOD, FES	-	-	-
<i>L. ternata</i> Vell.	FOD, FES,FED, RST	-	-	-
<i>Weinmannia</i> – 5/6				
<i>W. discolor</i> Gardner*	FOD	-	-	-
<i>W. humilis</i> Engl.*	AFL, FOD	-	-	-
<i>W. organensis</i> Gardner*	FOD	-	-	-
<i>W. paulliniifolia</i> Pohl <i>ex</i> Seringe*	FOD, RST	-	-	-
<i>W. pinnata</i> L.*	FOD, RST	-	-	-

Cyclanthaceae

Paula Moraes Leitman & Eduardo da Silva Leal

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CYCLANTHACEAE – 10/235				
<i>Asplundia</i> – 7/105				
<i>A. brachypus</i> (Drude) Harling*	FOD	-	-	-
<i>A. gardneri</i> (Hook.) Harling	FOD, FES	-	-	-
<i>A. glaucophylla</i> Harling*	FOD	-	-	-
<i>A. maximiliani</i> Harling*	FOD	-	-	-
<i>A. polymera</i> (Hand.-Mazz.) Harling*	FOD	-	-	-
<i>A. rivularis</i> (Lindm.) Harling*	FOD	-	-	-
<i>A. tetragonopus</i> (Mart. ex Drude) Harling*	FOD	-	-	-
<i>Evodianthus</i> – 1/1				
<i>E. funifer</i> (Poit.) Lindm.	FOD	-	-	-
<i>Stelestylis</i> – 1/4				
<i>S. coriacea</i> Drude*	FOD	-	-	-
<i>Thoracocarpus</i> – 1/1				
<i>T. bissectus</i> (Vell.) Harling	FOD, RST	-	-	-

Cymodoceaceae

Flávio Dayrell Gontijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CYMODOCEACEAE – 1/16				
<i>Halodule</i> – 1/7				
<i>H. emarginata</i> Hartog	FAQ	-	-	-

Cyperaceae

Marccus Alves & Ana Cláudia Araújo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
CYPERACEAE – 156/4000				
<i>Abildgaardia</i> – 1/15				
<i>A. baeothryon</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>Becquerelia</i> – 4/8				
<i>B. clarkei</i> T.Koyama*	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. cymosa</i> Brongn.	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. merkeliana</i> Nees	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. muricata</i> Nees	FOD, FOM	-	-	-
<i>Bulbostylis</i> – 5/203				
<i>B. capillaris</i> (L.) C.B.Clarke	AFL, FOD, FOM	-	-	-
<i>B. lanata</i> (Kunth) Lindm.	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. scabra</i> (J. Presl & C. Presl) C.B.Clarke	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. truncata</i> (Nees) M.Strong	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. vestita</i> (Kunth) C.B.Clarke	AFL, FOD, FOM	-	-	-
<i>Calyptracarya</i> – 1/8				
<i>C. glomerulata</i> (Brongn.) Urb.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Carex</i> – 7/1800				
<i>C. albolutescens</i> Schwein.	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. bonariensis</i> Desf. ex Poir.	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. brasiliensis</i> A.St.-Hil.	FCA, FOM	-	-	-
<i>C. fuscula</i> d’Urv.	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. longhi</i> Mackenz.	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. pseudocyperus</i> L.	FCA, FOD, FOM	-	-	-
<i>C. vixdentata</i> (Kük. ex Osten) G.A.Wheeler	FOD, FOM	-	-	-
<i>Cryptangium</i> – 2/25				
<i>C. polyphyllum</i> (Nees) Boeckeler*	AFL, FOD, FOM	-	-	-
<i>C. triquetum</i> Boeckeler	AFL, FOD, FOM	-	-	-
<i>Cyperus</i> – 20/700				
<i>C. aggregatus</i> (Willd.) Endl.	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. andreanus</i> Maury*	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. articulatus</i> L.	FCA, FOM	-	-	-
<i>C. burkartii</i> Guaglianone	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. chalaranthus</i> J.Presl & C.Presl	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. consors</i> C.B.Clarke	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. coriifolius</i> Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. dichromeniformis</i> Kunth*	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. difformis</i> L.	FOM	-	-	-
<i>C. enterianus</i> Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. friburgensis</i> Boeckeler*	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. haspan</i> L.	FCA, FOM	-	-	-
<i>C. laxus</i> Lam.	FOM	-	-	-
<i>C. ligularis</i> L.	FOM, RST	-	-	-
<i>C. luzulae</i> (L.) Retz.	FOM, RST	-	-	-
<i>C. meyenianus</i> Kunth	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. muniziae</i> G.C.Tucker	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. odoratus</i> L.	FOM	-	-	-
<i>C. simplex</i> Kunth	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. virens</i> Michx.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Diplacrum</i> – 1/8				
<i>D. capitatum</i> (Willd.) Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
<i>Eleocharis</i> – 7/260				
<i>E. acutangula</i> (Roxb.) Schult.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. confervoides</i> (Poir.) Miq.	FOM	-	-	-
<i>E. elegans</i> (Kunth) Roem. & Schult.	FOM	-	-	-
<i>E. filiculmis</i> Kunth	FOM	-	-	-
<i>E. flavescens</i> (Poir.) Urb.	FOM	-	-	-
<i>E. geniculata</i> (L.) Roem. & Schult.	FCA, FOM	-	-	-
<i>E. mutata</i> (L.) Roem. & Schult.	FOM	-	-	-
<i>Fimbristylis</i> – 5/303				
<i>F. autumnalis</i> (L.) Roem. & Schult.	FCA, FOM	-	-	-
<i>F. cymosa</i> R.Br.	AFL, FCA, FOM, RST	-	-	-
<i>F. dichotoma</i> (L.) Vahl	FCA, FOM, RST	-	-	-
<i>F. miliacea</i> (L.) Vahl	FCA, FOM	-	-	-
<i>F. spadicea</i> (L.) Vahl	FCA, FOM	-	-	-
<i>Fuirena</i> – 3/60				
<i>F. incompleta</i> Nees	FCA	-	-	-
<i>F. robusta</i> Kunth	FCA, FOM	-	-	-
<i>F. umbellata</i> Rottb.	FCA, FOM	-	-	-
<i>Hypolytrum</i> – 11/60				
<i>H. amorinii</i> M.Alves & W.W.Thomas*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
<i>H. bahiense</i> M.Alves & W.W.Thomas*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
<i>H. bullatum</i> C.B.Clarke*	FOD, FOM	-	-	-
<i>H. espiritosantense</i> M.Alves & W.W.Thomas*	FOD, FOM	-	-	-
<i>H. glaziovii</i> Boeckeler*	FOD, FOM	-	-	-
<i>H. glomeratum</i> M.Alves & W.W.Thomas	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>H. jardimii</i> M.Alves & W.W.Thomas	FOD, FOM	-	-	-
<i>H. lucennoi</i> M.Alves & W.W.Thomas	FOD, FOM	-	EN	ANEXO II
<i>H. pulchrum</i> (Rudge) H. Pfeiff.	RST	-	-	-
<i>H. schraderianum</i> Nees	FOD, FOM	-	-	-
<i>H. verticillatum</i> T.Koyama	FOD, FOM	-	-	-
<i>Kyllinga</i> – 1/75				
<i>K. vaginata</i> Lam.	FCA, FOM	-	-	-
<i>Lagenocarpus</i> – 4/20				
<i>L. guianensis</i> Lindl. ex Nees	FOM	-	-	-
<i>L. rigidus</i> Nees	AFL, FOM, RST	-	-	-
<i>L. subaphyllus</i> T.Koyama*	AFL, FOD, FOM	-	-	-
<i>L. verticillatus</i> (Spreng.) T. Koyama & Maguire	FOM, RST	-	-	-
<i>Lipocarpa</i> – 1/36				
<i>L. micrantha</i> (Vahl) G.C.Tucker	FCA, FOM, RST	-	-	-
<i>Machaerina</i> – 3/50				
<i>M. austrobrasilensis</i> M.T.Strong*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. ensifolia</i> (Boeckeler) T.Koyama*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. ficticia</i> (Hemsley) T.Koyama*	FCA, FOD, FOM	-	-	-
<i>Oxycaryum</i> – 1/1				
<i>O. cubense</i> (Poepp. & Kunth) Lye	FOM	-	-	-
<i>Pleurostachys</i> – 13/30				
<i>P. angustifolia</i> Boeckeler*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO I
<i>P. beyrichii</i> (Nees) Steud.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. distichophylla</i> (Boeckeler) C.B.Clarke*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. foliosa</i> Kunth*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. gaudichaudii</i> Brongn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. graminifolia</i> Brongn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. macrantha</i> Kunth*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. orbignyana</i> Brongn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. puberula</i> Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. regnellii</i> C.B.Clarke*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. stricta</i> Kunth*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. tenuiflora</i> Brongn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. urvillei</i> Brongn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Pycneus</i> – 4/120				
<i>P. decumbens</i> T.Koyama	FOM	-	-	-
<i>P. lanceolatus</i> (Poir.) C.B.Clarke	FOM	-	-	-
<i>P. niger</i> (Ruiz & Pav.) Cufod.	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. piceus</i> Liebm.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Rhynchospora</i> – 29/360				
<i>R. asperula</i> (Nees) Steud.	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. barrosiana</i> Guaglianone	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. biflora</i> Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. breviuscula</i> H.Pfeiff.	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. brittonii</i> Gale	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. cephalotes</i> (L.) Vahl	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>R. ciliata</i> Kük.	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. coriifolia</i> Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. comata</i> (Link) Roem. & Schult.	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. contracta</i> (Nees) Raynal	FCA, FOD, FOM	-	-	-
<i>R. corymbosa</i> (L.) Britt.	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. cryptantha</i> C.B.Clarke	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. exaltata</i> Kunth	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. floribunda</i> Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. gigantea</i> Link	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. holoschoenoides</i> (L.C.Rich.) Herter	FCA, FOD, FOM	-	-	-
<i>R. microcarpa</i> Baldw.	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. nervosa</i> (Vahl) Boeckeler	FOM	-	-	-
<i>R. polyantha</i> Steud.	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. pubera</i> (Vahl) Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. radicans</i> (Schlech. & Cham.) H.Pfeiff.	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. sampaioana</i> Gross	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. setigera</i> Griseb.	AFL, FOD, FOM	-	-	-
<i>R. splendens</i> Lindm.	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. stenocarpa</i> Kunth	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. subsetosa</i> C.B.Clarke	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. tenuis</i> Link	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. uniflora</i> Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. velutina</i> (Kunth) Boeckeler*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Schoenoplectus</i> – 4/77				
<i>S. americanus</i> (Pers.) Volkart ex Schinz & R.Keller	RST	-	-	-
<i>S. californicus</i> (C.A.Mey.) Soják	RST	-	-	-
<i>S. supinus</i> (L.) Palla	RST	-	-	-
<i>S. tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla	RST	-	-	-
<i>Schoenus</i> – 1/110				
<i>S. lymansmithii</i> M.T.Strong*	FOD, FOM, FCA	-	-	-
<i>Scleria</i> – 30/270				
<i>S. acanthocarpa</i> Boeckeler*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. alpina</i> Core*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. bracteata</i> Cav.	FOM, RST	-	-	-
<i>S. bradei</i> Pilg.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. castanea</i> Core*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. cyperina</i> Wild. ex Kunth	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. distans</i> Poir.	FCA, FOD, FOM	-	-	-
<i>S. filiculmis</i> Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. georgiana</i> Core*	FOD	-	-	-
<i>S. hirtella</i> Sw.	FCA, FOM	-	-	-
<i>S. latifolia</i> Sw.	FOM	-	-	-
<i>S. leptostachya</i> Kunth	FOM	-	-	-
<i>S. macrophylla</i> J. Presl & C. Presl	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. melaleuca</i> Rchb. ex Schldl. & Cham.	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. mexicana</i> (Liebm.) Boeckeler	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. microcarpa</i> Nees ex Kunth	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. millespicula</i> T.Koyama*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. mitis</i> P.J.Bergius	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. myricocarpa</i> Kunth*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. panicoides</i> Kunth	AFL, FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>S. pernambucana</i> Luceño & M.Alves*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. plusiophylla</i> Steud.	FOD	-	-	-
<i>S. reticularis</i> Michx. ex Willd.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. scabra</i> Willd.	FOD	-	-	-
<i>S. secans</i> (L.) Urb.	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. spicata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. uleana</i> Boeckeler ex C.B.Clarke*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. vaginata</i> Steud.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. variegata</i> (Nees) Steud.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. virgata</i> (Nees) Steud.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Trilepis</i> – 4/7				
<i>T. ciliatifolia</i> T.Koyama*	AFL	-	-	-
<i>T. lhotzkiana</i> Nees ex Arn.	AFL	-	-	-
<i>T. microstachya</i> (C.B.Clarke) H.Pfeiff.*	AFL	-	-	-
<i>T. tenuis</i> Vitta*	AFL	-	VU	ANEXO II

Dichapetalaceae

Flávio Dayrell Gontijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
DICHAPETALACEAE – 8/50				
Stephanopodium – 6/10				
S. blanchetianum Baill.*	FOD	-	-	-
S. engleri Baill.*	FES	-	-	-
S. estrellense Baill.*	FOD	-	-	-
S. magnifolium Prance*	FOD	VU	-	-
S. organense Prance*	FOD	-	-	-
S. sessile Rizzini*	FOD	-	-	-
Tapura – 2/25				
T. follii Prance*	FOD	-	-	-
T. wurdackiana Prance*	FOD	-	-	-

Dilleniaceae

Claudio Nicoletti de Fraga

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
DILLENIACEAE – 35/123				
Curatella – 1/1				
C. americana L.	FOM, RST	-	-	-
Davilla – 17/30				
D. angustifolia A.St.-Hil.	FES	-	-	-
D. bahiana Aymard*	FOD	-	-	-
D. bilobata Aymard*	FOM	-	-	-
D. cearensis J.Huber	FOD, RST	-	-	-
D. flexuosa A.St.-Hil.*	FOD, RST	-	-	-
D. glabrata Mart. ex Eichler*	FES	-	-	-
D. glaziovii Eichler*	FOD	-	CR	ANEXO I
D. grandifolia Moric. ex Eichler*	FOD	-	-	-
D. kunthii A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES	-	-	-
D. latifolia Casar*	FES	-	-	-
D. macrocarpa Eichler*	FOM, RST	-	-	-
D. morii Aymard*	FOM	-	VU	ANEXO II
D. nitida (Vauh) Kubitzki	FOD, FOM, FES	-	-	-
D. papyracea Aymard*	FES	-	-	-
D. rugosa Poir.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
D. sellowiana Schltdl.*	FOD	-	-	-
D. sessilifolia Fraga*	FOM, RST	-	-	-
Doliocarpus – 10/48				
D. dentatus Standl.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
D. glomeratus Eichler*	FOM	-	-	-
D. grandiflorus Eichler*	FOM	-	-	-
D. lancifolius Kubitzki*	FOM	-	-	-
D. lombardii Aymard*	FOM	-	-	-
D. major J.F.Gmel.	RST	-	-	-
D. schottianus Eichler*	FES	-	-	-
D. sellowianus Eichler*	FOM, RST	-	-	-
D. sessiliflorus Mart.*	RST	-	-	-
D. validus Kubitzki*	FOM, RST	-	-	-
Tetracera –7/44				
T. boomii Aymard*	FOM, RST	-	-	-
T. breyniana Schltdl.*	RST	-	-	-
T. forzzae Fraga & Aymard*	FES	-	-	-
T. lasiocarpa Eichler*	FOD, RST	-	-	-
T. oblongata DC.*	RST	-	-	-
T. sellowiana Schltdl.*	RST	-	-	-
T. willdenowiana Steud.	RST	-	-	-

Dioscoreaceae

Mizué Kirizawa & Cecília Carmen Xifreda

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
DIOSCOREACEAE – 49/ca. 900				
<i>Dioscorea</i> – 49/ca. 630				
<i>D. altissima</i> Lam.	FOD, RST	-	-	-
<i>D. amaranthoides</i> C.Presl	FOD, FES	-	-	-
<i>D. bradei</i> R.Knuth*	FOD	-	-	-
<i>D. bulbotricha</i> Hand.-Mazz.	FOD	-	-	-
<i>D. campestris</i> Griseb.	FOD, FES	-	-	-
<i>D. ceratandra</i> R.Knuth	FOD, RST	-	-	-
<i>D. cinnamomifolia</i> Hook.	RST	-	-	-
<i>D. coronata</i> Hauman	FOD	-	-	-
<i>D. debilis</i> Uline <i>ex</i> R.Knuth*	FOD, FCA	-	-	-
<i>D. demourae</i> Uline <i>ex</i> R.Knuth	FOD	-	-	-
<i>D. dodecaneura</i> Vell.	FOD	-	-	-
<i>D. fodinarum</i> Kunth	FOD, RST	-	-	-
<i>D. furcata</i> Griseb.	FOD, FCA	-	-	-
<i>D. glandulosa</i> (Griseb.) Klotzsch <i>ex</i> Kunth	FOD, AFL, RST	-	-	-
<i>D. grandiflora</i> Mart. <i>ex</i> Griseb.	FES	-	-	-
<i>D. grisebachii</i> Kunth	FOD	-	-	-
<i>D. hassleriana</i> Chodat & Hassl.	FED, FES	-	-	-
<i>D. kunthiana</i> Uline <i>ex</i> R.Knuth	FOD	-	-	-
<i>D. laxiflora</i> Mart. <i>ex</i> Griseb.	FOD, FES	-	-	-
<i>D. leptostachya</i> Gardner	FOD, FES RST	-	-	-
<i>D. loefgrenii</i> R.Knuth	FES	-	-	-
<i>D. mantiqueirensis</i> R.Knuth	FOD	-	-	-
<i>D. margarethia</i> G.Barroso <i>et al.</i> *	FOD	-	-	-
<i>D. marginata</i> Griseb.	FOD, FES	-	-	-
<i>D. martiana</i> Griseb.	FOD, RST	-	-	-
<i>D. mollis</i> Kunth	FOD, RST	-	-	-
<i>D. monadelphica</i> (Kunth) Griseb.	FOD	-	-	-
<i>D. multiflora</i> Mart. <i>ex</i> Griseb.	FOD, FES	-	-	-
<i>D. multispicata</i> R.Knuth	FOD FES	-	-	-
<i>D. olfersiana</i> Klotzsch <i>ex</i> Griseb.	FOD, RST	-	-	-
<i>D. ovata</i> Vell.	FOD	-	-	-
<i>D. perdicum</i> Taub.*	FOD	-	-	-
<i>D. piperifolia</i> Humb. & Bonpl. <i>ex</i> Willd.	FOD, FED	-	-	-
<i>D. planistipulosa</i> Uline <i>ex</i> R.Knuth	FOD	-	-	-
<i>D. plantaginifolia</i> R.Knuth*	FOD	-	-	-
<i>D. polygonoides</i> Humb. & Bonpl. <i>ex</i> Willd.	FOD	-	-	-
<i>D. pseudomacrocapsa</i> G.Barroso <i>et al.</i>	FOD	-	-	-
<i>D. pumilio</i> Griseb.	FOD	-	-	-
<i>D. regnellii</i> Uline <i>ex</i> R.Knuth	FOD	-	-	-
<i>D. rumicoides</i> Griseb.*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>D. sanpaulensis</i> R.Knuth	FOD	-	-	-
<i>D. sinuata</i> Vell.	FOD	-	-	-
<i>D. stegelmanniana</i> R.Knuth	FOD	-	-	-
<i>D. subhastata</i> Vell.	FOD, FED	-	-	-
<i>D. tauriglossum</i> R.Knuth	FOD FED	-	-	-
<i>D. therezopolensis</i> Uline <i>ex</i> R.Knuth	FOD	-	-	-
<i>D. torticaulis</i> R.Knuth*	FOD	-	-	-
<i>D. trilinguis</i> Griseb.	FOD	-	-	-
<i>D. trisecta</i> Griseb.	FOD	-	-	-

Droseraceae

Tania Regina dos Santos Silva

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
DROSERACEAE – 8/ca. 120				
<i>Drosera</i> – 8/120				
<i>D. brevifolia</i> Pursh	RST	-	-	-
<i>D. capillaris</i> Poir.	RST	-	-	-
<i>D. chrysolepis</i> Taub.	RST	-	-	-
<i>D. communis</i> A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
<i>D. intermedia</i> Dreves & Hayne	RST	-	-	-
<i>D. montana</i> A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
<i>D. villosa</i> A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
<i>D. viridis</i> F.Rivadavia*	FOD	-	-	-

Ebenaceae

Matheus Fortes Santos & Paulo Takeo Sano

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
EBENACEAE – 14/548				
<i>Diospyros</i> – 14/>500				
<i>D. amabi</i> B.Walln.*	FOD	-	-	-
<i>D. apeibacarpus</i> Raddi*	FOD, RST	-	-	-
<i>D. brasiliensis</i> Mart.*	FOD	-	-	-
<i>D. capraeifolia</i> Mart.	FOD	-	-	-
<i>D. duartei</i> Cavalcante*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>D. gaultheriifolia</i> Mart.*	FES, RST	-	-	-
<i>D. hispida</i> A.DC.	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>D. inconstans</i> Jacq.	FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>D. ketun</i> B.Walln.	FES	-	-	-
<i>D. mexiae</i> Standl.*	FES	-	-	-
<i>D. riedelii</i> (Hiern) B.Walln.*	FOD	-	-	-
<i>D. scott-morii</i> B.Walln.*	FOD	-	-	-
<i>D. serrana</i> Sothers*	FES	-	-	-
<i>D. ubaita</i> B.Walln.*	FOD	-	-	-

Elaeocarpaceae

Marcus Alberto Nadruz Coelho & Daniela Sampaio

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ELAEOCARPACEAE – 11/ca. 500				
<i>Crinodendron</i> – 1/1				
<i>C. brasiliense</i> Reitz & L.B.Sm.	FOM	-	-	-
<i>Sloanea</i> –10/120				
<i>S. eichleri</i> K.Schum.	FOD	-	-	-
<i>S. garckeana</i> K.Schum.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. guianensis</i> (Aubl.) Benth.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>S. hirsuta</i> (Schott) Planch <i>ex</i> Benth.	FOD, FES, RST, FED	-	-	-
<i>S. lasiocoma</i> K.Schum	FES, FOM, FOD	-	-	-
<i>S. obtusa</i> (Splitg.) K.Schum.	MAN	-	-	-
<i>S. obtusifolia</i> (Moric.) K.Schum.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. pubescens</i> Benth.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. retusa</i> (Schum.) Uitt.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. stipitata</i> Spruce <i>ex</i> Benth.	FOD, FES	-	-	-

Elatinaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ELATINACEAE – 2/35				
<i>Elatine</i> – 2/10				
<i>E. lindbergii</i> Rohrb.	FAQ	-	-	-
<i>E. triandra</i> Schkur	FAQ	-	-	-

Ericaceae

Gerson Oliveira Romão

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ERICACEAE – 48/ca.4000				
Agarista – 15/29				
A. chlorantha (Cham.) G.Don	AFL	-	-	-
A. coriifolia (Thunb.) Hook. ex Nied.	AFL	-	-	-
A. eucalyptoides (Cham. & Schltdl.) G.Don	AFL	-	-	-
A. hispidula (DC.) J.D.Hook. ex Nied.	AFL	-	-	-
A. minensis (Glaz. ex Sleumer) Judd*	AFL	-	-	-
A. nierdeleinii (Sleumer) Judd*	AFL	-	-	-
A. nummularia (Cham. & Schltdl.) G.Don*	AFL	-	-	-
A. oleifolia (Cham.) G.Don	AFL	-	-	-
A. organensis (Gardner) Hook. ex Nied.*	AFL	-	-	-
A. paraguayensis (Sleumer) Judd*	AFL	-	-	-
A. pulchella Cham. ex G.Don*	AFL	-	-	-
A. pulchra (Cham. & Schltdl.) G.Don	AFL	-	-	-
A. revoluta (Spreng.) Hook. ex Nied.*	RST	-	-	-
A. subrotunda (Pohl) G.Don*	AFL	-	-	-
A. uleana (Sleumer) Judd*	AFL, RST	-	-	-
Gaultheria – 7/37				
G. bradeana Sleumer*	AFL	-	-	-
G. eriophylla (Pers.) Sleumer ex Burt	AFL	-	-	-
G. itatiaiea Wawra*	AFL	-	-	-
G. myrtilloides Cham. & Schltdl.*	AFL	-	-	-
G. serrata (Vell.) Sleumer ex Kin.-Gouv.*	AFL	-	-	-
G. sleumeriana Kin.-Gouv.*	AFL	-	-	-
G. ulei Sleumer*	AFL	-	-	-
Gaylussacia – 26/52				
G. amoena Cham.*	AFL	-	-	-
G. angulata Gardner*	AFL	-	VU	ANEXO II
G. angustifolia Cham.*	AFL	-	-	-
G. arassatubensis R.R.Silva & Cervi*	AFL	-	-	-
G. brasiliensis (Spreng.) Meisn.	AFL, RST	-	-	-
G. caparoensis Sleumer*	AFL	-	VU	ANEXO II
G. caratuvensis R.R.Silva & Cervi*	AFL	-	-	-
G. chamissonis Meisn.	AFL, FCA	-	-	-
G. corvensis R.R.Silva & Cervi*	AFL	-	-	-
G. decipiens Cham.*	AFL	-	-	-
G. densa Cham.	AFL	-	-	-
G. fasciculata Gardner*	AFL	-	-	-
G. incana Cham.	AFL	-	-	-
G. jordanensis Sleumer*	AFL	-	-	-
G. montana (Pohl) Sleumer	AFL	-	-	-
G. pallida Cham.	AFL	-	-	-
G. pinifolia Cham.	AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>G. pruinosa</i> Loes.*	AFL	-	VU	ANEXO II
<i>G. pseudogaultheria</i> Cham. & Schltdl.*	FCA	-	-	-
<i>G. pulchra</i> Pohl	AFL	-	-	-
<i>G. reticulata</i> Mart. ex Meisn.	AFL	-	-	-
<i>G. rhododendron</i> Cham. & Schltdl.*	FOM, FCA	-	-	-
<i>G. rigida</i> Casaretto*	AFL	-	-	-
<i>G. rugosa</i> Cham. & Schltdl.	AFL	-	-	-
<i>G. salicifolia</i> Sleumer	AFL	-	-	-
<i>G. setosa</i> Kin.-Gouv.*	AFL	-	VU	ANEXO II

Eriocaulaceae

Paulo Takeo Sano, Livia Echternacht, Marcelo Trovó
& Ana Maria Giulietti Harley

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ERIOCAULACEAE – 169/ca. 1010				
Actinocephalus – 5/31				
A. bongardii (A.St-Hil.) Sano	FCA	-	-	-
A. callophyllus (Silveira) Sano*	FCA	-	-	-
A. falcifolius (Körn.) Sano*	FCA	-	-	-
A. ithyphyllus (Mart.) Sano*	FCA	-	-	-
A. ochrocephalus (Körn.) Sano	FCA, RST	-	-	-
Blastocaulon – 2/5				
B. prostratum (Körn.) Ruhland	FCA	-	-	-
B. scirpeum (Mart.) Giul.	FCA	-	-	-
Eriocaulon – 24/ca. 400				
E. arechevaetae Herter	FCA	-	-	-
E. argentinum Castell*	FCA	-	-	-
E. beauverdii Moldenke*	FCA	-	-	-
E. crassiscapum Bong.	FCA	-	-	-
E. dictyophyllum Körn.*	FCA	-	-	-
E. elychrysoides Bong.	FCA	-	-	-
E. gomphrenoides Kunth	FCA	-	-	-
E. kunthii Kunth	FCA	-	-	-
E. leptophyllum Kunth*	FCA	-	-	-
E. ligulatum (Vell.) L.B.Sm.	FCA, RST	-	-	-
E. longirostrum Silveira	FCA	-	-	-
E. magnificum Ruhland*	FCA	-	-	-
E. majusculum Ruhland*	FCA, AFL	-	-	-
E. melanocephalum Kunth	FCA	-	-	-
E. missionum A.Cast.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>E. modestum</i> Kunth	FCA, RST	-	-	-
<i>E. obtusum</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>E. palustre</i> Salzm.*	FCA	-	-	-
<i>E. reitzii</i> Moldenke & L.B.Sm.*	FCA	-	-	-
<i>E. sellowianum</i> Kunth.	FCA	-	-	-
<i>E. setaceum</i> L.	FCA	-	-	-
<i>E. spongiosifolium</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>E. ulaei</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>E. vaginatum</i> Körn.	FCA	-	-	-
<i>Leiothrix</i> – 16/ca. 50				
<i>L. argyroderma</i> Ruhland*	AFL	-	-	-
<i>L. arrecta</i> Ruhland	FCA	-	-	-
<i>L. beckii</i> (Szysz.) Ruhland*	AFL	-	-	-
<i>L. crassifolia</i> (Bong.) Ruhland	FCA	-	-	-
<i>L. curvifolia</i> (Bong.) Ruhland	FCA	-	-	-
<i>L. flagellaris</i> (Guillemin) Ruhland	FCA	-	-	-
<i>L. flavescens</i> (Bong.) Ruhland	FCA	-	-	-
<i>L. fluitans</i> (Mart.) Ruhland	FCA	-	-	-
<i>L. gomesii</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>L. hirsuta</i> (Wikstr.) Ruhland	RST	-	-	-
<i>L. pilulifera</i> (Körn.) Ruhland*	RST	-	-	-
<i>L. prolifera</i> (Bong.) Ruhland	FCA	-	-	-
<i>L. propinqua</i> (Körn.) Ruhland	FCA	-	-	-
<i>L. rufula</i> (A.St.-Hil.) Ruhland	RST	-	-	-
<i>L. subulata</i> Silveira	FCA	-	-	-
<i>L. vivipara</i> (Bong.) Ruhland	FCA	-	-	-
<i>Paepalanthus</i> – 91/ca. 500				
<i>P. acantholimon</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. aequalis</i> (Vell.) J.F.Macbr.	FCA	-	-	-
<i>P. albo-ciliatus</i> Silveira	FCA	-	-	-
<i>P. albo-vaginatus</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. amoenus</i> (Bong.) Körn.*	FCA	-	-	-
<i>P. argillicola</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. balansae</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. batatalensis</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. benedictii</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. bifidus</i> (Schr.) Kunth	FCA, RST	-	-	-
<i>P. blepharocnemis</i> Mart. ex Körn.	FCA	-	-	-
<i>P. bongardii</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>P. brachyphyllus</i> Ruhland	FCA	-	-	-
<i>P. brevicaulis</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. cachambuensis</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. caldensis</i> Malme*	FCA	-	-	-
<i>P. calvoides</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. calvus</i> Körn.*	FCA	-	-	-
<i>P. camptophyllus</i> Ruhland*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. caparoensis</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. catharinae</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. cephalopus</i> Silveira & Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. chloroblepharus</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. chloropus</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. ciliolatus</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. conduplicatus</i> Körn.*	FCA	-	-	-
<i>P. corymbosus</i> (Bong.) Kunth*	FCA	-	-	-
<i>P. dianthoides</i> Mart. ex Körn.	FCA	-	-	-
<i>P. diplobetor</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. diversifolius</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. dupatya</i> Mart. ex Körn.*	FCA	-	-	-
<i>P. elongatulus</i> Ruhland	FCA	-	-	-
<i>P. elongatus</i> (Bong.) Körn.	FCA	-	-	-
<i>P. euryphyllus</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. exiguus</i> (Bong.) Körn.	FCA	-	-	-
<i>P. fastigiatus</i> (Bong.) Körn.*	FCA	-	-	-
<i>P. flaccidus</i> (Bong.) Kunth	FCA	-	-	-
<i>P. freyreissii</i> (Thunb.) Körn.*	FCA	-	-	-
<i>P. garimpensis</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. glabrifolius</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. globosus</i> Ruhland	FCA	-	-	-
<i>P. gomesii</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. gracilipes</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. henriquei</i> Silveira & Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. heteropus</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. hydra</i> Ruhland	FCA	-	VU	ANEXO I
<i>P. ibitipocensis</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. itatiaiensis</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. jordanensis</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. klotzschianus</i> Körn.*	FCA, RST	-	-	-
<i>P. lamarckii</i> Kunth	FCA, RST	-	-	-
<i>P. langsdorffii</i> (Bong.) Körn.*	FCA	-	-	-
<i>P. leiseringii</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. leucoblepharus</i> Körn.*	FCA	-	-	-
<i>P. linearifolius</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. lundii</i> Körn.	FCA	-	-	-
<i>P. macahensis</i> Körn.*	FCA	-	-	-
<i>P. manicatus</i> Pouls. ex Malme	FCA	-	-	-
<i>P. melaleucus</i> (Bong.) Kunth*	FCA	-	-	-
<i>P. michaelii</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. miser</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. moedensis</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. mollis</i> Kunth*	FCA	-	-	-
<i>P. multicostatus</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. myocephalus</i> (Mart.) Körn.	RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. oerstedianus</i> Körn.*	FOD	-	-	-
<i>P. orthoblepharus</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. ovatus</i> Körn.	FCA	-	-	-
<i>P. pallidus</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. paulensis</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. planifolius</i> (Bong.) Körn.	FCA	-	-	-
<i>P. plantagineus</i> (Bong.) Körn.	FCA	-	-	-
<i>P. pruinosus</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. pseudotortilis</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. pubescens</i> Körn.	FCA	-	-	-
<i>P. pulchellus</i> Herzog	FCA, RST	-	-	-
<i>P. saxatilis</i> (Bong.) Körn.*	FCA	-	-	-
<i>P. scleranthus</i> Ruhland	FCA	-	-	-
<i>P. silveirae</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. spixianus</i> Mart.*	FCA	-	-	-
<i>P. striatus</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. suffruticans</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. tessmannii</i> Moldenke*	FCA	-	-	-
<i>P. tortilis</i> (Bong.) Mart.	FCA, RST	-	-	-
<i>P. trichophyllus</i> (Bong.) Körn.	FCA	-	-	-
<i>P. uleanus</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>P. usterii</i> Beauv.*	FCA	-	-	-
<i>P. vaginatus</i> Körn.	FCA	-	-	-
<i>P. variabilis</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>P. vellozioides</i> Körn.	FCA	-	-	-
<i>P. viridulus</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
Syngonanthus – 27/ca. 200				
<i>S. auripes</i> Silveira*	RST	-	-	-
<i>S. brasiliensis</i> Giul.*	FCA	-	CR	ANEXO I
<i>S. candidus</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>S. caracensis</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>S. caulescens</i> (Poir.) Ruhland	FCA	-	-	-
<i>S. chrysanthus</i> (Bong.) Ruhland*	RST	-	-	-
<i>S. costatus</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>S. densiflorus</i> Ruhland	FCA	-	-	-
<i>S. elegantulus</i> Ruhland	FCA	-	-	-
<i>S. fischerianus</i> (Bong.) Ruhland	FCA	-	-	-
<i>S. garimpensis</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>S. gracilis</i> (Körn.) Ruhland	FCA	-	-	-
<i>S. hirtellus</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>S. imbricatus</i> (Körn.) Ruhland*	RST	-	-	-
<i>S. itambeensis</i> Silveira	FCA	-	-	-
<i>S. linearis</i> Ruhland*	RST	-	-	-
<i>S. magnificus</i> Giul.*	FCA	-	CR	ANEXO I
<i>S. nitens</i> Ruhland	RST	-	-	-
<i>S. niveus</i> (Bong.) Ruhland*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. paepalophyllus</i> Silveira	RST	-	-	-
<i>S. planus</i> Ruhland*	FCA	-	-	-
<i>S. prolifer</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>S. suberosus</i> Giul.*	FCA	-	CR	ANEXO I
<i>S. umbellatus</i> (Lam.) Ruhland	FCA	-	-	-
<i>S. vernonioides</i> (Kunth.) Ruhland	FCA	-	EN	ANEXO II
<i>S. widgrenianus</i> (Körn.) Ruhland	FCA	-	-	-
<i>S. xeranthemoides</i> (Bong.) Ruhland	FCA	-	-	-
Tonina – 1/1				
<i>T. fluviatilis</i> Aubl.	RST	-	-	-

Erythroxylaceae

Maria Iracema Bezerra Loiola,
Ana Claudia Pereira de Oliveira
& Antonieta Moraes Marinho

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ERYTHROXYLACEAE – 53/250				
Erythroxylum – 53/240				
E. affine A.St.-Hil.*	RST, AFL, FOD	-	-	-
E. ambiguum Peyr.*	FOM	-	-	-
E. amplifolium (Mart.) O.E.Schulz	FOD, FOM, FCA	-	-	-
E. andrei Plowman*	RST	-	-	-
E. argentinum O.E.Schulz*	FOD	-	-	-
E. bradeanum O.E.Schulz*	FOD, FCA	-	-	-
E. catharinense Amaral*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO I
E. cincinnatum Mart.*	FOD	-	-	-
E. citrifolium A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
E. coelophlebium Mart.*	FOD	-	-	-
E. columbinum Mart.	RST, AFL, FOD	-	-	-
E. compressum Peyr.*	FOD	-	VU	ANEXO I
E. cryptanthum O.E.Schulz*	FOD	-	-	-
E. cuneifolium (Mart.) O.E.Schulz	FOM, FCA, AFL	-	-	-
E. cuspidifolium Mart.*	RST	-	-	-
E. cyclophyllum O.E.Schulz*	FOD	-	-	-
E. daphnites Mart.	FOD	-	-	-
E. deciduum A.St.-Hil.	RST, FES, FCA, FOD	-	-	-
E. distortum Mart.*	RST	-	VU	ANEXO I
E. flaccidum Salzm. ex Peyr.*	RST	-	-	-
E. frangulifolium A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
E. gaudichaudii Peyr.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>E. glaziovii</i> O.E.Schulz*	RST	-	-	-
<i>E. gonocladum</i> (Mart.) O.E.Schulz*	FOD	-	-	-
<i>E. hamigerum</i> O.E.Schulz*	FOD	-	-	-
<i>E. lancifolium</i> Peyr.*	FOD	-	-	-
<i>E. leal-costae</i> Plowman*	RST	-	EN	ANEXO I
<i>E. lygoides</i> O.E.Schulz*	RST	-	-	-
<i>E. macrocalyx</i> Mart.*	RST	-	-	-
<i>E. magnoliifolium</i> A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
<i>E. martii</i> Peyr.*	FOD	-	-	-
<i>E. mattos-silvae</i> Plowman*	RST, FOD	-	EN	ANEXO I
<i>E. membranaceum</i> Plowman*	FOD	-	EN	ANEXO I
<i>E. microphyllum</i> A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
<i>E. mikanii</i> Peyr.*	FOD, RST	-	-	-
<i>E. mucronatum</i> Benth.	FOD	-	-	-
<i>E. myrsinites</i> Mart.	FOM, FCA	-	-	-
<i>E. nitidum</i> Spreng.*	FOD	-	-	-
<i>E. nobile</i> O.E.Schulz*	FOD	-	-	-
<i>E. occultum</i> Plowman*	FOD	-	-	-
<i>E. ochranthum</i> Mart.*	FOD	-	-	-
<i>E. ovalifolium</i> Peyr.	RST	-	-	-
<i>E. oxypetalum</i> O.E.Schulz*	FOD, FCA	-	-	-
<i>E. passerinum</i> Mart.*	RST	-	-	-
<i>E. paufferense</i> Plowman*	FOD	-	CR	ANEXO I
<i>E. petrae-caballi</i> Plowman*	FED, RST	-	VU	ANEXO II
<i>E. plowmanii</i> Amaral*	RST, FES	-	-	-
<i>E. pulchrum</i> A.St.-Hil.	RST, FCA	-	-	-
<i>E. santosii</i> Plowman*	RST	-	-	-
<i>E. simonis</i> Plowman	FOD	-	-	-
<i>E. splendidum</i> Plowman	RST	-	-	-
<i>E. squamatum</i> Sw.	FOD	-	-	-
<i>E. tenue</i> Plowman*	FOD	-	-	-

Escalloniaceae

Viviane Renata Scalon

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ESCALLONIACEAE – 9/70				
<i>Escallonia</i> – 9/40				
<i>E. bifida</i> Link & Otto*	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. chlorophylla</i> Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
<i>E. farinacea</i> A.St.-Hil.	FOD, FCA	-	-	-
<i>E. hispida</i> (Vell.) Sleumer	FOD, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>E. laevis</i> (Vell.) Sleumer*	FOD, FCA	-	-	-
<i>E. ledifolia</i> Sleumer*	FCA	-	-	-
<i>E. megapotamica</i> Spreng.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. obtusissima</i> A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
<i>E. petrophila</i> Rambo & Sleumer*	FOD	-	-	-

Euphorbiaceae

Marcos Sobral, Luciana H. Yoshino Kamino
& Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
EUPHORBIACEAE – 473/8100				
Acalypha – 27/430				
A. accedens Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
A. amblyodonta Müll.Arg.	FES	-	-	-
A. ampliata Pax & K.Hoffm.	FOD	-	-	-
A. apetiolata Allem & J.L.Waecht.*	FCA	-	-	-
A. arciana (Baill.) Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
A. aspericocca Pax & K.Hoffm.*	FCA	-	-	-
A. brasiliensis Müll.Arg.	FES	-	-	-
A. chorisandra Baill.	FCA	-	-	-
A. clausenii (Turcz.) Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
A. communis Müll.Arg.	FES	-	-	-
A. digynostachya Baill.	FCA	-	-	-
A. dimorpha Müll.Arg.	FCA	-	-	-
A. gracilis Spreng.	FES	-	-	-
A. hassleriana Chodat	FES	-	-	-
A. macularis Pax & K.Hoffm.*	FOD	-	-	-
A. martiana Müll.Arg.	FES	-	-	-
A. multicaulis Müll.Arg.	FES	-	-	-
A. nitschkeana Pax & K.Hoffm.	FES	-	-	-
A. oxyodonta (Müll.Arg.) Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
A. peckoltii Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
A. pohliana Müll.Arg.	FCA	-	-	-
A. poiretii Spreng.	FCA	-	-	-
A. prunifolia Nees & Mart.*	FES	-	-	-
A. pruriens Nees & Mart.*	FOD	-	-	-
A. uleana L.B.Sm. & Downs*	FOD	-	-	-
A. villosa Jacq.	FOD	-	-	-
A. weddelliana Baill.	FOD	-	-	-
Actinostemon – 14/40				
A. concolor (Spreng.) Müll.Arg.	FES, FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. echinatus</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>A. glaziovii</i> Pax & K.Hoffm.*	FOD	-	-	-
<i>A. klotzschii</i> (Ditr.) Pax	FOD	-	-	-
<i>A. lagoensis</i> (Müll.Arg.) Pax	FES	-	-	-
<i>A. lasiocarpus</i> (Müll.Arg.) Baill.*	FOD	-	-	-
<i>A. leptopus</i> (Müll.Arg.) Pax*	FOD	-	-	-
<i>A. macrocarpus</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>A. mandiocanus</i> (Müll.Arg.) Pax*	FOD	-	-	-
<i>A. multiflorus</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>A. oligandrus</i> (Müll.Arg.) Baill.	FES	-	-	-
<i>A. sparsifolius</i> (Müll.Arg.) Pax	FOD	-	-	-
<i>A. unciformis</i> Jabl.*	FOD	-	-	-
<i>A. verticillatus</i> (Klotzsch) Baill.	FOD	-	-	-
Adelia – 1/15				
<i>A. membranifolia</i> (Müll.Arg.) Chodat & Hassl.	FOD	-	-	-
Adenophaedra – 1/00				
<i>A. megalophylla</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.	FOD	-	-	-
Alchornea – 3/70				
<i>A. glandulosa</i> Pöpp.	FES, FOD	-	-	-
<i>A. sidifolia</i> Müll.Arg.	FES, FOD	-	-	-
<i>A. triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	FES, FOD	-	-	-
Algernonia – 11/12				
<i>A. bahiensis</i> (Emmerich) G.L.Webster*	FOD	-	-	-
<i>A. brasiliensis</i> Baill.*	FOD	-	-	-
<i>A. dimitrii</i> (Emmerich) G.L.Webster*	FOD	-	-	-
<i>A. gibbosa</i> (Pax & K.Hoffm.) Emmerich*	FOD	-	-	-
<i>A. glazioui</i> Emmerich*	FOD	-	-	-
<i>A. kuhlmannii</i> (Emmerich) G.L.Webster*	FOD	-	-	-
<i>A. leandrii</i> (Baill.) G.L.Webster*	FOD	-	-	-
<i>A. obovata</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>A. pardina</i> Croizat*	FOD	-	-	-
<i>A. paulae</i> Emmerich*	FOD	-	-	-
<i>A. riedelii</i> (Müll.Arg.) G.L.Webster*	FOD	-	-	-
Aparisthium – 1/1				
<i>A. cordatum</i> (A.Juss.) Baill.	FOD	-	-	-
Astraea – 2/5				
<i>A. lobata</i> (L.) Klotzsch	FCA	-	-	-
<i>A. praetervisa</i> (Müll.Arg.) P.E.Berry*	FOD	-	-	-
Bernardia – 16/20				
<i>B. alaricii</i> Allem & Irgang	FCA	-	-	-
<i>B. axillaris</i> (Spreng.) Müll.Arg.*	FES	-	-	-
<i>B. brevipes</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>B. celastrinea</i> (Baill.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>B. confertifolia</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>B. crassifolia</i> (Baill.) Müll.Arg.	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>B. flexuosa</i> Pax & K.Hoffm.	FCA	-	-	-
<i>B. gambosa</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. geniculata</i> Allem & J.L.Waecht.*	FCA	-	-	-
<i>B. hagelundii</i> Allem & Irgang	FCA	-	-	-
<i>B. micrantha</i> Pax & K.Hoffm.	FCA	-	-	-
<i>B. multicaulis</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>B. odonellii</i> Villa	FES	-	-	-
<i>B. pulchella</i> (Baill.) Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>B. scabra</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>B. tamanduana</i> (Baill.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>Bia</i> – 1/5				
<i>B. alienata</i> Didr.	FES	-	-	-
<i>Brasiliocroton</i> * – 1/1				
<i>B. mamoinha</i> P.E.Berry & Cordeiro*	FOD	-	-	-
<i>Caperonia</i> – 9/40				
<i>C. aculeolata</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. buettneriacea</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. castaneifolia</i> (L.) A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
<i>C. cordata</i> A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
<i>C. heteropetala</i> Didr.	FCA	-	-	-
<i>C. linearifolia</i> A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
<i>C. palustris</i> (L.) A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
<i>C. stenophylla</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. velloziana</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>Caryodendron</i> – 1/3				
<i>C. janeirense</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>Chiropetalum</i> – 8/17				
<i>C. anisotrichum</i> (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.	FCA	-	-	-
<i>C. foliosum</i> (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.*	FCA	-	-	-
<i>C. gymnadenium</i> (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.	FES	-	-	-
<i>C. molle</i> (Baill.) Pax & K.Hoffm.*	FCA	-	-	-
<i>C. phalacradenium</i> (J.W.Ingram) L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
<i>C. pilosistylum</i> (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts	?	-	-	-
<i>C. ramboi</i> (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts	?	-	-	-
<i>C. tricoccum</i> (Vell.) Chodat & Hassl.	FCA	-	-	-
<i>Cleidion</i> – 1/25				
<i>C. tricoccum</i> (Casar.) Baill.	FOD	-	-	-
<i>Cnidoscolus</i> – 7/75				
<i>C. aculeatissimus</i> (Mart.) Fern.Casas	FOD	-	-	-
<i>C. albomaculatus</i> (Pax) I.M.Johnst.	FES	-	-	-
<i>C. loasoides</i> (Pax) I.M.Johnst.	FES	-	-	-
<i>C. loefgrenii</i> (Pax & K.Hoffm.) Pax & K.Hoffm.	FOD	-	-	-
<i>C. oligandrus</i> (Müll.Arg.) Pax	FOD	-	-	-
<i>C. urens</i> (L.) Arthur	FES	-	-	-
<i>C. urentissimus</i> Fern.Casas*	FCA	-	-	-
<i>Colliguaja</i> – 1/3				
<i>C. brasiliensis</i> Klotzsch ex Baill.	FOD, FES	-	-	-
<i>Croton</i> – 172/750				
<i>C. aberrans</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. ackermannianus</i> (Müll.Arg.) G.L.Webster	FCA	-	-	-
<i>C. adamantinus</i> Müll.Arg.	FCA, RST	-	-	-
<i>C. adenodontus</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.	FCA, RST	-	-	-
<i>C. agrestis</i> (Pax & K.Hoffm.) Radcl.-Sm. & Govaerts	FCA	-	-	-
<i>C. agrophilus</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. alagoensis</i> Müll.Arg.	RST	-	-	-
<i>C. albellus</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. alchorneicarpus</i> Croizat*	FOD	-	-	-
<i>C. alegrensis</i> Glaz.	FCA	-	-	-
<i>C. allemii</i> G.L.Webster*	FES	-	-	-
<i>C. antisiphiliticus</i> Mart.	FCA	-	-	-
<i>C. apostolon</i> Radcl.-Sm. & Govaerts	FCA	-	-	-
<i>C. argenteus</i> L.	FCA	-	-	-
<i>C. arlineae</i> D.Medeiros <i>et al.</i> *	FCA	-	-	-
<i>C. astrogynus</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. betaceus</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. bidentatus</i> Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
<i>C. bresolinii</i> L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
<i>C. buxifolius</i> (Baill.) Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. caldensis</i> Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
<i>C. calonervosus</i> G.L.Webster	FCA	-	-	-
<i>C. calycireduplicatus</i> Allem*	FCA	-	-	-
<i>C. campanulatus</i> Caruzo & Cordeiro*	FOD	-	-	-
<i>C. campestris</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. caperoniifolius</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. catarinensis</i> L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
<i>C. ceanothifolius</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. celtidifolius</i> Baill.*	FES, FOD	-	-	-
<i>C. chaetophorus</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. chloroleucus</i> Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
<i>C. cinctus</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. claussenianus</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. comatus</i> Vell.	FCA	-	-	-
<i>C. comosus</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. compressus</i> Lam.*	RST	-	-	-
<i>C. confinis</i> L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
<i>C. cordeiroae</i> G.L.Webster	FCA	-	-	-
<i>C. corrientesianus</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. crustulifer</i> Croizat	FCA	-	-	-
<i>C. desertorum</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. dichrous</i> Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
<i>C. didrichsenii</i> G.L.Webster	FCA	-	-	-
<i>C. doratophylloides</i> (Croizat) G.L.Webster	FCA	-	-	-
<i>C. doratophyllus</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. dracunculoides</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. dusenii</i> Croizat*	FCA	-	-	-
<i>C. eichleri</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. ericoides</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. erythroxyloides</i> Baill.*	FCA	-	-	-
<i>C. exuberans</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>C. floribundus</i> Spreng.	FES	-	-	-
<i>C. fluminensis</i> K.Schum.	FCA	-	-	-
<i>C. fuscescens</i> Spreng.	FOD	-	-	-
<i>C. glandulosus</i> L.	FCA	-	-	-
<i>C. glaziovii</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. glechomifolius</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. gnaphalii</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. gnaphaloides</i> Schrad.	FCA	-	-	-
<i>C. gnidiaceus</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. gracilipes</i> Baill.	FES	-	-	-
<i>C. hecatonandrus</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>C. helichrysum</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. heliotropiifolius</i> Kunth	RST	-	-	-
<i>C. hemiargyreus</i> Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
<i>C. heterodoxus</i> Baill.*	FCA	-	-	-
<i>C. hirtus</i> L'Hér.	FCA	-	-	-
<i>C. ichthygaster</i> L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
<i>C. indivisus</i> Vell.	FOD	-	-	-
<i>C. isabellei</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. itacolumi</i> Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
<i>C. janeirensis</i> Radcl.-Sm. & Govaerts	FOD	-	-	-
<i>C. josephinus</i> Müll.Arg.*	FCA	-	-	-
<i>C. julopsidium</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. klaenzei</i> Müll.Arg.	FOD?	-	-	-
<i>C. kleinii</i> L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
<i>C. lachnocladus</i> Mart. ex Müll.Arg.	RST	-	-	-
<i>C. lachnostachyus</i> Baill.	RST	-	-	-
<i>C. lagoensis</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. lanatus</i> Lam.	FCA	-	-	-
<i>C. lapanus</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. laseguei</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. leptobotrys</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>C. leptophyllus</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. linearifolius</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. lundianus</i> (Didr.) Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. macrobotrys</i> Baill.*	FOD	-	-	-
<i>C. macrolepis</i> Radcl.-Sm. & Govaerts	FOD	-	-	-
<i>C. medusae</i> Müll.Arg.	?	-	-	-
<i>C. melanoleucus</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. microcalyx</i> (Müll.Arg.) G.L.Webster	FCA	-	-	-
<i>C. microgyne</i> Croizat	FOD	-	-	-
<i>C. microstachys</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. migrans</i> Casar.	FCA	-	-	-
<i>C. missionum</i> Croizat	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. montevidensis</i> Spreng.	FCA	-	-	-
<i>C. muellerianus</i> L.R.Lima*	FCA	-	-	-
<i>C. myrianthus</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. neuwiedii</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. nitrariifolius</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. novifriburgi</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>C. odontadenius</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. oleoides</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. oliganthus</i> Müll.Arg.	?	-	-	-
<i>C. organensis</i> Baill.*	FOD	-	-	-
<i>C. oxyphyllus</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>C. pallidulus</i> Baill.*	FCA	-	-	-
<i>C. pannosus</i> Thunb.	FCA?	-	-	-
<i>C. parvifolius</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>C. patrum</i> L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
<i>C. paulinianus</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. paulinus</i> (Didr.) Müll.Arg.	RST	-	-	-
<i>C. pedunculatus</i> Vell.	?	-	-	-
<i>C. peraffinis</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. piptocalyx</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>C. plagiograptus</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>C. polyandrus</i> Spreng.	RST	-	-	-
<i>C. polygonoides</i> L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
<i>C. priscus</i> Croizat*	FOD	-	-	-
<i>C. pseudoadipatus</i> Croizat	FCA	-	-	-
<i>C. pulegioides</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>C. punctulatus</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>C. pycnocephalus</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. pycnophyllus</i> Salzm. ex Schltdl.	RST?	-	-	-
<i>C. quintasii</i> Allem	FCA	-	-	-
<i>C. ramboi</i> Allem*	FCA	-	-	-
<i>C. refractus</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. reitzii</i> L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
<i>C. robustior</i> (L.B.Sm. & Downs) Radcl.-Sm. & Govaerts*	FCA	-	-	-
<i>C. rottlerifolius</i> Baill.	FES	-	-	-
<i>C. salutaris</i> Casar.*	FOD	-	-	-
<i>C. salzmännii</i> (Baill.) G.L.Webster	FOD	-	-	-
<i>C. sclerocalyx</i> (Didr.) Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. sellowii</i> Baill.	FOD, RST	-	-	-
<i>C. seminudus</i> Müll.Arg.	RST	-	-	-
<i>C. serpyllifolius</i> Baill.*	RST	-	-	-
<i>C. serratifolius</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. serratoideus</i> Radcl.-Sm. & Govaerts	FCA	-	-	-
<i>C. serratus</i> (Klotzsch) Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. siderophilus</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. sincorensis</i> Mart. ex Müll.Arg.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. sphaerogynus</i> Baill.	FES, RST	-	-	-
<i>C. spissirameus</i> Radcl.-Sm. & Govaerts	FCA	-	-	-
<i>C. splendidus</i> Mart. ex Colla	FCA	-	-	-
<i>C. stenotrichus</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. stipularis</i> (Müll.Arg.) G.L.Webster	FCA	-	-	-
<i>C. subferrugineus</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. subpannosus</i> Müll.Arg. ex Griseb.	FCA	-	-	-
<i>C. tenellus</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. terminalis</i> Vell.	?	-	-	-
<i>C. tetradenius</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. teucridium</i> Baill.	?	-	-	-
<i>C. thymelinus</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. timandroides</i> (Didr.) Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. trichophilus</i> (Pax & K.Hoffm.) Radcl.-Sm. & Govaerts	?	-	-	-
<i>C. tricolor</i> Klotzsch ex Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. triglandulatus</i> Vell.	FOD	-	-	-
<i>C. trinitatis</i> Millsp.	FCA	-	-	-
<i>C. triqueter</i> Lam.	FCA	-	-	-
<i>C. urticifolius</i> Lam.	FCA	-	-	-
<i>C. urucurana</i> Baill.	FES, FOD	-	-	-
<i>C. uruguayensis</i> Baill.	FCA	-	-	-
<i>C. velame</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. verbascoides</i> G.L.Webster	FCA	-	-	-
<i>C. verbenifolius</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. verrucosus</i> Radcl.-Sm. & Govaerts	FES, FOD	-	-	-
<i>C. vestitus</i> Spreng.	FCA	-	-	-
<i>C. viridulus</i> (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts	FCA	-	-	-
<i>C. vulnerarius</i> Baill.*	FCA, FOD	-	-	-
<i>C. warmingii</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>C. widgrenianus</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>Dalechampia</i> – 39/115				
<i>D. affinis</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>D. alata</i> Klotzsch ex Baill.*	FOD, FES	-	-	-
<i>D. allemii</i> G.L.Webster*	FOD	-	-	-
<i>D. anomala</i> Pax & K.Hoffm.*	FES	-	-	-
<i>D. arciana</i> Baill.*	FOD	-	-	-
<i>D. armbrusteri</i> G.L.Webster	FOD	-	-	-
<i>D. brasiliensis</i> Lam.	RST, FOD, FES	-	-	-
<i>D. brevipes</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>D. clauseniana</i> Baill.*	FOD, FES	-	-	-
<i>D. convolvuloides</i> Lam.	RST, FOD	-	-	-
<i>D. coriacea</i> Klotzsch ex Müll.Arg.	FES, FOD	-	-	-
<i>D. fernandesii</i> G.L.Webster*	FOD	-	-	-
<i>D. ficifolia</i> Lam.	FOD	-	-	-
<i>D. glechomifolia</i> Baill.*	FCA	-	-	-
<i>D. grandilla</i> Baill.*	FOD	-	-	-
<i>D. hassleriana</i> Chodat*	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>D. ilheotica</i> Wawra*	FOD, RST	-	-	-
<i>D. leandrii</i> Baill.*	FOD	-	-	-
<i>D. luetzelburgii</i> Pax & K.Hoffm.*	FOD	-	-	-
<i>D. martiana</i> Klotzsch ex Pax & K.Hoffm.	RST	-	-	-
<i>D. meridionalis</i> Müll.Arg.*	FES, FOD	-	-	-
<i>D. micromeria</i> Baill.	FCA, RST	-	-	-
<i>D. olfersiana</i> Müll.Arg.*	FES	-	-	-
<i>D. peckoltiana</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>D. pentaphylla</i> Lam.	FES, FED, FOD	-	-	-
<i>D. pernambucensis</i> Baill.*	FOD, FES	-	-	-
<i>D. purpurata</i> Cordeiro*	FED	-	VU	ANEXO II
<i>D. regnellii</i> Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
<i>D. reitzkleinii</i> L.B.Sm. & Downs*	FOD	-	-	-
<i>D. riparia</i> L.B.Sm. & Downs	FOM, FOD	-	CR	ANEXO I
<i>D. scandens</i> L.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>D. stenosepala</i> Müll.Arg.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>D. stipulacea</i> Müll.Arg.*	FOM	-	-	-
<i>D. subintegra</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
<i>D. sylvestris</i> S.Moore	FES	-	-	-
<i>D. tiliifolia</i> Lam.*	FOD	-	-	-
<i>D. triphylla</i> Lam.	FES, FOD	-	-	-
<i>D. variifolia</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>D. viridissima</i> G.L.Webster	FOD	-	-	-
<i>Ditaxis</i> – 1/50				
<i>D. malmeana</i> Pax & K.Hoffm.	?	-	-	-
<i>Euphorbia</i> – 31/2000				
<i>E. alsinifolia</i> Boiss.	FOD, FCA	-	-	-
<i>E. attastoma</i> Rizzini	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>E. caecorum</i> Mart. ex Boiss.	FCA	-	-	-
<i>E. caespitosa</i> Lam.	RST	-	-	-
<i>E. chamaeclada</i> Ule	FCA	-	-	-
<i>E. comosa</i> Vell.	FCA, AFL, FED, FES, RST, FOD	-	-	-
<i>E. elodes</i> Boiss.	FCA	-	-	-
<i>E. estevesii</i> N.Zimm. & P.J.Braun*		-	-	-
<i>E. foliolosa</i> Boiss.	FOD	-	-	-
<i>E. gymnoclada</i> Boiss.	RST, FCA	-	VU	ANEXO II
<i>E. heterophylla</i> L.	FCA, FED, RST, FES, FOD	-	-	-
<i>E. hirta</i> L.	RUD	-	-	-
<i>E. hirtella</i> Boiss.	FCA	-	-	-
<i>E. holochlorina</i> Rizzini		-	-	-
<i>E. hyssopifolia</i> L.	RUD	-	-	-
<i>E. insulana</i> Vell.	RST, FOD	-	-	-
<i>E. machrisiae</i> Steyerl.	?	-	-	-
<i>E. mesembryanthemifolia</i> Jacq.*		-	-	-
<i>E. papillosa</i> A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
<i>E. paranensis</i> Dusén*	FCA, FOM	-	-	-
<i>E. peperomioides</i> Boiss.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>E. portulacoides</i> L.	AFL	-	-	-
<i>E. prostrata</i> Aiton	RUD	-	-	-
<i>E. rhabdodes</i> Boiss.*	RST	-	-	-
<i>E. sabulicola</i> Boiss.	AFL	-	-	-
<i>E. sciadophila</i> Boiss.	FES, FCA, RUD	-	-	-
<i>E. serpens</i> Kunth	RUD	-	-	-
<i>E. spathulata</i> Lam.	RUD	-	-	-
<i>E. stenophylla</i> (Klotzsch & Garcke) Boiss.	RUD	-	-	-
<i>E. thymifolia</i> L.	FCA	-	-	-
Glycydendron – 1/1				
<i>G. espiritosantense</i> Kuhlman	FOD	-	-	-
Gymnanthes – 6/15				
<i>G. discolor</i> (Spreng.) Müll.Arg.	FCA, FOD	-	-	-
<i>G. gaudichaudii</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>G. glabrata</i> (Mart.) Govaerts	FOD	-	-	-
<i>G. hypoleuca</i> Benth.	FES	-	-	-
<i>G. nervosa</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>G. widgrenii</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
Hura – 1/2				
<i>H. crepitans</i> L.	FOD, FES	-	-	-
Jatropha – 11/175				
<i>J. bornmuelleri</i> Pax	FCA	-	-	-
<i>J. breviloba</i> (Morong) Pax & K.Hoffm.	FES	-	-	-
<i>J. curcas</i> L.		-	-	-
<i>J. elliptica</i> (Pohl) Müll.Arg.	FCA, FES	-	-	-
<i>J. gossypifolia</i> L.*	RUD	-	-	-
<i>J. intermedia</i> (Chodat & Hassler) Paxton	FCA	-	-	-
<i>J. isabellei</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>J. malmeana</i> Pax & K.Hoffm.	RST	-	-	-
<i>J. mollissima</i> (Pohl) Baill.	FED	-	-	-
<i>J. multifida</i> L.	?	-	-	-
<i>J. stigmatica</i> Pax & K.Hoffm.*	?	-	-	-
Joannesia – 1/2				
<i>J. princeps</i> Vell.*	?	-	-	-
Mabea – 6/50				
<i>M. angustifolia</i> Spruce ex Benth.	FES	-	-	-
<i>M. fistulifera</i> Mart.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. gaudichaudiana</i> Baill.	?	-	-	-
<i>M. glaziovii</i> Pax & K.Hoffm.*	FES	-	-	-
<i>M. occidentalis</i> Benth.	FED, FES, FCA	-	-	-
<i>M. piriri</i> Aubl.	FCA, FOD	-	-	-
Manihot – 22/98				
<i>M. affinis</i> Pax & K.Hoffm.*	FES	-	-	-
<i>M. anomala</i> Pohl	FES	-	-	-
<i>M. caerulea</i> Pohl	FED	-	-	-
<i>M. corymbiflora</i> Pax & K.Hoffm.*	FOD	-	-	-
<i>M. esculenta</i> Crantz	RUD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. glaziovii</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>M. gracilis</i> Pohl	FES	-	-	-
<i>M. grahamii</i> Hook.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. handroana</i> Cruz*	FOD	-	-	-
<i>M. hunzikeriana</i> Mart.Crov.*	FCA	-	-	-
<i>M. inflata</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>M. janiphoides</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>M. jolyana</i> Cruz*	FOD	-	-	-
<i>M. leptopoda</i> (Müll.Arg.) D.J.Rogers & Appan*	AFL	-	-	-
<i>M. neusana</i> Nassar*	FCA	-	-	-
<i>M. pilosa</i> Pohl	FOD, FES	-	-	-
<i>M. pohlii</i> Wawra*	FOD	-	-	-
<i>M. procumbens</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>M. tenella</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>M. tripartita</i> Müll.Arg.	FOD, FES, AFL	-	-	-
<i>M. violacea</i> Pohl	FES	-	-	-
<i>M. warmingii</i> Müll.Arg.*	FES	-	-	-
<i>Maprounea</i> – 2/4				
<i>M. brasiliensis</i> A.St.-Hil.	FES	-	-	-
<i>M. guianensis</i> Aubl.	FES	-	-	-
<i>Microstachys</i> – 4/15				
<i>M. corniculata</i> (Vahl) Griseb.	FES, RST	-	-	-
<i>M. daphnoides</i> (Mart.) Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>M. heterodoxa</i> (Müll.Arg.) Esser	FCA, FOD	-	-	-
<i>M. hispida</i> (Mart.) Govaerts	RUD	-	-	-
<i>Omphalea</i> – 1/20				
<i>O. brasiliensis</i> Müll.Arg.*	FES	-	-	-
<i>Ophthalmoblapton</i> * – 4/4				
<i>O. crassipes</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>O. macrophyllum</i> Allemão*	FOD	-	-	-
<i>O. parviflorum</i> Emmerich*	FOD	-	-	-
<i>O. pedunculare</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>Pachystroma</i> * – 1/1				
<i>P. longifolium</i> (Nees) I.M.Johnst.*	FOD, FES	-	-	-
<i>Pausandra</i> – 4/12				
<i>P. macropetala</i> Ducke	FOD	-	-	-
<i>P. macrostachya</i> Ducke	FOD	-	-	-
<i>P. megalophylla</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>P. morisiana</i> (Casar.) Radlk.	FOD, FES	-	-	-
<i>Philyra</i> – 1/1				
<i>P. brasiliensis</i> Klotzsch	FES	-	-	-
<i>Plukenetia</i> – 1/16				
<i>P. serrata</i> (Vell.) L.J.Gillespie*	FOD, FES	-	-	-
<i>Romanoa</i> – 1/1				
<i>R. tamnoides</i> (A.Juss.) Radcl.-Sm.	FOD, FES, AFL, RST	-	-	-
<i>Sapium</i> – 4/100				
<i>S. glandulosum</i> (L.) Morong	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. haematospermum</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>S. marginatum</i> Müll.Arg.	AFL	-	-	-
<i>S. sellowianum</i> (Müll.Arg.) Klotzsch ex Baill.	FES	-	-	-
<i>Sebastiania</i> – 32/100				
<i>S. anisodonta</i> Müll.Arg.	?	-	-	-
<i>S. argutidens</i> Pax & K.Hoffm.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. bahiensis</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>S. brasiliensis</i> Spreng.	FES	-	-	-
<i>S. brevifolia</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.	FED, AFL	-	-	-
<i>S. chaetodonta</i> Müll.Arg.*	FES	-	-	-
<i>S. commersoniana</i> (Baill.) L.B.Sm. & Downs	FES, FOD, FOM	-	-	-
<i>S. daphniphylla</i> (Baill.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>S. edwalliana</i> Pax & K.Hoffm.	FES	-	-	-
<i>S. eglandulata</i> (Vell.) Pax*	FOD	-	-	-
<i>S. glabrescens</i> Pax & K.Hoffm.*	FOD	-	-	-
<i>S. glaucophylla</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>S. gracilis</i> Pax & K.Hoffm.*	FOD	-	-	-
<i>S. heteroica</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>S. jacobinensis</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.	FED	-	-	-
<i>S. laureola</i> (Baill.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>S. mosenii</i> Pax & K.Hoffm.*	FES	-	-	-
<i>S. pteroclada</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.*	RST, AFL	-	-	-
<i>S. pubescens</i> Pax & K.Hoffm.	?	-	-	-
<i>S. ramulosa</i> Pax & K.Hoffm.*	FES	-	-	-
<i>S. riedelii</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>S. rigida</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.*	FES	-	-	-
<i>S. riparia</i> Schrad.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. rotundifolia</i> Pax & K.Hoffm.	?	-	-	-
<i>S. rupicola</i> Pax & K.Hoffm.*	FCA	-	-	-
<i>S. schottiana</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. serrata</i> (Baill. ex Müll.Arg.) Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. stipulacea</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.	?	-	-	-
<i>S. subsessilis</i> (Müll.Arg.) Pax*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. trichogyne</i> Pax & K.Hoffm.*	FES	-	-	-
<i>S. vestita</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>S. ypanemensis</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>Senefeldera</i> – 1/10				
<i>S. verticillata</i> (Vell.) Croizat*	FOD, FES	-	-	-
<i>Stillingia</i> – 6/30				
<i>S. dichotoma</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>S. dusenii</i> Pax & K.Hoffm.*	FCA	-	-	-
<i>S. oppositifolia</i> Baill. ex Müll.Arg.	FOM, FCA	-	-	-
<i>S. saxatilis</i> Müll.Arg.	AFL	-	-	-
<i>S. scutellifera</i> D.J.Rogers*	FCA	-	-	-
<i>S. uleana</i> Pax & K.Hoffm.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Tetrorchidium – 3/20				
T. dusenii Pax & K.Hoffm.	FOD, FES	-	-	-
T. parvulum Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
T. rubrivenium Poepp.	FOD	-	-	-
Tragia – 13/100				
T. alienata (Didr.) Múlgura & M.M.Gut.	FES	-	-	-
T. bahiensis Müll.Arg.	FOD, FES,	-	-	-
T. cearensis Pax & K.Hoffm.*	FES	-	-	-
T. cuneata Müll.Arg.*	FES, FOD	-	-	-
T. giardelliae M.M.Gut & Múlgura*	FCA, FES	-	-	-
T. leucandra Pax & K.Hoffm.	FES	-	-	-
T. melochioides Griseb.	FES	-	-	-
T. paxii Lourteig & O'Donnell	FOD, FES	-	-	-
T. peltata Vell.*	FOD	-	-	-
T. polyandra Vell.*	FES	-	-	-
T. tristis Müll.Arg.	FOD	-	-	-
T. uberabana Müll.Arg.	FES, FCA	-	-	-
T. volubilis L.	FES, RST	-	-	-

Fabaceae (Leguminosae)

Haroldo C. de Lima (coordenador), Ana Maria G. A. Tozzi,
 Ana Paula Fortuna-Perez, Andreia S. Flores, Angela Maria Studart F. Vaz,
 Bente B. Klitgaard, Domingos B. O. S. Cardoso, Fabiana R. Filardi,
 Flavia Cristina P. Garcia, Gwilym P. Lewis, João R. V. Iganci,
 José Eduardo Meireles, José F. M. Valls, Laura C.P. Lima,
 Luciano Paganucci de Queiroz, Marcos José da Silva, Marli P. Morim,
 Michel J. F. Barros, Rubens T. Queiroz, Renée H. Fortunato, R.
 Toby Pennington, Silvia T. Miotto, Tania M. Moura, Valquíria F. Dutra,
 Vidal F. Mansano, Vinicius C. Souza & Viviane R. Scalón

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
FABACEAE – 945/ca. 19.000				
Abarema – 10/49				
A. barnebyana Iganci & M.P.Morim*	FES, RST	-	-	-
A. brachystachya (DC.) Barneby & J.W.Grimes *	FOD, RST, FCA	-	-	-
A. cochliacarpus (Gomes) Barneby & J.W.Grimes	FOD, FES, RST	VU	-	-
A. filamentosa (Benth.) Pittier*	RST	VU	-	-
A. jupunba (Willd.) Britton & Killip	FOD, RST	-	-	-
A. langsdorffii (Benth.) Barneby & J.W.Grimes	FOD, RST, FCA	-	-	-
A. limae Iganci & M.P.Morim*	FOD, FES	-	-	-
A. obovata (Benth.) Barneby & J.W.Grimes	FOD, FCA	VU	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. turbinata</i> (Benth.) Barneby & J.W.Grimes *	RST	-	-	-
<i>A. villosa</i> Iganci & M.P.Morim*	FOD, FES	-	-	-
<i>Acosmium</i> – 2/3				
<i>A. diffusissimum</i> (Mohlenbr.) Yakovlev	FES	-	-	-
<i>A. lentiscifolium</i> (Schott) Spreng.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Adesmia</i> – 13/240				
<i>A. araujoi</i> Burkart	FCA	-	-	-
<i>A. arillata</i> Miotto*	FCA	-	-	-
<i>A. ciliata</i> Vogel*	FCA	-	-	-
<i>A. incana</i> Vogel	FCA	-	-	-
<i>A. latifolia</i> (Spreng.) Vogel	FCA	-	-	-
<i>A. paranensis</i> Burkart*	FCA	-	-	-
<i>A. psoraleoides</i> Vogel*	FCA	-	-	-
<i>A. punctata</i> (Poir.) DC.	FCA	-	-	-
<i>A. reitziana</i> Burkart*	FCA	-	-	-
<i>A. rocinhensis</i> Burkart*	FCA	-	-	-
<i>A. sulina</i> Miotto*	FCA	-	-	-
<i>A. tristis</i> Vogel*	FCA	-	-	-
<i>A. vallsii</i> Miotto*	FCA	-	-	-
<i>Aeschynomene</i> – 22/ca. 180				
<i>A. americana</i> L.	FCA, RST	-	-	-
<i>A. bradei</i> Rudd*	FCA	-	-	-
<i>A. brasiliensis</i> (Poir.) DC.	FCA, RST	-	-	-
<i>A. ciliata</i> Vogel	RST	-	-	-
<i>A. denticulata</i> Rudd	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>A. echinus</i> Vogel	FCA	-	-	-
<i>A. elegans</i> Schltld. & Cham.	FCA, RST	-	-	-
<i>A. evenia</i> C.Wright	FCA, RST	-	-	-
<i>A. falcata</i> (Poir.) DC.	FCA, RST	-	-	-
<i>A. filosa</i> Mart. ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>A. fluminensis</i> Vell.	FCA, RST	-	-	-
<i>A. fructipendula</i> A.Oliveira*	FOD, FCA, RST	-	VU	ANEXO I
<i>A. histrix</i> Poir.	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>A. mollicula</i> Kunth	FES, FCA	-	-	-
<i>A. montevidensis</i> Vogel	FCA	-	-	-
<i>A. paniculata</i> Willd. ex Vogel	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>A. parviflora</i> Micheli	FCA	-	-	-
<i>A. paucifolia</i> Vogel	FED, FCA	-	-	-
<i>A. podocarpa</i> Vogel*	FCA	-	-	-
<i>A. rudis</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>A. selloi</i> Vogel*	FCA	-	-	-
<i>A. sensitiva</i> Sw.	FCA, RST	-	-	-
<i>Albizia</i> – 6/ca. 140				
<i>A. burkartiana</i> Barneby & J.W.Grimes	FOD, FOM	VU	-	-
<i>A. edwallii</i> (Hoehne) Barneby & J.W.Grimes*	FOD	VU	-	-
<i>A. inundata</i> (Mart.) Barneby & J.W.Grimes	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. niopoides</i> (Benth.) Burkart	FOD, FES	-	-	-
<i>A. pedicellaris</i> (DC.) L.Rico	FOD, FES	-	-	-
<i>A. polycephala</i> (Benth.) Killip <i>ex</i> Record	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Amburana</i> – 1/2				
<i>A. cearensis</i> (Allemão) A.C.Sm.	FOD, FES, FED	EN	-	-
<i>Anadenanthera</i> – 2/2				
<i>A. colubrina</i> (Vell.) Brenan	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>A. peregrina</i> (L.) Speg.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Andira</i> – 10/29				
<i>A. anthelmia</i> (Vell.) Benth.*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. carvalhoi</i> R.T.Penn. & H.C.Lima*	RST	-	-	-
<i>A. fraxinifolia</i> Benth.	FOD, FES, RST, FCA	-	-	-
<i>A. humilis</i> Mart. <i>ex</i> Benth.	FED, FES, RST	-	-	-
<i>A. inermis</i> (W.Wright) DC.	FOD, FED	-	-	-
<i>A. legalis</i> (Vell.) Toledo*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>A. marauensis</i> N.Mattos*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. nitida</i> Mart. <i>ex</i> Benth.*	FOD, RST	-	-	-
<i>A. ormosioides</i> Benth.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>A. vermifuga</i> (Mart.) Benth.	FED	-	-	-
<i>Apuleia</i> – 2/2-3				
<i>A. grazielana</i> Afr.Fern.*	FES	-	-	-
<i>A. leiocarpa</i> (Vogel) J.F.Macbr.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Arachis</i> – 5/69				
<i>A. burkartii</i> Handro	FCA, RST	-	-	-
<i>A. dardani</i> Krapov. & W.C.Greg.	FCA, FED	-	-	-
<i>A. glabrata</i> Benth.	FCA, FOM	-	-	-
<i>A. macedoi</i> Krapov. & W.C.Greg.	FCA, FES	-	-	-
<i>A. pintoii</i> Krapov. & W.C.Greg.	FCA, RST, FES	-	-	-
<i>Arapatiella</i> * – 2/2				
<i>A. emarginata</i> R.S.Cowan*	FOD	-	-	-
<i>A. psilophylla</i> (Harms) R.S.Cowan*	FOD	VU	-	-
<i>Ateleia</i> – 2/20				
<i>A. glazioviana</i> Baill.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. ovata</i> Mohlenbr.	FES	-	-	-
<i>Barbieria</i> – 1/1				
<i>B. pinnata</i> (Pers.) Baill.	FES, FCA	-	-	-
<i>Barnebydendron</i> – 1/1				
<i>B. riedelii</i> (Tul.) J.H.Kirkbr.	FOD, FES	-	-	-
<i>Bauhinia</i> – 17/ca. 160				
<i>B. affinis</i> Vogel	FOD, RST	-	-	-
<i>B. albicans</i> Vogel*	FED, RST	-	-	-
<i>B. angulosa</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>B. carvalhoi</i> Vaz*	FOD	-	-	-
<i>B. forficata</i> Link	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>B. fusconervis</i> (Bong.) Steud.*	FES	-	-	-
<i>B. grazielae</i> Vaz*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. integerrima</i> Mart. ex Benth.*	FES	EN	-	-
<i>B. leiopetala</i> Benth.*	FES	-	-	-
<i>B. longifolia</i> (Bong.) Steud.	FOD FES	-	-	-
<i>B. maximilianii</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>B. microstachya</i> (Raddi) J.F.Macbr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. outimouta</i> Aubl.*	FOD	-	-	-
<i>B. ovata</i> (Bong.) Vogel	FOD, FES	-	-	-
<i>B. rufa</i> (Bong.) Steud.	FCA	-	-	-
<i>B. unguata</i> L.	FES	-	-	-
<i>B. uruguayensis</i> Benth.	FED, FOM	-	-	-
<i>Bionia</i> – 4/5				
<i>B. bella</i> Mart. ex Benth.*	FOD	-	-	-
<i>B. coccinea</i> Mart. ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>B. coriacea</i> (Nees & Mart.) Benth.	FCA	-	-	-
<i>B. tomentosa</i> (Benth.) L.P.Queiroz	FCA	-	-	-
<i>Blanchetiodendron</i> – 1/1				
<i>B. blanchetii</i> (Benth.) Barneby & J.W.Grimes	FED	-	-	-
<i>Bowdichia</i> – 1/2				
<i>B. virgilioides</i> Kunth	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>Brodriguesia</i> * – 1/1				
<i>B. santosii</i> R.S.Cowan*	FOD, RST	-	-	-
<i>Caesalpinia</i> – 3/ca. 94				
<i>C. echinata</i> Lam.*	FOD, FES, RST	EN	EN	ANEXO I
<i>C. ferrea</i> Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>C. pluviosa</i> DC.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Calliandra</i> – 6/135				
<i>C. bella</i> Benth.*	FOD, RST, FES	-	-	-
<i>C. brevipes</i> Benth.	FOD, FED	-	-	-
<i>C. foliolosa</i> Benth.	FOD, FES	-	-	-
<i>C. harrisii</i> (Lindl.) Benth.	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
<i>C. parvifolia</i> (Hook. & Arn.) Speg.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>C. tweediei</i> Benth.	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>Calopogonium</i> – 3/6				
<i>C. caeruleum</i> (Benth.) Sauv.	FES, FCA	-	-	-
<i>C. mucunoides</i> Desv.	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>C. sericeum</i> (Benth.) Chod. & Hassl.	FES, FCA	-	-	-
<i>Camptosema</i> – 4/5				
<i>C. isopetalum</i> (Lam.) Taub.*	FOD	-	-	-
<i>C. rubicundum</i> Hook. & Arn.	FOM	-	-	-
<i>C. scarlatinum</i> (Benth.) Burkart	FOM, AFL	-	-	-
<i>C. spectabile</i> (Tul.) Burkart*	FOM, FES, FED	-	-	-
<i>Canavalia</i> – 10/ca. 60				
<i>C. bonariensis</i> Lindl.	FOD	-	-	-
<i>C. brasiliensis</i> Mart. ex Benth.	FES, FOD, FED	-	-	-
<i>C. cassidea</i> G.P.Lewis*	FOD	-	-	-
<i>C. dictyota</i> Pilg.	FES, FOD, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. dolichothyrsa</i> G.P.Lewis*	?	-	-	-
<i>C. ensiformis</i> (L.) DC.	?	-	-	-
<i>C. matogrossensis</i> (Barb.Rodr.) Malme	FES	-	-	-
<i>C. parviflora</i> Benth.*	FES	-	-	-
<i>C. picta</i> Mart. ex Benth.*	FES	-	-	-
<i>C. rosea</i> (Sw.) DC.	RST	-	-	-
<i>Cassia</i> – 2/30				
<i>C. ferruginea</i> (Schrud.) DC.	FOD, FES	-	-	-
<i>C. leptophylla</i> Vogel*	FOD, FES	-	-	-
<i>Centrolobium</i> – 4/7				
<i>C. microchaete</i> (Benth.) H.C.Lima*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. robustum</i> (Vell.) Mart. ex Benth.*	FOD	-	-	-
<i>C. sclerophyllum</i> H.C.Lima*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Centrosema</i> – 15/ca. 36				
<i>C. arenarium</i> Benth.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
<i>C. brasilianum</i> (L.) Benth.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>C. coriaceum</i> Benth.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>C. dasyanthum</i> Benth.*	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>C. grandiflorum</i> Benth.*	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>C. grazieleae</i> Barbosa*	FES, FCA	-	-	-
<i>C. jaraguense</i> Hoehne*	FOD, FCA	-	-	-
<i>C. macrocarpum</i> Benth.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>C. pascuorum</i> Mart. ex Benth.	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>C. plumieri</i> (Pers.) Benth.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>C. pubescens</i> Benth.*	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>C. rotundifolium</i> Mart. ex Benth.*	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>C. sagittatum</i> (Kunth) Brandegee	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>C. vetulum</i> Mart. ex Benth.*	FES, FCA	-	-	-
<i>C. virginianum</i> (L.) Benth.	FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>Chaetocalyx</i> – 7/13				
<i>C. acutifolia</i> (Vogel) Benth.*	FOD	-	-	-
<i>C. blanchetiana</i> (Benth.) Rudd*	FES, FED	-	-	-
<i>C. brasiliensis</i> (Vogel) Benth.	FOD	-	-	-
<i>C. longiflora</i> A.Gray	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>C. nigricans</i> Burkart	FOD, FCA	-	-	-
<i>C. scandens</i> (L.) Urb.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>C. tomentosa</i> (Gardner) Rudd*	FOD	-	-	-
<i>Chamaecrista</i> – 33/ca. 330				
<i>C. amabilis</i> H.S.Irwin & Barneby*	FOD	-	-	-
<i>C. amorinii</i> Barneby*	FOD	-	-	-
<i>C. amphibola</i> (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby*	FCA	-	-	-
<i>C. arboae</i> Barneby*	FOD	-	-	-
<i>C. asplenifolia</i> (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby	FOD	-	-	-
<i>C. atroglandulosa</i> (Taubert ex Harms) H.S.Irwin & Barneby*	FCA	-	-	-
<i>C. bahiae</i> (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. blancheti</i> (Benth.) Conc., L.P.Queiroz & G.P.Lewis	RST	-	-	-
<i>C. calycioides</i> (DC. ex Collad.) Greene	FCA, FOD	-	-	-
<i>C. compitalis</i> (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby*	FES	-	-	-
<i>C. cytisoides</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	RST	-	-	-
<i>C. desvauxii</i> (Collad.) Killip	FCA, RST	-	-	-
<i>C. duartei</i> (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby*	FOD	-	-	-
<i>C. ensiformis</i> (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, RST	-	-	-
<i>C. fagonioides</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FCA, RST	-	-	-
<i>C. flexuosa</i> (L.) Greene	FCA, RST	-	-	-
<i>C. glandulosa</i> (L.) Greene	RST, FCA	-	-	-
<i>C. hispidula</i> (Vahl) H.S.Irwin & Barneby	RST	-	-	-
<i>C. linearifolia</i> (G.Don) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
<i>C. nictitans</i> (L.) Moench	FCA, RST	-	-	-
<i>C. onusta</i> H.S.Irwin & Barneby*	RST	-	-	-
<i>C. pteropoda</i> Barneby*	FOD	-	-	-
<i>C. punctata</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
<i>C. ramosa</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FCA, RST	-	-	-
<i>C. repens</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
<i>C. rotundifolia</i> (Pers.) Greene	FCA	-	-	-
<i>C. salvatoris</i> (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby* FOD, RST		-	-	-
<i>C. serpens</i> (L.) Greene	FCA, RST	-	-	-
<i>C. setosa</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
<i>C. supplex</i> (Mart. ex Benth.) Britton & Rose ex Britton & Killip		FCA	-	-
<i>C. swainsonii</i> (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	RST	-	-	-
<i>C. trachycarpa</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
<i>C. vestita</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	RST	-	-	-
<i>Chloroleucon</i> – 4/10				
<i>C. dumosum</i> (Benth.) G.P.Lewis	FED	-	-	-
<i>C. extortum</i> Barneby & J.W.Grimes	FES, FED	VU	VU	ANEXO II
<i>C. foliolosum</i> (Benth.) G.P.Lewis	FES, FED	-	-	-
<i>C. tortum</i> (Mart.) Pittier*	RST	CR	-	-
<i>Cleobulia</i> – 1/3				
<i>C. multiflora</i> Mart.*	FOD, FES	-	-	-
<i>Clitoria</i> – 4/ca. 62				
<i>C. falcata</i> Lam.	FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST-		-	-
<i>C. laurifolia</i> Poir.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>C. nana</i> Benth.	FOD, FCA	-	-	-
<i>C. selloi</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>Collaea</i> – 3/7				
<i>C. cipoensis</i> Fortunato*	FES, FCA	-	-	-
<i>C. speciosa</i> (Loisel.) DC.	FOM	-	-	-
<i>C. stenophylla</i> (Hook. & Arn.) Benth.	FOD, FCA	-	-	-
<i>Copaifera</i> – 6/ca. 35				
<i>C. cearensis</i> Ducke*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. duckei</i> Dwyer	FOD, FES	-	-	-
<i>C. langsdorffii</i> Desf.	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. lucens</i> Dwyer*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>C. majorina</i> Dwyer*	FOD	-	-	-
<i>C. trapezifolia</i> Hayne*	FOD	-	-	-
<i>Coursetia</i> – 2/ca. 35				
<i>C. rostrata</i> Benth.	FED	-	-	-
<i>C. vicioides</i> (Nees & Mart.) Benth.	FED	-	-	-
<i>Cranocarpus</i> – 3/3				
<i>C. gracilis</i> Afr.Fern. & P.Bezerra*	FED	-	-	-
<i>C. martii</i> Benth.	FOD, RST	-	-	-
<i>C. mezii</i> Taub.*	FOD, RST	-	-	-
<i>Cratylia</i> – 3/7				
<i>C. bahiensis</i> L.P.Queiroz	FES, FED	VU	-	-
<i>C. hypargyrea</i> Mart. ex Benth.*	FOM, FES	-	-	-
<i>C. intermedia</i> (Hassl.) L.P.Queiroz & R.Monteiro*	FES	-	-	-
<i>Crotalaria</i> – 21/42				
<i>C. balansae</i> Micheli	FES, FOD, FOM, FCA, RST	-	-	-
<i>C. breviflora</i> DC.	FES, FOD, FOM, FCA, RST	-	-	-
<i>C. clausenii</i> Benth.	FOD, FCA	-	-	-
<i>C. flavicoma</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>C. hilariana</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>C. holosericea</i> Nees & Mart.	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>C. incana</i> L.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>C. laeta</i> Mart. ex Benth.	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>C. martiana</i> Benth.	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>C. maypurensis</i> Benth.	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>C. micans</i> Link	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>C. miottae</i> A.S. Flores & A.M.G. Azevedo	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>C. otoptera</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>C. paulina</i> Schrank	FOD, FCA	-	-	-
<i>C. rufipila</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>C. stipularia</i> Desv.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
<i>C. tweediana</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>C. unifoliolata</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>C. velutina</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>C. vespertilio</i> Benth.	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>C. vitellina</i> Ker Gawl.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
<i>Cyclolobium</i> * – 1/1				
<i>C. brasiliense</i> Benth.*	FOD, FES	-	-	-
<i>Dahlstedtia</i> – 2/2				
<i>D. pentaphylla</i> (Taub.) Burk.	FOD	-	-	-
<i>D. pinnata</i> (Benth.) Malme*	FOD	-	-	-
<i>Dalbergia</i> – 15/ca. 250				
<i>D. brasiliensis</i> Vogel*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>D. cearensis</i> Ducke*	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>D. decipularis</i> Rizzini & A.Mattos	FOD, FES	-	-	-
<i>D. ecastaphyllum</i> (L.) Taub.	MAN, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>D. elegans</i> A.M.Carvalho*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>D. ernest-uiei</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>D. foliolosa</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>D. frutescens</i> (Vell.) Britton	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>D. glaucescens</i> (Mart. ex Benth.) Benth.	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>D. glaziovii</i> Harms*	FOD	-	-	-
<i>D. hortensis</i> Heringer, Rizzini & A.Mattos	FES, FED	-	-	-
<i>D. lateriflora</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>D. nigra</i> (Vell.) Allemão ex Benth.*	FOD, FES	VU	VU	ANEXO I
<i>D. sampaioana</i> Kuhlm. & Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>D. villosa</i> (Benth.) Benth.	FES	-	-	-
<i>Deguelia</i> – 4/ca. 17				
<i>D. costata</i> (Benth.) A.M.G.Azevedo*	FES, FED	-	-	-
<i>D. dasycalyx</i> (Harms) A.M.G.Azevedo*	FOD	-	-	-
<i>D. hatschbachii</i> A.M.G.Azevedo*	FES, FOD	-	-	-
<i>D. longeracemosa</i> (Benth.) A.M.G.Azevedo*	FES, FED	-	-	-
<i>Desmanthus</i> – 4/ca. 24				
<i>D. paspalaceus</i> (Lindm.) Burkart	FCA	-	-	-
<i>D. pernambucanus</i> (L.) Thell.	FCA	-	-	-
<i>D. tatuhyensis</i> Hoehne	FCA	-	-	-
<i>D. virgatus</i> (L.) Willd.	FCA, FED	-	-	-
<i>Desmodium</i> – 26/ca. 275				
<i>D. adscendens</i> (Sw.) DC.	RST, FSL, FCA	-	-	-
<i>D. affine</i> Schltdl.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>D. arechavaletae</i> Burkart	FCA	-	-	-
<i>D. axillare</i> (Sw.) DC.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>D. barbatum</i> (L.) Benth.	FCA	-	-	-
<i>D. craspediferum</i> A.M.G.Azevedo & M.L.A.A.Oliveira*	FCA	-	-	-
<i>D. cuneatum</i> Hook. & Arn.	FCA, FES	-	-	-
<i>D. discolor</i> Vogel	FCA, FES	-	-	-
<i>D. distortum</i> (Aubl.) J.F.Macbr.	FCA, FES	-	-	-
<i>D. glabrum</i> (Mill.) DC.	FCA	-	-	-
<i>D. guaraniticum</i> (Chodat & Hassl.) Malme	FCA, FES	-	-	-
<i>D. hassleri</i> (Schindl.) Burkart	FCA, RST	-	-	-
<i>D. incanum</i> DC.	FCA, FES, RST	-	-	-
<i>D. leiocarpum</i> (Spreng.) G.Don	FCA, FES	-	-	-
<i>D. pachyrhizum</i> Vogel	FCA	-	-	-
<i>D. platycarpum</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>D. polygaloides</i> Chodat & Hassl.	FCA	-	-	-
<i>D. procumbens</i> (Mill.) Hitch.	FCA	-	-	-
<i>D. sclerophyllum</i> Benth.	FCA, FES	-	-	-
<i>D. scorpiurus</i> (Sw.) Desv.	FCA	-	-	-
<i>D. subsericeum</i> Malme	FOM, FES	-	-	-
<i>D. tortuosum</i> (Sw.) DC.	FCA, FES	-	-	-
<i>D. triarticulatum</i> Malme	FOM, FES	-	-	-
<i>D. triflorum</i> (L.) DC.	FCA, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>D. uncinatum</i> (Jacq.) DC.	FOM, FES	-	-	-
<i>D. venosum</i> Vogel	FCA	-	-	-
<i>Dialium</i> – 1/1				
<i>D. guianense</i> (Aubl.) Sandwith	FOD, FES	-	-	-
<i>Dimorphandra</i> – 3/26				
<i>D. exaltata</i> Schott*	FOD, FES	-	-	-
<i>D. jorgei</i> M.F.Silva*	FOD, FES	-	-	-
<i>D. wilsonii</i> Rizzini*	FES	CR	CR	ANEXO I
<i>Dioclea</i> – 12/ca. 40				
<i>D. burkartii</i> R.H.Maxwell	FES, FCA	-	-	-
<i>D. coriacea</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>D. edulis</i> Kuhlman.*	FOD	-	-	-
<i>D. glabra</i> Benth.	FES	-	-	-
<i>D. grandiflora</i> Benth.	FED	-	-	-
<i>D. grandistipula</i> L.P.Queiroz*	FOD	-	-	-
<i>D. latifolia</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>D. rufescens</i> Benth.	FES	-	-	-
<i>D. schottii</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>D. violacea</i> Benth.	FES, FED	-	-	-
<i>D. virgata</i> (Rich.) Amsh.	FOD, RST	-	-	-
<i>D. wilsonii</i> Standl.	FOD, RST	-	-	-
<i>Diploptropis</i> – 2/12				
<i>D. ferruginea</i> Benth.*	FES, FED, RFA	-	-	-
<i>D. incaxis</i> Rizzini & A.Mattos	FOD, FES	-	-	-
<i>Dipteryx</i> – 1/12				
<i>D. odorata</i> Aubl.	FOD	-	-	-
<i>Diptychandra</i> – 1/1				
<i>D. aurantiaca</i> Tul.	FED	-	-	-
<i>Enterolobium</i> – 4/11				
<i>E. contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	FOD, FES	-	-	-
<i>E. glaziovii</i> (Benth.) Mesquita*	FOD, FES	-	-	-
<i>E. monjollo</i> (Vell.) Benth.*	FOD, FES	-	-	-
<i>E. timbouva</i> Mart.	FOD, FES	-	-	-
<i>Eriosema</i> – 9/ca. 150				
<i>E. campestre</i> Benth.	FOM, FCA	-	-	-
<i>E. crinitum</i> (Kunth) G.Don*	FCA, FOM, FES	-	-	-
<i>E. glabrum</i> Mart. ex Benth.	FOM, FCA	-	-	-
<i>E. heterophyllum</i> Benth.*	FES, FOM	-	-	-
<i>E. longifolium</i> Benth.	FCA, FOM, FES	-	-	-
<i>E. obovatum</i> Benth.	FCA, FOM	-	-	-
<i>E. platycarpon</i> Micheli	FCA, FES	-	-	-
<i>E. rufum</i> (Kunth) G.Don	FCA, FOD	-	-	-
<i>E. tacuarembense</i> Arechav.	FED, FCA	-	-	-
<i>Erythrina</i> – 7/ca. 120				
<i>E. cristagalli</i> L.	FOD	-	-	-
<i>E. dominguezii</i> Hassl.	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>E. falcata</i> Benth.	FOD, FES	-	-	-
<i>E. fusca</i> Lour.	FOD	-	-	-
<i>E. speciosa</i> Andr.	FOD, FES	-	-	-
<i>E. velutina</i> Willd.	FED	-	-	-
<i>E. verna</i> Vell.	FOD, FES	-	-	-
<i>Exostyles</i> – 3/4				
<i>E. glabra</i> Vogel*	FOD	-	-	-
<i>E. godoyensis</i> Soares-Silva & Mansano*	FOD	-	-	-
<i>E. venusta</i> Schott*	FOD, RST	-	-	-
<i>Galactia</i> – 13/ca. 60				
<i>G. benthamiana</i> Micheli	FCA	-	-	-
<i>G. boavista</i> (Vell.) Burkart	FES, FCA	-	-	-
<i>G. decumbens</i> (Benth.) Hoehne	FES, FCA	-	-	-
<i>G. dimorpha</i> Burkart*	FES, FCA	-	-	-
<i>G. glaucescens</i> Kunth	FES, FCA	-	-	-
<i>G. gracillima</i> Benth.	FOM, FCA	-	-	-
<i>G. marginalis</i> Benth.	FES, FCA	-	-	-
<i>G. martii</i> DC.	FES, FCA	-	-	-
<i>G. martioides</i> Burkart	FES, FCA	-	-	-
<i>G. neesii</i> DC.	FCA	-	-	-
<i>G. paraguayensis</i> Chodat & Hassl.	FCA	-	-	-
<i>G. pretiosa</i> Burkart	FCA	-	-	-
<i>G. striata</i> (Jacq.) Urb.	FOM, FES	-	-	-
<i>Geoffroea</i> – 1/2				
<i>G. spinosa</i> Jacq.	FED	-	-	-
<i>Gleditsia</i> – 1/ca. 16				
<i>G. amorphoides</i> (Griseb.) Taub.	FED	-	EN	ANEXO II
<i>Goniorrhachis</i> * – 1/1				
<i>G. marginata</i> Taub.*	FOD, FES	-	-	-
<i>Grazilodendron</i> * – 1/1				
<i>G. riodocense</i> H.C.Lima*	FOD, FES	-	VU	ANEXO I
<i>Guibourtia</i> – 16/ca. 141				
<i>G. hymenaeifolia</i> (Moric.) J.Leonard	FES	-	-	-
<i>Guilandina</i> – 1/ca. 7				
<i>G. bonduc</i> L.	MAN, RST	-	-	-
<i>Harleyodendron</i> * – 1/1				
<i>H. unifoliolatum</i> R.S.Cowan*	FOD	-	-	-
<i>Harpalyce</i> – 1/24				
<i>H. brasiliensis</i> Benth.	FES, FCA	-	-	-
<i>Holocalyx</i> – 1/1				
<i>H. balansae</i> Micheli	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Hymenaea</i> – 7/14				
<i>H. aurea</i> Y.T.Lee & Langenh.*	FOD, FES	-	-	-
<i>H. courbaril</i> L.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>H. eriogyne</i> Benth.	FED	-	-	-
<i>H. martiana</i> Hayne	FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>H. oblongifolia</i> Huber	FOD	-	-	-
<i>H. rubriflora</i> Ducke	FOD, FES	-	-	-
<i>H. stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne	FED	-	-	-
<i>Hymenolobium</i> – 3/17				
<i>H. alagoanum</i> Ducke*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>H. heringerianum</i> Rizzini*	FES	-	-	-
<i>H. janeirensis</i> Kuhlman*	FOD, FES	-	-	-
<i>Indigofera</i> – 7/ca. 700				
<i>I. asperifolia</i> Bong. ex Benth.	FOD, FCA	-	-	-
<i>I. bongardiana</i> (Kuntze) Burkart	FES, FCA	-	-	-
<i>I. campestris</i> Bong. ex Benth.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>I. lespedezioides</i> Kunth.	FES, FCA, RST	-	-	-
<i>I. microcarpa</i> Desv.	FES, FCA, RST	-	-	-
<i>I. sabulicola</i> Benth.	FE, FCA, RST	-	-	-
<i>I. suffruticosa</i> Mill.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
<i>Inga</i> – 47/300				
<i>I. aptera</i> (Vinha) T.D.Penn.*	FOD	VU	-	-
<i>I. arenicola</i> T.D.Penn.*	RST	EN	-	-
<i>I. barbata</i> Benth.*	FOD, FES	-	-	-
<i>I. blanchetiana</i> Benth.*	FOD, RST	-	-	-
<i>I. bollandii</i> Sprague & Sandwith*	FOD	VU	-	-
<i>I. bullata</i> Benth.*	FOD	VU	-	-
<i>I. cabelo</i> T.D.Penn.*	FOD, FES	EN	-	-
<i>I. capitata</i> Desv.	FOD, FES	-	-	-
<i>I. cayennensis</i> Sagot ex Benth.	FOD	-	-	-
<i>I. ciliata</i> C.Presl	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>I. conchifolia</i> L.P.Queiroz*	FOD, FES	-	-	-
<i>I. congesta</i> T.D.Penn.*	FOD	-	-	-
<i>I. cordistipula</i> Mart.*	FOD	-	-	-
<i>I. cylindrica</i> (Vell.) Mart.	FOD, FES	-	-	-
<i>I. edulis</i> Mart.	FOD, FES	-	-	-
<i>I. edwallii</i> (Harms) T.D.Penn.*	FOD	-	-	-
<i>I. enterolobioides</i> T.D.Penn.*	RST	CR	-	-
<i>I. exfoliata</i> T.D.Penn. & F.C.P.Garcia*	FOD	EN	-	-
<i>I. flagelliformis</i> (Vell.) Mart.	FOD, FES	-	-	-
<i>I. globularis</i> T.D.Penn.*	FOD	-	-	-
<i>I. grazielae</i> (Vinha) T.D.Penn.*	FOD	VU	-	-
<i>I. hispida</i> Schott ex Benth.*	FOD, FES	VU	-	-
<i>I. ingoides</i> (Rich.) Willd.	FOD, FES	-	-	-
<i>I. lanceifolia</i> Benth.*	FOD	EN	-	-
<i>I. laurina</i> Willd.	FOD, FES, RST, FCA	-	-	-
<i>I. lenticellata</i> Benth.*	FOD	VU	-	-
<i>I. lentiscifolia</i> Benth.*	FOD, FOM	VU	-	-
<i>I. leptantha</i> Benth.*	FOD, FES	VU	-	-
<i>I. marginata</i> Willd.	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>I. maritima</i> Benth.*	RST	EN	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>I. mendoncae</i> Harms*	FOD	EN	-	-
<i>I. pedunculata</i> (Vinha) T.D.Penn.*	FOD, RST	-	-	-
<i>I. platyptera</i> Benth.*	FOD	EN	-	-
<i>I. pleiogyna</i> T.D.Penn.*	FOD, RST	VU	-	-
<i>I. praegnans</i> T.D.Penn.*	FOD	VU	-	-
<i>I. schinifolia</i> Benth.*	FOD, FES	-	-	-
<i>I. sellowiana</i> Benth.*	FOD, FOM	EN	-	-
<i>I. sessilis</i> (Vell.) Mart.*	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>I. striata</i> Benth.	FOD, FES	-	-	-
<i>I. subnuda</i> Salzm. ex Benth.*	FOD, RST	-	-	-
<i>I. suborbicularis</i> T.D.Penn.*	FOD	VU	-	-
<i>I. tenuis</i> (Vell.) Mart.*	FOD	-	-	-
<i>I. thibaudiana</i> DC.	FOD, FES	-	-	-
<i>I. unica</i> Barneby & J.W.Grimes*	FOD	VU	-	-
<i>I. vera</i> Willd.	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
<i>I. virescens</i> Benth.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>I. vulpina</i> Mart. ex Benth.	FOD, FCA, FES	-	-	-
Lathyrus – 13/ca. 160				
<i>L. acutifolius</i> Vogel	FCA	-	CR	ANEXO II
<i>L. crassipes</i> Gill. ex Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
<i>L. elegans</i> Vogel*	FCA	-	-	-
<i>L. hasslerianus</i> Burkart*	FCA, FES	-	-	-
<i>L. hookeri</i> G.Don	FCA	-	-	-
<i>L. linearifolius</i> Vogel*	FCA	-	-	-
<i>L. macrostachys</i> Vogel	FCA	-	-	-
<i>L. nervosus</i> Lam.	FCA	-	-	-
<i>L. nitens</i> Vogel	FCA	-	-	-
<i>L. paraguayensis</i> Hassl.	FCA, FES	-	-	-
<i>L. paranensis</i> Burkart	FCA	-	-	-
<i>L. parodii</i> Burkart	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>L. pubescens</i> Hook. & Arn.	FCA, FES	-	-	-
Leptolobium – 6/11				
<i>L. bijugum</i> (Spreng.) Vogel*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>L. brachystachyum</i> (Benth.) Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo	FED, FCA	-	-	-
<i>L. dasycarpum</i> Vogel	FED, FCA	-	-	-
<i>L. elegans</i> Vogel*	FES, FED, RFA	-	-	-
<i>L. glaziovianum</i> (Harms) Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo*	FES, FCA	-	-	-
<i>L. tenuifolium</i> Vogel*	FOD, FES	-	-	-
Leucochloron – 2/4-5				
<i>L. incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. limae</i> Barneby & J.W.Grimes	FED	-	VU	ANEXO II
Lonchocarpus – 17/ca. 120				
<i>L. bahianus</i> A.M.G.Azevedo*	FES	-	-	-
<i>L. campestris</i> Mart. ex Benth.	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>L. cultratus</i> (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>L. filipes</i> Benth.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>L. glazioui</i> Taub.*	FOD	-	-	-
<i>L. grandiflorus</i> A.M.G.Azevedo*	FOD	-	-	-
<i>L. grazielae</i> M.J.Silva & A.M.G.Azevedo*	RST, FES	-	-	-
<i>L. latifolius</i> (Willd.) DC.	FOD	-	-	-
<i>L. longiunguiculatus</i> M.J.Silva & A.M.G.Azevedo	FOD	-	-	-
<i>L. muehlbergianus</i> Hassl.	FOD, FES	-	-	-
<i>L. nitidus</i> (Vogel) Benth.	FOD	-	-	-
<i>L. peckoltii</i> Wawra*	FOM	-	-	-
<i>L. punctatus</i> Kunth	FOD	-	-	-
<i>L. sericeus</i> (Poir) DC.	FES, MAN	-	-	-
<i>L. subglaucescens</i> Mart. ex Benth.*	FOM, FES	-	-	-
<i>L. torrensis</i> N.Mattos*	FOM	-	VU	ANEXO II
<i>L. virgilioides</i> (Vogel) Benth.*	RST, FES	-	-	-
<i>Luetzelburgia</i> – 3/11				
<i>L. guaissara</i> Toledo*	FOD	-	-	-
<i>L. purpurea</i> D.Cardoso, L.P.Queiroz & H.C.Lima	FED	-	-	-
<i>L. trialata</i> (Ducke) Ducke*	FOD	-	-	-
<i>Lupinus</i> – 25/ca. 230				
<i>L. albescens</i> Hook. & Arn.	FCA, RST	-	-	-
<i>L. arenarius</i> Gardner	FCA	-	-	-
<i>L. bracteolaris</i> Desr.	FCA	-	-	-
<i>L. comptus</i> Mart. ex Benth.	?	-	-	-
<i>L. coriaceus</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>L. crotalarioides</i> Mart. ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>L. dusenianus</i> C.P.Sm.	?	-	-	-
<i>L. gibertianus</i> C.P.Sm.	FCA	-	-	-
<i>L. guaraniticus</i> (Hassl.) C.P.Sm.	FCA	-	-	-
<i>L. laevigatus</i> Benth.*	FCA	-	-	-
<i>L. lanatus</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>L. linearis</i> Desr.	FCA	-	-	-
<i>L. magnistipulatus</i> Burkart ex Planchuelo & D.B.Dunn*	FCA	-	-	-
<i>L. multiflorus</i> Desr.	FCA, RST	-	-	-
<i>L. ovalifolius</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>L. paraguariensis</i> Chodat & Hassl.	FCA	-	-	-
<i>L. paranensis</i> C.P.Sm.*	FCA	-	-	-
<i>L. prouvensalanus</i> C.P.Sm.	FCA	-	-	-
<i>L. regnellianus</i> C.P.Sm.	FCA	-	-	-
<i>L. reitzii</i> Burkart ex M.Pinheiro & Miotto*	FCA	-	-	-
<i>L. rubriflorus</i> Planchuelo*	FCA	-	-	-
<i>L. russellianus</i> C.P.Sm.*	?	-	-	-
<i>L. sellowianus</i> Harms.*	FCA	-	-	-
<i>L. uleanus</i> C.P.Sm.*	FCA	-	-	-
<i>L. velutinus</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>Machaerium</i> – 39/ca. 130				
<i>M. aculeatum</i> Raddi*	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>M. acutifolium</i> Vogel	FES, FED, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. amplum</i> Benth.	FES, FCA	-	-	-
<i>M. brasiliense</i> Vogel*	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>M. cantarellianum</i> Hoehne*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. caratinganum</i> Kuhl. & Hoehne*	FES	-	-	-
<i>M. condensatum</i> Kuhl. & Hoehne*	FES	-	-	-
<i>M. declinatum</i> (Vell.) Stellfeld*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. dimorphandrum</i> Vogel*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. firmum</i> (Vell.) Benth.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>M. fluminense</i> Rudd*	FES	-	-	-
<i>M. fulvovenosum</i> H.C.Lima*	FES	-	-	-
<i>M. glabrum</i> Vogel*	FES	-	-	-
<i>M. gracile</i> Benth.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. hatschbachii</i> Rudd*	FOM, FES	-	-	-
<i>M. hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>M. incorruptibile</i> (Vell.) Benth.*	FES	-	-	-
<i>M. lanceolatum</i> (Vell.) J.F.Macbr.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>M. legale</i> (Vell.) Benth.*	FES	-	-	-
<i>M. leucopterum</i> Vogel*	FES, FED	-	-	-
<i>M. nigrum</i> Vogel*	FES, FED	-	-	-
<i>M. nyctitans</i> (Vell.) Benth.*	FOM, FES	-	-	-
<i>M. oblongifolium</i> Vogel*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>M. obovatum</i> Kuhl. & Hoehne	FED	-	VU	ANEXO I
<i>M. ovalifolium</i> Glaz. ex Rudd*	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>M. paraguariense</i> Hassl.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. pedicellatum</i> Vogel*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>M. punctatum</i> (Poir.) Pers.*	FES, FED	-	-	-
<i>M. reticulatum</i> (Poir.) Pers.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. ruddianum</i> C.V.Mendonça & A.M.G.Azevedo*	FES	-	-	-
<i>M. salzmännii</i> Benth.*	FES	-	-	-
<i>M. scleroxylon</i> Tul.	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>M. stipitatum</i> (DC.) Vogel*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. ternatum</i> Kuhl. & Hoehne*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. triste</i> Vogel*	FES, FED	-	-	-
<i>M. uncinatum</i> (Vell.) Benth.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>M. vestitum</i> Vogel*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. villosum</i> Vogel	FES	VU	-	-
<i>M. violaceum</i> Vogel*	FOD, FES	-	-	-
<i>Macrolobium</i> – 2/ca. 80				
<i>M. latifolium</i> Vogel*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>M. rigidum</i> R.S.Cowan*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Macroptilium</i> – 11/ca. 17				
<i>M. bracteatum</i> (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>M. erythroloma</i> (Mart. ex Benth.) Urb.	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>M. gracile</i> (Poepp. ex Benth.) Urb.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>M. heterophyllum</i> (Willd.) Maréchal & Baudet	FCA, RST	-	-	-
<i>M. lathyroides</i> (L.) Urb.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. martii</i> (Benth.) Maréchal & Baudet	FED, FCA, RST	-	-	-
<i>M. monophyllum</i> (Benth.) Maréchal & Baudet	FED, FCA	-	-	-
<i>M. panduratum</i> (Mart. ex Benth.) Maréchal & Baudet	FES, FED, RST	-	-	-
<i>M. prostratum</i> (Benth.) Urb.	FOD, FOM, FCA	-	-	-
<i>M. psammodes</i> (Lindm.) S.I.Drewes & R.A.Palacios	FCA	-	-	-
<i>M. sabaraense</i> (Hoehne) V.P.Barbosa	FES, FCA	-	-	-
<i>Martiodendron</i> – 2/4				
<i>M. fluminense</i> Lombardi*	FOD	-	-	-
<i>M. mediteraneum</i> (Mart. ex Benth.) Koeppen	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Melanoxylon</i> * – 1/1				
<i>M. brauna</i> Schott*	FOD, FES	-	VU	ANEXO I
<i>Mimosa</i> – 105/ca. 500				
<i>M. artemisiana</i> E.P.Heringer & J.E.de Paula	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>M. atlantica</i> Barneby*	FED	-	-	-
<i>M. aurivillus</i> Mart.	FCA	-	-	-
<i>M. axillaris</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>M. balduinii</i> Burkart*	FOD	-	CR	ANEXO I
<i>M. bathyrrhena</i> Barneby*	FCA	-	-	-
<i>M. bifurca</i> Benth.	FCA, RST	-	-	-
<i>M. bimucronata</i> (DC.) Kuntze	FES	-	-	-
<i>M. bocainae</i> Barneby*	FOD	-	-	-
<i>M. callidryas</i> Barneby*	FOD	-	-	-
<i>M. calodendron</i> Mart. ex Benth.*	FCA	-	-	-
<i>M. carvalhoi</i> Barneby*	RST	-	-	-
<i>M. catharinensis</i> Burkart*	RST	-	CR	ANEXO I
<i>M. ceratonia</i> L.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>M. chaetosphaera</i> Barneby*	FOD	-	-	-
<i>M. congestifolia</i> Burkart*	FOD	-	-	-
<i>M. coniflora</i> Burkart*	FOD	-	-	-
<i>M. cubatanensis</i> Hoehne	FOD	-	-	-
<i>M. daleoides</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>M. deceptrix</i> Barneby*	FOD	-	-	-
<i>M. diplotricha</i> C.Wright ex Sauvalle	FES	-	-	-
<i>M. dolens</i> Vell.	FCA	-	-	-
<i>M. dryandroides</i> Taub.*	AFL	-	-	-
<i>M. dutrae</i> Malme*	AFL	-	-	-
<i>M. elliptica</i> Benth.	RST	-	-	-
<i>M. eriocarpa</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>M. ernestii</i> Harms*	AFL	-	-	-
<i>M. extensa</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>M. fachinalensis</i> Burkart*	FOD, AFL	-	-	-
<i>M. filipetiola</i> Burkart*	FCA	-	-	-
<i>M. flagellaris</i> Benth.	?	-	-	-
<i>M. flocculosa</i> Burkart	?	-	-	-
<i>M. furfuracea</i> Benth.*	AFL, FED	-	-	-
<i>M. glabra</i> Benth.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. glazioui</i> Benth.*	AFL	-	-	-
<i>M. glycyrrhizoides</i> Barneby*	FOD	-	-	-
<i>M. gracilis</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>M. gymnas</i> Barneby*	AFL, FCA	-	-	-
<i>M. hatschbachii</i> Barneby*	AFL	-	-	-
<i>M. hilariana</i> Barneby*	FCA	-	-	-
<i>M. hirsutissima</i> Mart.	RST	-	-	-
<i>M. incana</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>M. insidiosa</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>M. invis</i> Mart. ex Collad.	?	-	-	-
<i>M. involucrata</i> Benth.*	FOD, FCA	-	-	-
<i>M. iperoensis</i> Hoehne	FCA	-	-	-
<i>M. itatiaensis</i> Dusén*	FCA	-	-	-
<i>M. kermesina</i> Otto & A.Dietr.	?	-	-	-
<i>M. kuhnisteroides</i> Barneby*	FCA	-	-	-
<i>M. lanata</i> Benth.*	FCA, FES	-	-	-
<i>M. lepidorepens</i> Burkart*	FCA	-	-	-
<i>M. lewisii</i> Barneby	RST	-	-	-
<i>M. lundiana</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>M. maracayuensis</i> Chodat & Hassl.	FCA	-	-	-
<i>M. medioxima</i> Barneby*	FOD	-	-	-
<i>M. micropteris</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>M. miranda</i> Barneby*	?	-	-	-
<i>M. monticola</i> Dusén*	FCA	-	-	-
<i>M. multiplex</i> Benth.*	AFL	-	-	-
<i>M. murex</i> Barneby*	FCA	-	-	-
<i>M. myriophylla</i> Bong. ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>M. myuros</i> Barneby*	FOD	-	-	-
<i>M. niederleinii</i> Burkart*	FOD, FCA	-	-	-
<i>M. oblonga</i> Benth.*	AFL, FCA	-	-	-
<i>M. orthacantha</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>M. ourobrancoensis</i> Burkart*	AFL, FCA	-	-	-
<i>M. pabstiana</i> Barneby*	FOD	-	EN	ANEXO I
<i>M. paraguayae</i> M.Micheli	FCA	-	-	-
<i>M. paranapiacabae</i> Barneby*	AFL	-	-	-
<i>M. pedersenii</i> Barneby	?	-	-	-
<i>M. per-dusenii</i> Burkart*	FCA	-	-	-
<i>M. pigra</i> L.	FES	-	-	-
<i>M. pilulifera</i> Benth.	FOD	-	-	-
<i>M. pithecolobioides</i> Benth.	FES	-	-	-
<i>M. polydactyla</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	FOD, RST	-	-	-
<i>M. prionopus</i> Barneby*	FOD, FCA	-	-	-
<i>M. pseudocallosa</i> Burkart*	FOD	-	-	-
<i>M. pseudolepidota</i> (Burkart) Barneby*	FCA	-	-	-
<i>M. pseudotrachycarpa</i> Barneby	AFL, FES	-	-	-
<i>M. psittacina</i> Barneby*	?	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. pudica</i> L.	RST	-	-	-
<i>M. quadrivalvis</i> L.	RST	-	-	-
<i>M. ramentacea</i> Burkart*	FCA, FOD	-	-	-
<i>M. ramosissima</i> Benth.*	FOD, FCA	-	-	-
<i>M. ramulosa</i> Benth.	AFL	-	-	-
<i>M. regnellii</i> Benth.*	AFL	-	-	-
<i>M. rupestris</i> Benth.	?	-	-	-
<i>M. sanguinolenta</i> Barneby	FCA, AFL	-	-	-
<i>M. scabrella</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>M. schleidenii</i> Herter	AFL	-	-	-
<i>M. selloi</i> Benth.*	FCA, FOD, FES	-	-	-
<i>M. sensitiva</i> L.	RST	-	-	-
<i>M. serra</i> Burkart*	FCA, FOD	-	-	-
<i>M. setosa</i> Benth.	FES	-	-	-
<i>M. somnians</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	?	-	-	-
<i>M. sparsiformis</i> Barneby*	?	-	-	-
<i>M. strobiliflora</i> Burkart*	FOD	-	-	-
<i>M. taimbensis</i> Burkart*	FOD	-	-	-
<i>M. tarda</i> Barneby	RST	-	-	-
<i>M. trichocephala</i> Benth.*	FES, FOD	-	-	-
<i>M. uliginosa</i> Chodat & Hassl.*	FCA	-	-	-
<i>M. urticaria</i> Barneby*	?	-	-	-
<i>M. velloziana</i> Mart.	?	-	-	-
<i>M. widgrenii</i> Harms*	FCA	-	-	-
<i>M. xanthocentra</i> Mart.	FCA	-	-	-
Moldenhawera – 6/9				
<i>M. blanchetiana</i> Tul.*	FOD, RST	-	-	-
<i>M. floribunda</i> Schrad.*	FOD	-	-	-
<i>M. luschnathiana</i> Yakovlev*	RST	-	-	-
<i>M. nutans</i> L.P.Queiroz, G.P.Lewis & R.Allkin*	RST	-	-	-
<i>M. papillanthera</i> L.P.Queiroz, G.P.Lewis & R.Allkin*	FOD	-	-	-
<i>M. polysperma</i> (Vell.) Stelfeld*	FOD	-	-	-
Mucuna – 4/ca. 100				
<i>M. japira</i> A.M.G.Azevedo, K.Agostini & Sazima*	RST	-	-	-
<i>M. pruriens</i> (L.) DC.	FES, RST	-	-	-
<i>M. sloanei</i> Fawc. & Rendle	FOM, RST	-	-	-
<i>M. urens</i> (L.) Medik.	FOD, FOM, RST	-	-	-
Myrocarpus – 3/5				
<i>M. fastigiatus</i> All.*	FOD	-	-	-
<i>M. frondosus</i> All.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>M. leprosus</i> Pickel*	FOD	-	-	-
Myroxylon – 1/2				
<i>M. peruiiferum</i> L.f.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
Mysanthus – 1/1				
<i>M. uleanus</i> (Harms) G.P.Lewis & A.Delgado	FOD, FES	-	-	-
Neptunia – 3/12				

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>N. oleracea</i> Lour.	FCA	-	-	-
<i>N. plena</i> (L.) Benth.	FCA	-	-	-
<i>N. pubescens</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>Ormosia</i> – 10/ca. 130				
<i>O. arborea</i> (Vell.) Harms*	RST, FOD	-	-	-
<i>O. bahiensis</i> Monach.*	FES	-	-	-
<i>O. costulata</i> (Miq.) Kleinh.	RST	-	-	-
<i>O. fastigiata</i> Tul.	FOD	-	-	-
<i>O. friburgensis</i> Taub. ex Glaz.*	FOD	-	-	-
<i>O. minor</i> Vogel*	FOD	-	-	-
<i>O. nitida</i> Vogel*	RST	-	-	-
<i>O. ruddiana</i> Yakovlev*	FES	-	-	-
<i>O. timboënsis</i> D.Cardoso, Meireles & H.C.Lima*	FOD	-	-	-
<i>O. vicosana</i> Rudd*	FES	-	-	-
<i>Oryxis</i> – 1/1				
<i>O. monticola</i> (Mart. ex Benth.) A.Delgado & G.P.Lewis	FES, FCA	-	-	-
<i>Parapiptadenia</i> – 5/6				
<i>P. blanchetii</i> (Benth.) Vaz & M.P.Lima	FES, FED	-	-	-
<i>P. ilheusana</i> G.P.Lewis*	FOD	-	-	-
<i>P. pterosperma</i> (Benth.) Brenan*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>P. rigida</i> (Benth.) Brenan	FOD, FES	-	-	-
<i>P. zehntneri</i> (Harms) M.P.Lima & H.C.Lima	FES, FED	-	-	-
<i>Parkia</i> – 3/34				
<i>P. bahiae</i> H.C.Hopkins*	FOD, RST	-	-	-
<i>P. pendula</i> (Willd.) Benth.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. platycephala</i> Benth.	FES	-	-	-
<i>Peltogyne</i> – 7/25				
<i>P. angustiflora</i> Ducke*	FOD	-	-	-
<i>P. chrysopsis</i> Barneby*	FOD	-	-	-
<i>P. confertiflora</i> (Mart. ex Hayne) Benth.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. discolor</i> Vogel*	FOD, FES	-	-	-
<i>P. mattosiana</i> Rizzini*	FOD	-	-	-
<i>P. pauciflora</i> Ducke	FES, FED	-	-	-
<i>P. recifensis</i> Ducke*	FOD	-	-	-
<i>Peltophorum</i> – 1/5-7				
<i>P. dubium</i> (Spreng.) Taub.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Periandra</i> – 3/6				
<i>P. coccinea</i> (Schrud.) Benth.	FES, FCA	-	-	-
<i>P. densiflora</i> Benth.	FES, FCA	-	-	-
<i>P. mediterranea</i> (Vell.) Taub.	FCA, RST	-	-	-
<i>Phaseolus</i> – 1/ca. 65				
<i>P. lunatus</i> L.	FCA, RST	-	-	-
<i>Piptadenia</i> – 14/ca. 24				
<i>P. adiantoides</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>P. affinis</i> Burkart*	FOD	-	-	-
<i>P. gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. irwinii</i> G.P.Lewis	FES	-	-	-
<i>P. killipii</i> J.F.Macbr.*	FOD	-	-	-
<i>P. latifolia</i> Benth.*	RST, FOD	-	-	-
<i>P. laxipinna</i> G.Barroso*	FOD	-	-	-
<i>P. micracantha</i> Benth.*	FOD, FES	-	-	-
<i>P. paniculata</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>P. polyptera</i> Benth.	?	-	-	-
<i>P. ramosissima</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>P. santosii</i> Barneby ex G.P.Lewis*	FOD	-	-	-
<i>P. trisperma</i> (Vell.) Benth.*	RST	-	-	-
<i>P. viridiflora</i> (Kunth) Benth.	FED	-	-	-
<i>Pityrocarpa</i> – 1/3				
<i>P. moniliformis</i> (Benth.) Luckow & Jobson	FED	-	-	-
<i>Plathymenia</i> – 1/1				
<i>P. reticulata</i> Benth.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Platycyamus</i> – 1/1				
<i>P. regnellii</i> Benth.	FOD, FES	-	-	-
<i>Platymiscium</i> – 3/19				
<i>P. floribundum</i> Vogel	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>P. pubescens</i> Micheli	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>P. speciosum</i> Vogel*	FOD, RST	-	-	-
<i>Platypodium</i> – 1/2				
<i>P. elegans</i> Vogel	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Poecilanthe</i> – 5/ca. 12				
<i>P. falcata</i> (Vell.) Heringer*	FES, FOD	-	-	-
<i>P. grandiflora</i> Benth.*	FES, FED	-	-	-
<i>P. itapuana</i> G.P.Lewis*	RST	-	-	-
<i>P. parviflora</i> Benth.*	FES, FOD	-	-	-
<i>P. ulei</i> (Harms) Arroyo & Rudd	FOD	-	-	-
<i>Poeppigia</i> – 1/1				
<i>P. procera</i> C.Presl	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Poiretia</i> – 4/11				
<i>P. angustifolia</i> Vogel	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>P. latifolia</i> Vogel	FOM, FCA	-	-	-
<i>P. punctata</i> (Willd.) Desv.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>P. tetrphylla</i> (Poir.) Burkart	FOD, FCA	-	-	-
<i>Pomaria</i> – 4/16				
<i>P. parviflora</i> (Micheli) B.B.Simpson & G.P.Lewis	FES	-	-	-
<i>P. pilosa</i> (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. rubicunda</i> (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis	FCA, FES	-	-	-
<i>P. stipularis</i> (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis*	FOD	-	-	-
<i>Pseudoptadenia</i> – 7/11				
<i>P. bahiana</i> G.P.Lewis & M.P.Lima	FES, FED	-	-	-
<i>P. contorta</i> (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>P. inaequalis</i> (Benth.) Rauschert*	FOD	-	-	-
<i>P. leptostachya</i> (Benth.) Rauschert*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. psilostachya</i> (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima*	FOD	-	-	-
<i>P. schumanniana</i> (Taub.) G.P.Lewis & M.P.Lima*	FOD, FES	-	-	-
<i>P. warmingii</i> (Benth.) G.P.Lewis & M.P.Lima*	FOD, FES	-	-	-
<i>Pterocarpus</i> – 1/ca. 40				
<i>P. rohrii</i> Vahl	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Pterodon</i> – 1/3				
<i>P. emarginatus</i> Vogel	FES, FED	-	-	-
<i>Pterogyne</i> – 1/1				
<i>P. nitens</i> Tul.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Rhynchosia</i> – 15/ca. 230				
<i>R. arenicola</i> Hassl.	FES, FCA	-	-	-
<i>R. corylifolia</i> Mart. ex Benth.	FES, FCA	-	-	-
<i>R. diversifolia</i> Micheli	FOM, FCA	-	-	-
<i>R. edulis</i> Griseb.	FOM, FCA	-	-	-
<i>R. hauthalii</i> Harms ex Kuntze	FOM, FCA	-	-	-
<i>R. lateritia</i> Burkart	FED, FCA	-	-	-
<i>R. leucophylla</i> Benth.	FED, FCA	-	-	-
<i>R. lineata</i> Benth.	FED, FCA	-	-	-
<i>R. melanocarpa</i> Grear	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>R. minima</i> (L.) DC.	FOD, FES	-	-	-
<i>R. naineckensis</i> Fortunato	FES	-	-	-
<i>R. phaseoloides</i> (Sw.) DC.	FES	-	-	-
<i>R. reticulata</i> (Sw.) DC.	FCA	-	-	-
<i>R. rojasii</i> Hassl.	FCA	-	-	-
<i>R. senna</i> Gill. ex Hook.	FCA	-	-	-
<i>Riedeliella</i> – 1/2				
<i>R. sessiliflora</i> Kuhl.*	FES	-	-	-
<i>Samanea</i> – 3/3				
<i>S. inopinata</i> (Harms) Barneby & W.J. Grimes	FES, FED	-	-	-
<i>S. saman</i> (Jacq.) Merr.	FES, FED	-	-	-
<i>S. tubulosa</i> (Benth.) Barneby & J.W. Grimes	FES, FED	-	-	-
<i>Schizolobium</i> – 1/1				
<i>S. parahyba</i> (Vell.) Blake	FOD, FES	-	-	-
<i>Senegalia</i> – 26/ca. 207				
<i>S. bahiensis</i> (Benth.) Seigler & Ebinger	?	-	-	-
<i>S. catharinensis</i> (Burkart) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
<i>S. giganticarpa</i> (G.P.Lewis) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
<i>S. grandistipula</i> (Benth.) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
<i>S. kallunkiae</i> (Grimes & Barneby) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
<i>S. lacerans</i> (Benth.) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
<i>S. langsdorfii</i> (Benth.) Seigler & Ebinger	FED	-	-	-
<i>S. lasiophylla</i> (Benth.) Seigler & Ebinger	?	-	-	-
<i>S. magnibracteosa</i> (Burkart) Seigler & Ebinger*	FOM	-	-	-
<i>S. martii</i> (Benth.) Seigler & Ebinger	?	-	-	-
<i>S. martiusiana</i> (Steud.) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
<i>S. miersii</i> (Benth.) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. mikanii</i> (Benth.) Seigler & Ebinger*	RST	-	-	-
<i>S. monacantha</i> (Willd.) Seigler & Ebinger	?	-	-	-
<i>S. nitidifolia</i> (Speg.) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
<i>S. olivensana</i> (G.P.Lewis) Seigler & Ebinger*	FCA, RST	-	-	-
<i>S. pedicellata</i> (Benth.) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
<i>S. piptadenioides</i> (G.P.Lewis) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
<i>S. polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	?	-	-	-
<i>S. pteridifolia</i> (Benth.) Seigler & Ebinger*	FOD, RST	-	-	-
<i>S. recurva</i> (Benth.) Seigler & Ebinger	?	-	-	-
<i>S. riparia</i> (Kunth) Britton & Rose ex Britton & Killip	?	-	-	-
<i>S. serra</i> (Benth.) Seigler & Ebinger*	FOD (?)	-	-	-
<i>S. tenuifolia</i> (L.) Britton & Rose	?	-	-	-
<i>S. tucumanensis</i> (Griseb.) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
<i>S. velutina</i> (DC.) Seigler & Ebinger*	FOD	-	-	-
<i>Senna</i> – 33/ca. 300				
<i>S. acutisepala</i> (Benth.) H.S.Irwin & Barneby*	FOD, RST	-	-	-
<i>S. affinis</i> (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	FOD	-	-	-
<i>S. alata</i> (L.) Roxb.	FOD, RST	-	-	-
<i>S. angulata</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FOD	-	-	-
<i>S. appendiculata</i> (Vogel) Wiersema*	RST	-	-	-
<i>S. araucarietorum</i> H.S.Irwin & Barneby*	FOM	-	-	-
<i>S. cana</i> (Nees & Mart.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, RST, FES, FCA	-	-	-
<i>S. cernua</i> (Balb.) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
<i>S. corymbosa</i> (Lam.) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
<i>S. formosa</i> H.S.Irwin & Barneby*	RST	-	-	-
<i>S. hirsuta</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FES	-	-	-
<i>S. itatiaiae</i> H.S.Irwin & Barneby*	FOD, FCA	-	-	-
<i>S. macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FES	-	-	-
<i>S. multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>S. neglecta</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FOD, RST, FOM, FES	-	-	-
<i>S. oblongifolia</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
<i>S. obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, RST, FES, FCA	-	-	-
<i>S. occidentalis</i> (L.) Link	FOD, FES, FOM, RST	-	-	-
<i>S. organensis</i> (Glaz. ex Harms) H.S.Irwin & Barneby*	FOM, FCA	-	-	-
<i>S. pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FOM, RST, FCA, FES	-	-	-
<i>S. pentagonia</i> (Mill.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FES	-	-	-
<i>S. phlebadenia</i> H.S.Irwin & Barneby*	FOD	-	-	-
<i>S. pilifera</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FCA, RST, FES	-	-	-
<i>S. pinheiroi</i> H.S.Irwin & Barneby	FOD, RST	-	-	-
<i>S. pneumatica</i> H.S.Irwin & Barneby*	FCA	-	-	-
<i>S. quinquangulata</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	RST	-	-	-
<i>S. silvestris</i> (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>S. spectabilis</i> (DC.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FES	-	-	-
<i>S. spinigera</i> (Rizzini) H.S.Irwin & Barneby*	FOD	-	-	-
<i>S. splendida</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>S. subtrijuga</i> H.S.Irwin & Barneby*	RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. tenuifolia</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	FCA	-	-	-
<i>S. tropica</i> (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	FOD, FES	-	-	-
<i>Sesbania</i> – 4/ca. 60				
<i>S. exasperata</i> Kunth	FOD, FES	-	-	-
<i>S. oligosperma</i> Taub.*	?	-	-	-
<i>S. punicea</i> (Cav.) Burkart	FCA	-	-	-
<i>S. virgata</i> (Cav.) Pers.	FCA	-	-	-
<i>Sophora</i> – 1/ca. 50				
<i>S. tomentosa</i> L.	RST	-	-	-
<i>Stryphnodendron</i> – 4/ca. 35				
<i>S. polyphyllum</i> Mart.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. pulcherrimum</i> (Willd.) Hochr.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. roseiflorum</i> (Ducke) Ducke	FES	-	-	-
<i>S. rotundifolium</i> Mart.	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>Stylosanthes</i> – 15/ca. 25				
<i>S. angustifolia</i> Vogel	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
<i>S. aurea</i> M.B.Ferreira & S.Costa	FCA	-	-	-
<i>S. bracteata</i> Vogel	FED, FCA	-	-	-
<i>S. capitata</i> Mohlenbr.	FED, FCA, RST	-	-	-
<i>S. gracilis</i> Kunth	FOD, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>S. grandifolia</i> M.B.Ferreira & S.Costa	FOD, FES, FED, FCA,	-	-	-
<i>S. guianensis</i> (Aubl.) Sw.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>S. hippocampoides</i> Mohlenbr.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>S. humilis</i> Kunth	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>S. leiocarpa</i> Vogel	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>S. longiseta</i> Micheli	FOD, FCA	-	-	-
<i>S. macrocephala</i> M.B.Ferreira & S.Costa	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>S. montevidensis</i> Vogel	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>S. scabra</i> Vogel	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>S. viscosa</i> Sw.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>Swartzia</i> – 24/ca. 180				
<i>S. acutifolia</i> Vogel*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. alternifoliolata</i> Mansano*	FOD	-	-	-
<i>S. apetala</i> Raddi*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>S. bahiensis</i> R.S.Cowan*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. capixabensis</i> Mansano*	FOD	-	-	-
<i>S. curranii</i> R.S.Cowan*	FOD	-	-	-
<i>S. dipetala</i> Willd. ex Vogel	FOD	-	-	-
<i>S. flaemingii</i> Raddi	FOD, FES	-	-	-
<i>S. glazioviana</i> (Taub.) Glaz.*	RST	-	EN	ANEXO I
<i>S. langsdorffii</i> Raddi*	FOD	-	-	-
<i>S. linharensis</i> Mansano*	FOD	-	-	-
<i>S. macrostachya</i> Benth.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. micrantha</i> R.S.Cowan*	FOD	-	-	-
<i>S. multijuga</i> Vogel*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. myrtifolia</i> Sm.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. oblata</i> R.S.Cowan*	FES, FOD	-	-	-
<i>S. peremarginata</i> R.S.Cowan*	FOD	-	-	-
<i>S. pickelii</i> Killip ex Druce*	FOD	-	EN	ANEXO I
<i>S. pilulifera</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>S. pinheiroana</i> R.S.Cowan*	FOD	-	-	-
<i>S. polita</i> (R.S.Cowan) Torke *	FOD	-	-	-
<i>S. riedelii</i> R.S.Cowan*	FOD	-	-	-
<i>S. simplex</i> (Sw.) Spreng.	FOD	-	-	-
<i>S. submarginata</i> (Benth.) Mansano*	FOD	-	-	-
<i>Sweetia</i> – 1/1				
<i>S. fruticosa</i> Spreng.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Tachigali</i> – 11/ca. 70				
<i>T. aurea</i> Tul.	FES, FED	-	-	-
<i>T. beaurepairei</i> (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima *	FOD	-	-	-
<i>T. densiflora</i> (Benth.) L.G.Silva & H.C.Lima *	FOD, FES	-	-	-
<i>T. denudata</i> (Vogel) Oliveira-Filho*	FOD	-	-	-
<i>T. duckei</i> (Dwyer) Oliveira-Filho*	FOD	-	-	-
<i>T. friburgensis</i> (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima *	FOD	-	-	-
<i>T. paratyensis</i> (Vell.) H.C.Lima *	FOD, FES	-	-	-
<i>T. pilgeriana</i> (Harms) Oliveira-Filho*	FOD	-	-	-
<i>T. rugosa</i> (Mart. ex Benth.) Zarucchi & Pipoly	FOD, FES	-	-	-
<i>T. urbaniana</i> (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima *	FOD	-	-	-
<i>T. vulgaris</i> L.G.Silva & H.C.Lima	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>Tephrosia</i> – 13/ca. 350				
<i>T. adunca</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>T. candida</i> DC.	FOM	-	-	-
<i>T. cinerea</i> (L.) Pers.	FCA	-	-	-
<i>T. egregia</i> Sandwith	RST	-	-	-
<i>T. guaranitica</i> Chodat & Hassl.	FCA	-	-	-
<i>T. hassleri</i> Chodat	FCA	-	-	-
<i>T. leptostachya</i> DC.	FCA	-	-	-
<i>T. noctiflora</i> Bojer ex Baker	FCA	-	-	-
<i>T. purpurea</i> (L.) Pers.	FCA	-	-	-
<i>T. rufescens</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>T. sessiliflora</i> (Poir.) Hassl.	FCA	-	-	-
<i>T. sinapou</i> (Bunchoz) A.Chev.	FOM	-	-	-
<i>T. vogelii</i> Hook.f.	FOM	-	-	-
<i>Teramnus</i> – 1/9				
<i>T. uncinatus</i> (L.) Sw.	FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST-	-	-	-
<i>Trifolium</i> – 1/ca. 250				
<i>T. riograndense</i> Burkart*	FCA	-	-	-
<i>Trischidium</i> – 4/ ?				
<i>T. alternum</i> (Benth.) H.Ireland	FOD, FES	-	-	-
<i>T. decipiens</i> (R.S.Cowan) H.Ireland*	FOD	-	-	-
<i>T. limae</i> (R.S.Cowan) H.Ireland*	RST	-	-	-
<i>T. molle</i> (Benth.) H.E.Ireland	FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Vachellia – 1/ca. 161				
V. farnesiana (L.) Wight & Arn	FED, RST	-	-	-
Vatairea – 1/8				
V. heteroptera (Allemão) Ducke ex Assis Iglesias*	FOD, FES	-	-	-
Vataireopsis –1/3				
V. araroba (Aguiar) Ducke*	FOD, FES		-	-
Vicia – 6/ca. 160				
V. graminea Sm.	FCA	-	-	-
V. linearifolia Hook. & Arn.	FCA	-	-	-
V. montevidensis Vogel	FCA	-	-	-
V. nana Vogel	FCA, FED	-	-	-
V. stenophylla Vogel	FCA, FOM	-	-	-
V. tephrosoides Vogel	FCA, FED	-	-	-
Vigna – 10/ca. 100				
V. adenantha (G.Mey.) Maréchal et al.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
V. candida (Vell.) Maréchal et al.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
V. caracalla (L.) Verdc.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
V. lasiocarpa (Mart. ex Benth.) Verdc.	FES, FCA	-	-	-
V. linearis (Kunth) Maréchal et al.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
V. longifolia (Benth.) Verdc.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
V. luteola (Jacq.) Benth.	FCA, RST	-	-	-
V. peduncularis (Kunth) Fawc. & Rendle	FOD, FES, FCA	-	-	-
V. speciosa (Kunth) Verdc.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
V. vexillata (L.) A.Rich.	FOD, RST	-	-	-
Zollernia – 6/10				
Z. cowanii Mansano*	FOD	-	-	-
Z. glabra (Spreng.) Yakovlev*	FOD, FES	-	-	-
Z. glaziovii Yakovlev*	FOD	-	-	-
Z. ilicifolia (Brongn.) Vogel	FOD, FES	-	-	-
Z. magnifica A.M.Carvalho & Barneby*	FOD	-	-	-
Z. modesta A.M.Carvalho & Barneby*	FOD	-	-	-
Zornia – 20/ca. 75				
Z. brasiliensis Vogel	AFL	-	-	-
Z. burkartii Vanni	FCA	-	-	-
Z. cearensis Huber	FCA, AFL	-	-	-
Z. confusa Vanni	AFL	-	-	-
Z. crinita (Mohlenbr.) Vanni	FCA	-	-	-
Z. cryptantha Arechav.	AFL	-	-	-
Z. curvata Mohlenbr.	FCA, AFL	-	-	-
Z. echinocarpa (Moric.) Benth.	AFL	-	-	-
Z. glabra Desv.	RST	-	-	-
Z. hebecarpa Mohlenbr.	FCA	-	-	-
Z. latifolia Sm.	FCA, AFL	-	-	-
Z. multinervosa Burkart ex N.M.Bacigal.	FCA	-	-	-
Z. myriadena Benth.	AFL	-	-	-
Z. orbiculata Mohlenbr.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>Z. pardina</i> Mohlenbr.	FCA	-	-	-
<i>Z. ramboiana</i> Mohlenbr.	FCA	-	-	-
<i>Z. reticulata</i> Sm.	FCA, AFL	-	-	-
<i>Z. trachycarpa</i> Vogel	FCA	-	-	-
<i>Z. vestita</i> Mohlenbr.	AFL	-	-	-
<i>Z. virgata</i> Moric.	FCA	-	-	-
<i>Zygia</i> – 4/ca. 50				
<i>Z. cataractae</i> (Kunth) L.Rico	FES	-	-	-
<i>Z. latifolia</i> (L.) Fawc. & Rendle	FOD	-	-	-
<i>Z. morongii</i> Barneby & J.W.Grimes	FOD	-	-	-
<i>Z. selloi</i> (Benth.) L.Rico*	FOD	-	-	-

Gelsemiaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
GELSEMIACEAE – 1/11				
Mostuea – 1/2				
M. muricata Sobral & L.Rossi	FES	-	-	-

Gentianaceae

Mariana Machado Saavedra, Claudio Nicoletti de Fraga
& Elsie Franklin Guimarães

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
GENTIANACEAE – 41/174				
<i>Calolisianthus</i> – 5/6				
<i>C. amplissimus</i> (Mart.) Gilg	FCA	-	-	-
<i>C. pedunculatus</i> (Cham. & Schltdl.) Gilg	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. pendulus</i> (Mart.) Gilg	FCA	-	-	-
<i>C. pulcherrimus</i> (Mart.) Gilg	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. speciosus</i> (Cham. & Schltdl.) Gilg	FCA, AFL	-	-	-
<i>Chelonanthus</i> – 3/8				
<i>C. alatus</i> (Aubl.) Pulle	FCA	-	-	-
<i>C. purpurascens</i> (Aubl.) L.Struwe <i>et al.</i>	AFL, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. viridiflorus</i> (Mart.) Gilg	FCA	-	-	-
<i>Coutoubea</i> – 1/5				
<i>C. spicata</i> Aubl.	FCA, RST	-	-	-
<i>Curtia</i> – 3/8				
<i>C. conferta</i> (Mart.) Knobl.	FCA, AFL, RST	-	-	-
<i>C. diffusa</i> (Mart.) Cham.	AFL	-	-	-
<i>C. patula</i> (Mart.) Knobl.	FCA, AFL	-	-	-
<i>Deianira</i> – 4/7				
<i>D. chiquitana</i> Herzog	FCA	-	-	-
<i>D. damazioi</i> E.F.Guim.*	AFL	-	-	-
<i>D. erubescens</i> Cham. & Schltdl.	FCA, AFL	-	-	-
<i>D. nervosa</i> Cham. & Schltdl.	FCA, AFL	-	-	-
<i>Helia</i> – 1/2				
<i>H. oblongifolia</i> Mart.	FCA	-	-	-
<i>Hockinia</i> * – 1/1				
<i>H. montana</i> Gardner*	FCA, AFL	-	-	-
<i>Macrocarpaea</i> – 4/90				
<i>M. glaziovii</i> Gilg.*	FOD	-	-	-
<i>M. illecebrosa</i> J.R.Grant*	FOD	-	-	-
<i>M. obtusifolia</i> (Griseb.) Gilg	FOD, AFL, FCA	-	-	-
<i>M. rubra</i> Malme*	FOD	-	-	-
<i>Prepusa</i> – 4/5				
<i>P. alata</i> Porto & Brade*	FCA	-	-	-
<i>P. connata</i> Gardner*	FCA	-	-	-
<i>P. hookeriana</i> Gardner*	FCA	-	EN	ANEXO I
<i>P. viridiflora</i> Brade*	FCA	-	EN	ANEXO II
<i>Schultesia</i> – 6/19				
<i>S. australis</i> Griseb.	FCA, RST	-	-	-
<i>S. brachyptera</i> Cham.	FCA	-	-	-
<i>S. doniana</i> Progel	FCA, RST	-	-	-
<i>S. gracilis</i> Mart.	FCA, AFL	-	-	-
<i>S. guianensis</i> (Aubl.) Malme	FCA, RST	-	-	-
<i>S. pohliana</i> Progel	FCA	-	-	-
<i>Senaea</i> – 2/2				
<i>S. coerulea</i> Taub.	FCA	-	CR	ANEXO II
<i>S. janeirensis</i> Brade*	FCA	-	CR	ANEXO II
<i>Tetrapollinia</i> – 1/1				
<i>T. caerulea</i> (Aubl.) Maguire & B.M.Boom	FCA	-	-	-
<i>Voyria</i> – 5/19				
<i>V. aphylla</i> (Jacq.) Pers.	FOD	-	-	-
<i>V. caerulea</i> Aubl.	FOD	-	-	-
<i>V. flavescens</i> Griseb.	FOD	-	-	-
<i>V. obconica</i> Progel*	FOD	-	-	-
<i>V. tenella</i> Guild. ex Hook.	FOD	-	-	-
<i>Zygostigma</i> – 1/1				
<i>Z. australe</i> (Cham. & Schltdl.) Griseb.	FCA	-	-	-

Geraniaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
GERANIACEAE – 8/700				
<i>Erodium</i> – 1/60				
<i>E. geoides</i> A.St.-Hil.	FOD, FCA	-	-	-
<i>Geranium</i> – 7/300				
<i>G. albicans</i> A.St.-Hil.	FOD, FCA	-	-	-
<i>G. arachnoideum</i> A.St.-Hil.*	FOD, FCA	-	-	-
<i>G. brasiliense</i> Progel*	FOD, FCA	-	-	-
<i>G. carolinianum</i> L.	FOD, FCA	-	-	-
<i>G. dissectum</i> L.	FOD, FCA	-	-	-
<i>G. glanduligerum</i> R.Knuth*	FOD, FCA	-	-	-
<i>G. robertianum</i> L.	FOD, FCA	-	-	-

Gesneriaceae

Alain Chautems

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
GESNERIACEAE – 127/3500				
Anetanthus – 1/2				
A. gracilis Hiern	AFL	-	-	-
Besleria – 9/>150				
B. flavovirens Nees & Mart.	FOD	-	-	-
B. fluminensis Brade*	FOD	-	-	-
B. laxiflora Benth.	FOD	-	-	-
B. longimucronata Hoehne*	FOD	-	-	-
B. macahensis Brade*	FOD	-	-	-
B. melancholica (Vell.) C.V.Morton*	FOD	-	-	-
B. meridionalis C.V.Morton*	FOD	-	-	-
B. selloana Klotzsch & Hanst.*	FOD	-	-	-
B. umbrosa Mart.*	FOD	-	-	-
Codonanthe – 9/18				
C. carnosia (Gardner) Hanst.*	FOD	-	-	-
C. cordifolia Chautems*	FOD	-	-	-
C. devosiana Lem.*	FOD, RST	-	-	-
C. gibbosa Rossini & Chautems*	FOD	-	-	-
C. gracilis (Mart.) Hanst.*	FOD, RST	-	-	-
C. matts-silvae Chautems*	FOD	-	-	-
C. serrulata Chautems*	FOD	-	-	-
C. uleana Fritsch	FOD	-	-	-
C. venosa Chautems*	FOD	-	-	-
Columnea – 2/ca 200				
C. sanguinea (Pers.) Hanst.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. ulei</i> Mansf.*	FOD	-	-	-
<i>Drymonia</i> – 2/70				
<i>D. coccinea</i> (Aubl.) Wiehler	FOD	-	-	-
<i>D. serrulata</i> (Poepp.) Wiehler	FOD	-	-	-
<i>Napeanthus</i> – 2/16				
<i>N. primulifolius</i> (Raddi) Sandwith*	FOD	-	-	-
<i>N. reitzii</i> (L.B.Sm.) Leeuwenb.*	FOD	-	-	-
<i>Nematanthus</i> * – 31/31				
<i>N. albus</i> Chautems*	FOD	-	-	-
<i>N. australis</i> Chautems*	FOD	-	-	-
<i>N. bradei</i> (Handro) Chautems*	FOD	-	-	-
<i>N. brasiliensis</i> (Vell.) Chautems*	FOD	-	-	-
<i>N. corticola</i> Schrad.*	FOD	-	-	-
<i>N. crassifolius</i> (Schott) Wiehler*	FOD	-	-	-
<i>N. fissus</i> (Vell.) L.E.Skog*	FOD	-	-	-
<i>N. fluminensis</i> (Vell.) Fritsch*	FOD	-	-	-
<i>N. fornix</i> (Vell.) Chautems*	FOD	-	-	-
<i>N. fritschii</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>N. gregarius</i> D.L.Denham*	FOD	-	-	-
<i>N. hirtellus</i> (Schott) Wiehler*	FOD	-	-	-
<i>N. jolyanus</i> (Handro) Chautems*	FOD	-	-	-
<i>N. kautskyi</i> Chautems & Rossini*	FOD	-	-	-
<i>N. kuhlmannii</i> (Handro) Chautems*	FOD	-	-	-
<i>N. lanceolatus</i> (Poir.) Chautems*	FOD, FES	-	-	-
<i>N. maculatus</i> (Fritsch) Wiehler*	FOD	-	-	-
<i>N. mattosianus</i> (Handro) H.E.Moore*	FOD	-	-	-
<i>N. mirabilis</i> (Handro) Chautems*	FOD	-	-	-
<i>N. monanthos</i> (Vell.) Chautems*	FOD	-	-	-
<i>N. punctatus</i> Chautems*	FOD	-	-	-
<i>N. pycnophyllus</i> Chautems <i>et al.</i> *	FOD	-	-	-
<i>N. sericeus</i> (Hanst.) Chautems*	FOD, FES	-	-	-
<i>N. serpens</i> (Vell.) Chautems*	FOD	-	-	-
<i>N. striatus</i> (Handro) Chautems*	FOD	-	-	-
<i>N. strigillosus</i> (Mart.) H.E.Moore*	AFL	-	-	-
<i>N. teixeiranus</i> (Handro) Chautems*	FOD	-	-	-
<i>N. tessmannii</i> (Hoehne) Chautems*	FOD	-	-	-
<i>N. villosus</i> (Hanst.) Wiehler*	FOD	-	-	-
<i>N. wettsteinii</i> (Fritsch) H.E.Moore*	FOD	-	-	-
<i>N. wiehleri</i> Chautems & M.Peixoto*	FOD	-	-	-
<i>Paliavana</i> – 5/6				
<i>P. gracilis</i> (Mart.) Chautems	FCA	-	-	-
<i>P. prasinata</i> (Ker Gawl.) Benth.*	FOD	-	-	-
<i>P. sericiflora</i> Benth.	AFL	-	-	-
<i>P. tenuiflora</i> Mansf.	AFL	-	-	-
<i>P. werdermannii</i> Mansf.	AFL	-	-	-
<i>Seemannia</i> – 1/4				
<i>S. sylvatica</i> (Kunth) Hanst.	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Sinningia – 57/ca. 75				
S. aggregata (Ker Gawl.) Wiehler	FOD, AFL	-	-	-
S. aghensis Chautems*	AFL	-	-	-
S. allagophylla (Mart.) Wiehler	AFL, FCA	-	-	-
S. amambayensis Chautems*	AFL	-	-	-
S. araneosa Chautems	AFL	-	-	-
S. barbata (Nees & Mart.) G.Nicholson*	FOD	-	-	-
S. brasiliensis (Regel & Schmidt) Wiehler & Chautems*	AFL	-	-	-
S. bulbosa (Ker Gawl.) Wiehler*	AFL	-	-	-
S. calcaria (Malme) Chautems*	AFL, FOD	-	-	-
S. canescens (Mart.) Wiehler*	AFL	-	-	-
S. carangolensis Chautems*	AFL	-	EN	ANEXO II
S. cardinalis (Lehm.) H.E.Moore*	AFL	-	EN	ANEXO I
S. cochlearis (Hook.) Chautems*	AFL	-	EN	ANEXO I
S. conspicua (Seem.) G.Nicholson*	FOD	-	-	-
S. cooperi (Paxton) Wiehler*	FOD	-	-	-
S. curtiflora (Malme) Chautems*	FOD, FCA	-	-	-
S. defoliata (Malme) Chautems	FES	-	-	-
S. douglasii (Lindl.) Chautems*	FOD, FOM	-	-	-
S. elatior (Kunth) Chautems	FCA	-	-	-
S. eumorpha H.E.Moore*	FES	-	-	-
S. gigantifolia Chautems*	FOD, FOM	-	-	-
S. glazioviana (Fritsch) Chautems*	FOD, FOM	-	-	-
S. guttata Lindl.*	FOD	-	EN	ANEXO I
S. hatschbachii Chautems*	AFL	-	-	-
S. helleri Nees*	FOD	-	-	-
S. hirsuta (Lindl.) G.Nicholson*	FOD	-	EN	ANEXO I
S. iarae Chautems*	FOD	-	-	-
S. incarnata (Aubl.) D.L.Denham	AFL	-	-	-
S. insularis (Hoehne) Chautems*	AFL	-	-	-
S. kautskyi Chautems*	FOD	-	-	-
S. lateritia (Lindl.) Chautems*	AFL	-	-	-
S. leopoldii (Planch.) Chautems*	AFL	-	-	-
S. leucotricha (Hoehne) H.E.Moore*	AFL	-	-	-
S. lindleyi Schauer*	FOD	-	EN	ANEXO I
S. lineata (Hjelmq.) Chautems*	AFL	-	-	-
S. macrophylla (Nees & Mart.) Benth. & Hook. ex Fritsch*	FOD	-	-	-
S. macropoda (Sprague) H.E.Moore*	AFL	-	-	-
S. macrostachya (Lindl.) Chautems	AFL	-	-	-
S. magnifica (Otto & A.Dietr.) Wiehler*	AFL	-	-	-
S. mauroana Chautems*	FOD	-	-	-
S. micans (Fritsch) Chautems*	FOD	-	-	-
S. nivalis Chautems*	AFL	-	-	-
S. nordestina Chautems et al.*	AFL	-	-	-
S. piresiana (Hoehne) Chautems	FES, AFL	-	-	-
S. polyantha (DC.) Wiehler*	RST	-	-	-
S. pusilla (Mart.) Baill.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. reitzii</i> (Hoehne) L.E.Skog*	FOD	-	-	-
<i>S. rupicola</i> (Mart.) Wiehler*	AFL	-	-	-
<i>S. sceptrum</i> (Mart.) Wiehler*	FOD	-	-	-
<i>S. schiffneri</i> Fritsch*	FOD	-	-	-
<i>S. sellovii</i> (Mart.) Wiehler*	AFL	-	-	-
<i>S. speciosa</i> (Lodd.) Hiern*	AFL, FOD	-	-	-
<i>S. striata</i> (Fritsch) Chautems*	AFL	-	-	-
<i>S. tuberosa</i> (Mart.) H.E.Moore*	AFL	-	-	-
<i>S. valsuganensis</i> Chautems*	AFL	-	-	-
<i>S. villosa</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>S. warmingii</i> (Hiern) Chautems	AFL, FES	-	-	-
<i>Vanhouttea</i> * – 9/9				
<i>V. bradeana</i> Hoehne*	AFL	-	EN	ANEXO I
<i>V. brueggeri</i> Chautems*	AFL	-	-	-
<i>V. calcarata</i> Lem.*	AFL	-	-	-
<i>V. fruticosus</i> (Glaz. ex Hoehne) Chautems*	FOD	-	EN	ANEXO I
<i>V. gardneri</i> (Hook.) Fritsch*	AFL, FOD	-	-	-
<i>V. hilariana</i> Chautems*	AFL	-	-	-
<i>V. lanata</i> Fritsch*	AFL	-	EN	ANEXO I
<i>V. leonii</i> Chautems*	AFL	-	VU	ANEXO II
<i>V. pendula</i> Chautems*	AFL	-	VU	ANEXO II

Goodeniaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
GOODENIACEAE – 1/440				
Scaevola – 1/130				
S. plumieri (L.) Vahl	RST	-	-	-

Griselinaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
GRISELINIACEAE – 1/7				
<i>Griselinia</i> – 1/7				
<i>G. ruscifolia</i> (Clos) Taub.	FOD, FOM	-	-	-

Gunneraceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
GUNNERACEAE – 2/42				
<i>Gunnera</i> – 2/40				
<i>G. herteri</i> Ost.	RST	-	VU	ANEXO II
<i>G. manicata</i> Linden*	FOD, FOM	-	-	-

Haloragaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HALORAGACEAE – 3/ca. 150				
<i>Lauremburgia</i> – 1/4				
<i>L. tetrandra</i> (Schott) Kanitz	FAQ, RST	-	-	-
<i>Myriophyllum</i> – 1/60				
<i>M. aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	FAQ	-	-	-
<i>Proserpinaca</i> – 1/2				
<i>P. palustris</i> L.	FAQ	-	-	-

Heliconiaceae

João Marcelo Alvarenga Braga

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HELICONIACEAE – 14/ca. 225				
<i>Heliconia</i> – 11/ca. 225				
<i>H. aemygdiana</i> Burle-Marx	FOD, FES	-	-	-
<i>H. angusta</i> Vell.	FOD, FES	-	-	ANEXO I
<i>H. episcopalis</i> Vell.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>H. farinosa</i> Raddi	FOD	-	-	ANEXO I
<i>H. hirsuta</i> L.f.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>H. kautzkiana</i> Emygdio & E.Santos	FOD	-	-	-
<i>H. pendula</i> Wawra	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>H. psittacorum</i> L.f.	FOD, FES, FOM, RST	-	-	-
<i>H. richardiana</i> Miq.	FOD, FES	-	-	-
<i>H. spathocircinata</i> Aristeg.	FOD, FES	-	-	-
<i>H. subulata</i> Ruiz & Pav.	FOD, FES	-	-	-

Heliotropiaceae

Elsie Franklin Guimarães & Erika von Sohsten Medeiros

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HELIOTROPIACEAE – 23/410				
<i>Heliotropium</i> – 14/260				
<i>H. amplexicaule</i> Vahl	FOD, RST	-	-	-
<i>H. angiospermum</i> Murray	FOD, FCA, RUD	-	-	-
<i>H. elongatum</i> (Lehm.) I.M.Johnst.	FOD, FES	-	-	-
<i>H. filiforme</i> Lehm.	FOD	-	-	-
<i>H. fruticosum</i> L.	FOD	-	-	-
<i>H. indicum</i> L.	FOD, RUD	-	-	-
<i>H. leiocarpum</i> Morong	FOD	-	-	-
<i>H. ocellatum</i> Cham.	FOD	-	-	-
<i>H. phyllicoides</i> Cham.	FOD	-	-	-
<i>H. polyphyllum</i> Lehm.	FOD	-	-	-
<i>H. procumbens</i> Mill.	FOD	-	-	-
<i>H. salicoides</i> Cham.	FOD, FCA	-	-	-
<i>H. tiaridioides</i> Cham.	FOD, FES	-	-	-
<i>H. transalpinum</i> Vell.	FOD, FES, FCA, RUD	-	-	-
<i>Tournefortia</i> – 9/150				
<i>T. bicolor</i> Sw.	FOD	-	-	-
<i>T. breviflora</i> DC.	FOD	-	-	-
<i>T. gardneri</i> A.DC.	FOD	-	-	-
<i>T. membranacea</i> DC.	FOD, RST	-	-	-
<i>T. paniculata</i> Cham.	FOD	-	-	-
<i>T. rubicunda</i> Salzm. ex DC.	FOD	-	-	-
<i>T. salicifolia</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>T. subsessilis</i> Cham.	FOD	-	-	-
<i>T. villosa</i> Salzm. ex DC.	FOD, RST	-	-	-

Hernandiaceae

Flávio Dayrell Gontijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HERNANDIACEAE – 4/45				
<i>Gyrocarpus</i> – 1/4				
<i>G. acuminatus</i> Meisn.*	FOD	-	-	-
<i>Sparattanthelium</i> – 3/16				
<i>S. botocudorum</i> Mart.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. tupinambazum</i> Mart.*	FOD	-	-	-
<i>S. tupiniquinorum</i> Mart.	FOD	-	-	-

Herreriaceae

Julie H. A. Dutilh

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HERRERIACEAE – 6/ca. 15				
<i>Hagenbachia</i> – 1/5				
<i>H. brasiliensis</i> Nees & Mart.	FOD, FES	-	-	-
<i>Herreria</i> – 5/8				
<i>H. glaziovii</i> Lecomte	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>H. grandiflora</i> Griseb.	FOD, FOM	-	-	-
<i>H. latifolia</i> Woodson	FES	-	-	-
<i>H. montevidensis</i> Klotzsch ex Griseb.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>H. salsaparrilha</i> Mart.	FOD, FES, FED	-	-	-

Humiriaceae

Luís Carlos da Silva Giordano

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HUMIRIACEAE – 10/63				
<i>Humiria</i> – 1/4				
<i>H. balsamifera</i> (Aubl.) J. St.-Hil.	FOD, FCA, RST	-	-	-
<i>Humiriastrum</i> – 4/17				
<i>H. dentatum</i> (Casar.) Cuatrec.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>H. glaziovii</i> (Urb.) Cuatrec.*	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
<i>H. mussungense</i> Cuatrec.*	FOD	-	-	-
<i>H. spiritu-sancti</i> Cuatrec.*	FOD	-	-	-
<i>Sacoglottis</i> – 1/10				
<i>S. mattogrossensis</i> Malme	FOD, FCA, RST	-	-	-
<i>Schistostemon</i> – 1/9				
<i>S. retusum</i> (Ducke) Cuatrec.	RST	-	-	-
<i>Vantanea</i> – 3/20				
<i>V. bahiaensis</i> Cuatrec.*	FOD, FCA, RST	-	-	-
<i>V. compacta</i> (Schnizl.) Cuatrec.	FOD	-	-	-
<i>V. obovata</i> (Nees & Mart.) Benth.	FOD, FCA	-	-	-

Hydnoraceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HYDNORACEAE – 1/7				
<i>Prosopanche</i> – 1/2				
<i>P. bonacinae</i> Speg.	FES, FED	-	-	-

Hydrocharitaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HYDROCHARITACEAE – 5/ca. 76				
<i>Apalanthe</i> – 1/1				
<i>A. granatensis</i> (Humb. & Bonpl.) Planch.	FAQ	-	-	-
<i>Egeria</i> – 2/2				
<i>E. densa</i> Planch.	FAQ			
<i>E. najas</i> Planch.	FAQ	-	-	-
<i>Limnobium</i> – 1/2				
<i>L. laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine	FAQ	-	-	-
<i>Ottelia</i> – 1/21				
<i>O. brasiliensis</i> (Planch.) Walp.	FAQ	-	-	-
HYDROCHARITACEAE – 5/ca. 76				
<i>Apalanthe</i> – 1/1				
<i>A. granatensis</i> (Humb. & Bonpl.) Planch.	FAQ	-	-	-
<i>Egeria</i> – 2/2				
<i>E. densa</i> Planch.	FAQ			
<i>E. najas</i> Planch.	FAQ	-	-	-
<i>Limnobium</i> – 1/2				
<i>L. laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine	FAQ	-	-	-
<i>Ottelia</i> – 1/21				
<i>O. brasiliensis</i> (Planch.) Walp.	FAQ	-	-	-

Hydroleaceae

Marco Otávio Pivari & Fernando Alves Ferreira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HYDROLEACEAE – 2/10				
<i>Hydrolea</i> – 2/10				
<i>H. elatior</i> Schott	FAQ	-	-	-
<i>H. spinosa</i> Griseb.	FAQ	-	-	-

Hypericaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HYPERICACEAE – 25/540				
<i>Hypericum</i> – 17/420				
<i>H. brasiliense</i> Choisy	FCA	-	-	-
<i>H. campestre</i> Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
<i>H. caprifoliatum</i> Cham. & Schltdl.*	FCA	-	-	-
<i>H. carinatum</i> Griseb.	FCA	-	-	-
<i>H. connatum</i> Lam.	FCA	-	-	-
<i>H. cordatum</i> (Vell.) N.Robson*	FCA	-	-	-
<i>H. denudatum</i> A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
<i>H. gentianoides</i> (L.) Britton <i>et al.</i>	FCA	-	-	-
<i>H. linoides</i> A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
<i>H. lorentzianum</i> R.Keller	FCA	-	-	-
<i>H. mutilum</i> L.	FOD, FCA	-	-	-
<i>H. piriai</i> Arechav.	FCA	-	-	-
<i>H. pleiostylum</i> C.Jim.*	FCA	-	-	-
<i>H. polyanthemum</i> Reichardt	FCA	-	-	-
<i>H. rigidum</i> A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
<i>H. teretiusculum</i> A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
<i>H. ternum</i> A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
<i>Vismia</i> – 8/52				
<i>V. brasiliensis</i> Choisy	FOD, FES			
<i>V. macrophylla</i> Kunth	FOD	-	-	-
<i>V. magnoliifolia</i> Cham. & Schltdl.*	FOD, FES	-	-	-
<i>V. martiana</i> Mart.	FOD, FES	-	-	-
<i>V. micrantha</i> A.St.-Hil.*	FOD, FES			
<i>V. parviflora</i> Cham. & Schltdl.	FES	-	-	-
<i>V. pentagyna</i> (Spreng.) Ewan*	FOD	-	-	-
<i>V. reichardtiana</i> (Kuntze) Ewan	FOD	-	-	-

Hypoxidaceae

Julie H. A. Dutilh

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
HYPOXIDACEAE – 1/60				
<i>Hypoxis</i> – 1/50				
<i>H. decumbens</i> L.	FOM, FES, RST	-	-	-

Icacinaceae

Milton Groppo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ICACINACEAE – 5/ca. 150				
<i>Casimirella</i> – 1/7				
<i>C. diversifolia</i> R.A.Howard	FOD	-	-	-
<i>Emmotum</i> – 2/17				
<i>E. affine</i> Miers*	FOD	-	-	-
<i>E. nitens</i> (Benth.) Miers	FES, FOD	-	-	-
<i>Leretia</i> – 1/10				
<i>L. cordata</i> Vell.	FOD	-	-	-
<i>Pleurisanthes</i> – 1/6				
<i>P. brasiliensis</i> (Val.) Tiegh.	FOD	-	-	-

Iridaceae

Nadia Said Chukr

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
IRIDACEAE – 34/2025				
<i>Alophia</i> – 2/4				
<i>A. coerulea</i> (Vell.) Chukr	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>A. sellowiana</i> Klatt	FCA	-	-	-
<i>Calydorea</i> – 1/10				
<i>C. campestris</i> (Klatt) Baker*	FCA	-	-	-
<i>Cipura</i> – 1/5				
<i>C. paludosa</i> Aubl.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Crocasmia – 1/22				
C. crocosmiflora (Lem. ex E.Morren) N.E.Br*	FCA	-	-	-
Cypella – 1/15				
C. linearis (Kunth) Baker	FCA, FES	-	-	-
Eleutherine – 1/2				
E. bulbosa (Mill.) Urb.	FES, FCA	-	-	-
Itysa – 1/2				
I. gardneri (Baker) Ravenna	FCA	-	-	-
Neomarica – 13/20				
N. caulosa (Ravenna) Chukr*	RST, FOD	-	-	-
N. coerulea (Ker Gawl.) Sprague*	RST, FOM	-	-	-
N. fluminensis (Ravenna) Chukr*	RST	-	-	-
N. glauca (Seub. ex Klatt) Sprague	FCA, FES	-	-	-
N. gracilis (Herb.) Sprague*	RST, FES	-	-	-
N. heloisa-mariae Occhioni*	RST, FOD	-	-	-
N. humilis (Klatt) Capell.	RST, FOD	-	-	-
N. imbricata (Hand.-Mazz.) Sprague	RST, FCA, FES	-	-	-
N. northiana (Schneev.) Sprague*	RST, FES, FOM	-	-	-
N. portosecurensis (Ravenna) Chukr*	RST, FOD	-	-	-
N. rigida (Ravenna) Capell.*	FCA, FES	-	-	-
N. sabini (Lindl.) Chukr*	RST, FOD	-	-	-
N. sylvestris (Vell.) Chukr*	FOD	-	-	-
Sisyrinchium – 9/150				
S. commutatum Klatt	FCA, FES	-	-	-
S. fasciculatum Klatt	FCA	-	-	-
S. hasslerianum Baker	FCA	-	-	-
S. luzula Klotzsch ex Klatt	FCA	-	-	-
S. micranthum Cav.	FCA, FES	-	-	-
S. palmifolium L.	FCA	-	-	-
S. restioides Spreng.	FCA	-	-	-
S. setaceum Klatt	FCA	-	-	-
S. vaginatum Spreng.	FCA, FES	-	-	-
Trimezia – 4/18				
T. juncifolia (Klatt) Benth. & Hook.	FCA	-	-	-
T. lutea (Klatt) Foster	FCA, FES	-	-	-
T. martinicensis (Jacq.) Herb.	FCA, RST, FES	-	-	-
T. spathata (Klatt) Baker	FCA, FES	-	-	-

Juncaceae

Marcus Alves

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
JUNCACEAE – 7/300				
<i>Juncus</i> – 6/220				
<i>J. densiflorus</i> Kunth	AFL, FCA, FOD, FAQ	-	-	-
<i>J. effusus</i> L.	FOD, FAQ	-	-	-
<i>J. micranthus</i> Schrad. ex Meyer	FOD, FAQ	-	-	-
<i>J. microcephalus</i> Kunth	AFL, FOD, FOM, FAQ	-	-	-
<i>J. tenuis</i> Willd.	FCA, FOD, FAQ	-	-	-
<i>J. ustulatus</i> Buchenau*	AFL, FCA, FOD, FAQ	-	-	-
<i>Luzula</i> – 1/75				
<i>L. campestris</i> (L.) DC.	FOD	-	-	-

Juncaginaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
JUNCAGINACEAE – 1/20				
<i>Triglochin</i> – 1/17				
<i>T. striata</i> Ruiz & Pav.	FAQ	-	-	-

Krameriaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
KRAMERIACEAE – 3/15				
<i>Krameria</i> – 3/15				
<i>K. bahiana</i> B.Simpson*	RST	-	-	-
<i>K. grandiflora</i> A.St.-Hil.	RST	-	-	-
<i>K. tomentosa</i> A.St.-Hil.	RST	-	-	-

Lacistemaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LACISTEMACEAE – 6/14				
<i>Lacistema</i> – 6/11				
<i>L. aggregatum</i> (P.J.Bergius) Rusby	FOD, FES	-	-	-
<i>L. hasslerianum</i> Chodat	FOD, FES	-	-	-
<i>L. lucidum</i> Schnizl.*	FOD	-	-	-
<i>L. pubescens</i> Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>L. robustum</i> Schnizl.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>L. serrulatum</i> Mart.*	FOD	-	-	-

Lamiaceae

Élide Santos Jimena, Flávio França & Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LAMIACEAE – 236/7173				
Aegiphila – 19/116				
A. australis Moldenke*	FOD	-	-	-
A. brachiata Vell.*	FOD	-	-	-
A. capitata Moldenke*	?	-	-	-
A. casseliiformis Schauer*	FOD	-	-	-
A. fluminensis Vell.*	FOD	-	-	-
A. gloriosa Moldenke	FOD	-	-	-
A. graveolens Mart. & Schauer	FOD	-	-	-
A. integrifolia (Jacq.) Moldenke	FOD, FES	-	-	-
A. laevis (Aubl.) Gmel.	FOD	-	-	-
A. luschnathii Schauer	RST	-	-	-
A. macrantha Ducke	FOD, RST	-	-	-
A. mediterranea Vell.	FOD, FES, RST	-	-	-
A. novofriburgensis Moldenke*	FOD	-	-	-
A. obducta Vell.	FOD	-	-	-
A. pernambucensis Moldenke*	FOD, RST	-	-	-
A. racemosa Vell.	FOD	-	-	-
A. riedeliana Schauer*	FOD	-	-	-
A. verticillata Vell.	FOD, FOM, FES, FED, FCA, AFL, RST		-	-
A. vitelliniflora Walp.	FOD, FES	-	-	-
Amasonia – 1/8				
A. angustifolia Mart. & Schauer	FCA	-	-	-
Clinopodium – 1/100				
C. brownei (Sw.) Kuntze	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Cunila – 11/15				
C. angustifolia Benth.*	FCA, FOM	-	-	-
C. fasciculata Benth.*	FCA	-	-	-
C. galioides Benth.*	FCA	-	-	-
C. incana Benth.*	FCA	-	-	-
C. incisa Benth.*	FCA	-	-	-
C. menthiformis Epling*	FCA	-	-	-
C. menthoides Benth.*	FCA	-	-	-
C. microcephala Benth.*	FCA	-	-	-
C. platyphylla Epling*	FCA	-	-	-
C. spicata Benth.*	FCA	-	-	-
C. tenuifolia Epling*	FCA	-	-	-
Eriope – 4/30				
E. arenaria Harley	FCA	-	-	-
E. blanchetii (Benth.) Harley*	RST	-	EN	ANEXO II
E. crassipes Benth.	FCA	-	-	-
E. macrostachya Mart. ex Benth.	FCA	-	-	-
Eriothymus* – 1/1				
E. rubiaceus J.Schmidt*	FCA	-	-	-
Glechom* – 6/6				
G. ciliata Benth.*	FCA	-	-	-
G. discolor Epling*	FCA	-	-	-
G. elliptica C.Pereira & Hatschb.*	FCA	-	-	-
G. marifolia Benth.*	FCA	-	-	-
G. spathulata Benth.*	FCA	-	-	-
G. thymoides Spreng.*	FCA	-	-	-
Hedeoma – 3/42				
H. crenatum Irving*	FCA	-	-	-
H. multiflorum Benth.	FCA	-	-	-
H. polygalifolium Benth.	FCA	-	-	-
Hesperozygis – 7/8				
H. dimidiata Epling & Mathias*	FCA	-	-	-
H. kleinii Epling*	FCA	-	-	-
H. myrtoides (A.St.-Hil.) Epling*	FOD, FCA	-	-	-
H. nitida (Benth.) Epling*	FCA	-	-	-
H. rhododon Epling*	FCA	-	-	-
H. ringens (Benth.) Epling	FOD, FCA	-	VU	ANEXO I
H. spathulata Epling*	FCA	-	-	-
Hoehnea* – 4/4				
H. epilobioides (Epling) Epling & Stewart*	FCA	-	-	-
H. minima (J.Schmidt) Epling*	FCA	-	-	-
H. parvula (Epling) Epling*	FCA	-	-	-
H. scutellarioides (Benth.) Epling*	FCA	-	-	-
Hypenia – 4/23				
H. glauca (A.St.-Hil. ex Benth.) Harley	FCA	-	-	-
H. macrantha (A.St.-Hil. ex Benth.) Harley	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>H. reticulata</i> (Mart. ex Benth.) Harley	FCA	-	-	-
<i>H. salzmännii</i> (Benth.) Harley	FCA	-	-	-
<i>Hyptidendron</i> – 8/19				
<i>H. asperrimum</i> (Epling) Harley	FCA	-	-	-
<i>H. canum</i> (Pohl ex Benth.) Harley	FCA	-	-	-
<i>H. clausenii</i> (Benth.) Harley*	FCA	-	VU	ANEXO I
<i>H. conspersum</i> (Benth.) Harley	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>H. leucophyllum</i> (Pohl ex Benth.) Harley	FCA	-	-	-
<i>H. rhabdocalyx</i> (Mart. ex Benth.) Harley	FCA	-	-	-
<i>H. vauthieri</i> (Briq.) Harley	FCA	-	-	-
<i>H. vepretorum</i> (Mart. ex Benth.) Harley	FCA	-	-	-
<i>Hyptis</i> – 85/280				
<i>H. alata</i> (Raf.) Shinnars	FCA, FES, FOM	-	-	-
<i>H. althaeifolia</i> Pohl ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. alutacea</i> Pohl ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. amaurocaula</i> Briq.	FCA	-	-	-
<i>H. angulosa</i> Schott ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. apertiflora</i> Epling	FCA	-	-	-
<i>H. atrorubens</i> Poit.	FOM, RST	-	-	-
<i>H. australis</i> Epling*	FES	-	-	-
<i>H. balansae</i> Briq.	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>H. brevipes</i> Poit.	FES, FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>H. caespitosa</i> A.St.-Hil. ex Benth.	FCA, FES	-	-	-
<i>H. calida</i> Mart. ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. cardiophylla</i> Pohl ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. carpinifolia</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. complicata</i> A.St.-Hil. ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. conferta</i> Pohl ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. corymbosa</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. crinita</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. cuneata</i> Pohl ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. cymulosa</i> Benth.*	FCA	-	-	-
<i>H. ditassoides</i> Mart. ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. duplicatodentata</i> Pohl ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. elegans</i> (Briq.) Briq. ex Micheli	FCA	-	-	-
<i>H. eriophylla</i> Pohl ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. erythrostachys</i> Epling*	FCA	-	-	-
<i>H. fasciculata</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. fruticosa</i> Salzm. ex Benth.	FCA, RST	-	-	-
<i>H. glomerata</i> Mart. ex Schrank	FCA	-	-	-
<i>H. hassleri</i> Briq.	FCA	-	-	-
<i>H. heterodon</i> Epling*	FCA	-	-	-
<i>H. homalophylla</i> Pohl ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. imbricata</i> Pohl ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. lacunosa</i> Pohl ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. lacustris</i> A.St.-Hil. ex Benth.	FOD, RST	-	-	-
<i>H. lagenaria</i> A.St.-Hil. ex Benth.*	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>H. lappacea</i> Benth.	FCA, FES, FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>H. lappulacea</i> Mart. ex Benth.	FOM	-	-	-
<i>H. leptostachys</i> Epling	FCA	-	-	-
<i>H. linarioides</i> Pohl ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. lippoides</i> Pohl ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. lorentziana</i> O.Hoffm.	FCA, FES, FOD, RST	-	-	-
<i>H. lucida</i> Pohl ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. lutescens</i> Pohl ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. macrotera</i> Briq.	FCA	-	-	-
<i>H. marrubioides</i> Epling	FCA, FES	-	-	-
<i>H. microphylla</i> Pohl ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. mollissima</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. monticola</i> Mart. ex Benth.*	FCA	-	-	-
<i>H. muelleri</i> Briq.	FCA, FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>H. multibracteata</i> Benth.*	FCA, FOD	-	-	-
<i>H. multiseta</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. muricata</i> Schott ex Benth.*	FCA	-	-	-
<i>H. mutabilis</i> (Rich.) Briq.	FCA, FES, FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>H. nudicaulis</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. paludosa</i> A.St.-Hil. ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. passerina</i> Mart. ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. pectinata</i> (L.) Poit.	FCA	-	-	-
<i>H. peduncularis</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. plectranthoides</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. propinqua</i> Epling*	FCA	-	-	-
<i>H. proteoides</i> A.St.-Hil. ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. pulchella</i> Briq.	FCA	-	-	-
<i>H. racemulosa</i> Mart. ex Benth.*	FES	-	-	-
<i>H. recurvata</i> Poit.	FCA	-	-	-
<i>H. rhyptidiophylla</i> Briq.*	FCA	-	VU	ANEXO I
<i>H. rotundifolia</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. rubicunda</i> Pohl ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. rubiginosa</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. rugosa</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. salviifolia</i> Pohl ex Benth.*	FCA	-	-	-
<i>H. selloi</i> Benth.*	FCA	-	-	-
<i>H. sericea</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. sinuata</i> Pohl ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. stricta</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. suaveolens</i> Poit.	FCA	-	-	-
<i>H. suaveolens</i> Poit.	FCA	-	-	-
<i>H. subviolacea</i> Briq.	FCA	-	-	-
<i>H. tenuifolia</i> Epling	FCA	-	-	-
<i>H. tetrapephala</i> Bordignon*	FCA, FOD, RST	-	-	-
<i>H. tetragona</i> Pohl	FCA	-	-	-
<i>H. thyrsiflora</i> Epling*	FCA, FOD	-	-	-
<i>H. tricephala</i> A.St.-Hil. ex Benth.	FCA	-	VU	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>H. turnerifolia</i> Mart. ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. uliginosa</i> A.St.-Hil. ex Benth.*	FCA	-	-	-
<i>H. umbrosa</i> Salzm. ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>H. virgata</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>Lepechinia</i> – 1/40				
<i>L. speciosa</i> (A.St.-Hil. ex Benth.) Epling*	FCA	-	-	-
<i>Marsypianthes</i> – 2/5				
<i>M. chamaedrys</i> (Vahl) Kuntze	FCA, RST	-	-	-
<i>M. hassleri</i> Briq.	FCA	-	-	-
<i>Monochilus</i> – 1/2				
<i>M. gloxiniifolius</i> Fisch. & C.A.Mey.	FCA	-	-	-
<i>Ocimum</i> – 4/65				
<i>O. neurophyllum</i> Briq.	FCA	-	-	-
<i>O. nudicaule</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>O. ovatum</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>O. selloi</i> Benth.	FCA	-	-	-
<i>Peltodon</i> – 4/6				
<i>P. longipes</i> A.St.-Hil. ex Benth.	FCA	-	-	-
<i>P. radicans</i> Pohl	FCA	-	-	-
<i>P. rugosus</i> Tolm.*	FCA	-	-	-
<i>P. tomentosus</i> Pohl	FCA	-	-	-
<i>Rhabdocaulon</i> * – 7/7				
<i>R. coccineum</i> (Benth.) Epling*	FOD, FCA	-	-	-
<i>R. denudatum</i> (Benth.) Epling*	FCA	-	-	-
<i>R. erythrostachys</i> Epling*	FCA	-	-	-
<i>R. gracile</i> (Benth.) Epling*	FCA	-	-	-
<i>R. lavanduloides</i> (Benth.) Epling*	FCA	-	-	-
<i>R. stenodontum</i> (Briq.) Epling*	FCA	-	-	-
<i>R. strictum</i> (Benth.) Epling*	FCA	-	-	-
<i>Rhaphiodon</i> – 1/1				
<i>R. echinus</i> Schauer	FCA	-	-	-
<i>Salvia</i> – 63/900				
<i>S. aliciae</i> E.P.Santos*	FCA	-	-	-
<i>S. altissima</i> Pohl*	FOD	-	-	-
<i>S. apparicii</i> Brade & Barb.Per.*	FCA	-	-	-
<i>S. arenaria</i> A.St.-Hil. ex Benth.*	FCA	-	-	-
<i>S. aridicola</i> Briq.*	FCA	-	-	-
<i>S. articulata</i> Epling*	FOD	-	-	-
<i>S. balaustina</i> Pohl*	FOD	-	-	-
<i>S. benthamiana</i> Gardner*	FCA	-	-	-
<i>S. borjensis</i> E.P.Santos*	FCA	-	-	-
<i>S. brevipes</i> Benth.*	FCA	-	-	-
<i>S. caaguazuensis</i> Briq.*	FCA	-	-	-
<i>S. calcicola</i> Harley*	FCA	-	-	-
<i>S. campicola</i> Briq.*	FCA	-	-	-
<i>S. camposportoi</i> Brade*	FCA	-	-	-
<i>S. cardiophylla</i> Benth.*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. confertiflora</i> Pohl*	FOD, FCA	-	-	-
<i>S. congestiflora</i> Epling*	FCA	-	-	-
<i>S. consimilis</i> Epling*	FCA	-	-	-
<i>S. cordata</i> Benth.*	FCA	-	-	-
<i>S. curta</i> Epling*	FOD	-	-	-
<i>S. decurrens</i> Epling*	FCA	-	-	-
<i>S. durifolia</i> Epling*	FCA	-	-	-
<i>S. espiritosantensis</i> Brade & Barb.Per.*	FCA	-	-	-
<i>S. expansa</i> Epling*	FCA	-	-	-
<i>S. fruticetorum</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>S. guaranitica</i> A.St.-Hil. ex Benth.*	FOD	-	-	-
<i>S. hatschbachii</i> E.P.Santos*	FOD	-	-	-
<i>S. hilarii</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>S. itatiaiensis</i> Dusén*	FOD	-	-	-
<i>S. lachnostachys</i> Benth.*	FCA	-	-	-
<i>S. lepida</i> Epling*	FCA	-	-	-
<i>S. longibracteata</i> E.P.Santos*	FOD	-	-	-
<i>S. macrocalyx</i> Gardner*	FOD	-	-	-
<i>S. melissiflora</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>S. mentiens</i> Pohl*	FOD	-	-	-
<i>S. minarum</i> Briq.*	FCA	-	-	-
<i>S. neovidensis</i> Benth.*	FCA	-	-	-
<i>S. oligantha</i> Dusén*	FOD, FCA	-	-	-
<i>S. ombrophila</i> Dusén*	FOD	-	-	-
<i>S. ovalifolia</i> A.St.-Hil. ex Benth.*	FCA	-	-	-
<i>S. pachypoda</i> Briq.*	FCA	-	-	-
<i>S. pallida</i> Benth.*	FCA	-	-	-
<i>S. paraguariensis</i> Briq.*	FCA	-	-	-
<i>S. persicifolia</i> A.St.-Hil. ex Benth.*	FOD	-	-	-
<i>S. procurrens</i> Benth.*	FCA	-	-	-
<i>S. propinqua</i> Benth.	?	-	-	-
<i>S. regnelliana</i> Briq.*	FCA	-	-	-
<i>S. rivularis</i> Gardner*	FOD	-	-	-
<i>S. rosmarinoides</i> A.St.-Hil. ex Benth.*	FCA	-	-	-
<i>S. salicifolia</i> Pohl*	FOD	-	-	-
<i>S. scabrida</i> Pohl*	FCA	-	-	-
<i>S. scoparia</i> Epling*	FCA	-	-	-
<i>S. scytinophylla</i> Briq.*	FCA	-	-	-
<i>S. secunda</i> Benth.*	FOD, FCA	-	-	-
<i>S. sellowiana</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>S. splendens</i> Sellow ex Roem. & Schult.*	FOD	-	-	-
<i>S. subrotunda</i> A.St.-Hil. ex Benth.*	FES	-	-	-
<i>S. tenuiflora</i> Epling*	FOD	-	-	-
<i>S. tomentella</i> Pohl*	FCA	-	-	-
<i>S. uliginosa</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>S. viscida</i> A.St.-Hil. ex Benth.*	FCA	-	-	-
<i>S. xanthotricha</i> Harley ex E.P.Santos*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Scutellaria – 6/360				
S. agrestis A.St.-Hil. ex Benth.	FCA	-	-	-
S. platensis Speg.	FCA	-		
S. purpurascens Sw.	FCA	-	-	-
S. racemosa Pers.	FCA	-	-	-
S. tubiflora Benth.*	FCA	-	-	-
S. uliginosa A.St.-Hil. ex Benth.	FCA	-	-	-
Vitex – 11/250				
V. chryslariana Moldenke	FOD	-	-	-
V. cymosa Bertero ex Spreng.	FOD, FES	-	-	-
V. hypoleuca Schauer*	RST	-	-	-
V. megapotamica (Spreng.) Moldenke	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
V. mexiae Moldenke	FOD	-	-	-
V. orinocensis Kunth	FOD	-	-	-
V. polygama Cham.	FOD, FES, FCA	-	-	-
V. regnelliana Moldenke*	FOD, RST	-	-	-
V. rufescens A.Juss.	FOD, RST	-	-	-
V. sellowiana Cham.	FOD, FCA	-	-	-
V. vauthieri DC. ex Schauer	FOD	-	-	-

Lauraceae

Alexandre Quinet

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LAURACEAE – 142/2500				
Aiouea – 3/19				
A. acarodomatifera Kosterm.*	FOD	-	-	-
A. bracteata Kosterm.	FOD	-	VU	ANEXO II
A. saligna Meisn.	FOD	-	-	-
Aniba – 2/41				
A. firmula (Nees & Mart. ex Nees) Mez	FOD, FES, RST	-	-	-
A. pedicellata Kosterm.*	FOD	-	-	-
Beilschmiedia – 7/250				
B. angustifolia Kosterm.*	FOD	-	-	-
B. emarginata (Meisn.) Kosterm.*	FOD	-	-	-
B. fluminensis Kosterm.*	FOD	-	-	-
B. linharensis S.Nishida & van der Werff*	FOD	-	-	-
B. rigida (Mez) Kosterm.*	FOD	-	VU	ANEXO I
B. stricta Kosterm.*	FOD	-	-	-
B. taubertiana (Schwacke & Mez) Kosterm.*	FOD	-	-	-
Cassytha – 1/17				
C. filiformis L.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Cinnamomum – 6/200-350				
C. glaziovii Mez*	FOD	-	-	-
C. riedelianum Kosterm.*	FOD	-	-	-
C. sellowianum (Nees & Mart. ex Nees) Kosterm.	FCAB,FOM	-	-	-
C. stenophyllum (Meisn.) Vattimo-Gil*	FOD	-	-	-
C. tomentulosum Kosterm.	FOD	-	-	-
C. triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm.	FOD, FES	-	-	-
Cryptocarya – 12/300-350				
C. aschersoniana Mez	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. botelhensis P.L.R. de Moraes*	FOD	-	-	-
C. citrifolmis (Vell.) P.L.R. de Moraes*	FOD	-	-	-
C. mandioccana Meisn.*	FOD, FES	-	-	-
C. micrantha Meisn.*	FOD, FES	-	-	-
C. moschata Nees & Mart. ex Nees	FES	-	-	-
C. riedeliana P.L.R. de Moraes*	FOD	-	-	-
C. saligna Mez*	FOD, FES	-	-	-
C. sellowiana P.L.R. de Moraes*	FES	-	-	-
C. subcorymbosa Mez*	FOD	-	-	-
C. velloziana P.L.R.de Moraes*	FOD	-	-	-
C. wiedensis P.L.R. de Moraes*	FOD	-	-	-
Endlicheria – 2/60				
E. glomerata Mez	FOD, FES	-	-	-
E. paniculata (Spreng.) J.F.Macbr.	FOD, FES, RST, MAN	-	-	-
Licaria – 3/38				
L. armeniaca (Nees) Kosterm.	FOD, FES	-	-	-
L. bahiana Kurz	FOD, FES	-	-	-
L. guianensis Aubl.	FOD	-	-	-
Mezilaurus – 1/18				
M. navalium (Allemão) Taub. ex Mez*	FOD	VU	-	-
Nectandra – 15/114				
N. barbellata Coe-Teix.*	FOD, FES	VU	-	-
N. cissiflora Nees	FOD, FES	-	-	-
N. debilis Mez*	FOD	CR	-	-
N. grandiflora Nees & Mart. ex Nees	FOD, FES, FOM, FCA	-	-	-
N. lanceolata Nees & Mart. ex Nees	FOD, FES, FOM	-	-	-
N. leucantha Nees & Mart. ex Nees*	FOD	-	-	-
N. megapotamica (Spreng.) Mez	FES, FOM	-	-	-
N. membranacea (Sw.) Griseb.	FOD, FES	-	-	-
N. nitidula Nees & Mart. ex Nees*	FOD, FES	-	-	-
N. oppositifolia Nees & Mart. ex Nees	FOD, FES, RST	-	-	-
N. psammophila Nees*	FOD, RST	-	-	-
N. puberula (Schott) Nees	FOD, RST	-	-	-
N. reticulata (Ruiz & Pav.) Mez	FOD, FES, RST	-	-	-
N. spicata Meisn.*	FOD	-	-	-
N. weddellii Meisn.*	FOD	EN	-	-
Ocotea – 70/350				
O. aciphylla (Nees & Mart. ex Nees) Mez	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>O. aniboides</i> (Meisn.) Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. argentea</i> Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. basicordatifolia</i> Vattimo-Gil*	FOD	EN	VU	ANEXO I
<i>O. beulahiae</i> Baitello *	FES	-	-	-
<i>O. beyrichii</i> (Nees) Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. brachybotrya</i> (Meisn.) Mez*	FOD, FES	-	-	-
<i>O. braggae</i> Coe-Teix.*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>O. caesia</i> Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. catharinensis</i> Mez*	FOD, FES	VU	VU	ANEXO I
<i>O. cernua</i> (Nees) Mez	FOD	-	-	-
<i>O. citrosmoides</i> (Nees) Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. complicata</i> (Meisn.) Mez	FOD, RST	-	-	-
<i>O. confertiflora</i> (Meisn.) Mez	RST	-	-	-
<i>O. corymbosa</i> (Meisn.) Mez	FOD, FES	-	-	-
<i>O. cryptocarpa</i> Baitello*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>O. curucutuensis</i> Baitello*	FOD	-	-	-
<i>O. daphnifolia</i> (Meisn.) Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. diospyrifolia</i> (Meisn.) Mez	FOD, FES	-	-	-
<i>O. dispersa</i> (Nees & Mart. ex Nees) Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. divaricata</i> (Nees) Mez*	FOD, FES	-	-	-
<i>O. domatiata</i> Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. elegans</i> Mez*	FOD, FES	-	-	-
<i>O. felix</i> Coe-Teix.*	FOD	-	-	-
<i>O. frondosa</i> (Meisn.) Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. glauca</i> (Nees & Mart. ex Nees) Mez	FOD, RST	-	-	-
<i>O. glaziovii</i> Mez	FOD, FES	-	-	-
<i>O. hypoglauca</i> (Nees & Mart. ex Nees) Mez*	FOD, FES	-	-	-
<i>O. indecora</i> (Schott) Mez*	FOD, FES	-	-	-
<i>O. insignis</i> Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. itatiaiae</i> Vattimo-Gil*	FOD	-	-	-
<i>O. kostermanniana</i> Vattimo-Gil*	FOD	-	-	-
<i>O. lanata</i> (Nees & Mart. ex Nees) Mez*	FOD, FES	-	-	-
<i>O. lancifolia</i> (Schott) Mez	FOD, FES	-	-	-
<i>O. langsdorffii</i> (Meisn.) Mez*	FOD, FES, FCA	VU	VU	ANEXO I
<i>O. laxa</i> (Nees) Mez*	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>O. lobbii</i> (Meisn.) Rohwer	FES, FCA, RST	-	-	-
<i>O. longifolia</i> Kunth	FES, FOD	-	-	-
<i>O. microbotrys</i> (Meisn.) Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. minarum</i> (Nees & Mart. ex Nees) Mez	FES	-	-	-
<i>O. montana</i> (Meisn.) Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. nectandrifolia</i> Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. nitida</i> (Meisn.) Rohwer	FOD	-	-	-
<i>O. notata</i> (Nees & Mart. ex Nees) Mez*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>O. nunesiana</i> (Vattimo-Gil) Baitello*	FOD	-	-	-
<i>O. nutans</i> (Nees) Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. odorifera</i> (Vell.) Rohwer*	FOD, FES	-	VU	ANEXO I
<i>O. percoriacea</i> Kosterm.*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>O. pluridomatiata</i> A.Quinet*	FOD	-	-	-
<i>O. polyantha</i> (Nees & Mart.) Mez*	RST	-	-	-
<i>O. porosa</i> (Nees & Mart. ex Nees) Barroso*	FOD, FOM	VU	VU	ANEXO I
<i>O. puberula</i> (Rich.) Nees	FOD, FES	-	-	-
<i>O. pulchella</i> (Nees & Mart. ex Nees) Mez	FOD, FES, RST, FOM	-	-	-
<i>O. pulchra</i> Vattimo-Gil*	FOD	-	-	-
<i>O. sassafra</i> (Meisn.) Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. schwackeana</i> Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. semicompleta</i> (Nees & Mart. ex Nees) Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. serrana</i> Coe-Teix.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>O. silvestris</i> Vattimo-Gil*	FOD, FES	-	-	-
<i>O. spixiana</i> (Nees) Mez	FOD, FES	-	-	-
<i>O. sulcata</i> Vattimo-Gil*	FOD	-	-	-
<i>O. tabacifolia</i> (Meisn.) Rohwer	FOD, FES	-	-	-
<i>O. teleiandra</i> (Meisn.) Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. tenuiflora</i> (Nees) Mez*	FOD, FES	-	-	-
<i>O. tristis</i> (Nees & Mart. ex Nees) Mez	FOD	-	-	-
<i>O. urbaniana</i> Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. vaccinioides</i> (Meisn.) Mez*	FOD	-	-	-
<i>O. velloziana</i> (Meisn.) Mez	FES, FOD	-	-	-
<i>O. velutina</i> (Nees) Rohwer	FES, FOD	-	-	-
<i>O. villosa</i> Kosterm.*	FOD	-	-	-
<i>Persea</i> – 11/200				
<i>P. alba</i> Nees & Mart. ex Nees	FOD	-	-	-
<i>P. aurata</i> Miq.	FOD, RST	-	-	-
<i>P. caesia</i> Meisn.*	FOD	-	-	-
<i>P. fulva</i> Kopp	FOD	-	-	-
<i>P. major</i> Kopp	FOD	-	-	-
<i>P. microphylla</i> Mez*	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. obovata</i> Nees & Mart. ex Nees*	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. punctata</i> Meisn.*	FOD	-	EN	ANEXO I
<i>P. rufotomentosa</i> Nees & Mart. ex Nees	FOD	-	-	-
<i>P. venosa</i> Nees & Mart. ex Nees*	FES, FOD	-	-	-
<i>P. willdenovii</i> Kosterm.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Phyllostemonodaphne</i> * – 1/1				
<i>P. geminiflora</i> (Mez) Kosterm.*	FOD	EN	VU	ANEXO I
<i>Pleurothyrium</i> – 1/40				
<i>P. amplifolium</i> (Mez) Rohwer*	FOD	-	-	-
<i>Rhodostemonodaphne</i> – 3/41				
<i>R. anomala</i> (Mez) Rohwer*	FOD	-	-	-
<i>R. capixabensis</i> Baitello & Coe-Teix.*	FOD	-	EN	ANEXO I
<i>R. macrocalyx</i> (Meisn.) Rohwer ex Madriñán*	FOD	-	-	-
<i>Urbanodendron</i> * – 3/3				
<i>U. bahiense</i> (Meisn.) Rohwer*	FOD, FES	EN	VU	ANEXO II
<i>U. macrophyllum</i> Rohwer*	FOD	EN	EN	ANEXO II
<i>U. verrucosum</i> (Nees) Mez*	FOD	VU	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Williamodendron – 1/4				
W. cinnamomeum Van der Werff*	FOD	-	EN	ANEXO II

Laxmanniaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LAXMANNIACEAE – 25/178				
Cordyline – 1/24				
C. spectabilis Kunth & C.D.Bouché	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-

Lecythidaceae

Nathan P. Smith & Scott A. Mori

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LECYTHIDACEAE – 19/ca. 300				
<i>Cariniana</i> – 4/9				
<i>C. estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	FOD	-	-	-
<i>C. ianeirensis</i> R.Knuth	FOD	EN	-	-
<i>C. legalis</i> (Mart.) Kuntze*	FOD	VU	-	-
<i>C. parvifolia</i> S.A.Mori, Prance & Menandro*	FOD	-	EN	ANEXO I
<i>Couratari</i> – 4/19				
<i>C. asterophora</i> Rizzini*	FOD	CR	-	-
<i>C. asterotricha</i> Prance*	FOD	CR	VU	ANEXO I
<i>C. macrosperma</i> A.C.Sm.	FOD	-	-	-
<i>C. pyramidata</i> (Vell.) Kunth*	FOD	EN	-	-
<i>Eschweilera</i> – 6/86				
<i>E. alvimii</i> S.A.Mori*	FOD	EN	VU	ANEXO II
<i>E. complanata</i> S.A.Mori*	FOD	-	-	-
<i>E. compressa</i> (Vell.) Miers*	FOD	CR	-	-
<i>E. mattos-silvae</i> S.A.Mori*	FOD	-	-	-
<i>E. ovata</i> (Cambess.) Mart. ex Miers	FOD, RST	-	-	-
<i>E. tetrapetala</i> S.A.Mori*	FOD	VU	VU	ANEXO II
<i>Gustavia</i> – 1/40				
<i>G. augusta</i> L.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>Lecythis</i> – 4/26				
<i>L. lanceolata</i> Poir.	FOD	-	-	-
<i>L. lurida</i> (Miers) S.A.Mori	FOD	-	-	-
<i>L. pisonis</i> Cambess.	FOD	-	-	-
<i>L. schwackei</i> (R.Knuth) S.A.Mori	FOD, FCA	VU	-	-

Lentibulariaceae

Cláudia Petean Bove & Paulo Cesar Baleeiro Souza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LENTIBULARIACEAE – 42/ca. 325				
Genlisea – 6/21				
G. aurea A.St.-Hil.	FAQ, FOD, FOM, FAQ, FED	-	-	-
G. filiformis A.St.-Hil.	FAQ, FOD, FES	-	-	-
G. lobata Fromm*	FAQ, FOD, FCA, AFL	-	-	-
G. pigmea A.St.-Hil.	FAQ, FED	-	-	-
G. repens Benj.	FAQ, FOD, FOM, FES	-	-	-
G. violacea A.St.-Hil.	FAQ, FOD, FES, FCA, AFL	-	-	-
Utricularia – 36/ca. 220		-		
U. amethystina Salzm. ex A.St.-Hil. & Girard	FAQ, FOD, FES, FCA	-	-	-
U. breviscapa Wright ex Griseb.	FAQ, FOD, FES	-	-	-
U. cucullata A.St.-Hil. & Girard	FAQ, FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
U. erectiflora A.St.-Hil. & Girard	FAQ, FOD, RST, FCA	-	-	-
U. flaccida A.DC.*	FAQ, FED, RST	-	VU	ANEXO II
U. foliosa L.	FAQ, FOD, FES, RST	-	-	-
U. geminiloba Benj.*	FAQ, FOD, FES	-	-	-
U. gibba L.	FAQ, FOD, FES, RST	-	-	-
U. guyanensis A.DC.	FAQ, FOD, FES	-		
U. hispida Lam.	FAQ, FOD	-	-	-
U. hydrocarpa Vahl	FAQ, FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
U. juncea Vahl.	FAQ, FES, FED	-	-	-
U. laciniata A.St.-Hil & Girard.	FAQ, FES, FCA, AFL	-	-	-
U. laxa A.St.-Hil. & Girard	FAQ, FES, RST	-	-	-
U. longifolia Gardner*	FAQ, FOD, FCA, RST	-	-	-
U. myriocista A.St.-Hil & Girard.	FAQ, FOD, FES, FCA	-	-	-
U. nana A.St.-Hil. & Girard	FAQ, FOD, RST, FCA	-	-	-
U. nelumbifolia Gardner*	FAQ, FOD, FCA, AFL	-	-	-
U. neottioides A. St.–Hil & Girard	FAQ, FCA, AFL	-	-	-
U. nephrophylla Benj.*	FAQ, FOD	-	-	-
U. nervosa G.Weber ex Benj.	FAQ, FOD, FES, FCA	-	-	-
U. nigrescens Sylvén	FAQ, FOD, FES, FCA	-	-	-
U. olivacea C. Wright ex Griseb.	FAQ, FES, RST, FCA	-	-	-
U. platensis Speg.	FAQ, FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>U. poconensis</i> Fromm	FAQ, FES, RST	-	-	-
<i>U. praelonga</i> A.St.-Hil. & Girard	FAQ, FOD, FES, RST	-	-	-
<i>U. pubescens</i> Sm.	FAQ, FOD, FES, AFL	-	-	-
<i>U. pusilla</i> Vahl	FAQ, FOD, FES	-	-	-
<i>U. reniformis</i> A.St.-Hil.*	FAQ, FOD, FES	-	-	-
<i>U. simulans</i> Pilg.	FAQ, FOD, FES	-	-	-
<i>U. subulata</i> L.	FAQ, FOD, FES, FOM, FCA, RST	-	-	-
<i>U. tricolor</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES, FAQ, RST	-	-	-
<i>U. tricophyla</i> Spruce ex Oliv.	FAQ, FES, FCA	-	-	-
<i>U. tridentata</i> Sylven	FAQ, FOD, FES	-	-	-
<i>U. triloba</i> Benj.	FAQ, FOD, FES, FCA,	-	-	-
<i>U. warmingii</i> Kamienski	FAQ, FES	-	-	-

Limnocharitaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LIMNOCHARITACEAE – 5/7				
<i>Hydrocleys</i> – 4/5				
<i>H. martii</i> Seub.	FAQ	-	-	-
<i>H. modesta</i> Pedersen	FAQ	-	-	-
<i>H. nymphoides</i> (Willd.) Buchenau	FAQ	-	-	-
<i>H. parviflora</i> Seub.	FAQ	-	-	-
<i>Limnocharis</i> – 1/2				
<i>L. flava</i> (L.) Buchenau	FAQ	-	-	-

Linaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LINACEAE – 6/250				
Cliococca – 1/1				
C. selaginoides (Lam.) Rogers & Mildner	FCA	-	-	-
Linum – 5/180				
L. brevifolium A.St.-Hil. & Naudin*	FCA	-	-	-
L. carneum A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
L. erigeroides A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
L. littorale A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
L. smithii Mildner*	FCA	-	-	-

Loasaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LOASACEAE – 7/ca. 300				
<i>Aosa</i> – 2/7				
<i>A. parviflora</i> (Schr. <i>ex</i> DC.) Weigend*	FOD	-	-	-
<i>A. uleana</i> (Urb. & Gilg) Weigend*	FOD, FCA	-	-	-
<i>Blumenbachia</i> – 5/ca. 30				
<i>B. catharinensis</i> Urb. & Gilg*	FOD	-	-	-
<i>B. eichleri</i> Urb.*	FOD	-	-	-
<i>B. exalata</i> Weigend*	FOM	-	-	-
<i>B. latifolia</i> Cambess.	FOM, FED, FCA	-	-	-
<i>B. scabra</i> (Miers) Urb.*	FOD, FOM, FCA	-	-	-

Loganiaceae

Elsie Franklin Guimarães & Evelin Andrade Manoel

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LOGANIACEAE - 55/400				
<i>Bonyunia</i> – 1/6				
<i>B. antoniifolia</i> Progel	FCA	-	-	-
<i>Spigelia</i> – 31/57				
<i>S. amplexicaulis</i> E.F.Guim. & Fontella*	FOD	-	-	-
<i>S. anthelmia</i> L.	FCA	-	-	-
<i>S. araucariensis</i> E.F.Guim. & Fontella	FOM	-	-	-
<i>S. australis</i> L.B.Sm.	FOD	-	-	-
<i>S. bahiana</i> L.B.Sm.	FCA	-	-	-
<i>S. beyrichiana</i> Cham. & Schltdl.	FOM	-	-	-
<i>S. blanchetiana</i> A.DC.	FCA	-	-	-
<i>S. catarinensis</i> E.F.Guim. & Fontella	FOD	-	-	-
<i>S. dusenii</i> L.B.Sm.	FOD	-	-	-
<i>S. flemingeana</i> Cham. & Schltdl.	FOM	-	-	-
<i>S. glabrata</i> Mart.	FOD	-	-	-
<i>S. heliotropoides</i> (Pohl) E.F.Guim. & Fontella	FOM	-	-	-
<i>S. insignis</i> Progel	FCA	-	-	-
<i>S. kleinii</i> L.B.Sm.	FOD, FCA	-	-	-
<i>S. laurina</i> Cham. & Schltdl.	RST	-	-	-
<i>S. linarioides</i> DC.	FOD	-	-	-
<i>S. lundiana</i> A.DC.*	FCA, FOD	-	CR	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. macrophylla</i> A.DC.	FOM	-	-	-
<i>S. martiana</i> Cham.	FOD	-	-	-
<i>S. olfersiana</i> Cham. & Schltdl.	FCA, FOD	-	-	-
<i>S. pusilla</i> Mart.	FOM	-	-	-
<i>S. reflexicalyx</i> E.F.Guim. & Fontella	FOM	-	-	-
<i>S. reitzii</i> L.B.Sm.	FCA	-	-	-
<i>S. riparia</i> L.B.Sm.	FOD	-	-	-
<i>S. scabra</i> Cham. & Schltdl.	FOM	-	-	-
<i>S. schlechtendaliana</i> Mart.	FOM	-	-	-
<i>S. sellowiana</i> Cham. & Schltdl.	FOM	-	VU	ANEXO II
<i>S. spartioides</i> Cham.	FCA, FOD	-	-	-
<i>S. stenophylla</i> Progel	FOM	-	-	-
<i>S. tetraptera</i> Taub.	FOM	-	-	-
<i>S. vestita</i> L.B.Sm.*	FOM	-	-	-
<i>Strychnos</i> – 23/200				
<i>S. acuta</i> Progel	FOM	-	-	-
<i>S. alvimiana</i> Krukoff & Barneby*	FOM	-	-	-
<i>S. atlantica</i> Krukoff & Barneby*	FOM	-	-	-
<i>S. bahiensis</i> Krukoff & Barneby	FOM	-	-	-
<i>S. beyrichiana</i> Cham. & Schltdl.	FOD	-	-	-
<i>S. bicolor</i> Progel	FCA	-	-	-
<i>S. brasiliensis</i> Mart.	FOM	-	-	-
<i>S. cerradoensis</i> Krukoff & Barneby	FOD	-	-	-
<i>S. divaricans</i> Ducke	FOM	-	-	-
<i>S. fulvotomentosa</i> Gilg.	FOM	-	-	-
<i>S. gardneri</i> A.DC.	RST, FCA	-	-	-
<i>S. kuhlmannii</i> Ducke*	FOD	-	-	-
<i>S. mattogrossensis</i> S.Moore	FOM	-	-	-
<i>S. nigricans</i> Progel	FOD	-	-	-
<i>S. parviflora</i> Spruce ex Benth.	FOM	-	-	-
<i>S. parvifolia</i> A.DC.	FOD	-	-	-
<i>S. pseudoquina</i> A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
<i>S. recognita</i> Krukoff & Barneby	FOM	-	-	-
<i>S. romeu-belenii</i> Krukoff & Barneby	FOM	-	-	-
<i>S. rubiginosa</i> A.DC.	FCA	-	-	-
<i>S. setosa</i> Krukoff & Barneby	FOM	-	-	-
<i>S. torresiana</i> Krukoff & Monachino	FOM	-	-	-
<i>S. trinervis</i> (Vell.) Mart.	FOD	-	-	-

Loranthaceae

Claudenir Simões Caires

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LORANTHACEAE – 43/264				
Cladocolea – 1/33				
C. alternifolia (Eichl.) Kuijt*	FOD	-	-	-
Ixocactus – 2/7				
I. clandestinus (Mart.) Kuijt*	FOD, RST	-	-	-
I. macrophyllus Kuijt*	FOD	-	-	-
Ligaria – 1/2				
L. cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh.	FOD	-	-	-
Phthirusa – 3/ca. 40				
P. caatingae Rizz.	FED, AFL	-	-	-
P. janeirensis Eichl.*	FOD	-	-	-
P. podoptera (Cham. & Schltdl.) Kuijt	FOD	-	-	-
Psittacanthus – 9/119				
P. bolbocephalus Kuijt	FED	-	-	-
P. brasiliensis (Desr.) G. Don*	FOD	-	-	-
P. dichroos (Mart.) Mart.	RST	-	-	-
P. excrenulatus Rizz.*	FOD	-	-	-
P. hatschbachii Kuijt*	FOD	-	-	-
P. pluricotyledonarius Rizz.*	FOD	-	-	-
P. robustus (Mart.) Mart.	FOD	-	-	-
P. salvadorensis Kuijt*	RST	-	-	-
P. tenellus Kuijt*	FOD	-	-	-
Struthanthus – 25/ca. 60				
S. acuminatus (Ruiz & Pav.) Blume ex Roem. & Schult.	FOD	-	-	-
S. andrastylus Eichl.	FOD	-	-	-
S. armandianus Rizz.	FOD	-	-	-
S. concinnus Mart.	FOD, RST	-	-	-
S. confertus Mart.	FOD	-	-	-
S. cuspidatus (Mart.) Mart.	FOD	-	-	-
S. dorothyi Rizz.*	FOD	-	-	-
S. flexicaulis Mart.	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
S. glomeriflorus Eichl.	FOD	-	-	-
S. involucratus Rizz.	FOD	-	-	-
S. jatibocensis Rizz.	FOD	-	-	-
S. marginatus (Desr.) Blume	FOD	-	-	-
S. maricensis Rizz.*	RST	-	-	-
S. pentamerus Rizz.*	FOD	-	-	-
S. polyrhizus Mart.	FOD, FOM	-	-	-
S. retusus Blume ex Roem. & Schult.	FOD	-	-	-
S. rhyncophyllus Eichl.	FOD	-	-	-
S. salicifolius Mart.	FOD	-	-	-
S. sessiliflorus Kuijt*	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. staphylinus</i> Mart.	FOD	-	-	-
<i>S. syringifolius</i> (Mart.) Mart.	FOD	-	-	-
<i>S. taubataensis</i> Eichl.	FOD	-	-	-
<i>S. tetraquetrus</i> (Mart.) Mart.	FES	-	-	-
<i>S. uraguensis</i> (Hook. & Arn.) G.Don	FOD, RST, MAN	-	-	-
<i>S. vulgaris</i> Mart.	FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>Tripodanthus</i> – 2/3				
<i>T. acutifolius</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	FOM, FES	-	-	-
<i>T. flagellaris</i> (Cham. & Schltdl.) Eichl.	FOD	-	-	-

Lythraceae

Taciana Barbosa Cavalcanti

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
LYTHRACEAE – 57/ca. 600				
<i>Adenaria</i> – 1/6				
<i>A. floribunda</i> Kunth	FES, MAN	-	-	-
<i>Ammannia</i> – 3/ca. 130				
<i>A. auriculata</i> Willd.	FCA, MAN	-	-	-
<i>A. coccinea</i> Rottboell	MAN	-	-	-
<i>A. latifolia</i> L.	RST	-	-	-
<i>Crenea</i> – 1/4				
<i>C. surinamensis</i> (L.f.) Koehne	MAN, RST	-	-	-
<i>Cuphea</i> – 40/ca. 250				
<i>C. acinifolia</i> A.St.-Hil.	AFL, FOD	-	-	-
<i>C. anagalloidea</i> A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
<i>C. antisiphilitica</i> Kunth	FCA, RST	-	-	-
<i>C. aperta</i> Koern.*	FCA, RST	-	-	-
<i>C. arenarioides</i> A.St.-Hil.	FCA, FOD	-	-	-
<i>C. brachiata</i> Koern.	FCA, RST	-	-	-
<i>C. calophylla</i> Cham. & Schltdl.	FOD	-	-	-
<i>C. campylocentra</i> Griseb.*	FCA	-	-	-
<i>C. carthagenensis</i> (Jacq.) J.F.Macbr.	FOD	-	-	-
<i>C. confertiflora</i> A.St.-Hil.	FCA, FOM	-	-	-
<i>C. flava</i> Spreng.	RST	-	-	-
<i>C. fruticosa</i> Spreng.	FCA, FOD, RST	-	-	-
<i>C. glaziovii</i> Koern.	AFL, FOD	-	-	-
<i>C. glutinosa</i> Cham. & Schltdl.	AFL, FCA, FES, FOM	-	-	-
<i>C. ingrata</i> Cham. & Schltdl.	FCA, FOD	-	-	-
<i>C. linarioides</i> Cham. & Schltdl.	FCA, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. lindmaniana</i> Bacig.*	FCA	-	-	-
<i>C. linifolia</i> (A.St.-Hil.) Koehne	FCA, FOM	-	-	-
<i>C. lutescens</i> Koern.	AFL, FCA, FES, RST	-	-	-
<i>C. lysimachioides</i> Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
<i>C. melvilla</i> Lindl.	AFL, FOD	-	-	-
<i>C. micrantha</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>C. organifolia</i> Griseb.	FCA	-	-	-
<i>C. pascuorum</i> Koern.	FCA	-	-	-
<i>C. polymorpha</i> A.St.-Hil.	FCA, FOM	-	-	-
<i>C. polymorphoides</i> Koern.	FES	-	-	-
<i>C. pterosperma</i> Koern.	FCA, FOD	-	-	-
<i>C. racemosa</i> (L.f.) Spreng.	AFL, FCA, FOD, MAN, RST	-	-	-
<i>C. reitzii</i> Lourteig*	FCA, MAN	-	-	-
<i>C. repens</i> Koern.	FCA	-	-	-
<i>C. rubescens</i> Koern.*	FOD	-	-	-
<i>C. santos-limae</i> G.Barroso*	AFL	-	-	-
<i>C. schwackei</i> Koern.*	FCA, AFL, FOD	-	-	-
<i>C. sessiliflora</i> A.St.-Hil.	FES, FOD, FCA	-	-	-
<i>C. sessilifolia</i> Mart.	FES, FOD, FCA, RST	-	-	-
<i>C. strigulosa</i> Kunth	FOD, RST	-	-	-
<i>C. thymoides</i> Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
<i>C. tuberosa</i> Cham. & Schltdl.	FCA, FOM, MAN	-	-	-
<i>C. urbaniana</i> Koern.*	AFL, FCA, FOD, FOM, MAN	-	-	-
<i>C. varia</i> Bacig.*	FCA, FOD, FOM	-	-	-
<i>Diplusodon</i> – 2/ca. 100				
<i>D. villosissimus</i> Pohl	FCA	-	-	-
<i>D. virgatus</i> Pohl	FES	-	-	-
<i>Heimia</i> – 2/5				
<i>H. myrtifolia</i> Cham. & Schltdl.*	FES, FOD	-	-	-
<i>H. salicifolia</i> (Kunth) Link	FOD	-	-	-
<i>Lafoensia</i> – 2/12				
<i>L. nummularifolia</i> A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
<i>L. pacari</i> A.St.-Hil.	FED, FES, FOM	-	-	-
<i>Lythrum</i> – 2/ca. 160				
<i>L. hyssopifolia</i> L.	FCA	-	-	-
<i>L. maritimum</i> Kunth	RST	-	-	-
<i>Pleurophora</i> – 2/13				
<i>P. anomala</i> (A.St.-Hil.) Koehne	FES, RST	-	-	-
<i>P. saccocarpa</i> Koern.*	FCA	-	-	-
<i>Rotala</i> – 2/57				
<i>R. mexicana</i> Cham. & Schltdl.	FAQ, FCA, FOD	-	-	-
<i>R. ramosior</i> (L.) Koehne	FAQ, FCA, FOD	-	-	-

Magnoliaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MAGNOLIACEAE – 2/230				
<i>Magnolia</i> – 2/215				
<i>M. ovata</i> (A.St.-Hil.) Spreng.	FES	-	-	-
<i>M. sellowiana</i> (A.St.-Hil.) Govaerts*	FES, FOD	-	-	-

Malpighiaceae

André Márcio Araujo Amorim

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MALPIGHIACEAE – 154/ca. 1.200				
<i>Alicia</i> – 1/2				
<i>A. anisopetala</i> (A.Juss.) W.R.Anderson	FOD	-	-	-
<i>Amorimia</i> – 3/10				
<i>A. exotropica</i> (Griseb.) W.R.Anderson*	FOD	-	-	-
<i>A. maritima</i> (A.Juss.) W.R.Anderson*	AFL, FOD	-	-	-
<i>A. rigida</i> (A.Juss.) W.R.Anderson	FOD, FES	-	-	-
<i>Banisteriopsis</i> – 12/ca. 70				
<i>B. adenopoda</i> (A.Juss.) B.Gates	FOD, FES	-	-	-
<i>B. basifixa</i> B.Gates*	FOD	-	-	-
<i>B. magdalenensis</i> B.Gates*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>B. membranifolia</i> (A.Juss.) B.Gates	FOD	-	-	-
<i>B. multifoliolata</i> (A.Juss.) B.Gates	FOD	-	-	-
<i>B. muricata</i> (Cav.) Cuatrec.	FES	-	-	-
<i>B. nummifera</i> (A.Juss.) B.Gates	FOD	-	-	-
<i>B. parviflora</i> (A.Juss.) B.Gates*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>B. parviglandula</i> B.Gates	FOD	-	-	-
<i>B. pseudojanusia</i> (Nied.) B.Gates	FOD	-	-	-
<i>B. scutellata</i> (Griseb.) B.Gates*	FOD	-	-	-
<i>B. sellowiana</i> (A.Juss.) B.Gates*	FOD, RST	-	VU	ANEXO II
<i>Barnebya</i> – 1/2				
<i>B. dispar</i> (Griseb.) W.R.Anderson & B.Gates*	FOD	-	-	-
<i>Bronwenia</i> – 2/10				
<i>B. ferruginea</i> (Cav.) W.R.Anderson & C.Cav.Davis	FES	-	-	-
<i>B. peckoltii</i> W.R.Anderson & C.Cav.Davis*	FOD	-	-	-
<i>Bunchosia</i> – 5/ca. 100				
<i>B. acuminata</i> Dobson*	FOD	-	VU	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. itacarensis</i> W.R.Anderson*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>B. macilenta</i> Dobson*	FES	-	-	-
<i>B. maritima</i> (Vell.) J.F.Macbr.*	FOD	-	-	-
<i>B. pernambucana</i> W.R.Anderson*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>Byrsonima</i> – 19/ca. 230				
<i>B. alvimii</i> W.R.Anderson*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>B. bahiana</i> W.R.Anderson*	RST	-	VU	ANEXO II
<i>B. cacaophila</i> W.R.Anderson*	FOD, FES	-	VU	ANEXO II
<i>B. coccolobifolia</i> Kunth	FCA, RST	-	-	-
<i>B. correifolia</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>B. crispa</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>B. fanswawei</i> W.R.Anderson	FOD	-	-	-
<i>B. intermedia</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>B. laevigata</i> (Poir.) DC.	FOD	-	-	-
<i>B. laxiflora</i> Griseb.	FOD	-	-	-
<i>B. ligustrifolia</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>B. microphylla</i> A.Juss.*	RST	-	VU	ANEXO II
<i>B. myricifolia</i> Griseb.	FOD	-	-	-
<i>B. niedenzuiana</i> Skottsb.	FOD, RST	-	-	-
<i>B. oblanceolata</i> Nied.*	FOD	-	-	-
<i>B. pedunculata</i> W.R.Anderson*	FOD	-	-	-
<i>B. perseifolia</i> Griseb.	FOD	-	-	-
<i>B. sericea</i> DC.	FOD, RST	-	-	-
<i>B. stipulacea</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>Callaeum</i> – 1/11				
<i>C. psilophyllum</i> (A.Juss.) D.M.Johnson	AFL, FCA, FES	-	-	-
<i>Carolus</i> – 2/6				
<i>C. chlorocarpus</i> (A.Juss.) W.R.Anderson	FOD, FES	-	-	-
<i>C. renidens</i> (A.Juss.) W.R.Anderson	FOD	-	-	-
<i>Dicella</i> – 2/11				
<i>D. bracteosa</i> (A.Juss.) Griseb.	FOD, FES	-	-	-
<i>D. nucifera</i> Chodat	FOD	-	-	-
<i>Diplopterys</i> – 4/29				
<i>D. carvalhoi</i> W.R.Anderson & C.Cav.Davis*	FOD	-	-	-
<i>D. nigrescens</i> (A.Juss.) W.R.Anderson & C.Cav.Davis*	FOD	-	-	-
<i>D. patula</i> (B.Gates) W.R.Anderson & C.Cav.Davis	FES	-	-	-
<i>D. sepium</i> (A.Juss.) W.R.Anderson & C.Cav.Davis	FES	-	-	-
<i>Galphimia</i> – 2/38				
<i>G. australis</i> Chodat	AFL, FES, RST	-	-	-
<i>G. brasiliensis</i> (L.) A.Juss.	AFL, RST	-	-	-
<i>Heladena</i> – 1/5				
<i>H. multiflora</i> (Hook. & Arn.) Nied.	FOD	-	-	-
<i>Heteropterys</i> – 41/ca. 210				
<i>H. admirabilis</i> Amorim*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>H. alternifolia</i> W.R.Anderson*	RST	-	EN	ANEXO II
<i>H. andersonii</i> Amorim*	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>H. argyrophaea</i> A.Juss.	FES	-	-	-
<i>H. bahiensis</i> Nied.*	FOD, FES	-	-	-
<i>H. banksiifolia</i> Griseb.*	FOD	-	-	-
<i>H. bicolor</i> A.Juss.	FES	-	-	-
<i>H. bullata</i> Amorim*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>H. capixaba</i> Amorim*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>H. chrysophylla</i> (Lam.) DC.*	FOD, RST	-	-	-
<i>H. coleoptera</i> A.Juss.*	FOD, RST	-	-	-
<i>H. conformis</i> W.R.Anderson*	FES	-	VU	ANEXO II
<i>H. cordifolia</i> Moric. ex A.Juss.*	FOD	-	-	-
<i>H. crenulata</i> Mart. ex Griseb.	FES	-	-	-
<i>H. crinigera</i> Griseb.*	FOD	-	-	-
<i>H. fluminensis</i> (Griseb.) W.R.Anderson*	FES, RST	-	-	-
<i>H. fragilis</i> Amorim*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>H. glabra</i> Hook. & Arn.	FOM, FES	-	-	-
<i>H. glazioviana</i> Nied.*	AFL	-	-	-
<i>H. grandiflora</i> A.Juss.	AFL, FOD, FES	-	-	-
<i>H. imperata</i> Amorim*	FOD	-	-	-
<i>H. intermedia</i> (A.Juss.) Griseb.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>H. jardimii</i> Amorim*	FOD	-	-	-
<i>H. leschenaultiana</i> A.Juss.*	FOD	-	-	-
<i>H. lindleyana</i> A.Juss.*	FOD	-	-	-
<i>H. macrostachya</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>H. megaptera</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>H. mulgurae</i> W.R.Anderson	FES	-	-	-
<i>H. nitida</i> (Lam.) DC.*	FOD	-	-	-
<i>H. nordestina</i> Amorim*	FOD, FES	-	-	-
<i>H. oberdanii</i> Amorim*	RST	-	VU	ANEXO II
<i>H. occhionii</i> Amorim	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>H. patens</i> (Griseb.) A.Juss.*	FOD	-	-	-
<i>H. pauciflora</i> A.Juss.*	FOD, FES	-	-	-
<i>H. rufula</i> A.Juss.*	RST	-	-	-
<i>H. sanctorum</i> W.R.Anderson*	FOD, FES	-	VU	ANEXO II
<i>H. sericea</i> (Cav.) A.Juss.	AFL, FOD	-	-	-
<i>H. syringifolia</i> Griseb.	FES	-	-	-
<i>H. ternstroemiifolia</i> A.Juss.*	FOD	-	CR	ANEXO II
<i>H. thyrsoides</i> (Griseb.) A.Juss.*	FOD	-	-	-
<i>H. trigoniifolia</i> A.Juss.	AFL, FOD	-	-	-
<i>Hiraea</i> – 5/ca. 140				
<i>H. bahiensis</i> Moric.*	FOD	-	-	-
<i>H. bullata</i> W.R.Anderson*	FOD	-	-	-
<i>H. cuneata</i> Griseb.	FOD	-	-	-
<i>H. fagifolia</i> (DC.) A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>H. wideana</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>Janusia</i> – 2/16				
<i>J. anisandra</i> (A.Juss.) Griseb.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>J. hexandra</i> (Vell.) W.R.Anderson	FOD	-	-	-
<i>Lophopterys</i> – 1/7				
<i>L. floribunda</i> W.R.Anderson & C.Cav.Davis	AFL, FES	-	-	-
<i>Mascagnia</i> – 5/ca. 120				
<i>M. bierosa</i> (A.Juss.) W.R.Anderson	FOD, FES	-	-	-
<i>M. cordifolia</i> (A.Juss.) Griseb.	FOD	-	-	-
<i>M. divaricata</i> (Kunth) Nied.	FOD	-	-	-
<i>M. sepium</i> (A.Juss.) Griseb.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. velutina</i> C.Anderson	FOD	-	-	-
<i>Mezia</i> – 1/15				
<i>M. araujoi</i> Nied.*	FOD	-	-	-
<i>Niedenzuella</i> – 7/16				
<i>N. acutifolia</i> (Cav.) W.R.Anderson	AFL, FOD, FES	-	-	-
<i>N. glabra</i> (Spreng.) W.R.Anderson	FOD	-	-	-
<i>N. leucosepala</i> (Griseb.) W.R.Anderson	FOD	-	-	-
<i>N. lucida</i> (A.Juss.) W.R.Anderson	FOD	-	-	-
<i>N. mogoriifolia</i> (A.Juss.) W.R.Anderson*	FOD	-	-	-
<i>N. poeppigiana</i> (A.Juss.) W.R.Anderson	FOD	-	-	-
<i>N. sericea</i> (A.Juss.) W.R.Anderson	FOD, FES	-	-	-
<i>Peixotoa</i> – 5/32				
<i>P. catarinensis</i> C.Anderson*	RST	-	VU	ANEXO II
<i>P. hispidula</i> A.Juss.*	FOD, RST	-	-	-
<i>P. jussieuana</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>P. parviflora</i> A.Juss.	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. sericea</i> C.Anderson*	FOD	-	-	-
<i>Stigmaphyllon</i> – 27/ca. 150				
<i>S. acuminatum</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>S. affine</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>S. alternifolium</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>S. angustilobum</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>S. arenicola</i> C.Anderson*	FOD, RST	-	-	-
<i>S. auriculatum</i> (Cav.) A.Juss.	AFL, FED, FES, RST	-	-	-
<i>S. blanchetii</i> C.Anderson*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>S. bonariense</i> (Hook. & Arn.) C.Anderson	FES, FOD	-	-	-
<i>S. bradei</i> C.Anderson	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>S. carautae</i> C.Anderson	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>S. cavernulosum</i> C.Anderson	FES	-	-	-
<i>S. ciliatum</i> (Lam.) A.Juss.	RST	-	-	-
<i>S. crenatum</i> C.Anderson*	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>S. gayanum</i> A.Juss.*	FOD	-	-	-
<i>S. glabrum</i> C.Anderson	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>S. hatschbachii</i> C.Anderson	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>S. hispidum</i> C.Anderson*	FOD	-	-	-
<i>S. jatrophiifolium</i> A.Juss.	FES	-	-	-
<i>S. lalandianum</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>S. macropodum</i> A.Juss.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. paralias</i> A.Juss.	AFL, FCA, RST	-	-	-
<i>S. puberulum</i> Griseb.	FOD	-	-	-
<i>S. rotundifolium</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>S. salzmännii</i> A.Juss.*	FOD	-	-	-
<i>S. saxicola</i> C.Anderson	FES	-	-	-
<i>S. tomentosum</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>S. vitifolium</i> A.Juss.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>Tetrapteryx</i> – 4/ca. 130				
<i>T. anisoptera</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>T. longibracteata</i> A.Juss.	FES	-	-	-
<i>T. mucronata</i> Cav.	FOD, FES	-	-	-
<i>T. phlomoides</i> (Spreng.) Nied.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Thryallis</i> – 1/27				
<i>T. brachystachys</i> Lindl.	RST	-	-	-

Malvaceae

Massimo G. Bovini

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MALVACEAE – 284/2.500				
Abutilon – 27/160				
A. anodoides A.St.-Hil. & Naud.*	FOD, RST	-	CR	ANEXO II
A. appendiculatum K.Schum.*	FOD	-	-	-
A. bedfordianum (Hook.) A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
A. carinatum Krapov.*	FOD	-	-	-
A. clausenii Krapov.*	FOD	-	-	-
A. costicalyx K.Schum.*	FOD	-	-	-
A. esculentum A.St.-Hil.*	RST	-	-	-
A. fluviale (Vell.) K.Schum.*	FOD	-	-	-
A. inaequale (Link & Otto) K.Schum.*	FOD, RST	-	-	-
A. inaequilaterum A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
A. itatiaiae R.E.Fr.*	FOD	-	-	-
A. latipetalum G.L.Esteves & Krapov.*	FOD	-	-	-
A. longifolium K.Schum.*	FOD	-	-	-
A. macranthum A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
A. minarum K.Schum.*	FOD	-	-	-
A. molle Sweet*	FOD	-	-	-
A. nigricans G.L.Esteves & Krapov.*	FOD	-	-	-
A. parviflorum A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
A. pauciflorum A.St.-Hil.	FOD, RST	-	-	-
A. peltatum K.Schum.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. purpurascens</i> K.Schum.*	RST	-	-	-
<i>A. ramiflorum</i> A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
<i>A. regnellii</i> Miq.*	FOD	-	-	-
<i>A. rufinerve</i> A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
<i>A. scabridum</i> K.Schum.*	FOD	-	-	-
<i>A. sellowianum</i> (Klotzsch) Regel*	FOD	-	-	-
<i>A. umbelliflorum</i> A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
<i>Akrosida</i> * – 1/1				
<i>A. macrophylla</i> (Ulbr.) Fryxell & J.Fuertes*	FOD	-	-	-
<i>Apeiba</i> – 2/17				
<i>A. albiflora</i> Ducke	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>A. tibourbou</i> Aubl.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Ayenia</i> – 1/73				
<i>A. tomentosa</i> L.	FOD, RST	-	-	-
<i>Bastardia</i> – 1/4				
<i>B. bivalvis</i> Kunth*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Bastardiopsis</i> – 1/10				
<i>B. densiflora</i> (Hook. & Arn.) Hassl.	FOD	-	-	-
<i>Bombacopsis</i> – 3/26				
<i>B. calophylla</i> (K.Schum.) A.Robyns*	FOD	-	-	-
<i>B. glabra</i> (Pasq.) A.Robyns	FOD	-	-	-
<i>B. stenopetala</i> (Casar.) A.Robyns	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>Briquetia</i> – 1/5				
<i>B. spicata</i> (Kunth) Fryxell	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>Byttneria</i> – 12/130				
<i>B. abutiloides</i> A.St.-Hil. & Naudin*	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. australis</i> A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-
<i>B. beyrichiana</i> K.Schum.*	FOD, RST	-	-	-
<i>B. catalpifolia</i> (A.St.-Hil.) Cristóbal	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>B. gayana</i> A.St.-Hil.*	FOD, RST, AFL	-	-	-
<i>B. gracilipes</i> Decne. ex Baill.	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. hatschbachii</i> Cristóbal*	FOD	-	-	-
<i>B. implacabilis</i> Cristóbal*	FOD	-	-	-
<i>B. sagittifolia</i> A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-
<i>B. scabra</i> L.	FES, FED, AFL	-	-	-
<i>B. triadenia</i> Cristóbal*	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. urticifolia</i> K.Schum.	FOD	-	-	-
<i>Calyculogyas</i> – 1/1				
<i>C. uruguayensis</i> Krapov.	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
<i>Calyptraemalva</i> * – 1/1				
<i>C. catharinensis</i> Krapov.*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>Ceiba</i> – 6/16				
<i>C. crispiflora</i> (Kunth) Ravenna*	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>C. erianthos</i> (Cav.) K.Schum.	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>C. glaziovii</i> (Kuntze) K.Schum.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. pubiflora</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	FOD, FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>C. ventricosa</i> (Nees & Mart.) Ravenna	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Cienfuegosia</i> – 2/27				
<i>C. affinis</i> (Kunth) Hochr.	FOM, FES	-	-	-
<i>C. ituiutabensis</i> Brandão & Laca-Buendia	FOM, FES	-	-	-
<i>Corchorus</i> – 3/30				
<i>C. argutus</i> Kunth*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. hirtus</i> L.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>C. olitorius</i> L.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Cristiana</i> – 2/7				
<i>C. africana</i> DC.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. macrodon</i> Toledo*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
<i>Eriotheca</i> – 7/21				
<i>E. candolleana</i> (K.Schum.) A.Robyns	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>E. dolichopoda</i> A.Robyns*	FOM	-	-	-
<i>E. globosa</i> (Aubl.) A.Robyns	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>E. macrophylla</i> (K.Schum.) A.Robyns*	FOD	-	-	-
<i>E. obcordata</i> A.Robyns & S.Nilsson	FOD, FES	-	-	-
<i>E. pentaphylla</i> (Vell. emend. K.Schum.) A.Robyns*	FOD, RST	-	-	-
<i>E. platyandra</i> A.Robyns*	FES	-	-	-
<i>Gaya</i> – 6/34				
<i>G. aurea</i> A.St.-Hil.*	FOM, FES	-	-	-
<i>G. dominguensis</i> Urb.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>G. gaudichaudiana</i> A.St.-Hil.*	RST	-	-	-
<i>G. gracilipes</i> K.Schum.	FOM, FES	-	-	-
<i>G. guerkeana</i> K.Schum.	FES	-	-	-
<i>G. ibitipocana</i> Krapov.*	FES	-	-	-
<i>Guazuma</i> – 2/4				
<i>G. crinita</i> Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>G. ulmifolia</i> Lam.	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
<i>Helicteres</i> – 10/60				
<i>H. brevispira</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>H. eichleri</i> K.Schum.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>H. heptandra</i> L.B.Sm.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>H. laciniosa</i> Cristóbal*	FOD	-	-	-
<i>H. macropetala</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>H. ovata</i> Lam.*	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>H. pintonis</i> Cristóbal	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>H. sacarolha</i> A.St.-Hil.	FOM, FES, FED	-	-	-
<i>H. velutina</i> K.Schum.	FOM, FES, FED	-	-	-
<i>H. vuaramé</i> Mart.	FOM, FES, FED	-	-	-
<i>Heliocarpus</i> – 1/11				
<i>H. americanus</i> L.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Herissantia</i> – 2/6				
<i>H. crispa</i> Brizicky	FOM, AFL	-	-	-
<i>H. nemoralis</i> (A.St.-Hil.) Brizicky	FOM, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Hibiscus – 6/200				
H. bifurcatus Cav.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
H. diversifolius Jacq.	FOD, RST	-	-	-
H. flagelliformis A.St.-Hil.	FES, FED	-	-	-
H. furcellatus Desr.	FOD, FES, RST	-	-	-
H. kitaibelifolius A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
H. radiatus Cav.	FOD, FES	-	-	-
Hydrogaster* – 1/1				
H. trinervis Kuhlman.*	FOD, FES	-	-	-
Krapovickasia – 3/5				
K. flavescens (Cav.) Fryxell	FOD, FOM, FES	-	-	-
K. macrodon (DC.) Fryxell	FOD, FOM, FES	-	-	-
K. urticifolia (A.St.-Hil.) Fryxell	FOD, FOM, FES	-	-	-
Luehea – 7/20				
L. candicans Mart. & Zucc.	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. conwentzii K.Schum.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. divaricata Mart. & Zucc.	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. grandiflora Mart. & Zucc.	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. ochrophylla Mart.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. paniculata Mart. & Zucc.	FOD, FOM, FES	-	-	-
L. rufescens A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Malvastrum – 3/25				
M. americanum (L.) Torrey	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. coromandelianum (L.) Garcke	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. tomentosum (L.) S.R.Hill	FOD, FOM, FES	-	-	-
Melochia – 4/190				
M. pyramidata L.*	FOD, RST	-	-	-
M. simplex A.St.-Hil.	FOD, FOM	-	-	-
M. spicata (L.) Fryxell	FOD, FES, FCA	-	-	-
M. tomentosa L.	FOD, FES, RST	-	-	-
Monteiroa – 10/10				
M. bullata (Ekman) Krapov.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. catharinensis Krapov.*	FOD, FOM	-	-	-
M. dusenii (Ekman) Krapov.*	FOD, FOM	-	-	-
M. glomerata (Hook. & Arn.) Krapov.	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. hatschbachii Krapov.*	FOD, FOM	-	-	-
M. leitei Monteiro*	FOD	-	-	-
M. ptarmicifolia (A.St.-Hil. & Naudin) Krapov.*	FOD, FOM	-	-	-
M. reitzii Krapov.*	FOD, FOM	-	-	-
M. smithii Krapov.*	FOD	-	-	-
M. triangularifolia Krapov.*	FOD, FOM	-	-	-
Pavonia – 65/250				
P. almasana Ulbr.*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
P. alnifolia A.St.-Hil.*	RST	-	VU	ANEXO I
P. atlantica Fryxell*	FOD	-	-	-
P. blanchetiana Miq.	FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. calyculosa</i> A.St.-Hil.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. cancellata</i> (L.) Cav.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>P. castaneifolia</i> A.St.-Hil.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. cauliflora</i> (Nees) Fryxell*	FOD	-	-	-
<i>P. ciliata</i> G.L.Esteves*	FOD	-	-	-
<i>P. communis</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>P. corymbosa</i> (Sw.) Willd.	FOD	-	-	-
<i>P. cracens</i> Fryxell & G.L.Esteves	FOD, FES, AFL	-	-	-
<i>P. crassipedicellata</i> Krapov.*	FES	-	-	-
<i>P. crispa</i> Krapov.*	FOD	-	-	-
<i>P. distinguenda</i> A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
<i>P. ducke-limae</i> Monteiro*	FOD	-	-	-
<i>P. dusenii</i> Krapov.*	FOD	-	-	-
<i>P. flavispina</i> Miq.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. fruticosa</i> (Mill.) Fawc. & Rendle	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>P. garckeana</i> Gürke	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. geminiflora</i> Moric.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. glazioviana</i> Gürke	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. goetheoides</i> (Hassl.) Fryxell*	FOD	-	-	-
<i>P. gracilis</i> R.E.Fr.	FES	-	-	-
<i>P. guerkeana</i> R.E.Fr.	FOD	-	-	-
<i>P. harleyi</i> Krapov.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. hastata</i> Cav.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. hexaphylla</i> (S.Moore) Krapov.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. horrida</i> Krapov.*	FOD	-	-	-
<i>P. humifusa</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>P. intermedia</i> A.St.-Hil.*	FES	-	-	-
<i>P. kleinii</i> Krapov. & Cristóbal*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. latibracteolata</i> Krapov.*	FOD	-	-	-
<i>P. laxifolia</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. longifolia</i> A.St.-Hil.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. longipedunculata</i> Gürke*	FOD	-	-	-
<i>P. makoyana</i> E.Morren*	FOD	-	-	-
<i>P. malacophylla</i> (Link & Otto) Garcke	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. malvaviscoides</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. martii</i> Colla	FOM, FES	-	-	-
<i>P. montana</i> Garcke ex Gürke	FOM, FES	-	-	-
<i>P. morii</i> Krapov.*	FOD	-	-	-
<i>P. multiflora</i> A.St.-Hil.*	FES	-	-	-
<i>P. nemoralis</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>P. opulifolia</i> S.Moore	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. ovaliphylla</i> G.L.Esteves & Krapov.*	FOD	-	-	-
<i>P. paniculata</i> Cav.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. reticulata</i> Garcke*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. rubriphylla</i> G.L.Esteves*	FOD	-	-	-
<i>P. sagittata</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. sancti</i> Krapov.*	FOD	-	-	-
<i>P. schiedeana</i> Steud.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. schrankii</i> Spreng.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. schwackei</i> Gürke	FOM, FES	-	-	-
<i>P. semiserrata</i> (Schrud.) Steud.*	FOD	-	-	-
<i>P. sepium</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>P. sidifolia</i> Kunth	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>P. spectabilis</i> Krapov.*	FOD	-	-	-
<i>P. spiciformis</i> Krapov.*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>P. spinistipula</i> Gürke	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. stellata</i> (Spreng.) Spreng.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. stipularis</i> Krapov.*	FOD	-	-	-
<i>P. strictiflora</i> (Hook.f.) G.L.Esteves*	FOD	-	-	-
<i>P. tricalycaris</i> A.St.-Hil.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. viscosa</i> A.St.-Hil.*	FOM, FES	-	-	-
<i>Peltaea</i> – 5/17				
<i>P. edouardii</i> (Hochr.) Krapov. & Cristóbal	FOD, FOM, FES, AFL	-	-	-
<i>P. lasiantha</i> Krapov. & Cristóbal	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. obsita</i> (Mart. ex Colla) Krapov. & Cristóbal	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>P. polymorpha</i> (A.St.-Hil.) Krapov. & Cristóbal	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. speciosa</i> (Kunth) Standley	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Pseudabutilon</i> – 2/21				
<i>P. aristulosum</i> (K.Schum.) Krapov.	FES, FED	-	-	-
<i>P. pintoii</i> Monteiro*	FOM, FES	-	-	-
<i>Pseudobombax</i> – 4/22				
<i>P. endecaphyllum</i> (Vell.) A.Robyns*	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>P. grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns*	FOD, RST	-	-	-
<i>P. longiflorum</i> (Mart. & Zucc.) A.Robyns	FOD	-	-	-
<i>P. marginatum</i> (A.St.-Hil. et al.) A.Robyns	FOD, FED	-	-	-
<i>Pterygota</i> – 1/11				
<i>P. brasiliensis</i> Allemão*	FOD, RST	-	-	-
<i>Quararibea</i> – 1/30				
<i>Q. turbinata</i> (Sw.) Poir.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Rhynchosida</i> – 1/1				
<i>R. physocalyx</i> (A.Gray) Fryxell	FOD, FES	-	-	-
<i>Sida</i> – 43/110				
<i>S. acuta</i> Burm.f.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. angustissima</i> A.St.-Hil.	FOD, FED, RST	-	-	-
<i>S. anomala</i> A.St.-Hil.	FOD, RST	-	-	-
<i>S. ascendens</i> A.St.-Hil.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. brittoni</i> Leon	FOD, RST	-	-	-
<i>S. caudata</i> A.St.-Hil. & Naudin*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>S. cearensis</i> Ulbr.	FES	-	-	-
<i>S. chapadensis</i> K.Schum.	FOD, AFL	-	-	-
<i>S. cordifolia</i> L.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>S. galheirensis</i> Ulbr.	FES, FED, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. glaziovii</i> K.Schum.	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>S. glomerata</i> Cav.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. harleyi</i> Krapov.	AFL	-	-	-
<i>S. hatschbachii</i> Krapov.*	FOD	-	-	-
<i>S. honoriana</i> Krapov.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>S. jussiaeana</i> DC.	FOM, FES	-	-	-
<i>S. leitaofilhoi</i> Krapov.*	AFL	-	-	-
<i>S. linifolia</i> Cav.	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>S. lonchitis</i> A.St.-Hil. & Naudin*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. luschnathiana</i> Steud.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>S. martiana</i> A.St.-Hil.	FES	-	-	-
<i>S. multicrena</i> Hochr.*	FOD	-	-	-
<i>S. nemorensis</i> Mart. ex Colla	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>S. petropolitana</i> Monteiro*	FOD	-	-	-
<i>S. planicaulis</i> Cav.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. plumosa</i> Cav.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>S. potentilloides</i> A.St.-Hil.*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. pseudopotentilloides</i> Monteiro	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. pseudorubifolia</i> Krapov. & Bueno	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. regnellii</i> R.E.Fr.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. reitzii</i> Krapov.*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. rhombifolia</i> L.	FOD, FOM, FES, FED, RST, RUD	-	-	-
<i>S. salviifolia</i> C.Presl	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. salzmännii</i> Monteiro	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>S. sampaiana</i> Monteiro*	FOD	-	-	-
<i>S. santaremensis</i> Monteiro	FOD, RST	-	-	-
<i>S. schumanniana</i> Krapov.*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. spinosa</i> L.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. tomentella</i> Miq.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. tuberculata</i> R.E.Fr.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. ulmifolia</i> Mill.	FOD	-	-	-
<i>S. urens</i> L.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>S. viarum</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>Sidastrum</i> – 3/8				
<i>S. micranthum</i> (A.St.-Hil.) Fryxell	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>S. multiflorum</i> (Jacq.) Fryxell	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>S. paniculatum</i> (L.) Fryxell	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>Spirotheca</i> – 1/11				
<i>S. rivieri</i> (Decne.) Ulbr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Sterculia</i> – 1/300				
<i>S. curiosa</i> (Vell.) Taroda*	FOD	-	-	-
<i>Talipariti</i> – 1/22				
<i>T. tiliaceum</i> (L.) Fryxell	MAN	-	-	-
<i>Triumfetta</i> – 7/45				
<i>T. abutiloides</i> A.St.-Hil.	FOD, RST	-	-	-
<i>T. altheoides</i> Lam.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>T. bartramia</i> L.	FOD	-	-	-
<i>T. bogotensis</i> DC.	FOD, FOM	-	-	-
<i>T. grandiflora</i> Vahl	FOD, FOM	-	-	-
<i>T. obscura</i> A.St.-Hil.	FOM, FOM, RST	-	-	-
<i>T. semitriloba</i> Jacq.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>Tropidococcus</i> * – 1/1				
<i>T. pinnatipartitus</i> (A.St.-Hil. & Naudin) Krapov.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Urena</i> – 1/8				
<i>U. lobata</i> L.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>Waltheria</i> – 13/60				
<i>W. americana</i> L.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>W. aspera</i> K.Schum.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>W. bracteosa</i> A.St.-Hil. & Naudin	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>W. cinerascens</i> A.St.-Hil.	FOD, FES, AFL	-	-	-
<i>W. communis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>W. douradinha</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM	-	-	-
<i>W. ferruginea</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>W. glazioviana</i> K.Schum.	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>W. indica</i> L.	FOD, FOM, FES, RST, RUD	-	-	-
<i>W. macropoda</i> Turcz.*	FOD, FED, AFL	-	-	-
<i>W. maritima</i> A.St.-Hil.*	RST	-	-	-
<i>W. petiolata</i> K.Schum.*	FOD, RST	-	-	-
<i>W. viscosissima</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM, AFL, RST	-	-	-
<i>Wissadula</i> – 8/28				
<i>W. amplissima</i> (L.) R.E.Fr.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>W. caribea</i> (DC.) Bovini	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>W. contracta</i> (Link) R.E.Fr.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>W. excelsior</i> (Cav.) C.Presl	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>W. glechomifolia</i> (A.St.-Hil.) R.E.Fr.*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>W. hernandioides</i> (L.Hér.) Garcke	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>W. parviflora</i> (A.St.-Hil.) R.E.Fr.*	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>W. periplocifolia</i> (L.) C.Presl ex Thwaites	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-

Marantaceae

João Marcelo Alvarenga Braga

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MARANTACEAE – 90/ca. 530				
<i>Calathea</i> – 37/ca. 300				
<i>C. aemula</i> Körn.*	FOD	-	-	-
<i>C. amplissima</i> Petersen*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. annae</i> H.Kenn. & J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-
<i>C. arrabidae</i> Körn.*	FOD	-	-	-
<i>C. brasiliensis</i> Körn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. burle-marxii</i> H.Kenn.*	FOD	-	-	-
<i>C. colorata</i> (Körn.) Benth.*	FOD	-	-	-
<i>C. crocata</i> E.Morren & Joriss.	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. cylindrica</i> (Roscoe) K.Schum.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. dryadica</i> J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-
<i>C. eichleri</i> Petersen	FOD, FES	-	-	-
<i>C. fasciata</i> (Linden ex K.Koch) Regel & Körn.*	FOD	-	-	-
<i>C. fatimae</i> H.Kenn. & J.M.A.Braga*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>C. glazioui</i> Körn.*	FOD	-	-	-
<i>C. grandiflora</i> (Roscoe) K.Schum.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. graziellae</i> H.Kenn. & J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-
<i>C. joffilyana</i> J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-
<i>C. longibracteata</i> (Sweet) Lindl.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. makoyana</i> E.Morren & Joriss.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. monophylla</i> (Vell.) Körn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. oblonga</i> (Mart.) Körn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. orbifolia</i> (Linden) H.Kenn.*	FOD	-	-	-
<i>C. prolifera</i> (Vell.) J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-
<i>C. reginae</i> J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-
<i>C. rufibarba</i> Fenzl*	FOD	-	-	-
<i>C. sciuroides</i> Petersen*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. sellowii</i> Körn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. singularis</i> H.Kenn.*	FES	-	-	-
<i>C. sphaerocephala</i> K.Schum.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. truncata</i> (Link) K.Schum.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. tuberosa</i> (Vell.) Körn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. umbrosa</i> Körn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. vaginata</i> Petersen*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. violacea</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>C. widgrenii</i> Körn.*	FOD	-	-	-
<i>C. wiotii</i> (E.Morren) Regel*	FOD	-	-	-
<i>C. zebrina</i> (Sims) Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>Ctenanthe</i> – 12/ca.13				
<i>C. burle-marxii</i> Kennedy*	FOD	-	-	-
<i>C. casupoides</i> Petersen*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. compressa</i> (A.Dietr.) Eichler	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. glabra</i> (Körn.) Eichler	FOD, FES	-	-	-
<i>C. kummeriana</i> (E.Morren) Eichler*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. lanceolata</i> Petersen*	FOD	-	-	-
<i>C. lubbersiana</i> (E.Morren) Eichler*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. luschnathiana</i> (Regel & Körn.) Eichler	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>C. marantifolia</i> (Vell.) J.M.A.Braga & H.Gomes*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. muelleri</i> Petersen*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. oppenheimiana</i> (E.Morren) K.Schum.*	FOD	-	-	-
<i>C. setosa</i> (Roscoe) Eichler	FOD, FES	-	-	-
<i>Ischnosiphon</i> – 3/ca. 35				
<i>I. bahiensis</i> L.Andersson*	FOD	-	-	-
<i>I. gracilis</i> (Rudge) Körn.	FOD, FED	-	-	-
<i>I. ovatus</i> Körn.*	FOD	-	-	-
<i>Maranta</i> – 20/ca. 34				
<i>M. anderssoniana</i> Yosh.-Arns <i>et al.</i>	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>M. bicolor</i> Ker Gawl.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. burchellii</i> K.Schum.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. cordata</i> Körn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. divaricata</i> Roscoe*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. foliosa</i> Körn.*	FOD	-	-	-
<i>M. hatschbachiana</i> Yosh.-Arns <i>et al.</i>	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>M. incrassata</i> L.Andersson	FOD, FES	-	-	-
<i>M. leuconeura</i> E.Morren	FOD, FES	-	-	-
<i>M. lindmanii</i> L.Andersson*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. noctiflora</i> Regel & Körn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. parviflora</i> Petersen	FOD, FES	-	-	-
<i>M. phrynioides</i> Körn.	FES	-	-	-
<i>M. pluriflora</i> (Petersen) K.Schum.	FES, FED	-	-	-
<i>M. protracta</i> Miq.	FOD	-	-	-
<i>M. rupicola</i> L.Andersson	FOD FES	-	-	-
<i>M. sobolifera</i> L.Andersson	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. subterranea</i> J.M.A.Braga*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. tuberculata</i> L.Andersson*	FES	-	-	-
<i>M. zingiberina</i> L.Andersson	FES, FED	-	EN	ANEXO II
<i>Monotagma</i> – 1/ca. 20				
<i>M. plurispicatum</i> (Körn.) K.Schum.	FOD, FES	-	-	-
<i>Myrosma</i> – 1/1				
<i>M. cannifolia</i> L.f.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Saranthe</i> * – 7/7				
<i>S. composita</i> (Link) K.Schum.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. eichleri</i> Petersen*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. gladioli</i> (Jakob-Makoy) K.Schum.*	FOD	-	-	-
<i>S. glumacea</i> (van Houtte) K.Schum.*	FOD	-	-	-
<i>S. klotzschiana</i> (Körn.) Eichler*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. lennartiana</i> J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-
<i>S. leptostachya</i> (Regel & Körn.) Eichler*	FOD, FES	-	-	-
<i>Stromanthe</i> – 7/ca. 17				
<i>S. glabra</i> Yosh.-Arns	FOD, FES	-	-	-
<i>S. papilosa</i> Petersen*	FOD	-	-	-
<i>S. porteana</i> Gris*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. schottiana</i> (Körn.) Eichler*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. sellowiana</i> K.Schum.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. thalia</i> (Vell.) J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. tonckat</i> (Aubl.) Eichler	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>Thalia</i> – 2/7				
<i>T. densibracteata</i> Petersen	FOD, FES, FED, FAQ	-	-	-
<i>T. geniculata</i> L.	FOD, FOM, FES, FED, FAQ	-	-	-

Marcgraviaceae

Luciana H. Yoshino Kamino & Rafaella Cardoso Ribeiro

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MARCGRAVIACEAE – 11/ca. 260				
<i>Marcgravia</i> – 3/ca. 100				
<i>M. comosa</i> C.Presl*	FOD	-	-	-
<i>M. polyantha</i> Delpino*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. umbellata</i> L.	AFL	-	-	-
<i>Marcgraviastrum</i> – 2/14				
<i>M. cuneifolium</i> (Gardner) Bedell *	FOD	-	-	-
<i>M. delpinianum</i> (Wittm.) Gir.-Cañas*	FOD	-	-	-
<i>Norantea</i> – 2/49				
<i>N. bahiensis</i> Mart. ex Wittm.	RST	-	-	-
<i>N. guianensis</i> Aubl.	FCA, FES, AFL	-	-	-
<i>Schwartzia</i> – 3/19				
<i>S. adamantinum</i> (Cambess.) Bedell ex Gir.-Cañas	AFL	-	-	-
<i>S. brasiliensis</i> (Choisy) Bedell ex Gir.-Cañas*	FOD, FES, RST, MAN	-	-	-
<i>S. jucuiensis</i> Gir.-Cañas*	FOD, AFL	-	-	-
<i>Souroubea</i> – 1/28				
<i>S. guianensis</i> Aubl.	FOD, FES, RST	-	-	-

Martyniaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MARTYNIACEAE – 2/15				
<i>Craniolaria</i> – 1/3				
<i>C. integrifolia</i> Cham.	FCA	-	-	-
<i>Ibicella</i> – 1/3				
<i>I. lutea</i> (Lindl.) van Eselt.	FCA	-	-	-

Mayacaceae

Rafaella Cardoso Ribeiro

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MAYACACEAE – 2/5				
<i>Mayaca</i> – 2/5				
<i>M. fluviatilis</i> Aubl.	RST, FAQ	-	-	-
<i>M. sellowiana</i> Kunth	RST, FAQ	-	-	-

Melastomataceae

Renato Goldenberg, Paulo José F. Guimarães, Ricardo Kriebel
& Rosana Romero

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MELASTOMATACEAE – 571/4.570				
<i>Aciotis</i> – 5/13				
<i>A. indecora</i> (Bonpl.) Triana	FOD	-	-	-
<i>A. ornata</i> (Miq.) Gleason	FOD	-	-	-
<i>A. paludosa</i> (DC.) Triana*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. rubricaulis</i> (DC.) Triana	FOD	-	-	-
<i>A. viscida</i> (Benth.) Freire-Fierro	FOD	-	-	-
<i>Acisanthera</i> – 2/17				
<i>A. bivalvis</i> (Aubl.) Cogn.	FCA, RST	-	-	-
<i>A. quadrata</i> Pers.	FCA, RST	-	-	-
<i>Adelobothrys</i> – 1/31				
<i>A. atlântica</i> Schulman*	FOD			
<i>Behuria</i> * – 12/12				
<i>B. comosa</i> Tavares <i>et al.</i> *	AFL	-	-	-
<i>B. cordifolia</i> Cogn.*	AFL	-	-	-
<i>B. corymbosa</i> Cogn.*	AFL	-	-	-
<i>B. edmundoi</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>B. glazioviana</i> Cogn.*	?	-	-	-
<i>B. glutinosa</i> Cogn.*	FCA (?)	-	-	-
<i>B. huberioides</i> Brade*	AFL	-	-	-
<i>B. insignis</i> Cham.*	FOD	-	-	-
<i>B. limae</i> Brade*	AFL	-	-	-
<i>B. mourae</i> Cogn.*	AFL	-	-	-
<i>B. parvifolia</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>B. souzalimae</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>Benevidesia</i> * – 2/2				
<i>B. magdalenensis</i> Brade*	AFL	-	-	-
<i>B. organensis</i> Saldanha <i>ex</i> Cogn. *	AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Bertolonia – 16/18				
B. acuminata Gardner*	FOD	-	-	-
B. angustifolia Cogn.*	FOD	-	-	-
B. carmoi Baumgratz*	FOD	-	-	-
B. formosa Brade*	FOD	-	-	-
B. foveolata Brade*	FOD	-	-	-
B. grazielae Baumgratz*	FOD	-	-	-
B. hoehneana Brade*	FOD	-	-	-
B. leuzeana (Bonpl.) DC.*	FOD	-	-	-
B. maculata DC.*	FOD	-	-	-
B. marmorata (Naudin) Naudin*	FOD	-	-	-
B. mosenii Cogn.*	FOD	-	-	-
B. nymphaeifolia Raddi*	FOD	-	-	-
B. paranaensis (Wurdack) Baumgratz*	FOD	-	-	-
B. sanguinea Saldanha ex Cogn.*	FOD	-	-	-
B. valenteana Baumgratz*	FOD	-	-	-
B. wurdackiana Baumgratz*	FOD	-	-	-
Bisglaziovia* – 1/1				
B. behurioides Cogn.*	FOM (?)	-	-	-
Cambessedesia – 3/21				
C. eichlerii Cogn.*	AFL	-	VU	ANEXO II
C. espora DC.	AFL, FCA	-	-	-
C. hilariana (Kunth.) DC.	FCA	-	-	-
Chaetostoma – 5/11				
C. albiflorum (Naudin) Kosch & A.B.Martins	AFL	-	-	-
C. armatum (Spreng.) Cogn.	AFL	-	-	-
C. fastigiatum Naudin	AFL	-	VU	ANEXO II
C. glaziovii Cogn.	AFL	-	-	-
C. inerme Naudin	AFL	-	-	-
Clidemia – 10/120				
C. atrata Spring*	FOD	-	-	-
C. biserrata DC.	FES	-	-	-
C. blepharodes DC.*	FOD	-	-	-
C. capilliflora (Naudin) Cogn.*	FOD	-	-	-
C. capitellata (Bonpl.) D.Don	FOD	-	-	-
C. debilis Crueger	FOD	-	-	-
C. dentata D.Don	FOD	-	-	-
C. hirta (L.) D.Don	FOD, FES, RST	-	-	-
C. parasitica Triana*	FOD	-	-	-
C. urceolata DC.	FOD, RST	-	-	-
Conostegia – 1/43				
C. icosandra (Sw.) Urb.	FOD	-	-	-
Desmoscelis – 1/1				
D. villosa (Aubl.) Naudin	FCA	-	-	-
Dolichoura* – 2/2				
D. kollmannii R.Goldenb. & Tavares*	AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>D. spiritusantensis</i> Brade*	FOM	-	VU	ANEXO II
<i>Eriocnema</i> * – 2/2				
<i>E. acaulis</i> Triana*	FES	-	VU	ANEXO I
<i>E. fulva</i> Naudin*	FES	-	EN	ANEXO I
<i>Fritzschia</i> – 1/1				
<i>F. erecta</i> Cham.	FCA	-	-	-
<i>Graffenrieda</i> – 2/44				
<i>G. intermedia</i> Triana	FOD	-	-	-
<i>G. weddellii</i> Naudin	FES	-	-	-
<i>Henriettea</i> – 4/13				
<i>H. glazioviana</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>H. gomesii</i> Brade*	RST	-	-	-
<i>H. saldanhae</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>H. succosa</i> (Aubl.) DC.	FOD	-	-	-
<i>Henriettella</i> – 2/51				
<i>H. glabra</i> (Vell.) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>H. glazioviana</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>Huberia</i> – 10/16				
<i>H. carvalhoana</i> Baumgratz*	RST	-	-	-
<i>H. consimilis</i> Baumgratz	FOD, FES	-	-	-
<i>H. espiritosantensis</i> Baumgratz*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>H. glazioviana</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>H. minor</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>H. nettoana</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>H. ovalifolia</i> DC.*	FOD, RST	-	-	-
<i>H. parvifolia</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>H. semiserrata</i> DC.*	FOD, RST	-	-	-
<i>H. triplinervis</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>Itatiaia</i> * – 1/1				
<i>I. cleistopetala</i> (Ule) Ule*	FCA	-	-	-
<i>Lavoisiera</i> – 3/46				
<i>L. bicolor</i> Naudin	AFL	-	-	-
<i>L. imbricata</i> Cham.	AFL, FCA	-	-	-
<i>L. pulchella</i> Cham.	AFL, FCA	-	-	-
<i>Leandra</i> – 149/250				
<i>L. acuminata</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. acutiflora</i> (Naudin) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. alpestris</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. amplexicaulis</i> DC.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. aptera</i> Cogn.	?	-	-	-
<i>L. aspera</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. atrata</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. atroviridis</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. attenuata</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. aurea</i> (Cham.) Cogn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>L. australis</i> (Cham.) Cogn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>L. balduinii</i> Brade*	FOM	-	-	-
<i>L. barbinervis</i> (Triana) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. bergiana</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. blanchetiana</i> Cogn.	FES	-	-	-
<i>L. brackenridgei</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. breviflora</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. calvescens</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. carassana</i> (DC.) Cogn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>L. catharinensis</i> Cogn.*	FOM	-	-	-
<i>L. chaetocalyx</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. circumscissa</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. clidemioides</i> (Naudin) Wurdack	FOD	-	-	-
<i>L. collina</i> Wurdack*	FOD	-	-	-
<i>L. confusa</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. cordifolia</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. cordigera</i> (Triana) Cogn.*	FOD, FOM, AFL	-	-	-
<i>L. cuneata</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. dasytricha</i> Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. debilis</i> Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. dentata</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. depauperata</i> Cogn. ex Kuntze*	FOD	-	-	-
<i>L. diffusa</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. dispar</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. dubia</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>L. echinata</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. eichlerii</i> Cogn.	FOM, FES	-	-	-
<i>L. eriocalyx</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. erostrata</i> (DC.) Cogn.	FOM, FOD	-	-	-
<i>L. euphorbioides</i> (Naudin) M.L.D.R.Souza & Baumgratz*	FCA	-	-	-
<i>L. fallacissima</i> Markgr.*	FOD	-	-	-
<i>L. fallax</i> (Cham.) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. flavescens</i> Cogn.*	?	-	-	-
<i>L. fluminensis</i> Cogn.	?	-	-	-
<i>L. foveolata</i> (DC.) Cogn.	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. fragilis</i> Cogn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>L. freyreissii</i> Cogn.*	?	-	-	-
<i>L. gardneriana</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. glabrata</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. glazioviana</i> Cogn.	FOD	-	-	-
<i>L. gracilis</i> Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. grayana</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. hatschbachii</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>L. hermogenesii</i> Baumgratz & M.L.D.R.Souza*	FOD	-	-	-
<i>L. hirta</i> Raddi*	FOD	-	-	-
<i>L. hirtella</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. humilis</i> (Cogn.) Wurdack*	FOD, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>L. involucrata</i> DC.*	?	-	-	-
<i>L. ionopogon</i> (Mart.) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. itatiaiae</i> (Wawra) Cogn.*	FOD, AFL	-	-	-
<i>L. kleinii</i> Brade*	FOM	-	-	-
<i>L. laevigata</i> (Triana) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. lancifolia</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. lapae</i> M.L.D.R.Souza & Baumgratz*	FOD	-	-	-
<i>L. laxa</i> Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. limbata</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. longisetosa</i> Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. longistyla</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. luctatoris</i> Wurdack*	AFL	-	-	-
<i>L. lutea</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. macropora</i> Cogn.*	FOM	-	-	-
<i>L. macrosepala</i> Ule*	FOD	-	-	-
<i>L. magdalenensis</i> Brade*	FOM	-	-	-
<i>L. markgrafii</i> Brade*	?	-	-	-
<i>L. mattosii</i> Baumgratz & M.L.D.R.Souza*	FOD	-	-	-
<i>L. melastomoides</i> Raddi*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>L. miconiastrum</i> Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. microphylla</i> Cogn.	AFL	-	-	-
<i>L. mollis</i> Cogn.*	?	-	-	-
<i>L. mosenii</i> Cogn.*	?	-	-	-
<i>L. mourae</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. multiplinervis</i> (Naudin) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. multisetosa</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. navicularis</i> Brade*	FOM	-	-	-
<i>L. neglecta</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>L. neurotricha</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. nianga</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. niangiformis</i> Cogn.*	?	-	-	-
<i>L. niederleinii</i> Cogn.	?	-	-	-
<i>L. nutans</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. oblongifolia</i> Cogn.*	?	-	-	-
<i>L. opaca</i> Brade*	FOM	-	-	-
<i>L. organensis</i> Cogn.*	?	-	-	-
<i>L. pallida</i> Cogn.*	FOD, AFL	-	-	-
<i>L. paulina</i> DC.*	?	-	-	-
<i>L. pectinata</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. pennipilis</i> Cogn.*	AFL	-	-	-
<i>L. pilonensis</i> Wurdack*	FOD	-	-	-
<i>L. planifilamentosa</i> Brade*	FOM	-	-	-
<i>L. polystachya</i> (Naudin) Cogn.	FOM	-	-	-
<i>L. pubescens</i> Cogn.*	FOM	-	-	-
<i>L. purpurascens</i> Cogn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>L. purpureovillosa</i> Hoehne*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>L. quinqueidentata</i> (DC.) Cogn.	FOD	-	-	-
<i>L. quinquenodis</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. ramboi</i> Brade*	FOM	-	-	-
<i>L. refracta</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. regnellii</i> (Triana) Cogn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>L. reitzii</i> Wurdack*	FOD	-	-	-
<i>L. reversa</i> (DC.) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. rhamnifolia</i> (Naudin) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. ribesiaeflora</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. riograndensis</i> (Brade) Wurdack*	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. rubida</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. rufescens</i> (DC.) Cogn.	FOD	-	-	-
<i>L. sabiaensis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>L. saldanhae</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. salicina</i> (DC.) Cogn.	FOM, FES, FOD	-	-	-
<i>L. santos-limae</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>L. schwackei</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. sericea</i> DC.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>L. sessiliflora</i> Cogn.*	?	-	-	-
<i>L. sparsisetulosa</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>L. sphaerocarpa</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. strigilliflora</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. sulfurea</i> Cogn.*	FOD, AFL	-	-	-
<i>L. sylvatica</i> Cogn.*	?	-	-	-
<i>L. sylvestris</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>L. tetragona</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. tetraquetra</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. therezopolitana</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. thyrsiflora</i> Markgr.*	FOD	-	-	-
<i>L. tomentosa</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. trauninensis</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. tristis</i> Cogn.*	?	-	-	-
<i>L. truncata</i> Baumgratz & M.L.D.R.Souza*	FOD	-	-	-
<i>L. ulaei</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. uliginosa</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>L. umbellata</i> DC.*	FOD, FES	-	-	-
<i>L. urbaniana</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. urophylla</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. variabilis</i> Raddi*	FOD	-	-	-
<i>L. velutina</i> Cogn.*	?	-	-	-
<i>L. vesiculosa</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>L. viridiflora</i> Brade*	?	-	-	-
<i>L. xanthocoma</i> Cogn.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>L. xantholasia</i> Cogn.	FOD	-	-	-
<i>L. xanthopogon</i> Cogn.*	?	-	-	-
<i>L. xanthostachya</i> Cogn.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Marcetia – 2/27				
M. ericoides (Spreng.) Berg ex Cogn.	RST	-	-	-
M. taxifolia (A.St.-Hil.) DC.	AFL, FCA	-	-	-
Meriania – 13/74				
M. callophylla (Cham.) Triana*	FOD	-	-	-
M. calyptrata (Naudin) Triana*	FOD	-	-	-
M. clausenii (Naudin) Triana*	FOD	-	-	-
M. dentata Cogn.*	FOD	-	-	-
M. excelsa (Gardner) Cogn.*	FOD	-	-	-
M. glabra (DC.) Triana*	FOD	-	-	-
M. glazioviana Cogn.*	?	-	-	-
M. longipes Triana*	?	-	-	-
M. paniculata (DC.) Triana*	FOD	-	-	-
M. pergamentacea Cogn.*	FOD	-	-	-
M. robusta Cogn.*	FOD	-	-	-
M. sanchezii R.Goldenb.*	FOD	-	-	-
M. tetramera Wurdack*	FOD	-	-	-
Merianthera* – 2/2				
M. burlemarxii Wurdack*	AFL	-	CR	ANEXO I
M. pulchra Kuhlm.*	AFL	-	-	-
Miconia – 115/1.050				
M. affinis DC.	FES	-	-	-
M. albicans (Sw.) Triana	FES, FOD	-	-	-
M. altissima Cogn.*	FOD	-	-	-
M. amacurensis Wurdack	FOD	-	-	-
M. amoena Triana*	FOD, RST	-	-	-
M. argyraea Cogn.*	FOD	-	-	-
M. augusti Cogn.*	FOD	-	-	-
M. baumgratziana R.Goldenb. & C.V.Martin *	FOD	-	-	-
M. brasiliensis (Spreng.) Triana*	FOD	-	-	-
M. brunnea DC.*	FOD	-	-	-
M. budlejoides Triana*	FOD, FES	-	-	-
M. cabussu Hoehne*	FOD	-	-	-
M. calvescens DC.	FOD, FES	-	-	-
M. capixaba R.Goldenb.*	FOD	-	VU	ANEXO II
M. castaneiflora Naudin*	FOD	-	-	-
M. caudigera DC.	FOD	-	-	-
M. centrodesma Naudin	FOD	-	-	-
M. chamissois Naudin	FOD, FES	-	-	-
M. chartacea Triana	FOD	-	-	-
M. ciliata (Rich.) DC.	FOD	-	-	-
M. cinerascens Miq.*	FOD, FOM	-	-	-
M. cinerea Cogn.*	FOD	-	-	-
M. cinnamomifolia (DC.) Naudin*	FOD	-	-	-
M. collatata Wurdack	FOD, FES, FOM	-	-	-
M. compressa Naudin*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. cubatanensis</i> Hoehne	FOD	-	-	-
<i>M. cuspidata</i> Naudin	FOD	-	-	-
<i>M. cyathanthera</i> Triana	AFL, FCA	-	-	-
<i>M. depauperata</i> Gardner*	FOD	-	-	-
<i>M. dichroa</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. discolor</i> DC.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. divaricata</i> Gardner*	FOD	-	-	-
<i>M. dodecandra</i> (Desr.) Cogn.	FOD	-	-	-
<i>M. doriana</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. eichleri</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. elaeodendron</i> (DC.) Naudin*	FOD	-	-	-
<i>M. elegans</i> Cogn.	FES	-	-	-
<i>M. fasciculata</i> Gardner*	FOD	-	-	-
<i>M. flammea</i> Casar.*	FOD	-	-	-
<i>M. fluminensis</i> Ule*	FOD	-	-	-
<i>M. formosa</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. gigantea</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. gilva</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. glazioviana</i> Cogn.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>M. hirtella</i> Cogn.	FOD	-	-	-
<i>M. holosericea</i> (L.) DC.	FOD	-	-	-
<i>M. hyemalis</i> A.St.-Hil. & Naudin	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. hypoleuca</i> (Benth.) Triana	FOD	-	-	-
<i>M. ibaguensis</i> (Bonpl.) Triana	RST, FOD, FES	-	-	-
<i>M. inaequidens</i> (DC.) Naudin*	FOD	-	-	-
<i>M. inconspicua</i> Miq.*	FOD	-	-	-
<i>M. jucunda</i> (DC.) Triana*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. klotzschii</i> Triana*	FOD	-	-	-
<i>M. kollmannii</i> R.Goldenb. & Reginato*	FOM	-	-	-
<i>M. kriegeiriana</i> Baumgratz & Chaves.*	FOD	-	-	-
<i>M. labiakiana</i> R.Goldenb. & C.V.Martin*	FOD	-	-	-
<i>M. laeta</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. lagunensis</i> Ule*	FOD	-	-	-
<i>M. langsdorffii</i> Cogn.	FES	-	-	-
<i>M. latecrenata</i> (DC.) Naudin*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. lepidota</i> DC.	FOD	-	-	-
<i>M. ligustroides</i> (DC.) Naudin	FOD, FES	-	-	-
<i>M. longicuspis</i> Cogn.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>M. lurida</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. lymanii</i> Wurdack*	FOD	-	-	-
<i>M. mellina</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>M. mendoncae</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. minutiflora</i> (Bonpl.) DC.	FOD	-	-	-
<i>M. mirabilis</i> (Aubl.) L.O.Williams	FOD	-	-	-
<i>M. molesta</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. mourae</i> Cogn.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. multinervia</i> Cogn.*	FES	-	-	-
<i>M. nervosa</i> (Sm.) Triana	FOD	-	-	-
<i>M. oblongifolia</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. octopetala</i> Cogn.	FOD	-	-	-
<i>M. organensis</i> Gardner*	FOD	-	-	-
<i>M. ovalifolia</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. ovata</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. paniculata</i> (DC.) Naudin*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. penduliflora</i> Cogn.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>M. petroniana</i> Cogn. & Saldanha*	FOD, FES	-	VU	ANEXO II
<i>M. petropolitana</i> Cogn.*	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>M. picinguabensis</i> R.Goldenb.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>M. pileata</i> DC.	?	-	-	-
<i>M. polyandra</i> Gardner*	FOD	-	-	-
<i>M. prasina</i> (Sw.) DC.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. pseudoeichleri</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. pseudonervosa</i> Cogn.	FES	-	-	-
<i>M. pulchra</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. pusilliflora</i> (DC.) Naudin	FOD, FES, FOM, RST	-	-	-
<i>M. pyrifolia</i> Naudin	FOD	-	-	-
<i>M. rabenii</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. racemifera</i> (DC.) Triana*	FOD	-	-	-
<i>M. ramboi</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>M. rimalis</i> Naudin	FOD, FES	-	-	-
<i>M. robustissima</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. ruficalyx</i> Gleason	FOD	-	-	-
<i>M. rufipila</i> Triana*	FOD	-	-	-
<i>M. saldanhae</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. sellowiana</i> Naudin	FOD, FOM, AFL	-	-	-
<i>M. serrulata</i> (DC.) Naudin	FOD	-	-	-
<i>M. setosociliata</i> Cogn.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>M. shepherdii</i> R.Goldenb. & Reginato*	FOM	-	-	-
<i>M. speciosa</i> (A.St.-Hil. & Naudin) Naudin*	FES	-	-	-
<i>M. splendens</i> (Sw.) Griseb.	FES	-	-	-
<i>M. staminea</i> (Desr.) DC.*	FES, FOD	-	-	-
<i>M. subvernica</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>M. tentaculifera</i> Naudin*	FES, FOD	-	-	-
<i>M. theaezans</i> (Bonpl.) Cogn.	FES, FOD	-	-	-
<i>M. tomentosa</i> (Rich.) D.Don	FOD	-	-	-
<i>M. trianae</i> Cogn.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. tristis</i> Spring*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. urophylla</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>M. valtherii</i> Naudin*	FOD	-	-	-
<i>M. willdenowii</i> Klotzsch ex Naudin*	FOD	-	-	-
<i>Microlepis</i> – 1/4				
<i>M. oleifolia</i> (DC.) Triana	AFL, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Microlicia – 31/100				
M. avicularis Mart. ex Naudin	AFL, FCA	-	-	-
M. cardiophora Naudin	AFL	-	-	-
M. confertiflora Naudin	AFL, FCA	-	-	-
M. cordata (Spreng.) Cham.	AFL, FCA	-	-	-
M. crenulata (DC.) Mart.	AFL	-	-	-
M. cuspidifolia Mart. ex Naudin	AFL	-	VU	ANEXO II
M. doryphylla Naudin	FCA	-	-	-
M. elegans Naudin	AFL	-	VU	ANEXO II
M. euphorbioides Mart.	AFL, FCA	-	-	-
M. fasciculata Mart.	FCA	-	-	-
M. formosa Cham.	AFL	-	-	-
M. fulva (Spreng.) Cham.	AFL, FCA	-	-	-
M. glandulifera Cogn.	AFL, FCA	-	-	-
M. glazioviana Cogn.	AFL, FCA	-	EN	ANEXO II
M. graveolens DC.	AFL, FCA	-	-	-
M. helvola (Spreng.) Triana	FCA	-	-	-
M. humilis Naudin	FCA	-	VU	ANEXO II
M. isophylla DC.	AFL, FCA	-	-	-
M. juniperina A.St.-Hil.	AFL, FCA	-	VU	ANEXO II
M. linifolia Cham.	AFL	-	-	-
M. macrophylla Naudin	AFL, FCA	-	-	-
M. martiana O.Berg. ex Triana	AFL, FCA	-	-	-
M. microphylla (Naudin) Cogn.	AFL	-	VU	ANEXO II
M. multicaulis Mart. ex Naudin	AFL	-	-	-
M. polystemma Naudin	FCA	-	-	-
M. regeliana Cogn.	AFL	-	-	-
M. serrulata Cham.	AFL	-	-	-
M. suborbicularifolia Hoehne	AFL	-	-	-
M. tetrasticha Cogn.	AFL	-	-	-
M. tomentella Naudin	AFL	-	-	-
M. warmingiana Cogn.	AFL	-	-	-
Mouriri – 12/86				
M. arborea Gardner*	FOD	-	-	-
M. arenicola Morley*	RST	-	-	-
M. bahiensis Morley*	FOD	-	-	-
M. chamissoana Cogn.*	FOD	-	-	-
M. doriana Cogn.*	FOD	-	-	-
M. glazioviana Cogn.	FOD, FES	-	-	-
M. guianensis Aubl.	FOD, FES	-	-	-
M. megasperma Morley*	FES	-	-	-
M. myrtilloides (Sw.) Poir.	FES	-	-	-
M. regeliana Cogn.*	FOD	-	-	-
M. sagotiana Triana	FOD	-	-	-
M. sellowiana (Berg.) Burret*	?	-	-	-
Nepsera – 1/1				
N. aquatica (Aubl.) Naudin	FOD, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Ossaea – 14/91				
O. amygdaloides (DC.) Triana*	FOD, RST	-	-	-
O. angustifolia (DC.) Triana*	FOD	-	-	-
O. cabraliensis D.R.Souza*	FOD	-	-	-
O. cogniauxii D.R.Souza*	FES	-	-	-
O. confertiflora (DC.) Triana*	FOD	-	-	-
O. congestiflora (Naudin) Cogn.	FCA	-	-	-
O. consimilis D.R.Souza*	FOD	-	-	-
O. fragilis Cogn.*	FOD	-	-	-
O. marginata (Desr.) Triana*	FOD, FOM, FES	-	-	-
O. meridionalis D.R.Souza*	FOD, FOM, FES	-	-	-
O. quadrisulca (Naudin) Wurdack	FOD	-	-	-
O. sanguinea Cogn.*	FOD	-	-	-
O. sulbahiensis D.R.Souza*	FOD	-	-	-
O. suprabasalis R.Goldenb. & Reginato*	FOD	-	-	-
Physeterostemon* – 3/3				
P. fiaschii R.Goldenb. & Amorim*	FOD	-	-	-
P. jardimii R.Goldenb. & Amorim*	FOD	-	-	-
P. thomasi Amorim et al.*	FOD	-	-	-
Pleiochiton* – 9/9				
P. crassifolium A.Gray*	FOD	-	-	-
P. ebracteatum Triana*	FOD	-	-	-
P. glaziovianum Cogn.*	FOD	-	-	-
P. longipetiolatum Brade*	FOD	-	-	-
P. magdalenensis Brade*	FOD	-	-	-
P. micranthum Cogn.*	FOD	-	-	-
P. parvifolium Cogn.*	FOD	-	-	-
P. roseum Cogn.*	FOD	-	-	-
P. setulosum Cogn.*	FOD	-	-	-
Pterolepis – 3/14				
P. glomerata (Rottb.) Miq.	RST	-	-	-
P. repanda (DC.) Triana	FOM	-	-	-
P. trichotoma (Rottb.) Cogn.	FCA	-	-	-
Rhynchanthera – 7/15				
R. brachyrrhyncha Cham.	FCA	-	-	-
R. cordata DC.	FCA	-	-	-
R. dichotoma (Desr.) DC.	FCA	-	-	-
R. grandiflora (Aubl.) DC.	FCA	-	-	-
R. hispida Naudin	FCA	-	-	-
R. novemnervia DC.	FCA	-	-	-
R. ursina Naudin	FCA	-	-	-
Salpinga – 1/8				
S. margaritacea (Naudin) Triana*	FOD	-	-	-
Siphanthera – 5/16				
S. arenaria (DC.) Cogn.	FCA	-	-	-
S. cordata Pohl ex DC.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. foliosa</i> (Naudin) Wurdack	FCA	-	-	-
<i>S. gracillima</i> (Naudin) Wurdack	FCA	-	-	-
<i>S. paludosa</i> (DC.) Cogn.	FOD	-	-	-
<i>Svitramia</i> – 6/6				
<i>S. hatschbachii</i> Wurdack	AFL	-	-	-
<i>S. integerrima</i> R.Romero & A.B.Martins	AFL	-	VU	ANEXO II
<i>S. minor</i> R.Romero & A.B.Martins	AFL	-	VU	ANEXO II
<i>S. petiolata</i> R.Romero & A.B.Martins	AFL	-	EN	ANEXO II
<i>S. pulchra</i> Cham.	AFL	-	-	-
<i>S. wurdackiana</i> R.Romero & A.B.Martins	AFL	-	VU	ANEXO II
<i>Tibouchina</i> – 104/240				
<i>T. ademarii</i> P.J.F.Guim. <i>et al.</i>	FES	-	VU	ANEXO II
<i>T. alata</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. apparicioi</i> Brade*	FDO	-	-	-
<i>T. arborea</i> (Gardner) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. asperior</i> (Cham.) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. australis</i> (Triana) Cogn.	FOD, FCA, FOM	-	-	-
<i>T. axillaris</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. bahiensis</i> Wurdack*	FOD	-	-	-
<i>T. benthamiana</i> (Gardner) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. boraceiensis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>T. boudetii</i> P.J.F.Guim. & R.Goldenb.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>T. bradeana</i> Renner*	FOD, RST	-	-	-
<i>T. caldensis</i> Cogn.*	FOM	-	-	-
<i>T. canescens</i> (D.Don) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. castellensis</i> Brade*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>T. cerastifolia</i> Cogn.	FCA, FOD, FOM	-	-	-
<i>T. chamissoana</i> Cogn.*	FOM	-	-	-
<i>T. cinerea</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. cisplatensis</i> Cogn.*	FCA, FED	-	-	-
<i>T. clavata</i> (Pers.) Wurdack*	RST	-	-	-
<i>T. clidemioides</i> (Triana) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. clinopodiifolia</i> Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>T. cordifolia</i> Cogn.*	FOD, FCA	-	-	-
<i>T. corymbosa</i> (Raddi) Cogn.*	FOD, RST	-	-	-
<i>T. cristata</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>T. debilis</i> Cogn.*	FCA	-	-	-
<i>T. discolor</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>T. divaricata</i> Cogn.*	FOM	-	-	-
<i>T. dubia</i> Cogn.*	FCA	-	-	-
<i>T. dusenii</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. eichleri</i> Cogn.*	FCA	-	-	-
<i>T. elegans</i> (Gardner) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. estrellensis</i> (Raddi) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>T. fissinervia</i> (Schrunk & Mart. ex DC.) Cogn.	FOD, FOM	-	-	-
<i>T. floribunda</i> Cogn.*	FCA, FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>T. formosa</i> Cogn.*	FOM	-	-	-
<i>T. fothergillae</i> (Schränk & Mart. ex DC.) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>T. foveolata</i> (Naudin) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>T. francavillana</i> Cogn.*	RST	-	-	-
<i>T. frigidula</i> (DC.) Cogn.	FCA, FOM	-	-	-
<i>T. gardneriana</i> (Triana) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>T. gaudichaudiana</i> (DC.) Baill.*	FOD, RST	-	-	-
<i>T. gracilis</i> (Bonpl.) Cogn.	FCA	-	-	-
<i>T. granulosa</i> (Desr.) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. guimaraensis</i> Brade*	FCA	-	-	-
<i>T. hatschbachii</i> Wurdack*	FCA	-	-	-
<i>T. herbacea</i> (DC.) Cogn.*	FCA, FOD, FOM	-	-	-
<i>T. heteromalla</i> (D.Don) Cogn.	AFL, FCA, FOD, FOM	-	-	-
<i>T. hieracioides</i> (DC.) Cogn.*	FCA	-	-	-
<i>T. hirsutissima</i> Cogn.*	RST	-	-	-
<i>T. hospita</i> Cogn.*	FCA	-	-	-
<i>T. itatiaiae</i> Cogn.*	FCA	-	-	-
<i>T. kleinii</i> Wurdack*	FCA, FOD	-	-	-
<i>T. kuhlmannii</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>T. langsdorffiana</i> (Bonpl.) Baill.*	RST	-	-	-
<i>T. lhotzkyana</i> (C.Presl) Cogn.*	RST, FOD	-	-	-
<i>T. longipilosa</i> Cogn.	FED	-	-	-
<i>T. longistyla</i> (Cogn.) Renner*	FOD	-	-	-
<i>T. lutzii</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>T. macrochiton</i> (Mart. ex DC.) Cogn.*	RST	-	-	-
<i>T. manicata</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. martialis</i> (Cham.) Cogn.	FCA	-	-	-
<i>T. martiusiana</i> (DC.) Cogn.	FCA	-	-	-
<i>T. maximiliana</i> (DC.) Baill.*	RST	-	-	-
<i>T. melanocalyx</i> R.Romero et al.	AFL	-	-	-
<i>T. microphylla</i> Cogn. ex Schwake*	FOD	-	-	-
<i>T. minor</i> Cogn.	FCA	-	-	-
<i>T. minutiflora</i> Cogn.*	FCA	-	-	-
<i>T. mosenii</i> Cogn.*	FCA	-	-	-
<i>T. mutabilis</i> (Vell.) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. nitida</i> (Graham) Cogn.	FOD, FOM	-	-	-
<i>T. noblickii</i> Wurdack	?	-	-	-
<i>T. pallida</i> Cogn.*	FCA, FOD	-	-	-
<i>T. paratropica</i> (Griseb.) Cogn.	FOD	-	-	-
<i>T. paulo-alvimii</i> Guim. da Vinha*	FOD	-	-	-
<i>T. pilosa</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. pulchra</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. quartzophila</i> Brade*	FOD	-	CR	ANEXO I
<i>T. radula</i> Markgr.*	FCA, FOD	-	-	-
<i>T. ramboi</i> Brade*	FCA, FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>T. regnellii</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. reitzii</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>T. riedeliana</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. rigidula</i> (Naudin) Wurdack	FCA	-	-	-
<i>T. rupestris</i> Cogn.*	FCA, FED	-	-	-
<i>T. salviifolia</i> (Cham.) Cogn.*	RST	-	-	-
<i>T. scaberrima</i> (Triana) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. schenckii</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. schwackei</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. sebastianopolitana</i> Cogn.	FCA, FOD, FOM	-	-	-
<i>T. sellowiana</i> Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>T. semidecandra</i> (Schrunk & Mart. ex DC.) Cogn.	FCA, FOD, FOM	-	-	-
<i>T. serrana</i> P.J.F.Guim. & A.B.Martins	FCA, FOM	-	-	-
<i>T. stipulacea</i> Vinha*	FOD	-	-	-
<i>T. taperoensis</i> Wurdack*	FOD	-	-	-
<i>T. thereminiana</i> (DC.) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. tomentulosa</i> Wurdack*	FOD	-	-	-
<i>T. trichopoda</i> (DC.) Baill.*	RST, FOD	-	-	-
<i>T. urbanii</i> Cogn.*	FCA, FED	-	-	-
<i>T. urceolaris</i> (Schrunk & Mart. ex DC.) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. ursina</i> (Cham.) Cogn.*	FCA, FOD	-	-	-
<i>T. urvilleana</i> (DC.) Cogn.*	RST, FOD	-	-	-
<i>T. versicolor</i> (Lindl.) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>T. virgata</i> (Gardner) Cogn.*	FOD	-	-	-
Trembleya – 7/18				
<i>T. calycina</i> Cham.	AFL	-	-	-
<i>T. elegans</i> (Cogn.) Almeda & A.B.Martins	FCA	-	-	-
<i>T. laniflora</i> (D.Don) Cogn.	AFL	-	-	-
<i>T. parviflora</i> (D.Don) Cogn.	FCA	-	-	-
<i>T. pentagona</i> Naudin	AFL	-	-	-
<i>T. phlogiformis</i> DC.	FCA	-	-	-
<i>T. tridentata</i> Naudin	AFL	-	-	-

Meliaceae

Ary Teixeira de Oliveira-Filho

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MELIACEAE – 29/135				
Cabrlea – 1/1				
C. canjerana (Vell.) Mart.	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
Cedrela – 3/8				
C. fissilis Vell.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. lilloi</i> C.DC.	FES, FED	EN	VU	ANEXO II
<i>C. odorata</i> L.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Guarea</i> – 5/40				
<i>G. blanchetii</i> C.DC.*	FOD	-	-	-
<i>G. guidonia</i> (L.) Sleumer	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
<i>G. kunthiana</i> A.Juss.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>G. macrophylla</i> Vahl	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>G. pendula</i> R.S.Ramalho <i>et al.</i> *	FES	-	-	-
<i>Trichilia</i> – 20/86				
<i>T. blanchetii</i> C.DC.*	FOD	EN	-	-
<i>T. casarettoi</i> C.DC.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>T. catigua</i> A.Juss.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>T. claussenii</i> C.DC.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>T. elegans</i> A.Juss.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>T. emarginata</i> (Turcz.) C.DC.*	FOD, FES	-	-	-
<i>T. florbranca</i> T.D.Penn.*	FOD	CR	-	-
<i>T. hirta</i> L.	FES, FED	-	-	-
<i>T. lepidota</i> Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>T. magnifoliola</i> T.D.Penn.*	FOD, FES	VU	-	-
<i>T. martiana</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>T. pallens</i> C.DC.*	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>T. pallida</i> Sw.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>T. pleeana</i> (A.Juss.) C.DC.	FOD	-	-	-
<i>T. pseudostipularis</i> (A.Juss) C.DC.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>T. quadrijuga</i> Kunth	FOD, FES	-	-	-
<i>T. ramalhoi</i> Rizzini*	FOD, FES, RST	VU	-	-
<i>T. silvatica</i> C.DC.	FOD, FES	-	-	-
<i>T. tetrapetala</i> C.DC.*	FOD, FES	EN	-	-
<i>T. trifolia</i> L.	FOD, FED, FES	-	-	-

Menispermaceae

João Marcelo Alvarenga Braga

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MENISPERMACEAE – 23/ca. 520				
<i>Abuta</i> – 2/30				
<i>A. convexa</i> (Vell.) Diels*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. selloana</i> Eichler*	FOD, FES	-	-	-
<i>Anomospermum</i> – 1/7				
<i>A. reticulatum</i> (Mart.) Eichler	FOD, FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Borismene – 1/1				
B. japurensis (Mart.) Barneby	FOD, FOM, FES	-	-	-
Chondrodendron – 2/3				
C. microphyllum (Eichler) Moldenke*	FOD	-	-	-
C. platyphyllum (A.St.-Hil.) Miers *	FOD	-	-	-
Cissampelos – 4/19				
C. andromorpha DC.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. glaberrima A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-
C. pareira L.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
C. sympodialis Eichler	FOD, FES, FED	-	-	-
Curarea – 1/5				
C. crassa Barneby*	FOD	-	-	-
Disciphania – 4/19				
D. contraversa Barneby*	FOD	-	-	-
D. hernandia (Vell.) J.M.A.Braga*	FOD	-	-	-
D. modesta Diels*	FOD	-	-	-
D. sagittaria Barneby*	FOD	-	-	-
Hyperbaena – 2/19				
H. dominguensis (DC.) Benth.	FOD, FOM, FES	-	-	-
H. oblongifolia (Mart.) Chodat & Hassl.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Odontocarya –2/30				
O. acuparata Miers	FOD, FES	-	-	-
O. vitis (Vell.) J.M.A.Braga*	FOD, FES	-	VU	ANEXO II
Orthomene – 1/4				
O. schomburgkii (Miers) Barneby & Krukoff	FOD, FOM, FES	-	-	-
Sciadotenia – 2/17				
S. acutifolia Krukoff & Barneby*	FES	-	-	-
S. pubistaminea (K.Schum.) Diels*	FES	-	-	-
Ungulipetalum* – 1/1				
U. filipendulum (Mart.) Moldenke*	FOD, FES	-	EN	ANEXO II

Menyanthaceae

Marco Otávio Pivari

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MENYANTHACEAE – 1/40				
<i>Nymphoides</i> – 1/20				
<i>N. indica</i> (L.) Kuntze	FAQ	-	-	-

Molluginaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MOLLUGINACEAE – 2/ca. 130				
<i>Glinus</i> – 1/13				
<i>G. radiatus</i> (Ruiz & Pav.) Rohrb.	FAQ	-	-	-
<i>Mollugo</i> – 1/46				
<i>M. verticillata</i> L.	FOD, FES, RST, FAQ, FCA	-	-	-

Monimiaceae

Ariane Luna Peixoto & Marcos Gonzales

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MONIMIACEAE – 37/77				
Grazilanthus* – 1/1				
G. arkeocarpus Peixoto & Per.-Moura*	FOD	-	-	-
Hennecartia* – 1/1				
H. omphalandra J.Poiss.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
Macropheplus – 4/4				
M. dentatus (Perkins) I.Santos & Peixoto*	FOD, FES	-	-	-
M. friburgensis (Perkins) I.Santos & Peixoto*	FOD	-	EN	ANEXO I
M. ligustrinus (Tul.) Perkins	FOD	-	-	-
M. schwackeanus (Perkins) I.Santos & Peixoto*	FOD	-	-	-
Macrotorus* – 1/1				
M. utriculatus (Mart.) Perkins*	FOD	-	VU	ANEXO I
Mollinedia – 30/70				
M. acutissima Perkins*	FOD	-	-	-
M. argyrogyna Perkins	FOD, FES	-	-	-
M. blumenaviana Perkins*	FOM, FES	-	-	-
M. boracensis Peixoto*	FOD, RST	-	VU	ANEXO I
M. calodonta Perkins*	FOD	-	-	-
M. clavigera Tul.*	FOM	-	-	-
M. corcovadensis Perkins*	FOD	-	-	-
M. elegans Tul.*	FES, FOM	-	-	-
M. engleriana Perkins*	FOD	VU	-	-
M. fruticulosa Perkins*	FOD, FES	-	-	-
M. gilgiana Perkins*	FOD	CR	VU	ANEXO I
M. glabra (Spreng.) A.DC.*	FES, RST	VU	VU	ANEXO I
M. glaziovii Perkins*	FOD	-	-	-
M. heteranthera Perkins*	FOD	-	-	-
M. howeana Perkins*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. lamprophylla</i> Perkins*	FOD	CR	VU	ANEXO I
<i>M. longifolia</i> Perkins*	FOD	-	-	-
<i>M. luizae</i> Peixoto*	FOD	-	-	-
<i>M. marqueteana</i> Peixoto*	FES	VU	-	-
<i>M. micrantha</i> Perkins*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. myriantha</i> Perkins*	FOD	-	-	-
<i>M. oligantha</i> Perkins*	FOD	-	-	-
<i>M. ovata</i> Ruiz & Pav.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. pachysandra</i> Perkins*	FOD	-	-	-
<i>M. salicifolia</i> Perkins*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>M. schottiana</i> (Spreng.) Perkins	FOD, FES	-	-	-
<i>M. stenophylla</i> Perkins*	FOD	EN	-	-
<i>M. triflora</i> (Spreng.) Tul.*	FOD	-	-	-
<i>M. uleana</i> Perkins*	FOD	-	-	-
<i>M. widgrenii</i> A.DC.	FES	-	-	-

Moraceae

Sergio Romaniuc Neto, Gisela Pelissari, Alessandra dos Santos
& Patricia Aparecida de São José

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MORACEAE – 92/914				
<i>Brosimum</i> – 4/15				
<i>B. glaucum</i> Taub.*	FOD, FES	-	VU	ANEXO I
<i>B. glaziovii</i> Taub.*	FOD, FES	EN	-	-
<i>B. guianense</i> (Aubl.) Huber	FOD	-	-	-
<i>B. lactescens</i> (S.Moore) C.C.Berg	FOD, FOM	-	-	-
<i>Clarisia</i> – 2/3				
<i>C. ilicifolia</i> (Spreng.) Lanj. & Rossberg	FOD, FES	-	-	-
<i>C. racemosa</i> Ruiz & Pav.	FOD, FES	-	-	-
<i>Dorstenia</i> – 29/105				
<i>D. albertii</i> Carauta <i>et al.</i> *	FOD, FES	-	-	-
<i>D. appendiculata</i> Miq.	FES	-	-	-
<i>D. arifolia</i> Lam.	FOD, FES	-	-	-
<i>D. bahiensis</i> Klotzsch <i>ex</i> Fisch. & C.A.Mey.*	FOD, FES	-	-	-
<i>D. bonijesu</i> Carauta & C.Valente	FOD, FES	-	-	-
<i>D. bowmaniana</i> Baker*	FOD	-	-	-
<i>D. brevipetiolata</i> C.C.Berg *	FOD	-	-	-
<i>D. caatingae</i> R.M.Castro	FES	-	-	-
<i>D. capricorniana</i> Carauta <i>et al.</i> *	FOD, FES	-	-	-
<i>D. carautae</i> C.C.Berg	FOD	-	-	-
<i>D. cayapia</i> Vell.	FOD, FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>D. conceptionis</i> Carauta*	FOD	-	-	-
<i>D. contensis</i> Carauta & C.C.Berg*	FOD	-	-	-
<i>D. elata</i> Hook.*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO I
<i>D. erecta</i> Vell.*	FOD	-	-	-
<i>D. gracilis</i> Carauta <i>et al.</i>	FOD	-	-	-
<i>D. graziae</i> Carauta <i>et al.</i> *	FOD, FES	-	-	-
<i>D. hildegardis</i> Carauta <i>et al.</i> *	FOD	-	-	-
<i>D. hirta</i> Desv.*	FOD, FES	-	-	-
<i>D. longifolia</i> Moric.*	FOD	-	-	-
<i>D. mariae</i> Carauta <i>et al.</i> *	FOD	-	-	-
<i>D. maris</i> C.Valente & Carauta*	FOD	-	-	-
<i>D. milaneziana</i> Carauta <i>et al.</i>	FOD	-	-	-
<i>D. ramosa</i> (Desv.) Carauta <i>et al.</i>	FOD	-	-	-
<i>D. setosa</i> Moric.	FOD	-	-	-
<i>D. tentaculata</i> Fisch. & C.A.Mey.*	FOD	-	-	-
<i>D. tenuis</i> Bonpl. <i>ex</i> Bureau	FOD, FOM	-	-	-
<i>D. turnerifolia</i> Fisch. & C.A.Mey.	FOD	-	-	-
<i>D. urceolata</i> Schott	FOD, FOM	-	-	-
<i>Ficus</i> – 44/750				
<i>F. adhatodifolia</i> Schott <i>ex</i> Spreng.	FOD, FES	-	-	-
<i>F. arpazusa</i> Casar.*	FOD, RST	-	-	-
<i>F. bahiensis</i> C.C.Berg & Carauta*	FOD	-	-	-
<i>F. broadwayi</i> Urb.	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>F. calyptrocera</i> (Miq.) Miq.	FES	VU	-	-
<i>F. castelviana</i> Dugand	FOD, FES	-	-	-
<i>F. cestrifolia</i> Schott <i>ex</i> Spreng.*	FOD, FES	-	-	-
<i>F. citrifolia</i> Mill.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>F. clusiifolia</i> Schott	RST, FOD	-	-	-
<i>F. crocata</i> (Miq.) Miq.	RST, FOD, FED	-	-	-
<i>F. cyclophylla</i> (Miq.) Miq.	FOD, RST	-	-	-
<i>F. donnell-smithii</i> Standl.	FES	-	-	-
<i>F. duartei</i> C.C.Berg & Carauta	FOD	-	-	-
<i>F. enormis</i> Mart. <i>ex</i> Miq.	RST, FOD	-	-	-
<i>F. eximia</i> Schott	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>F. gardneriana</i> (Miq.) Miq.	FES	-	-	-
<i>F. gomelleira</i> Kunth & C.D.Bouché	FOD, FES	-	-	-
<i>F. guaranitica</i> Chodat	FOD, FES	-	-	-
<i>F. guianensis</i> Desv.	FOD	-	-	-
<i>F. hirsuta</i> Schott*	FOD, RST, FES	-	-	-
<i>F. holosericea</i> Schott*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>F. insipida</i> Willd.	FOD, FES	-	-	-
<i>F. lagoensis</i> C.C.Berg & Carauta*	FOD, FOM	-	-	-
<i>F. laureola</i> Warb. ex C.C.Berg & Carauta*	FOD	-	-	-
<i>F. longifolia</i> Schott	FOD	-	-	-
<i>F. luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	FOD, FES	-	-	-
<i>F. mariae</i> C.C.Berg et al.	FOD, FES	-	-	-
<i>F. mathewsii</i> (Miq.) Miq.	FOD	-	-	-
<i>F. maxima</i> Mill.	RST, FOD	-	-	-
<i>F. monckii</i> Hassl.	FES	-	-	-
<i>F. nevesiae</i> Carauta*	FOD	-	-	-
<i>F. nymphaeifolia</i> Mill.	FOD	-	-	-
<i>F. obtusifolia</i> Kunth	FOD, FES	-	-	-
<i>F. obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	FOD	-	-	-
<i>F. organensis</i> (Miq.) Miq.*	FOD, RST	-	-	-
<i>F. pakkensis</i> Standl.	FOD	-	-	-
<i>F. pertusa</i> L.f.	FOD, FES	-	-	-
<i>F. piresiana</i> Vázq.Avila & C.C.Berg	FOD	-	-	-
<i>F. pulchella</i> Schott ex Spreng.	FOD	VU	-	-
<i>F. rupicola</i> C.C.Berg & Carauta *	FED	EN	-	-
<i>F. salzmänniana</i> (Miq.) Miq.*	FOD	-	-	-
<i>F. tomentella</i> (Miq.) Miq.*	FOD	-	-	-
<i>F. trigona</i> L.f.	FOD, FES	-	-	-
<i>F. trigonata</i> L.	FOD, FES	-	-	-
<i>Helicostylis</i> – 2/7				
<i>H. pedunculata</i> Benoist	FOD	-	-	-
<i>H. tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) Rusby	FOD, FES	-	-	-
<i>Maclura</i> – 2/2				
<i>M. brasiliensis</i> (Mart.) Endl.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. tinctoria</i> (L.) D. Don ex Steud.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Pseudolmedia</i> – 3/9				
<i>P. hirtula</i> Kuhlmann*	FOD, FOM	EN	-	-
<i>P. laevigata</i> Trécul	FOD, FES	-	-	-
<i>P. macrophylla</i> Trécul	FOD	-	-	-
<i>Sorocea</i> – 6/23				
<i>S. bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger et al.*	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>S. guilleminiana</i> Gaudich.	FOD, FES, FOM	VU	-	-
<i>S. hilarii</i> Gaudich.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>S. jureiana</i> Romaniuc*	FOD	-	-	-
<i>S. racemosa</i> Gaudich.*	FOD	-	-	-
<i>S. saxicola</i> Hassl.	FES	-	-	-

Myristicaceae

William Rodrigues

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MYRISTICACEAE – 3/500				
Virola – 3/48				
V. bicuhyba (Schott ex Spreng.) Warb.*	FOD, FES	-	-	-
V. gardneri (A.DC.) Warb.*	FOD, FES	-	-	-
V. officinalis Warb.*	FOD	-	-	-

Myrsinaceae

Maria de Fátima Freitas & Tatiana Tavares Carrijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MYRSINACEAE – 51/1.400				
Ardisia – 1/500				
A. catharinensis Mez*	FOD	-	-	-
Cybianthus – 20/200				
C. alpestris (Warm) Mez*	AFL	-	-	-
C. amplus (Mez) G.Agostini	FOD	-	-	-
C. blanchetii (A.DC.) G.Agostini*	FES	-	-	-
C. coriaceus Mart.*	FOD	-	-	-
C. cuneifolius Mart.*	FOD	-	-	-
C. densicomus Mart.*	FES	-	-	-
C. densiflorus Miq.*	RST	-	-	-
C. detergens Mart.	FES	-	-	-
C. fulvopuberulentus (Mez) G.Agostini	RST	-	-	-
C. gardneri (A.DC.) G.Agostini*	RST	-	-	-
C. glaber A.DC.*	FOD	-	-	-
C. gracillimus (Warm.) Mez*	FOD	-	-	-
C. indecorus Mez*	FES	-	-	-
C. nemoralis (Mart.) G.Agostini*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. oblongifolius</i> (A.DC.) G.Agostini*	FOD	-	-	-
<i>C. peruvianus</i> (A.DC.) Miq.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. potiae</i> (Mez) G.Agostini*	FES	-	-	-
<i>C. psychotriifolius</i> (Rusby) Mez*	FES	-	-	-
<i>C. schwackeanus</i> Mez*	FES	-	-	-
<i>C. venezuelanus</i> Mez*	FES	-	-	-
Myrsine – 21/300				
<i>M. altomontana</i> M.F.Freitas & Kin.-Gouv.*	FCA	-	-	-
<i>M. balansae</i> (Mez) Arechav.	FES	-	-	-
<i>M. cipoensis</i> M.F.Freitas & Kin.-Gouv.*	AFL	-	-	-
<i>M. congesta</i> (Sw.) Pipoly*	AFL	-	VU	ANEXO II
<i>M. coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>M. emarginella</i> Miq.*	FES	-	-	-
<i>M. gardneriana</i> A.DC.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. glazioviana</i> Warm.*	FOD, FES, AFL	-	VU	ANEXO II
<i>M. guianensis</i> (Aubl.) O.Kuntze	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>M. lancifolia</i> Mart. ex A.DC.*	FOD, FES, AFL	-	-	-
<i>M. leuconeura</i> Mart.*	FES	-	-	-
<i>M. lineata</i> (Mez) Imkhan.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. loefgrenii</i> (Mez) Imkhan.	FES	-	-	-
<i>M. monticola</i> Mart.*	FES, AFL	-	-	-
<i>M. parvifolia</i> A.DC.*	RST	-	-	-
<i>M. parvula</i> (Mez) Otegui	FOD, FES	-	-	-
<i>M. rubra</i> M.F.Freitas & Kin.-Gouv.*	RST	-	-	-
<i>M. squarrosa</i> (Mez) M.F.Freitas & Kin.-Gouv.*	FES, AFL	-	-	-
<i>M. umbellata</i> Mart.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>M. venosa</i> A.DC.*	FOD, RST	-	-	-
<i>M. villosissima</i> A.DC.*	FOD, AFL	-	VU	ANEXO II
Stylogyne – 9/62				
<i>S. depauperata</i> Mez*	FOD, RST	-	-	-
<i>S. laevigata</i> (Miq.) Mez*	FOD	-	-	-
<i>S. leptantha</i> (Miq.) Mez*	FOD	-	-	-
<i>S. lhotzkiana</i> (A.DC.) Mez	FOD	-	-	-
<i>S. martiana</i> A.DC.*	FOD	-	-	-
<i>S. pauciflora</i> Mez*	FOD	-	-	-
<i>S. sellowiana</i> Mez*	FOD	-	-	-
<i>S. sordida</i> Mez*	FOD	-	-	-
<i>S. warmingii</i> Mez*	FOD, FOM, FES	-	-	-

Myrtaceae

Marcos Sobral, Eve Lucas, Leslie Landrum & Lúcia Soares-Silva

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
MYRTACEAE – 636/5.800				
Acca – 1/3				
A. sellowiana (O.Berg) Burret*	FES, FOM	-	-	-
Accara* – 1/1				
A. elegans (DC.) Landrum*	FCA	-	VU	ANEXO II
Blepharocalyx – 3/4				
B. eggersii (Kiaersk.) Landrum	FOD	-	-	-
B. myriophyllus (Casar.) P.O.Morais & Sobral*	FCA	-	-	-
B. salicifolius (Kunth) O.Berg	FES, FOD, FOM, FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
Calycolpus – 2/13				
C. australis Landrum*	FCA	-	-	-
C. legrandii Mattos*	RST	-	VU	ANEXO II
Calypttranthes – 42/250				
C. affinis O.Berg*	FOD	-	-	-
C. anceps O.Berg*	FOD	-	-	-
C. angustifolia Kiaersk.*	FOD	-	-	-
C. aromatica A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
C. bimariginata O.Berg*	FOD	-	-	-
C. blanchetiana O.Berg*	FOD	-	-	-
C. brasiliensis Spreng.*	FES, FCA, FOD, RST	-	-	-
C. caudata Gardner*	FOD	-	-	-
C. clusiifolia O.Berg	FCA, FOD, FOM, FES	-	-	-
C. concinna DC.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. cordata O.Berg	FCA	-	-	-
C. dardanoi Mattos*	FOD, RST	-	-	-
C. dichotoma Casar.*	FOD	-	-	-
C. dryadica M.L.Kawas.*	FOD	-	VU	ANEXO II
C. eugenioides Cambess.*	FOD	-	-	-
C. fusiformis M.L.Kawas.*	FOD	-	-	-
C. glazioviana Kiaersk.*	FOD	-	-	-
C. grammica (Spreng.) D.Legrand*	FCA, FOD, FES	-	-	-
C. grandiflora O.Berg*	FOD	-	-	-
C. grandifolia O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
C. hatschbachii D.Legrand*	FOD	-	-	-
C. lanceolata O.Berg*	FOD	-	-	-
C. langsdorffii O.Berg*	FOD	-	-	-
C. lucida Mart. ex DC. *	FOD, FES	-	-	-
C. martiusiana DC.*	FOD	-	-	-
C. obovata Kiaersk.*	FOD	-	-	-
C. obversa O.Berg*	FOD	-	-	-
C. ovalifolia Cambess.	FES	-	-	-
C. ovata O.Berg*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. pauciflora</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>C. pereireana</i> Mattos & D.Legrand *	RST	-	VU	ANEXO I
<i>C. pileata</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>C. platyphylla</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>C. pteropoda</i> O.Berg*	FCA, FOD	-	-	-
<i>C. regeliana</i> O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
<i>C. restingae</i> Sobral*	RST	-	VU	ANEXO I
<i>C. rubella</i> (O.Berg) D.Legrand*	FOD, RST	-	-	-
<i>C. strigipes</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>C. tetraptera</i> O.Berg*	FES, FCA, FOD, RST	-	-	-
<i>C. tricona</i> D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. ursina</i> Barroso & Peixoto *	FOD	-	-	-
<i>C. widgreniana</i> O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
<i>Campomanesia</i> – 28/30				
<i>C. adamantium</i> (Cambess.) O.Berg	FCA	-	-	-
<i>C. anemonea</i> Landrum*	FOD	-	-	-
<i>C. aromatica</i> (Aubl.) Griseb.	FOD	VU	-	-
<i>C. aurea</i> O.Berg	FCA	-	-	-
<i>C. dichotoma</i> (O.Berg) Mattos*	FOD	-	-	-
<i>C. espiritosantensis</i> Landrum*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>C. eugenioides</i> (Cambess.) D.Legrand ex Landrum	FOD, FES	-	-	-
<i>C. guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. guazumifolia</i> (Cambess.) O.Berg*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>C. hirsuta</i> Gardner*	FOD	EN	-	-
<i>C. laurifolia</i> Gardner*	FOD, FES	EN	-	-
<i>C. lineatifolia</i> Ruiz & Pav.	FOD	-	-	-
<i>C. littoralis</i> D.Legrand*	FOD, RST	-	-	-
<i>C. lundiana</i> (Kiaersk.) Mattos*	FOD	EX	-	-
<i>C. macrobracteolata</i> Landrum*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>C. neriflora</i> (O.Berg) Nied.*	FOD	VU	-	-
<i>C. phaea</i> (O.Berg) Landrum*	FOD, FES	VU	-	-
<i>C. prosthecesepala</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>C. pubescens</i> (DC.) O.Berg	FCA	-	-	-
<i>C. reitziana</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>C. rhombea</i> O.Berg*	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. rufa</i> (O.Berg) Nied.	FCA, FOD	-	-	-
<i>C. schlechtendaliana</i> (O.Berg) Nied.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. sessiliflora</i> (O.Berg) Mattos	FCA, FOD, FES, FED	-	-	-
<i>C. simulans</i> M.L.Kawas.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. velutina</i> (Cambess.) O.Berg	FCA, FED, FES	-	-	-
<i>C. viatoris</i> Landrum*	FOD	EN	-	-
<i>C. xanthocarpa</i> (Mart.) O.Berg*	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Curitiba</i> * – 1/1				
<i>C. prismatica</i> (D.Legrand) Salywon & Landrum*	FOM	-	-	-
<i>Eugenia</i> – 241/600				
<i>E. acutata</i> Miq.*	FOD, FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>E. adenantha</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. adenocarpa</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. angelyana</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. apiocarpa</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. arenaria</i> Cambess.*	FOD, RST, FES	-	-	-
<i>E. arvensis</i> Vell.*	FOD	-	-	-
<i>E. augustana</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>E. ayacuchae</i> Steyerl.*	FOD, RST	-	-	-
<i>E. bacopari</i> D.Legrand*	FOD, RST	-	-	-
<i>E. badia</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. bahiana</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. bahiensis</i> DC.*	FOD, RST	-	-	-
<i>E. batingabranca</i> Sobral*	FOD	-	-	-
<i>E. belemii</i> (Mattos) Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. beruttii</i> (Mattos) Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. bimarginata</i> DC.	FCA, RST	-	-	-
<i>E. blastantha</i> (O.Berg) D.Legrand*	FOD, FES	-	-	-
<i>E. bocainensis</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. botequimensis</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>E. brasiliensis</i> Lam.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>E. brejoensis</i> Mazine*	FES	-	-	-
<i>E. brunneopubescens</i> Mazine*	FOD	-	-	-
<i>E. brunoii</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. bunchosiifolia</i> Nied.*	FOD	-	-	-
<i>E. burkartiana</i> (D.Legrand) D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>E. calycina</i> Cambess.	FCA	-	-	-
<i>E. cambucae</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. candolleana</i> DC.*	FCA, FOD	-	-	-
<i>E. capitulifera</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. capixaba</i> Mazine*	FOD	-	-	-
<i>E. catharinae</i> O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
<i>E. catharinensis</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>E. cavalcanteana</i> Mattos	FCA, FOD	-	-	-
<i>E. cerasiflora</i> Miq.	FOD, FES	-	-	-
<i>E. cereja</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>E. chlorocarpa</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. chlorophylla</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. cinerascens</i> Gardner*	FOD	-	-	-
<i>E. coccifera</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. conchalensis</i> D.Legrand & Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. concolor</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. convexinervia</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>E. copacabanensis</i> Kiaersk.*	FOD, RST	-	-	-
<i>E. corcovadensis</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>E. costatifructa</i> Mazine*	RST	-	-	-
<i>E. cuprea</i> (O.Berg) Nied.*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>E. curvatopetiolata</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>E. cuspidata</i> O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
<i>E. cymatodes</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. dichroma</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. dimorpha</i> O.Berg	FCA, FOD	-	VU	ANEXO II
<i>E. disperma</i> Vell.*	FOD	-	-	-
<i>E. dodonaeifolia</i> Cambess.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>E. dulcis</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. dysenterica</i> DC.	FCA, FED	-	-	-
<i>E. egeensis</i> DC.	FES	-	-	-
<i>E. ellipsoidea</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>E. elongata</i> Nied.*	FOD	-	-	-
<i>E. excelsa</i> O.Berg*	FOD, RST, FES	-	-	-
<i>E. excoriata</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. exechusa</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. expansa</i> Spring ex Mart. *	FOD	-	-	-
<i>E. falkenbergiana</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. fissurata</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. flamingensis</i> O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
<i>E. flavescens</i> DC.	FOD	-	-	-
<i>E. florida</i> DC.	FCA, FOD, FOM, RST, FES, FED	-	-	-
<i>E. francavilleana</i> O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
<i>E. fusca</i> O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
<i>E. gaudichaudiana</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. glandulosissima</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>E. goyazensis</i> Nied.	FCA	-	-	-
<i>E. gracilis</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. gracillima</i> Kiaersk.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. grandifolia</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. grazielae</i> Mattos & D.Legrand *	FOD	-	-	-
<i>E. hamiltonii</i> (Mattos) Mattos*	FCA	-	-	-
<i>E. handroana</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>E. handroi</i> (Mattos) Mattos*	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. hermesiana</i> Mattos*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>E. hiemalis</i> Cambess.	FCA, FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>E. hirta</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. ilhensis</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. imaruiensis</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>E. inversa</i> Sobral*	RST	-	-	-
<i>E. involucrata</i> DC.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>E. irirensis</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. ischnosceles</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. itacarensis</i> Mattos*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>E. itaguahiensis</i> Nied.*	FOD	-	-	-
<i>E. itahypensis</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. itajurensis</i> Cambess.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>E. itapemirimensis</i> Cambess.*	FOD	-	-	-
<i>E. janeirensis</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. joenssonii</i> Kausel*	FOD	-	-	-
<i>E. kleinii</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>E. kuhlmanniana</i> Mattos & D.Legrand *	FOD	-	-	-
<i>E. lagoensis</i> Kiaersk.	FAC, FES	-	-	-
<i>E. lambertiana</i> DC.	FOD	-	-	-
<i>E. laruotteana</i> Cambess.*	FOD, FES	-	-	-
<i>E. leonanii</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. leonora</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. leptoclada</i> O.Berg*	FOM, FES	-	-	-
<i>E. ligustrina</i> (Sw.) Willd.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>E. lilloana</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>E. lindbergiana</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. linearifolia</i> O.Berg*	FCA	-	-	-
<i>E. linguiformis</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. longibracteata</i> Mazine*	FOD	-	-	-
<i>E. longifolia</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>E. longipetiolata</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. luschnathiana</i> (O.Berg) Klotzsch ex B.D.Jacks.*	FOD	-	-	-
<i>E. macahensis</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. macedoi</i> Mattos & D.Legrand	FCA	-	-	-
<i>E. macrantha</i> O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
<i>E. macrobracteolata</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. macrosperma</i> DC.*	FOD, FES	-	-	-
<i>E. magnibracteolata</i> Mattos & D.Legrand *	FOD	-	-	-
<i>E. magnifica</i> Spring ex Mart. *	FOD, FES	-	-	-
<i>E. magnifolia</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>E. malacantha</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>E. mandioccensis</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. mansoi</i> O.Berg	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>E. marambaiensis</i> M.C.Souza & M.P.Morim*	RST	-	-	-
<i>E. martiana</i> (O.Berg) Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. mattosii</i> D.Legrand*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>E. melanogyna</i> (Legrand) Sobral*	FOD	-	-	-
<i>E. membranifolia</i> Nied.*	FOD	-	-	-
<i>E. modesta</i> DC.	FCA, FES	-	-	-
<i>E. monosperma</i> Vell.*	FOD	-	-	-
<i>E. moonioides</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. moraviana</i> O.Berg	FOD	-	-	-
<i>E. mosenii</i> (Kausel) Sobral*	FOD	-	-	-
<i>E. multicostata</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>E. myrcianthes</i> Nied.	FCA, FOD	-	-	-
<i>E. myrciariifolia</i> Soares-Silva & Sobral *	FES	-	EN	ANEXO II
<i>E. neoaustralis</i> Sobral*	FOD, FES	-	-	-
<i>E. neoformosa</i> Sobral*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>E. neoglomerata</i> Sobral*	FOD	-	-	-
<i>E. neolaurifolia</i> Sobral*	FOD	-	-	-
<i>E. neomyrtifolia</i> Sobral*	FOD, FED	-	-	-
<i>E. neonitida</i> Sobral*	FOD, RST	-	-	-
<i>E. neosericea</i> P.O.Morais & Sobral*	FCA	-	-	-
<i>E. neosilvestris</i> Sobral*	FOD	-	-	-
<i>E. neotristis</i> Sobral*	FOD, RST	-	-	-
<i>E. neoverrucosa</i> Sobral*	FOM	-	-	-
<i>E. nutans</i> O.Berg*	FOM	-	-	-
<i>E. oblongata</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. oeidocarpa</i> O.Berg*	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. olivacea</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. ophthalmantha</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>E. orlandoi</i> (Mattos) Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. oxyentophylla</i> Kiaersk.*	FOD, FOM	-	EN	ANEXO II
<i>E. pachnantha</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. pachyclada</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>E. pallescens</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>E. pantagensis</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. paranapiacabensis</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. pauciflora</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>E. persicifolia</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. peruibensis</i> Mattos*	FOD, RST	-	EN	ANEXO II
<i>E. pia</i> DC.*	FCA	-	-	-
<i>E. piloensis</i> Cambess.*	FOD	-	-	-
<i>E. pirataquinensis</i> (Mattos) Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. piresiana</i> Cambess.*	FOD	-	-	-
<i>E. piresii</i> Mattos	FOD	-	-	-
<i>E. pisiformis</i> Cambess.*	FOD	-	-	-
<i>E. pitanga</i> (O.Berg) Nied.	FCA	-	-	-
<i>E. platyphylla</i> O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
<i>E. platysema</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. pleurantha</i> O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
<i>E. plicata</i> Nied.*	FOD	-	-	-
<i>E. plicatocostata</i> O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
<i>E. pluriflora</i> DC.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>E. prasina</i> O.Berg*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>E. prostrata</i> Mattos	FOD	-	-	-
<i>E. pruinosa</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>E. pruniformis</i> Cambess.*	FOD	-	-	-
<i>E. pseudodichasiantha</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>E. pseudomalacantha</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>E. puberula</i> Nied.*	FOD	-	-	-
<i>E. pulcherrima</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>E. puniceifolia</i> (Kunth) DC.	FCA, FOD, RST, FES, FED	-	-	-
<i>E. pyriformis</i> O.Berg*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>E. pyriformis</i> Cambess.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>E. ramboi</i> D.Legrand*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>E. reitziana</i> D.Legrand*	FCA	-	-	-
<i>E. repanda</i> O.Berg	FOD, FES	-	-	-
<i>E. rigida</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>E. rizzoana</i> Mattos	FCA	-	-	-
<i>E. robustovenosa</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>E. rostrata</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. rostrifolia</i> D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. rotundicosta</i> D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. rugosissima</i> Sobral*	FOD	-	-	-
<i>E. schottiana</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. schuechiana</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. sclerocalyx</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>E. sessilifolia</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>E. sonderiana</i> O.Berg	FCA, FOD	-	-	-
<i>E. speciosa</i> Cambess.	FOD, RST, FES	-	-	-
<i>E. sphenoides</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. sphenophylla</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. sprengelii</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>E. squamiflora</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. stenosepala</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>E. stephanii</i> O.Berg	FCA	-	-	-
<i>E. stictopetala</i> DC.	FCA, FOD, FES	-	-	-
<i>E. stigmatica</i> DC.*	FOD, RST	-	-	-
<i>E. strellensis</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. stricta</i> (O.Berg) Nied.	FCA, FOD	-	-	-
<i>E. strigipes</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. subamplexicaulis</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>E. subavenia</i> O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
<i>E. suberosa</i> Cambess.	FCA	-	-	-
<i>E. subreticulata</i> Glaz.*	FOD	-	-	-
<i>E. subterminalis</i> DC.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>E. subundulata</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>E. sulcata</i> Spring ex Mart. *	FOD, RST	-	-	-
<i>E. supraaxillaris</i> Spring*	FOD	-	-	-
<i>E. teixeireana</i> (Mattos) Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. tenuipedunculata</i> Kiaersk.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. ternatifolia</i> Cambess.*	FOD, FES	-	-	-
<i>E. theodora</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>E. tinguyensis</i> Cambess.*	FOD, FES	-	-	-
<i>E. umbelliflora</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. umbrosa</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. uniflora</i> L.	FCA, FOD, FOM, RST, FES	-	-	-
<i>E. uruguayensis</i> Cambess.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. vallsiana</i> Mattos	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>E. vattimoana</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. vernicosa</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. vicozensis</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. villaenovae</i> Kiaersk.*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>E. violascens</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>E. viridiflora</i> Cambess.*	FES	-	-	-
<i>E. widgrenii</i> Sond. ex O.Berg *	FES	-	-	-
<i>E. xanthoxyloides</i> Cambess.*	FOD	-	-	-
<i>E. xiriricana</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>E. zuccarinii</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>Marlierea</i> – 52/100				
<i>M. affinis</i> (O.Berg) D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>M. angustifolia</i> (O.Berg) Mattos*	FCA, FOD, FES	-	-	-
<i>M. antonia</i> (O.Berg) D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>M. choriophylla</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>M. clauseniana</i> (O.Berg) Kiaersk.	FCA, FOD, FES	-	-	-
<i>M. cordata</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>M. dimorpha</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. estrellensis</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. eugenioides</i> (Cambess.) D.Legrand*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. eugeniosoides</i> (Kausel & D.Legrand) D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>M. excoriata</i> Mart.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. gardneriana</i> (O.Berg) Nied.*	FOD	-	-	-
<i>M. gaudichaudiana</i> (O.Berg) Loefgr. & Everett*	FOD	-	-	-
<i>M. glabra</i> Cambess.*	FOD	-	-	-
<i>M. glazioviana</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>M. grandifolia</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. guanabarina</i> Mattos & D.Legrand *	FOD	-	-	-
<i>M. involucrata</i> (O.Berg) Nied.*	FOD	-	-	-
<i>M. krapovickae</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>M. laevigata</i> (DC.) Kiaersk.	FCA, FOD, FES	-	-	-
<i>M. langsdorffii</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. lealcostae</i> G.Barroso & Peixoto *	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>M. luschnathiana</i> (O.Berg) D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>M. martinellii</i> G.Barroso & Peixoto *	FOD	-	-	-
<i>M. neuwiediana</i> (O.Berg) Nied.*	FOD	-	-	-
<i>M. obscura</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. obversa</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>M. occhionii</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>M. parvifolia</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. polygama</i> (O.Berg) D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>M. racemosa</i> (Vell.) Kiaersk.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. regeliana</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. reitzii</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>M. resupinata</i> (Vell.) O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. riedeliana</i> (O.Berg) D.Legrand*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. rubiginosa</i> (Cambess.) D.Legrand	FCA, FOD, FES	-	-	-
<i>M. rufa</i> (Vell.) O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. schottiana</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. schottii</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>M. sessiliflora</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. silvatica</i> (O.Berg) Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>M. silvestris</i> (Vell.) Mattos*	FOD	-	-	-
<i>M. skortzoviana</i> Mattos*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>M. strigipes</i> (Mart.) O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. suaveolens</i> Cambess.*	FOD	-	-	-
<i>M. subacuminata</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>M. sucrei</i> G.Barroso & Peixoto *	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>M. teuscheriana</i> (O.Berg) D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>M. tomentosa</i> Cambess.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. verticillaris</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. villasboasii</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>M. warmingiana</i> Kiaersk.	FOD	-	-	-
<i>Myrceugenia</i> – 28/41				
<i>M. acutiflora</i> (Kiaersk.) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. alpigena</i> (DC.) Landrum*	FAC, FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. bracteosa</i> (DC.) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM, FES	VU	-	-
<i>M. brevipedicellata</i> (Burret) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM	VU	VU	ANEXO II
<i>M. campestris</i> (DC.) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM, RST	VU	-	-
<i>M. cucullata</i> D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. euosma</i> (O.Berg) D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. foveolata</i> (O.Berg) Sobral*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
<i>M. franciscensis</i> (O.Berg) Landrum*	FOD, FOM	VU	-	-
<i>M. gertii</i> Landrum*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. glaucescens</i> (Cambess.) D.Legrand & Kausel	FCA, FOD, FOM	-	-	-
<i>M. hatschbachii</i> Landrum*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
<i>M. hoehnei</i> (Burret) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. kleinii</i> D.Legrand & Kausel *	FOD	VU	-	-
<i>M. mesomischa</i> (Burret) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. miersiana</i> (Gardner) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. myrcioides</i> (Cambess.) O.Berg*	FOD, FOM, RST, FES	-	-	-
<i>M. myrtoides</i> O.Berg	FCA, FOD	-	-	-
<i>M. ovalifolia</i> (O.Berg) Landrum*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. ovata</i> (Hook. & Arn.) O.Berg	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. oxysepala</i> (Burret) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. pilotantha</i> (Kiaersk.) Landrum*	FOD, FOM	VU	-	-
<i>M. reitzii</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>M. rufescens</i> (DC.) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM	VU	-	-
<i>M. scutellata</i> D.Legrand*	FOD, FOM	VU	-	-
<i>M. seriatoramosa</i> (Kiaersk.) D.Legrand & Kausel*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. smithii</i> Landrum*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
<i>M. venosa</i> D.Legrand*	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Myrcia – 132/350				
M. accioliana Mattos*	FOD	-	-	-
M. amazonica DC.	FOD, RST, FES, FED	-	-	-
M. amblyphylla Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. amplexicaulis (O.Berg) Hook.f.*	FOD	-	-	-
M. anacardiifolia Gardner*	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
M. anceps (Spreng.) O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
M. anomala Cambess.	AFL, FCA	-	-	-
M. apiocarpa (O.Berg) N.Silveira*	FOD	-	-	-
M. badia (O.Berg) N.Silveira*	FOD	-	-	-
M. bergiana O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
M. bicolor Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. blanchetiana (O.Berg) Mattos	FES	-	-	-
M. bombycina (O.Berg) Nied.*	FOD, FOM	-	-	-
M. brasiliensis Kiaersk.*	FOD, RST	-	-	-
M. brunnea Cambess.*	FOD	-	-	-
M. calyptranthoides (O.Berg) Mattos*	FOD	-	-	-
M. cambessedeaniana O.Berg	FCA	-	-	-
M. clavija Sobral*	FOD	-	-	-
M. coelosepala Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. colpodes Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. cordifolia DC.*	FOD, FES	-	-	-
M. crocea (Vell.) Kiaersk.*	FOD, FES	-	-	-
M. decorticans DC.	FOD, RST, FES	-	-	-
M. densa (DC.) Sobral	FCA, FOD	-	-	-
M. diaphana (O.Berg) N.Silveira*	FOD	-	-	-
M. dichrophylla D.Legrand*	FOD, RST	-	-	-
M. dolichopetala Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. eriocalyx DC.	FCA, FOD, FOM, FES	-	-	-
M. eriopus DC.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. eumecephylla (O.Berg) Nied.*	FOD	-	-	-
M. felisbertii (DC.) O.Berg*	FOD	-	-	-
M. feniziana O.Berg	FCA, FOD	-	-	-
M. folii G.Barroso & Peixoto*	FOD, FES	-	VU	ANEXO I
M. freyreissiana (O.Berg) Kiaersk.*	FOD, RST	-	-	-
M. gestasiana Cambess.*	FOD	-	-	-
M. gigantea (O.Berg) Nied.*	FOD	-	-	-
M. gilsoniana G.Barroso & Peixoto *	FOD	-	VU	ANEXO I
M. glabra (O.Berg) D.Legrand*	FOD, RST	-	-	-
M. glazioviana Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. glaziovii Mattos & D.Legrand	FCA	-	-	-
M. gomidesioides Kiaersk.*	FOD	-	-	-
M. grandifolia Cambess.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. guianensis (Aubl.) DC.	FCA, FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
M. hartwegiana (O.Berg) Kiaersk.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
M. hatschbachii D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. hebepetala</i> DC.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. heringii</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>M. hexasticha</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>M. hirtiflora</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>M. hypoleuca</i> Spring ex Mart.	FES	-	-	-
<i>M. ilheosensis</i> Kiaersk.*	FOD, RST	-	-	-
<i>M. inconspicua</i> L.Kollmann & Sobral *	FOD	-	-	-
<i>M. innovans</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>M. insularis</i> Gardner*	FOD, RST	-	-	-
<i>M. isaiana</i> G.Barroso & Peixoto *	FOD, RST	-	VU	ANEXO I
<i>M. lacerdaeana</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. lacunosa</i> (O.Berg) N.Silveira*	FOD	-	-	-
<i>M. lajeana</i> D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. lanceolata</i> Cambess.*	FOD	-	-	-
<i>M. laruotteana</i> Cambess.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. lasiantha</i> DC.	FCA	-	-	-
<i>M. laxiflora</i> Cambess.*	FOD	-	-	-
<i>M. limae</i> G.Barroso & Peixoto *	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>M. lineata</i> (O.Berg) Nied.*	FOD, FES	VU	-	-
<i>M. littoralis</i> DC.*	FOD, RST	-	-	-
<i>M. lundiana</i> Kiaersk.*	FOD, RST	-	-	-
<i>M. lutescens</i> Cambess.*	FCA, FOD	-	-	-
<i>M. macrocarpa</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>M. magnifolia</i> Cambess.*	FOD	-	-	-
<i>M. maximiliana</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. micropetala</i> (Mart.) Nied.*	FOD	-	-	-
<i>M. mischophylla</i> Kiaersk.	FCA, FOD, FES	-	-	-
<i>M. montana</i> Cambess.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. morroqueimadensis</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>M. multiflora</i> (Lam.) DC.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>M. mutabilis</i> (O.Berg) N.Silveira	FCA, FOD, FES	-	-	-
<i>M. neorostrata</i> Sobral*	FOD	-	-	-
<i>M. nivea</i> Cambess.	FCA	-	-	-
<i>M. oblongata</i> DC.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. oligantha</i> O.Berg*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. oreioeca</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>M. ovata</i> Cambess.*	FOD, RST	-	-	-
<i>M. palustris</i> DC.	FOD, RST, FES	-	-	-
<i>M. perforata</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. plusiantha</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>M. polyantha</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>M. pubescens</i> DC.	FCA, FOD, FES	-	-	-
<i>M. pubiflora</i> DC.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. pubipetala</i> Miq.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>M. pulchra</i> (O.Berg) Kiaersk.*	FCA, FOD, FOM, FES, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. racemosa</i> (O.Berg) Kiaersk.*	FOD, RST	-	-	-
<i>M. ramuliflora</i> (O.Berg) N.Silveira*	FOD, RST	-	-	-
<i>M. recurvata</i> O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
<i>M. reticulata</i> Cambess.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. retorta</i> Cambess.*	FCA, FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. richardiana</i> (O.Berg) Kiaersk.*	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>M. rimosa</i> Cambess.	FES	-	-	-
<i>M. riococensis</i> G.Barroso & Peixoto *	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>M. robusta</i> Sobral*	FOD	-	-	-
<i>M. rubiginosa</i> Cambess.*	FOD	-	-	-
<i>M. rufipes</i> DC.	FOD	-	-	-
<i>M. rupicola</i> D.Legrand*	FCA, FOD, FOM	-	-	-
<i>M. salzmännii</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. selloi</i> (Spreng.) N.Silveira	FOD, RST	-	-	-
<i>M. silvatica</i> (Mey.) DC.	FOD	-	-	-
<i>M. spathulata</i> (O.Berg) Nied.*	FCA	-	-	-
<i>M. spectabilis</i> DC.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>M. splendens</i> (Sw.) DC.	FCA, FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>M. sporadosticta</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>M. springiana</i> (O.Berg) Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>M. squamata</i> (Mattos & D.Legrand) Mattos*	FOD	-	-	-
<i>M. stictophylla</i> (O.Berg) N.Silveira*	FOD	-	-	-
<i>M. stigmatica</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. subavenia</i> (O.Berg) N.Silveira	FCA	-	-	-
<i>M. subcordata</i> DC.*	FCA, FOD, FES	-	-	-
<i>M. subsericea</i> A.Gray*	FOD	-	-	-
<i>M. subverticillaris</i> (O.Berg) Kiaersk. - conf. Autores*	FCA, FOD	-	-	-
<i>M. tenuifolia</i> (O.Berg) Sobral	FOD	-	-	-
<i>M. tenuivenosa</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>M. thyrsoides</i> O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
<i>M. tijucensis</i> Kiaersk.*	FOD, RST	-	-	-
<i>M. tomentosa</i> (Aubl.) DC.	FCA, FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>M. undulata</i> O.Berg*	FOM, FES	-	-	-
<i>M. variabilis</i> DC.	FCA, FES	-	-	-
<i>M. vauthieriana</i> O.Berg*	FCA, FOD	-	-	-
<i>M. velutiflora</i> (Mattos & D.Legrand) Mattos*	FOD	-	-	-
<i>M. venulosa</i> DC.	FCA, FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. verrucosa</i> Sobral*	FOD	-	-	-
<i>M. verticillaris</i> O.Berg	FCA, FOD	-	-	-
<i>M. vestita</i> DC.	FCA, FES	-	-	-
<i>M. vittoriana</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>M. warmingiana</i> Kiaersk.*	FOD	-	-	-
<i>Myrcianthes</i> – 5/30				
<i>M. bradeana</i> Mattos & D.Legrand	FOD	-	-	-
<i>M. cionei</i> Mattos*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. cisplatensis</i> (Cambess.) O.Berg	FCA, RST	-	-	-
<i>M. gigantea</i> (D.Legrand) D.Legrand	FOM, FES	-	-	-
<i>M. pungens</i> (O.Berg) D.Legrand	FCA, FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Myrciaria</i> – 15/30				
<i>M. cuspidata</i> O.Berg	FCA, FOD, FES, RST	-	-	-
<i>M. delicatula</i> (DC.) O.Berg*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. disticha</i> O.Berg*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. ferruginea</i> O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
<i>M. floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	FCA, FOD, FOM, RST, FES, FED	-	-	-
<i>M. glanduliflora</i> (Kiaersk.) Mattos & D.Legrand	FCA, FOD	-	-	-
<i>M. guaqueia</i> (Kiaersk.) Mattos & D.Legrand	FOD	-	-	-
<i>M. glazioviana</i> (Kiaersk.) G.Barroso ex Sobral*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. leucadendron</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. pallida</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>M. pilosa</i> Sobral & Couto*	FCA, FOD	-	-	-
<i>M. plinioides</i> D.Legrand*	FOD	-	-	-
<i>M. pumila</i> Gardner*	FOD	-	-	-
<i>M. strigipes</i> O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
<i>M. tenella</i> (DC.) O.Berg	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Myrrhinium</i> – 1/1				
<i>M. atropurpureum</i> Schott	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>Neomitranthes</i> * – 16/16				
<i>N. amblymitra</i> (Burret) Mattos*	FOD	-	-	-
<i>N. apiculata</i> (Burret) Mattos*	FOD	-	-	-
<i>N. capivariensis</i> (Mattos) Mattos*	FOD	-	-	-
<i>N. castellanosis</i> (Mattos & D.Legrand) Mattos*	FOD	-	-	-
<i>N. cordifolia</i> (D.Legrand) D.Legrand*	FOD, RST	VU	-	-
<i>N. gemballae</i> (D.Legrand) D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-
<i>N. glomerata</i> (D.Legrand) D.Legrand*	FOD, RST	-	-	-
<i>N. gracilis</i> (Burret) N.Silveira*	FOD	-	-	-
<i>N. langsdorffii</i> (O.Berg) Mattos*	FOD	VU	-	-
<i>N. nitida</i> Mattos*	RST	-	VU	ANEXO I
<i>N. obscura</i> (DC.) N.Silveira*	RST	-	-	-
<i>N. obtusa</i> Sobral & Zambom *	RST	-	VU	ANEXO II
<i>N. pedicellata</i> (Burret) Mattos*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>N. riedeliana</i> (O.Berg) Mattos*	FOD	-	-	-
<i>N. warmingiana</i> (Kiaersk.) Mattos*	FOD, FES	-	-	-
<i>N. wilsoniana</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>Pimenta</i> – 1/15				
<i>P. pseudocaryophyllus</i> (Gomes) Landrum*	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>Plinia</i> – 28/40				
<i>P. anonyma</i> Sobral	FOD	-	-	-
<i>P. brachybotrya</i> (D.Legrand) Sobral*	FOD	-	-	-
<i>P. callosa</i> Sobral*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>P. cauliflora</i> (Mart.) Kausel	FOD, FES	-	-	-
<i>P. complanata</i> M.L.Kawas. & B.Holst *	FOD	-	CR	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. cordifolia</i> (D.Legrand) Sobral*	FOD	-	-	-
<i>P. edulis</i> (Vell.) Sobral*	FOD	-	-	-
<i>P. grandifolia</i> (Mattos) Sobral*	FOD, FES	-	-	-
<i>P. hatschbachii</i> (Mattos) Sobral*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>P. ilhensis</i> G.Barroso*	FOD	-	EN	ANEXO I
<i>P. jaboticaba</i> (Vell.) Kausel	FOD	-	-	-
<i>P. longiacuminata</i> Sobral*	FOD	-	-	-
<i>P. marqueteana</i> G.Barroso*	FOD	-	-	-
<i>P. martinellii</i> G.Barroso & Peron *	FOD	-	-	-
<i>P. muricata</i> Sobral*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>P. oblongata</i> (Mattos) Mattos*	FOD	-	-	-
<i>P. pauciflora</i> M.L.Kawas. & B.Holst *	FOD	-	-	-
<i>P. phitrantha</i> (Kiaersk.) Sobral*	FOD, FES	-	-	-
<i>P. rara</i> Sobral*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>P. renatiana</i> G.Barroso & Peixoto *	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>P. rivularis</i> (Cambess.) Rotman	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. rogersiana</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>P. sebastianopolitana</i> G.Barroso*	FOD	-	-	-
<i>P. spiciflora</i> (Nees & Mart.) Sobral*	FOD	-	-	-
<i>P. spiritosantensis</i> (Mattos) Mattos*	FOD	-	-	-
<i>P. stictophylla</i> G.Barroso & Peixoto*	FOD	-	-	-
<i>P. subavenia</i> Sobral*	FOD	-	-	-
<i>P. trunciflora</i> (O.Berg) Kausel	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Psidium</i> – 32/100				
<i>P. amplexicaule</i> Pers.	RST	-	-	-
<i>P. araucanum</i> Soares-Silva & Proença*	FOM	-	-	-
<i>P. australe</i> Cambess.	FCA	-	-	-
<i>P. bahianum</i> Landrum & Funch*	FOD	-	-	-
<i>P. brownianum</i> Mart. ex DC.	FOD	-	-	-
<i>P. cattleianum</i> Sabine*	FOD, RST, FES	-	-	-
<i>P. cauliflorum</i> Landrum & Sobral*	FOD	-	-	-
<i>P. cupreum</i> DC.	FOD	-	-	-
<i>P. decussatum</i> DC.	FOD	-	-	-
<i>P. firmum</i> O.Berg	FCA	-	-	-
<i>P. giganteum</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>P. glaziovianum</i> Kiaersk.	FOD	-	-	-
<i>P. guineense</i> Sw.	FCA, FOD, FES, FED, RST	-	-	-
<i>P. larutense</i> Cambess.	FOD	-	-	-
<i>P. longipetiolatum</i> D.Legrand*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. macahense</i> O.Berg*	FOD, RST	-	-	-
<i>P. myrtoides</i> O.Berg	FOD, FES RST	-	-	-
<i>P. nutans</i> O.Berg	FCA	-	-	-
<i>P. oblongatum</i> O.Berg*	FOD	-	-	-
<i>P. oblongifolium</i> O.Berg	FOD	-	-	-
<i>P. oligospermum</i> DC.	FCA, FOD	-	-	-
<i>P. ovale</i> (Spreng.) Burret*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. reptans</i> (D.Legrand) Soares-Silva & Proença*	FCA	-	-	-
<i>P. riparium</i> Mart. ex DC.	FOD	-	-	-
<i>P. robustum</i> O.Berg	FCA	-	-	-
<i>P. rufum</i> Mart. ex DC. *	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. salutare</i> (Kunth) O.Berg	FCA, FOD	-	-	-
<i>P. sartorianum</i> (O.Berg) Nied.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. schenckianum</i> Kiaersk.	FCA	-	-	-
<i>P. sorocabense</i> O.Berg	FOD	-	-	-
<i>P. striatulum</i> Mart. ex DC.	FOD	-	-	-
<i>P. ubatubense</i> Mattos*	FOD	-	-	-
<i>Siphoneugena</i> – 7/9				
<i>S. delicata</i> Sobral & Proença*	FOD	-	-	-
<i>S. dussii</i> (Krug & Urb.) Proença	FOD	-	-	-
<i>S. guilfoyleiana</i> Proença*	FOD, RST	-	-	-
<i>S. kiaerskoviana</i> (Burret) Kausel*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>S. kuhlmannii</i> Mattos*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
<i>S. reitzii</i> D.Legrand*	FOM, FOD	-	-	-
<i>S. widgreniana</i> O.Berg*	FES, FOD, FOM,	-	-	-

Nyctaginaceae

Cyl Farney Catarino de Sá

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
NYCTAGINACEAE – 27/300-400				
<i>Andradea</i> * – 1/1				
<i>A. floribunda</i> All.*	FOD, FES	-	-	-
<i>Belemia</i> * – 1/1				
<i>B. fucsioides</i> Pires*	FOD, FES	-	-	-
<i>Boerhavia</i> – 1/20				
<i>B. diffusa</i> L.	FOD, FES, RST, FOM, FED	-	-	-
<i>Bougainvillea</i> – 2/18				
<i>B. glabra</i> Choisy	FES, FED	-	-	-
<i>B. spectabilis</i> Willd.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Guapira</i> – 8/30-40				
<i>G. areolata</i> (Heimerl) Lundell	FOD, FES	-	-	-
<i>G. hirsuta</i> (Choisy) Lundell	FOD, FES	-	-	-
<i>G. nitida</i> (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell*	FOD, RST	-	-	-
<i>G. obtusata</i> (Jacq.) Little	FOD, RST	-	-	-
<i>G. opposita</i> (Vell.) Reitz	FOD, FES, RST, MAN	-	-	-
<i>G. pernambucensis</i> (Casar.) Lundell*	RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>G. tomentosa</i> (Casar.) Lundell*	FOD, FCA	-	-	-
<i>G. venosa</i> (Choisy) Lundell	FOD	-	-	-
<i>Leucaster</i> * – 1/1				
<i>L. caniflorus</i> (Mart.) Choisy*	RST, FES	-	-	-
<i>Mirabilis</i> – 1/54				
<i>M. jalapa</i> L.	FOD, FES	-	-	-
<i>Neea</i> – 9/30-40				
<i>N. floribunda</i> Poepp. & Endl.	FOD, FES	-	-	-
<i>N. hermaphrodita</i> S.Moore	FES	-	-	-
<i>N. hirsuta</i> Poepp. & Endl.	FOD	-	-	-
<i>N. laxa</i> Poepp. & Endl.	FOD	-	-	-
<i>N. macrophylla</i> Poepp. & Endl.	FES	-	-	-
<i>N. ovalifolia</i> Spruce ex J.A.Schmidt	FOD	-	-	-
<i>N. pendulina</i> Heimerl*	FOD	-	-	-
<i>N. schwackeana</i> Heimerl*	FOD	-	-	-
<i>N. verticillata</i> Ruiz & Pav.	FOD	-	-	-
<i>Pisonia</i> – 2/35				
<i>P. aculeata</i> L.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>P. ambigua</i> Heimerl	FOD, FOM	-	-	-
<i>Ramisia</i> * – 1/1				
<i>R. brasiliensis</i> Oliv.*	FOD, FES	-	-	-

Nymphaeaceae

Maria do Carmo Estanislau do Amaral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
NYMPHAEACEAE – 14/60				
Nymphaea – 14/50				
N. amazonum Mart. & Zucc.	FAQ	-	-	-
N. ampla (Salisb.) DC.	FAQ	-	-	-
N. caerulea Savigny	FAQ	-	-	-
N. conardii Wiersema	FAQ	-	-	-
N. gardneriana Planch.	FAQ	-	-	-
N. gibertii (Morong) Conard	FAQ	-	-	-
N. jamesoniana Planch.	FAQ	-	-	-
N. lasiophylla Mart. & Zucc.	FAQ	-	-	-
N. lingulata Wiersema	FAQ	-	-	-
N. lotus L.	FAQ	-	-	-
N. mexicana Zucc.	FAQ	-	-	-
N. odorata Aiton	FAQ	-	-	-
N. rudgeana G.Mey.	FAQ	-	-	-
N. tenerinervia Casp.	FAQ	-	-	-

Ochnaceae

Claudio Nicoletti de Fraga & Ary Teixeira de Oliveira-Filho

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OCHNACEAE – 59/ca.400				
Elvasia – 4/15				
E. capixaba Fraga & Saavedra*	FOD	-	-	-
E. gigantifolia Fraga & Saavedra*	FOD	-	-	-
E. kollmannii Fraga & Saavedra*	FOD	-	-	-
E. tricarpellata Sastre*	FOD	-	-	-
Luxemburgia – 8/17				
L. bracteata Dwyer	FCA	-	-	-
L. corymbosa A.St.-Hil.*	FES	-	VU	ANEXO II
L. glazioviana (Engl.) Beauverd*	FCA	-	-	-
L. misteriosa Fraga & Feres*	AFL	-	-	-
L. nobilis Eichler ex Engl.*	FCA	-	-	-
L. octandra A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
L. schwackeana Taub.	FCA	-	-	-
L. speciosa A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
Ouratea – 38/ca.150				
O. bahiensis Sastre*	FOD, RST	-	-	-
O. blanchetiana (Planch.) Engl.*	FOD, RST	-	-	-
O. campos-portoi Sleumer*	FOD	-	-	-
O. cassinifolia (DC.) Engl.*	FOD, RST	-	-	-
O. castaneifolia (DC.) Engl.	FOD	-	-	-
O. cearensis (Tiegh.) Santos*	FOD	-	-	-
O. crassa Tiegh.*	FOD, RST	-	-	-
O. crassifolia (Pohl) Engl.	FOD, FES	-	-	-
O. cuspidata Tiegh.*	FOD, RST	-	-	-
O. decipiens Tiegh.*	FOD	-	-	-
O. fieldingiana Engl.	RST	-	-	-
O. floribunda (A.St.-Hil.) Engl.	FOD, FES	-	-	-
O. gigantophylla (Erhardt) Engl.*	FOD, RST	-	-	-
O. grandifolia (Planch.) Engl.*	FOD	-	-	-
O. hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.	FOD, FES	-	-	-
O. humilis (A.St.-Hil.) Engl.*	FOD	-	-	-
O. longipes Sastre	FOD	-	-	-
O. lucidula (Turcz.) Engl.*	FOD, FES	-	-	-
O. miersii (Planch.) Engl.*	FOD	-	-	-
O. multiflora (Pohl) Engl.*	FOD	-	-	-
O. oleifolia (A.St.-Hil.) Engl.	FES	-	-	-
O. oliviformis (A.St.-Hil.) Engl.*	FOD	-	-	-
O. papulosa Sastre*	FOD	-	-	-
O. parviflora (DC.) Baill.*	FOD, FES	-	-	-
O. parvifolia (A.St.-Hil.) Engl.	FES	-	-	-
O. platycaulis Sastre*	RST	-	-	-
O. polygyna Engl.	FOD, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>O. pychnostachys</i> (Mart. ex Erhardt) Engl.*	FOD	-	-	-
<i>O. rotundifolia</i> (Field & Gardn.) Engl.	FOD, RST	-	-	-
<i>O. salicifolia</i> (A.St.-Hil. & Tul.) Engl.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>O. sellowii</i> (Planch.) Engl.*	FOD	-	-	-
<i>O. semiserrata</i> (Mart.et Nees) Engl.	FES	-	-	-
<i>O. spectabilis</i> (Mart.) Engl.	FES	-	-	-
<i>O. stipulata</i> (Vell.) Engl.*	FOD	-	-	-
<i>O. suaveolens</i> Engl.*	FOD, RST	-	-	-
<i>O. tenuifolia</i> Engl.	FOD, FES	-	-	-
<i>O. vaccinioides</i> (A.St.-Hil. & Tul.) Engl.*	FOD	-	-	-
<i>O. verticillata</i> (Vell.) Engl.	FOD, FES	-	-	-
<i>Sauvagesia</i> – 9/ca.70				
<i>S. alpestris</i> (Mart.) Zappi & E.Lucas*	FCA	-	-	-
<i>S. capillaris</i> (A.St.-Hil.) Sastre	FCA	-	-	-
<i>S. erecta</i> L.	FCA	-	-	-
<i>S. ericoides</i> (A.St.-Hil.) Sastre	FCA	-	-	-
<i>S. glandulosa</i> (A.St.-Hil.) Sastre	FCA	-	-	-
<i>S. racemosa</i> A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
<i>S. sprengelii</i> A.St.-Hil.	FOM	-	-	-
<i>S. tenella</i> Lam.	FCA	-	-	-
<i>S. vellozii</i> (Vell. ex A.St.-Hil.) Sastre*	FOM	-	-	-

Olacaceae

Milton Groppo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OLACACEAE – 13/103				
Aptandra – 1/3				
A. tubicina (Poepp.) Benth. ex Miers	FOD	-	-	-
Cathedra – 2/4				
C. bahiensis Sleumer*	FOD	-	-	-
C. rubricaulis Miers*	FOD	-	-	-
Dulacia – 3/15				
D. papillosa (J.O.Rangel) Sleumer	FOD	-	-	-
D. pauciflora (Benth.) Kuntze	FOD	-	-	-
D. singularis Vell.*	FOD	-	-	-
Heisteria – 5/33				
H. brasiliensis (Engl.) Sleumer	FES, FOD	-	-	-
H. cauliflora Sm.	FOD	-	-	-
H. ovata Benth.	FOD	-	-	-
H. perianthomega (Vell.) Sleumer	FES, FOD	-	-	-
H. silvianii Schwacke*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Tetrastylidium – 1/2				
T. grandiflorum (Baill.) Sleumer*	FOD	-	-	-
Ximenia – 1/8				
X. americana L.	FOD	-	-	-

Oleaceae

Julio Antonio Lombardi

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OLEACEAE – 9/25				
<i>Chionanthus</i> – 9/ca.60				
<i>C. crassifolius</i> (Mart.) P.S.Green	FES	-	-	-
<i>C. ferrugineus</i> (Gilg) P.S.Green	FES	-	-	-
<i>C. filiformis</i> (Vell.) P.S.Green*	FOD	-	-	-
<i>C. fluminensis</i> (Miers) P.S.Green*	FOD	CR	-	-
<i>C. greenii</i> Lombardi*	FES	-	-	-
<i>C. micranthus</i> (Mart.) Lozano & Fuertes*	FOD	VU	-	-
<i>C. subsessilis</i> (Eichler) P.S.Green	FES	CR	EN	ANEXO I
<i>C. tenuis</i> P.S.Green*	FOD	CR	-	-
<i>C. trichotomus</i> (Vell.) P.S.Green	FOD	-	-	-

Onagraceae

Ana Odete Santos Vieira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ONAGRACEAE – 41/656				
<i>Epilobium</i> – 1/165				
<i>E. hirtigerum</i> A.Cunn.	FOM, FAQ	-	-	-
<i>Fuchsia</i> – 8/105				
<i>F. alpestris</i> Gardner*	FOM, FCA	-	-	-
<i>F. brachelinae</i> Munz*	FCA	-	-	-
<i>F. brevilobes</i> P.Berry*	FOM	-	-	-
<i>F. campos-portoi</i> Pilger & Schulze *	FOM, FCA	-	-	-
<i>F. coccinea</i> Dryander*	FOM	-	-	-
<i>F. glazioviana</i> Taubert*	FOD	-	-	-
<i>F. hatschbachii</i> P.Berry*	FCA	-	-	-
<i>F. regia</i> (Vell.) Munz*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Ludwigia</i> – 26/82				
<i>L. affinis</i> (DC.) H.Hara	FAQ	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>L. anastomosans</i> (DC.) H.Hara*	FOM, FAQ	VU	-	-
<i>L. bonariensis</i> (Micheli) H.Hara	FAQ	-	-	-
<i>L. burchellii</i> (Micheli) H.Hara	FAQ	-	-	-
<i>L. caparosa</i> (Cambess.) H.Hara	FAQ	-	-	-
<i>L. elegans</i> (Cambess.) H.Hara	FAQ	-	-	-
<i>L. erecta</i> (L.) H.Hara	FAQ	-	-	-
<i>L. grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	FAQ	-	-	-
<i>L. hookeri</i> (Micheli) H.Hara	FAQ	-	-	-
<i>L. hyssopifolia</i> (G.Don) Exell	FAQ	-	-	-
<i>L. irwinii</i> Ramamoorthy	FAQ	-	-	-
<i>L. lagunae</i> (Morong) H.Hara	FAQ	-	-	-
<i>L. laruotteana</i> (Cambess.) H.Hara	FAQ	-	-	-
<i>L. leptocarpa</i> (Nutt.) H.Hara	FAQ	-	-	-
<i>L. longifolia</i> (DC.) H.Hara	FAQ	-	-	-
<i>L. major</i> (Micheli) Ramamoorthy	FAQ	-	-	-
<i>L. martii</i> (Micheli) Ramamoorthy	FAQ	-	-	-
<i>L. multinervia</i> (Hook. & Arn.) Ramamoorthy	FAQ	-	-	-
<i>L. myrtifolia</i> (Cambess.) H.Hara	FAQ	-	-	-
<i>L. nervosa</i> (Poir.) H.Hara	FAQ	-	-	-
<i>L. octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven	FAQ	-	-	-
<i>L. peploides</i> (Kunth) P.H.Raven	FAQ	-	-	-
<i>L. peruviana</i> (L.) H.Hara	FAQ	-	-	-
<i>L. quadrangularis</i> (Micheli) H.Hara*	FOM	-	-	-
<i>L. sedoides</i> (Bonpl.) H.Hara	FAQ	-	-	-
<i>L. sericea</i> (Cambess.) H.Hara	FAQ	-	-	-
<i>Oenothera</i> – 6/145				
<i>O. affinis</i> Cambess.	FOM	-	-	-
<i>O. catharinensis</i> Cambess.*	RST	-	-	-
<i>O. indecora</i> W.Dietr.	FCA	-	-	-
<i>O. mollissima</i> L.	FCA, RST	-	-	-
<i>O. parodiana</i> W.Dietr.	FCA	-	-	-
<i>O. ravenii</i> W.Dietr.	FCA	-	-	-

Opiliaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OPILIACEAE – 3/33				
<i>Agonandra</i> – 3/10				
<i>A. brasiliensis</i> Miers <i>ex</i> Benth. & Hook.	FES	-	-	-
<i>A. excelsa</i> Griseb.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>A. fluminensis</i> Rizzini & Occhioni*	FOD	-	-	-

Orchidaceae

Fábio de Barros, Vinícius Trettel Rodrigues & João Aguiar Nogueira Batista

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ORCHIDACEAE – 1.257/24.900				
Acianthera – 78/140				
A. acuminatipetala (A.Samp.) Luer*	FOD	-	-	-
A. adirii (Brade) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. alborosea (Kraenzl.) Luer*	FOD	-	-	-
A. alligatorifera (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. antennata (Garay) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. aphthosa (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
A. auriculata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
A. aveniformis (Hoehne) C.N.Gonç. & Waechter	FOM	-	-	-
A. binotii (Regel) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. brachyloba (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. bragae (Ruschi) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. caldensis (Hoehne & Schltr.) F.Barros*	FOM	-	-	-
A. capanemae (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. capillaris (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. crinita (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. cristata (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
A. cryptantha (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. cryptophoranthoides (Loefgr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. duartei (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. dutrae (Pabst) C.N.Conç. & Waechter*	FOM	-	-	-
A. exarticulata (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. exdrasii (Luer & Toscano) Luer*	FOD	-	-	-
A. fenestrata (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. glanduligera (Lindl.) Luer*	FOM	-	-	-
A. glumacea (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. gracilisejala (Brade) Luer*	FES	-	-	-
A. guimaraensis (Brade) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. heliconiscapa (Hoehne) F.Barros*	FOM	-	-	-
A. heringeri (Hoehne) F.Barros	FOM	-	-	-
A. hoffmannseggiana (Rchb.f.) Luer*	FOM	-	-	-
A. hygrophila (Berb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
A. hystrix (Kraenzl.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. johannensis (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase	AFL	-	-	-
A. jordanensis (Brade) F.Barros*	FOM	-	-	-
A. karlii (Pabst) C.N.Conç. & Waechter*	FOD	-	-	-
A. klotzschiana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
A. leptotifolia (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
A. limae (Porto & Brade) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. luteola (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
A. macropoda (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. macuconensis (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. magalhanesii</i> (Pabst) F.Barros*	FOD	-	-	-
<i>A. malachantha</i> (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
<i>A. marumbyana</i> (Garay) Luer*	FOD	-	-	-
<i>A. melachyla</i> (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
<i>A. micrantha</i> (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
<i>A. modestissima</i> (Rchb.f. & Warm.) Pridgeon & M.W.Chase	FES	-	-	-
<i>A. muscicola</i> (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
<i>A. muscosa</i> (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
<i>A. nemorosa</i> (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. ochreate</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM, FES	-	-	-
<i>A. octophrys</i> (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD, FES	-	-	-
<i>A. oligantha</i> (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
<i>A. panduripetala</i> (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
<i>A. papillosa</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
<i>A. pardipes</i> (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
<i>A. pectinata</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
<i>A. prolifera</i> (Herb. ex Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	FES	-	-	-
<i>A. pubescens</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. punctata</i> (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
<i>A. purpureoviolacea</i> (Cogn.) F.Barros*	FOD	-	-	-
<i>A. ramosa</i> (Barb.Rodr.) F.Barros	FOM	-	-	-
<i>A. recurva</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
<i>A. rostellata</i> (Barb.Rodr.) Luer*	FOM	-	-	-
<i>A. saundersiana</i> (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>A. saurocephala</i> (Lodd.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
<i>A. serpentula</i> (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
<i>A. sonderana</i> (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
<i>A. spilantha</i> (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
<i>A. strupifolia</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
<i>A. teres</i> (Lindl.) Borba	FES, AFL	-	-	-
<i>A. translucida</i> (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
<i>A. tricarinata</i> (Poepp. & Endl.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
<i>A. tristis</i> (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
<i>A. variegata</i> (Barb.Rodr.) Campacci*	FOD	-	-	-
<i>A. violaceomaculata</i> (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
<i>A. wagneriana</i> (Klotzsch) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
<i>A. wels-windischiae</i> (Pabst) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
Alatiglossum – 8/18				
<i>A. barbatum</i> (Lindl.) Baptista	FED	-	-	-
<i>A. ciliatum</i> (Lindl.) Baptista	FOM, FES	-	-	-
<i>A. cognauxianum</i> (Schltr.) Baptista*	FOD	-	-	-
<i>A. croesus</i> (Rchb.f.) Baptista*	FOD	-	-	-
<i>A. longipes</i> (Lindl.) Baptista	FOD, FOM	-	-	-
<i>A. macropetalum</i> (Lindl.) Baptista	FOM	-	-	-
<i>A. micropogon</i> (Rchb.f.) Baptista	FOM	-	-	-
<i>A. uniflorum</i> (Booth.) Baptista*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Anathallis – 54/100				
A. adenochila (Loefgr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. aquinoi (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD, FOM	-	-	-
A. bleyensis (Pabst) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. carvalhoi (Luer & Toscano) Luer*	FOD	-	-	-
A. citrina (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. corticicola (Schltr. ex Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. crebrifolia (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
A. dryadum (Schltr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. ferdinandiana (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. fernandiana (Hoehne) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. flammea (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. gehrtii (Hoehne & Schltr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. gert-hatschbachii (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. githaginea (Pabst & Garay) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. graveolens (Pabst) F.Barros	FOD, AFL	-	-	-
A. guarujaensis (Hoehne) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. helmutii (Hoehne) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. imbricata (Barb.Rodr.) F.Barros & F.Pinheiro	FOM	-	-	-
A. jordanensis (Hoehne) F.Barros*	FOM	-	-	-
A. kautskyi (Pabst) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. kleinii (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
A. lichenophila (Porto & Brade) Luer*	FOD	-	-	-
A. linearifolia (Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase	FOM	-	-	-
A. liparanges (Rchb.f.) Luer*	FOD	-	-	-
A. malmeana (Dutra ex Pabst) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. microblephara (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. microgemma (Schltr. ex Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. microphyta (Barb.Rodr.) C.O.Azevedo & van den Berg	FOM	-	-	-
A. modesta (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. montipelladensis (Hoehne) F.Barros *	FOD	-	-	-
A. nectarifera Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
A. obovata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	FOD, FOM	-	-	-
A. pabstii (Garay) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. paranaensis (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. paranapiacabensis (Hoehne) F.Barros *	FOD	-	-	-
A. peroupavae (Hoehne & Brade) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. petersiana (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. piratiningana (Hoehne) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. pubipetala (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. pusilla (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. puttemansii (Hoehne) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. radialis (Porto & Brade) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
A. reedii (Luer) F.Barros*	FOD	-	-	-
A. rubens (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOM	-	-	-
A. rudolfii (Pabst) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. sclerophylla</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
<i>A. simpliciglossa</i> (Loefgr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
<i>A. sororcula</i> (Schltr.) Luer*	FOD	-	-	-
<i>A. spannageliana</i> (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
<i>A. stictophylla</i> (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
<i>A. subnulla</i> (Luer & Toscano) F.Barros*	FOD	-	-	-
<i>A. trullilabia</i> (Pabst) F.Barros*	FOD	-	-	-
<i>A. welteri</i> (Pabst) F.Barros*	FOM	-	-	-
<i>A. ypirangae</i> (Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
<i>Anneliesia</i> * – 4/4				
<i>A. candida</i> (Lindl.) Brieger & Lückel*	FOD	-	-	-
<i>A. cuneata</i> (Lindl.) Senghas & Lückel*	FOD	-	-	-
<i>A. kayasimae</i> (Pabst) Senghas & Lückel*	FOD	-	-	-
<i>A. russeliana</i> (Lindl.) Senghas & Lückel*	FOD	-	-	-
<i>Aspasia</i> – 2/7				
<i>A. lunata</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>A. silvana</i> F.Barros*	FOD	-	-	-
<i>Aspidogyne</i> – 12/20				
<i>A. argentea</i> (Vell.) Garay*	FOD	-	-	-
<i>A. bidentifera</i> (Schltr.) Garay	FOM	-	-	-
<i>A. bruxelii</i> (Pabst) Garay	FOM	-	-	-
<i>A. commelinoides</i> (Barb.Rodr.) Garay*	FOM	-	-	-
<i>A. decora</i> (Rchb.f.) Garay & G.Romero	FOM	-	-	-
<i>A. fimbrillaris</i> (B.S.Will.) Garay*	FOD	-	-	-
<i>A. foliosa</i> (Poepp. & Endl.) Garay	FOM	-	-	-
<i>A. hylibates</i> (Rchb.f.) Garay*	FOD	-	-	-
<i>A. kuczynskii</i> (Porsch) Garay	FOM	-	-	-
<i>A. lindleyana</i> (Cogn.) Garay	FOM	-	-	-
<i>A. logicornu</i> (Cogn.) Garay	FOM	-	-	-
<i>A. malmei</i> (Kraenzl.) Garay	FOM	-	-	-
<i>Baptistonia</i> – 24/27				
<i>B. albinoi</i> (Schltr.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>B. amicta</i> (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	FOM	-	-	-
<i>B. brieniana</i> (Rchb.f.) V.P.Castro & Chiron	FOM	-	-	-
<i>B. colorata</i> (Koern. & J.G.Winman) Chiron*	FOD	-	-	-
<i>B. cornigera</i> (Lindl.) Chiron & V.P.Castro	FOM	-	-	-
<i>B. cruciata</i> (Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>B. damacenoï</i> Chiron & V.P.Castro*	FOM	-	-	-
<i>B. echinata</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>B. gutfreundiana</i> (Chiron & V.P.Castro) Chiron & V.P.Castro*	FOM	-	-	-
<i>B. kautskyi</i> (Pabst) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>B. leinigii</i> (Pabst) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>B. lietzei</i> (Regel) Chiron & V.P.Castro*	FOM	-	-	-
<i>B. nitida</i> (Barb.Rodr.) Chiron & V.P.Castro*	FOM	-	-	-
<i>B. pabstii</i> (Campacci & C.Espejo) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>B. pubes</i> (Lindl.) Chiron & V.P.Castro	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. pulchella</i> (Regel) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>B. riograndensis</i> (Cogn.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>B. sarcodes</i> (Lindl.) van den Berg & M.W.Chase*	FOD	-	-	-
<i>B. silvana</i> (V.P.Castro & Campacci) V.P.Castro & Chiron*	FOD	-	-	-
<i>B. truncata</i> (Pabst) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>B. uhlii</i> Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>B. velteriana</i> V.P.Castro & Chiron*	FOD	-	-	-
<i>B. venusta</i> (Drapiez) Chiron*	FOD	-	-	-
<i>B. widgrenii</i> (Lindl.) V.P.Castro & Chiron*	FOM	-	-	-
Barbosella – 10/18				
<i>B. australis</i> (Cogn.) Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>B. cogniauxiana</i> (Speg. & Kraenzl.) Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>B. crassifolia</i> (Edwall) Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>B. dusenii</i> (A.Samp.) Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>B. gardneri</i> (Lindl.) Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>B. macaheensis</i> (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
<i>B. miersii</i> (Lindl.) Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>B. porschii</i> (Kraenzl.) Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>B. spiritu-sanctensis</i> (Pabst) F.Barros & Toscano*	FOD	-	-	-
<i>B. trilobata</i> Pabst*	FOD	-	-	-
Baskervilla – 1/12				
<i>B. paranaensis</i> (Kraenzl.) Schltr.*	FOD, FES	-	-	-
Bifrenaria – 15/18				
<i>B. atropurpurea</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>B. aureofulva</i> (Hook.) Lindl.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>B. calcarata</i> Barb.Rodr.	FOD	-	-	-
<i>B. charlesworthii</i> Rolfe*	FOD	-	-	-
<i>B. clavigera</i> Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>B. harrisoniae</i> (Hook.) Rchb.f.	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. inodora</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>B. leucorrhoda</i> Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>B. mellicolor</i> Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>B. racemosa</i> (Hook.) Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>B. silvana</i> V.P.Castro*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>B. stefanae</i> V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>B. tetragona</i> (Lindl.) Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>B. vitellina</i> (Lindl.) Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>B. wittigii</i> (Rchb.f.) Hoehne*	FOD	-	VU	ANEXO II
Binotia* – 2/2				
<i>B. messmeriana</i> Campacci*	FOD	-	-	-
<i>B. brasiliensis</i> (Rolfe) Rolfe*	FOD	-	-	-
Bipinnula – 1/11				
<i>B. biplumata</i> (L.f.) Rchb.f.	FCA	-	-	-
Brachionidium – 1/65				
<i>B. restrepioides</i> (Hoehne) Pabst*	FOD	-	-	-
Brachystele – 4/20				
<i>B. cyclochila</i> (Kraenzl.) Schltr.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. dilatata</i> (Lindl.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>B. subfiliformis</i> (Cogn.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>B. widgrenii</i> (Rchb.f.) Schltr.	FCA	-	-	-
Brasilidium – 9/10				
<i>B. crispum</i> (Lodd.) Campacci*	FOM	-	-	-
<i>B. curtum</i> (Lindl.) Campacci*	FOM	-	-	-
<i>B. forbesii</i> (Hook.) Campacci	FOM	-	-	-
<i>B. gardneri</i> (Lindl.) Campacci	FOM	-	-	-
<i>B. gravesianum</i> (Rolfe) Campacci	FOM	-	-	-
<i>B. marshallianum</i> (Rchb.f.) Campacci*	FOD	-	-	-
<i>B. pectorale</i> (Lindl.) Campacci*	FOD	-	-	-
<i>B. praetextum</i> (Rchb.f.) Campacci*	FOM	-	-	-
<i>B. zappii</i> (Pabst) Campacci*	FOM	-	-	-
Brasiliorchis – 12/13				
<i>B. barbosa</i> (Loefgr.) R.Singer <i>et al.</i> *	FOM	-	-	-
<i>B. chrysantha</i> (Barb.Rodr.) R.Singer <i>et al.</i> *	FOM	-	-	-
<i>B. consanguinea</i> (Klotzsch) R.Singer <i>et al.</i> *	FOM, AFL	-	-	-
<i>B. gracilis</i> (Lodd.) R.Singer <i>et al.</i> *	FOM	-	-	-
<i>B. kautskyi</i> (Pabst) R.Singer <i>et al.</i> *	FOD	-	-	-
<i>B. marginata</i> (Lindl.) R.Singer <i>et al.</i> *	FOM	-	-	-
<i>B. phoenicanthera</i> (Barb.Rodr.) R.Singer <i>et al.</i> *	FOD	-	-	-
<i>B. picta</i> (Hook.) R.Singer <i>et al.</i> *	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. polyantha</i> (Barb.Rodr.) R.Singer <i>et al.</i> *	FOD	-	-	-
<i>B. porphyrostele</i> (Rchb.f.) R.Singer <i>et al.</i> *	FOD	-	-	-
<i>B. schunkiana</i> (Campacci & Kautsky) R.Singer	FOD	-	-	-
<i>B. ubatubana</i> (Hoehne) R.Singer <i>et al.</i> *	FOD	-	-	-
Brassavola – 2/20				
<i>B. flagellaris</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>B. tuberculata</i> Hook.	FOD, FOM, RST, MAN	-	-	-
Brassia – 1/34				
<i>B. arachnoidea</i> Barb.Rodr.	FOD	-	-	-
Bulbophyllum – 30/1.800				
<i>B. arianae</i> Fraga & E.C.Smidt*	FOD	-	-	-
<i>B. atropurpureum</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>B. boudetianum</i> Fraga*	FOM	-	-	-
<i>B. campos-portoi</i> Brade*	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. cantagallense</i> (Barb.Rodr.) Cogn.	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. carassense</i> R.C. Mota <i>et al.</i> *	FES, AFL	-	-	-
<i>B. chloroglossum</i> Rchb.f. & Warm.	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. chloropterum</i> Rchb.f.	FOD	-	-	-
<i>B. dusenii</i> Kraenzl.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>B. epiphytum</i> (Barb.Rodr.) Cogn.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>B. exaltatum</i> Lindl.	FOM, AFL	-	-	-
<i>B. gehrtii</i> E.C.Smidt & Borba	FOM, FES	-	-	-
<i>B. gladiatum</i> Lindl.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>B. glutinosum</i> (Barb.Rodr.) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. granulosum</i> Barb.Rodr.*	FOD, FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. kautskyi</i> Toscano*	FOD	-	-	-
<i>B. macroceras</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>B. malachadenia</i> Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. melloi</i> Pabst	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. mentosum</i> Barb.Rodr.	FOM, FES	-	-	-
<i>B. meridense</i> Rchb.f.	FOD, FOM, AFL	-	-	-
<i>B. micranthum</i> Barb.Rodr.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>B. micropetaliforme</i> J.E.Leite	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. napellii</i> Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. perii</i> Schltr.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>B. plumosum</i> (Barb.Rodr.) Cogn.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>B. regnellii</i> Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>B. teimosense</i> E.C.Smidt & Borba*	FOD	-	-	-
<i>B. tripetalum</i> Lindl.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>B. weddellii</i> (Lindl.) Rchb.f.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>Camaridium</i> – 3/80				
<i>C. carinatum</i> (Barb.Rodr.) Hoehne	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. micranthum</i> M.A.Blanco*	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. ochroleucum</i> Lindl.	FOM	-	-	-
<i>Campylocentrum</i> – 24/73				
<i>C. aciculatum</i> (Rchb.f. & Warm.) Cogn.*	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>C. aromaticum</i> Barb.Rodr.	FOM	-	-	-
<i>C. brachycarpum</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>C. crassirhizum</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>C. densiflorum</i> Cogn.	FOM	-	-	-
<i>C. gracile</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>C. grisebachii</i> Cogn.	FOM	-	-	-
<i>C. hirtellum</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>C. iglesiasii</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>C. lansbergii</i> (Rchb.f.) Schltr.	FOM	-	-	-
<i>C. linearifolium</i> Cogn.	FOM	-	-	-
<i>C. micranthum</i> (Lindl.) Rolfe	FOM, RST	-	-	-
<i>C. neglectum</i> (Rchb.f. & Warm.) Cogn.	FOM, RST	-	-	-
<i>C. organense</i> (Rchb.f.) Rolfe*	FOD	-	-	-
<i>C. ornithorhynchum</i> (Lindl.) Rolfe*	FOD	-	-	-
<i>C. parahybunense</i> (Barb.Rodr.) Rolfe*	FOD	-	-	-
<i>C. pauloense</i> Schltr. & Hoehne	FOD	-	-	-
<i>C. pernambucense</i> Hoehne*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>C. pubirhachys</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>C. robustum</i> Cogn.	FOM	-	-	-
<i>C. sellowii</i> (Rchb.f.) Rolfe	FOM	-	-	-
<i>C. spannagelii</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>C. ulei</i> Cogn.*	FOM	-	-	-
<i>C. wawrae</i> (Rchb.f. ex Beck) Rolfe	FOM	-	-	-
<i>Capanemia</i> – 11/14				
<i>C. adelaidae</i> Brade*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. angustilabia</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>C. australis</i> (Kraenzl.) Schltr.	FOM	-	-	-
<i>C. carinata</i> Barb.Rodr.	FOM	-	-	-
<i>C. fluminensis</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>C. gehrtii</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>C. micromera</i> Barb.Rodr.	FOM	-	-	-
<i>C. riograndensis</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>C. spathuliglossa</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>C. superfula</i> (Rchb.f.) Garay	FOM	-	-	-
<i>C. thereziae</i> Barb.Rodr.	FOM	-	-	-
<i>Carenidium</i> – 7/10				
<i>C. concolor</i> (Hook.) Baptista	FOM	-	-	-
<i>C. dasystyle</i> (Rchb.f.) Baptista*	FOD	-	-	-
<i>C. hookeri</i> (Rolfe) Baptista	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. loefgrenii</i> (Cogn.) Baptista*	FOD	-	-	-
<i>C. ouricanense</i> (V.P.Castro & Campacci) Baptista*	FOD	-	-	-
<i>C. paranaense</i> (Kraenzl.) Baptista	FOM	-	-	-
<i>C. raniferum</i> (Lindl.) Baptista	FOD, FOM	-	-	-
<i>Catasetum</i> – 16/157				
<i>C. arietinum</i> F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda*	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. atratum</i> Lindl.*	FOM	-	-	-
<i>C. blackii</i> Pabst*	FOM	-	-	-
<i>C. cernuum</i> (Lindl.) Rchb.f.*	FOM, FOD	-	-	-
<i>C. discolor</i> Lindl.	FOD, RST	-	-	-
<i>C. fimbriatum</i> Lindl.	FED, FES	-	-	-
<i>C. hookeri</i> Lindl.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. labiatum</i> Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
<i>C. luridum</i> Lindl.*	FOD, RST	-	-	-
<i>C. macrocarpum</i> Rich. ex Kunth	FOM	-	-	-
<i>C. mattosianum</i> Bicalho*	FOD, RST	-	-	-
<i>C. micranthum</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>C. purum</i> Nees & Sinnings*	FOD, FOD	-	-	-
<i>C. triodon</i> Rchb.f.*	FOM	-	-	-
<i>C. trulla</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>C. uncatum</i> Rolfe*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>Cattleya</i> – 18/54				
<i>C. acklandiae</i> Planch.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>C. amethystoglossa</i> Linden & Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>C. bicolor</i> Lindl.	FOM	-	-	-
<i>C. dormaniana</i> Rchb.f.*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>C. forbesii</i> Lindl.*	FOD, RST	-	-	-
<i>C. granulosa</i> Veitch*	RST	-	VU	ANEXO I
<i>C. guttata</i> Lindl.*	FOD, RST	-	-	-
<i>C. harrisoniana</i> Batem. ex Lindl.*	FOM, RST	-	-	-
<i>C. intermedia</i> Graham*	FOD, RST, MAN	-	-	-
<i>C. kerrii</i> Brieger & Bicalho*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. labiata</i> Lindl.	FES, FED, AFL	-	EN	ANEXO I
<i>C. loddigesii</i> Lindl.	FOM	-	-	-
<i>C. porphyroglossa</i> Linden & Rchb.f.	FOM	-	-	-
<i>C. schilleriana</i> Rchb.f.*	FOD	-	CR	ANEXO I
<i>C. schofieldiana</i> Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>C. tigrina</i> A.Rich.*	FOD	-	-	-
<i>C. velutina</i> Rchb.f.*	FOM	-	EN	ANEXO I
<i>C. warneri</i> T.Moore*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO I
<i>Centroglossa</i> * – 5/5				
<i>C. castellensis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>C. greeniana</i> (Rchb.f.) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>C. macroceras</i> Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>C. nuneslimae</i> Porto & Brade*	FOD	-	-	-
<i>C. tripollinica</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>Christensonella</i> – 8/10				
<i>C. acicularis</i> (Herb. ex Lindl.) Szlach. et al.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. cepula</i> (Rchb.f.) S Koehler*	FOD	-	-	-
<i>C. echinophyta</i> (Barb.Rodr.) Szlach. et al.*	FOD	-	-	-
<i>C. ferdinandiana</i> (Barb.Rodr.) Szlach. et al.*	FOM, FES	-	-	-
<i>C. neuwiedii</i> (Rchb.f.) S.Koehler*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. pumila</i> (Hook.) Szlach. et al.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. subulata</i> (Lindl.) Szlach. et al.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. vernicosa</i> (Barb.Rodr.) Szlach. et al.*	FOD, FES	-	-	-
<i>Chytroglossa</i> * – 3/3				
<i>C. aurata</i> Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>C. marileoniae</i> Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>C. paulensis</i> Edwall*	FOD	-	-	-
<i>Cirrhaea</i> – 7/9				
<i>C. dependens</i> Rchb.f.	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. loddigesii</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>C. longiracemosa</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>C. nasuta</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>C. saccata</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>C. seidelii</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>C. silvana</i> V.P.Castro & Campacci*	FOD	-	-	-
<i>Cleistes</i> – 8/20				
<i>C. castanoides</i> Hoehne	FCA	-	-	-
<i>C. gracilis</i> (Barb.Rodr.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>C. itatiaiae</i> Pabst	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. libonii</i> (Rchb.f.) Schltr.*	FOD, FOM, RST, FCA	-	-	-
<i>C. montana</i> Gardner*	FCA	-	-	-
<i>C. paranaensis</i> (Barb.Rodr.) Schltr.	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. tenuis</i> (Rchb.f. ex Griseb.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>C. unguiculata</i> (Rchb.f.) Schltr.*	FCA	-	-	-
<i>Cochleanthes</i> – 1/2				
<i>C. flabelliformis</i> (Sw.) Schult. & Garay	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Comparettia – 1/7				
C. coccinea Lindl.*	FOM	-	-	-
Constantia – 2/6				
C. australis (Cogn.) Porto & Brade	FOD	-	-	-
C. rupestris Barb.Rodr.	FOM	-	VU	ANEXO II
Coppensia – 16/30				
C. barbaceniae (Lindl.) Campacci	FCA	-	-	-
C. bifolia (Sims) Dumort	FOM	-	-	-
C. blanchetii (Rchb.f.) Campacci	FCA	-	-	-
C. caldensis (Rchb.f.) Docha Neto	FCA	-	-	-
C. doniana (Batem ex W.Baxter) Campacci*	FCA	-	-	-
C. edmundoi (Pabst) Campacci*	AFL	-	-	-
C. flexuosa (Sims) Campacci	FOD, FOM	-	-	-
C. fuscans (Rchb.f.) Campacci	FCA	-	-	-
C. hydrophyla (Barb.Rodr.) Campacci	FCA	-	-	-
C. majevskyi (Toscano & V.P.Castro) Campacci*	FCA	-	-	-
C. paranapiacabensis (Hoehne) Campacci*	FCA	-	-	-
C. pontagrossensis Campacci*	FCA	-	-	-
C. ramosa (Lindl.) Campacci	FCA	-	-	-
C. varicosa (Lindl.) Campacci	FOM	-	-	-
C. warmingii (Rchb.f.) Campacci	FCA	-	-	-
C. welteri (Pabst) Campacci*	FOM	-	-	-
Coryanthes – 1/38				
C. speciosa Hook.	FOD, FOM	-	-	-
Corymborchis – 1/6				
C. flava (Sw.) Kuntze	FOD, FOM	-	-	-
Cranichis – 3/54				
C. candida (Barb.Rodr.) Cogn.	FOM	-	-	-
C. diphylla Sw.	FOM	-	-	-
C. muscosa Sw.	FOM	-	-	-
Cryptarrhena – 2/2				
C. brasiliensis Brade*	FOD	-	-	-
C. guatemalensis Schltr.	FOD	-	-	-
Cyanaeorchis – 2/2				
C. arundinae (Rchb.f.) Barb.Rodr.	FOM, FCA	-	-	-
C. minor Schltr.	FCA	-	-	-
Cyclopogon – 25/82				
C. alexandrae (Kraenzl.) Schltr.*	FOM	-	-	-
C. apricus (Lindl.) Schltr.	FOM	-	-	-
C. argyriifolius Barb.Rodr.*	FCA	-	-	-
C. bicolor (Ker Gawl.) Schltr.	FOM	-	-	-
C. calophyllus Barb.Rodr.	FOM	-	-	-
C. cearensis Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
C. congestus (Vell.) Hoehne	FOM	-	-	-
C. dusenii Schltr.*	FOM	-	-	-
C. dutrae Schltr.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. elatus</i> (Sw.) Schltr.	FOM	-	-	-
<i>C. elegans</i> Hoehne	FOD, RST	-	-	-
<i>C. graciliscapus</i> Schltr.	FOM	-	-	-
<i>C. hatschbachii</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>C. iguapensis</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>C. itatiayensis</i> (Kraenzl.) Hoehne	FOM	-	-	-
<i>C. longibracteatus</i> (Barb.Rodr.) Schltr.	FOD	-	-	-
<i>C. multiflorus</i> Schltr.*	FOM, RST	-	-	-
<i>C. oliganthus</i> (Hoehne) Hoehne & Schltr.	FOM	-	-	-
<i>C. proboscideus</i> Szlach.*	FOD	-	-	-
<i>C. subalpestris</i> Schltr.	FOM	-	-	-
<i>C. trifasciatus</i> Schltr.	FOM	-	-	-
<i>C. variegatus</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>C. venustus</i> (Barb.Rodr.) Schltr.	FOM	-	-	-
<i>C. vittatus</i> Dutra ex Pabst*	FCA	-	-	-
<i>C. warmingii</i> (Rchb.f.) Schltr.*	FOM	-	-	-
<i>Cynoches</i> – 1/33				
<i>C. pentadactylum</i> Lindl.	FOD	-	-	-
<i>Cyrtopodium</i> – 14/44				
<i>C. aliciae</i> Lindl. & Rchb.f.	FOD	-	-	-
<i>C. brandonianum</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>C. flavum</i> Link & Otto ex Rchb.f.	FCA, RST	-	-	-
<i>C. gigas</i> (Vell.) Hoehne*	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. glutiniferum</i> Raddi	FCA	-	-	-
<i>C. hatschbachii</i> Pabst	FCA	-	-	-
<i>C. holstii</i> L.C.Menezes*	FOM, RST	-	-	-
<i>C. intermedium</i> Brade	FCA	-	-	-
<i>C. kleinii</i> J.A.N.Batista & Bianchetti	FCA	-	-	-
<i>C. lissochiloides</i> Hoehne & Schltr.	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>C. pallidum</i> Rchb.f. & Warm.	FCA	-	-	-
<i>C. palludicolum</i> Hoehne	FCA	-	-	-
<i>C. palmifrons</i> Rchb.f. & Warm.	FOM	-	-	-
<i>C. parviflorum</i> Lindl.	FOD	-	-	-
<i>Dichaea</i> – 8/110				
<i>D. anchorifera</i> Rchb.f.*	FOM	-	-	-
<i>D. australis</i> Cogn.	FOM	-	-	-
<i>D. brevicaulis</i> Cogn.*	FOM	-	-	-
<i>D. bryophylla</i> Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>D. cogniauxiana</i> Schltr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>D. mosenii</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>D. pendula</i> (Aubl.) Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>D. trulla</i> Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Dictyophyllaria</i> * – 1/1				
<i>D. dietschiana</i> (Edwall) Garay*	FCA	-	-	-
<i>Dimerandra</i> – 1/6				
<i>D. emarginata</i> (G.Mey.) Hoehne	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Dryadella – 12/42				
D. auriculigera (Rchb.f.) Luer*	FOD	-	-	-
D. aviceps (Rchb.f.) Luer*	FOD	-	-	-
D. crenulata (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
D. edwallii (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
D. espirito-santensis (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
D. gomes-ferreirae (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
D. kautskyi (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
D. liliputiana (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
D. susanae (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
D. toscanoi Luer*	FOD	-	-	-
D. vitorinoi Luer & Toscano*	FOD	-	-	-
D. zebrina (Porsch) Luer*	FOD	-	-	-
Dungsia – 2/4				
D. harpophylla (Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
D. kautskyi (Pabst) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
Elleanthus – 3/106				
E. brasiliensis Rchb.f.	FOD, FOM	-	-	-
E. crinipes Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
E. graminifolius (Barb.Rodr.) Løjtnant*	FOD, RST	-	-	-
Eltroplectris – 6/13				
E. calcarata (Sw.) Garay & Sweet	FOM, RST	-	-	-
E. janeirensis (Porto & Brade) Pabst	FOM	-	-	-
E. kuhlmanniana (Hoehne) Pabst*	FOD	-	-	-
E. lurida (M.N.Correa) Pabst	FCA	-	-	-
E. schlechteriana (Porto & Brade) Pabst	FCA	-	-	-
E. triloba (Lindl.) Pabst	FOD, RST, FCA	-	-	-
Encyclia – 19/154				
E. advena (Rchb.f.) Porto & Brade	FOM, AFL	-	-	-
E. bonhkiana V.P.Castro & Campacci*	FOM	-	-	-
E. bracteata (Barb.Rodr.) Schltr.*	FOD	-	-	-
E. bragancae Ruschi*	FOD	-	-	-
E. conchaechila (Barb.Rodr.) Porto & Brade*	FOD	-	-	-
E. cordigera (Kunth) Dressler	?	-	-	-
E. dasilvae V.P.Castro & Campacci*	FOD	-	-	-
E. dichroma (Lindl.) Schltr.	AFL	-	-	-
E. euosma (Rchb.f.) Porto & Brade*	FOD	-	-	-
E. fowliei Duveen*	FOD	-	VU	ANEXO II
E. gallopavina (Rchb.f.) Porto & Brade*	FOD, FOM	-	-	-
E. marxiana Campacci	FOM	-	-	-
E. onchidioides (Lindl.) Schltr.	FOM, AFL	-	-	-
E. osmantha (Barb.Rodr.) Schltr.	FOM, AFL	-	-	-
E. patens Hook.	FOD, FOM, RST	-	-	-
E. pauciflora (Barb.Rodr.) Porto & Brade*	FOM	-	-	-
E. silvana V.P.Castro & Campacci*	FOD	-	-	-
E. spiritusantensis L.C.Menezes*	FOD, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>E. unaensis</i> Fowlie*	FOD	-	-	-
<i>Epidendrum</i> – 64/1130				
<i>E. addae</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>E. ammophilum</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>E. anatipedium</i> L.M.Sánchez & Hágsater*	FOD	-	-	-
<i>E. armeniacum</i> Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. avicula</i> Lindl.	FOD	-	-	-
<i>E. berkeleyi</i> (Rolfe) Baptista*	FOD	-	-	-
<i>E. caldense</i> Barb.Rodr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. campaccii</i> Hágsater & L.M.Sánchez	FOM, FOD	-	-	-
<i>E. carvalhoi</i> Toscano*	FOD	-	-	-
<i>E. chlorinum</i> Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
<i>E. cinnabarinum</i> Salzm.*	RST	-	-	-
<i>E. cooperianum</i> Batem.	FOD	-	-	-
<i>E. coronatum</i> Ruiz & Pav.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. cristatum</i> Ruiz & Pav.*	FOD	-	-	-
<i>E. dendrobioides</i> Thunb.	FOM	-	-	-
<i>E. densiflorum</i> Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. denticulatum</i> Barb.Rodr.	FOM, AFL, RST	-	-	-
<i>E. ecostatum</i> Pabst*	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. filicaule</i> (Sw.) Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>E. forcipatoides</i> Hágsater*	FOD	-	-	-
<i>E. fulgens</i> Brongn.*	RST	-	-	-
<i>E. garciae</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>E. geniculatum</i> Barb.Rodr.	FOD	-	-	-
<i>E. goebelii</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>E. henschenii</i> Barb.Rodr.	FOM	-	-	-
<i>E. hololeucum</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>E. imatophyllum</i> Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. infaustum</i> Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. janeirense</i> Porto & Brade*	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. kautskyi</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>E. klueppelianum</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>E. latilabre</i> Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. loefgrenii</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>E. magdalenense</i> Porto & Brade*	FOD	-	-	-
<i>E. mantiqueiranum</i> Porto & Brade	FOM	-	-	-
<i>E. martianum</i> Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. minarum</i> Hoehne & Schltr.	FOM, AFL	-	-	-
<i>E. nocturnum</i> Jacq.	FOM, FOD	-	-	-
<i>E. nutans</i> Sw.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. obergii</i> Hawkes	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. ochrochlorum</i> Barb.Rodr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. orchidiflorum</i> (Salzm.) Lindl.	FOM, RST	-	-	-
<i>E. paniculosum</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>E. paranaense</i> Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. patens</i> Sw.	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>E. pium</i> Rchb.f. & Warm.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. proligerum</i> Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. pseudodifforme</i> Hoehne & Schltr.*	FOM, FOD	-	-	-
<i>E. punicoluteum</i> F.Pinheiro & F.Barros*	FOD, RST	-	-	-
<i>E. ramosum</i> Jacq.	FOD, FOM, MAN	-	-	-
<i>E. rigidum</i> Jacq.	FOD, FOM, RST, MAN	-	-	-
<i>E. robustum</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>E. rodriguesii</i> Cogn.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. saxatile</i> Lindl.	FOM	-	-	-
<i>E. saximontanum</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>E. schomburgkii</i> Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. secundum</i> Jacq.	FOD, FOM, RST, AFL	-	-	-
<i>E. strobiliferum</i> Rchb.f.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. successivum</i> Hágsater & F.E.L.Miranda*	FOD	-	-	-
<i>E. tridactylum</i> Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. vesicatum</i> Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. xanthinum</i> Lindl.	FOM, AFL	-	-	-
<i>E. waianthii</i> V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>E. zappii</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>Epistephium</i> – 1/23				
<i>E. lucidum</i> Cogn.	FOD, RST, FCA	-	-	-
<i>Erycina</i> – 2/7				
<i>E. glossomistax</i> (Rchb.f.) N.H.Williams & M.W.Chase	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. pusilla</i> (L.) N.H.Williams & M.W.Chase	FOD, FOM	-	-	-
<i>Eulophia</i> – 1/211				
<i>E. alta</i> (L.) Fawc. & Rendle	FOM	-	-	-
<i>Eurystyles</i> – 6/18				
<i>E. actinophila</i> (Barb.Rodr.) Schltr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. cogniauxii</i> (Kraenzl.) Pabst	FOM	-	-	-
<i>E. cotyleton</i> Wawra	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. crocodilus</i> Szlach.*	FOD	-	-	-
<i>E. lorenzii</i> (Cogn.) Schltr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. rutkowskiana</i> Szlach.*	FOD	-	-	-
<i>Galeandra</i> – 6/18				
<i>G. beyrichii</i> Rchb.f.	FOM, FES	-	-	-
<i>G. junceoides</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>G. montana</i> Barb.Rodr.	FCA, RST	-	-	-
<i>G. paraguayensis</i> Cogn.	FCA	-	-	-
<i>G. stangeana</i> Rchb.f.	FOD	-	-	-
<i>G. stylomisantha</i> (Vell.) Hoehne	FCA	-	-	-
<i>Galeottia</i> – 1/12				
<i>G. ciliata</i> (Morel) Dressler & Christenson	FOD	-	-	-
<i>Geoblasta</i> – 1/2				
<i>G. penicillata</i> (Rchb.f.) Hoehne ex M.N.Correa	FCA	-	-	-
<i>Gomesa</i> – 12/17				
<i>G. alpina</i> Porsch*	FOM	-	-	-
<i>G. barkeri</i> (Hook.) Regel*	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>G. crispa</i> (Lindl.) Klotzsch & Rchb.f.	FOM	-	-	-
<i>G. duseniana</i> Kraenzl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>G. fischeri</i> Regel*	FOD, FOM	-	-	-
<i>G. foliosa</i> (Hook.) Klotzsch & Rchb.f.*	FOM	-	-	-
<i>G. glaziovii</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>G. laxiflora</i> (Lindl.) Klotzsch & Rchb.f.*	FOM	-	-	-
<i>G. paranaensis</i> Kraenzl.*	FOD	-	-	-
<i>G. planifolia</i> (Lindl.) Klotzsch & Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>G. recurva</i> R.Br.*	FOM	-	-	-
<i>G. sessilis</i> Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
<i>Gongora</i> – 1/58				
<i>G. bufonia</i> Lindl.*	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>Govenia</i> – 1/19				
<i>G. utriculata</i> (Sw.) Lindl.	FOM	-	-	-
<i>Grandiphyllum</i> – 8/10				
<i>G. auricula</i> (Vell.) Docha Neto*	FOD	-	-	-
<i>G. divaricatum</i> (Lindl.) Docha Neto*	FOD	-	-	-
<i>G. edwallii</i> (Cogn.) Docha Neto*	FOD, FOM	-	-	-
<i>G. hians</i> (Lindl.) Docha Neto*	FOD, FOM	-	-	-
<i>G. pohlianum</i> (Cogn.) Docha Neto*	FOD	-	-	-
<i>G. pulvinatum</i> (Lindl.) Docha Neto	FOD, FOM	-	-	-
<i>G. schunkianum</i> (Campacci & Catharino) Docha Neto*	FOD	-	-	-
<i>G. sphegiferum</i> (Lindl.) Docha Neto*	FOD	-	-	-
<i>Grobya</i> – 4/5				
<i>G. amherstiae</i> Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>G. fascifera</i> Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>G. galeata</i> Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>G. guieselii</i> F.Barros & R.Lourenço*	FOD	-	-	-
<i>Habenaria</i> – 77/850				
<i>H. achalensis</i> Kraenzl.	FCA	-	-	-
<i>H. alpestris</i> Cogn.	FCA	-	-	-
<i>H. angulosa</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. areaneiflora</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. armata</i> Rchb.f.	FCA	-	-	-
<i>H. ayangannensis</i> Renz	FCA	-	-	-
<i>H. balansae</i> Cogn.	FCA	-	-	-
<i>H. biflora</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. brachyplectron</i> Hoehne & Schltr.	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>H. bractescens</i> Lindl.	FCA	-	-	-
<i>H. caldensis</i> Kraenzl.	FCA	-	-	-
<i>H. crucifera</i> Rchb.f. & Warm.	FCA	-	-	-
<i>H. cryptophila</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. cultellifolia</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. curvilabria</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. distans</i> Griseb.	FCA	-	-	-
<i>H. drepanopetala</i> Pabst	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>H. dusenii</i> Schltr.	FCA	-	-	-
<i>H. edwallii</i> Cogn.	FCA	-	-	-
<i>H. ekmaniana</i> Kraenzl.	FCA	-	-	-
<i>H. ernestiulei</i> Hoehne	FCA	-	-	-
<i>H. exaltata</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. fluminensis</i> Hoehne	FOD	-	-	-
<i>H. galeandriiformis</i> Hoehne	FCA	-	-	-
<i>H. glaucophylla</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. gnoma</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. gourlieana</i> Gill. ex Lindl.	FCA	-	-	-
<i>H. graciliscapa</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. guilleminii</i> Rchb.f.	FCA	-	-	-
<i>H. gustavi-edwallii</i> Hoehne	FCA	-	-	-
<i>H. habenarioides</i> (Hoehne) R.E.Nogueira & R.J.V.Alves	FCA	-	-	-
<i>H. heleogena</i> Schltr.	FCA	-	-	-
<i>H. henscheniana</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. hexaptera</i> Lindl.	FCA	-	-	-
<i>H. hydrophila</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. inconspicua</i> Cogn.	FCA	-	-	-
<i>H. itatiayae</i> Schltr.	FCA	-	-	-
<i>H. jaguariahyvae</i> Kraenzl.	FCA	-	-	-
<i>H. johannensis</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. jordanensis</i> (J.E.Leite) Garay	FOM, FCA	-	-	-
<i>H. josephensis</i> Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
<i>H. leptoceras</i> Hook.	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>H. leucosantha</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. macrodactyla</i> Kraenzl.	FCA	-	-	-
<i>H. macronectar</i> (Vell.) Hoehne	FCA	-	-	-
<i>H. magdalenensis</i> Hoehne	FCA	-	-	-
<i>H. megapotamensis</i> Hoehne	FCA	-	-	-
<i>H. melanopoda</i> Hoehne & Schltr.	FCA	-	-	-
<i>H. mitomorpha</i> Kraenzl.	FCA	-	-	-
<i>H. modestissima</i> Rchb.f.	FCA	-	-	-
<i>H. montevidensis</i> Spreng.	FCA	-	-	-
<i>H. nabucoi</i> Ruschi	FCA	-	-	-
<i>H. novaesii</i> Edwall & Hoehne	FCA	-	-	-
<i>H. nuda</i> Lindl.	FCA	-	-	-
<i>H. paranaensis</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. parviflora</i> Lindl.	FCA	-	-	-
<i>H. paulensis</i> Porsch	FCA	-	-	-
<i>H. paulistana</i> J.A.N.Batista & Bianchetti*	FCA	-	-	-
<i>H. petalodes</i> Lindl.	FCA	-	-	-
<i>H. piraquarensis</i> Hoehne*	FCA	-	-	-
<i>H. pleiophylla</i> Hoehne & Schltr.	FCA	-	-	-
<i>H. pratensis</i> (Salzm. ex Lindl.) Rchb.f.	FCA	-	-	-
<i>H. regnellii</i> Cogn.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>H. repens</i> Nutt.	FCA	-	-	-
<i>H. riedelii</i> Cogn.*	FCA	-	-	-
<i>H. rodeiensis</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. rolfeana</i> Schltr.	FCA	-	-	-
<i>H. rotundiloba</i> Pabst*	FCA	-	-	-
<i>H. rudolfi-schlechteri</i> Hoehne*	FCA	-	-	-
<i>H. rupicola</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. sceptrum</i> Schltr.	FCA	-	-	-
<i>H. schwackei</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>H. secunda</i> Lindl.	FCA	-	-	-
<i>H. setacea</i> Lindl.	FCA	-	-	-
<i>H. trifida</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>H. ulei</i> Cogn.*	FCA	-	-	-
<i>H. umbraticola</i> Barb.Rodr.*	FCA	-	-	-
<i>Hadrolaelia</i> – 15/22				
<i>H. alarii</i> (Brieger & Bicalho) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>H. coccinea</i> (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>H. crispa</i> (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>H. fidelensis</i> (Pabst) Chiron & V.P.Castro*	FOM	-	-	-
<i>H. grandis</i> (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	FOD, FOM	-	-	-
<i>H. lobata</i> (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	AFL	-	-	-
<i>H. mantiqueirae</i> (Fowlie) Chiron & V.P.Castro*	FOM	-	-	-
<i>H. perrinii</i> (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>H. pumila</i> (Hook.) Chiron & V.P.Castro*	FOD, FOM	-	-	-
<i>H. purpurata</i> (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>H. pygmaea</i> (Pabst) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>H. tenebrosa</i> (Rolfe) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>H. virens</i> (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>H. wittigiana</i> (Barb.Rodr.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>H. xanthina</i> (Lindl.) Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>Hapalorchis</i> – 4/8				
<i>H. candidus</i> (Kraenzl.) Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>H. lineatus</i> (Lindl.) Schltr.	FOD	-	-	-
<i>H. micranthus</i> (Barb.Rodr.) Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>H. pauciflorus</i> Porto & Brade*	AFL	-	-	-
<i>Heterotaxis</i> – 2/14				
<i>H. brasiliensis</i> (Brieger & Bicalho) F.Barros*	FOD, FOM	-	-	-
<i>H. valenzuelana</i> (A.Rich.) F.Barros*	FOD	-	-	-
<i>Hoehneella</i> * – 2/2				
<i>H. gehrtiana</i> (Hoehne) Ruschi*	FOD, FOM	-	-	-
<i>H. heloisae</i> Ruschi*	FOD	-	-	-
<i>Hoffmannseggella</i> – 7/50				
<i>H. alvaroana</i> (F.E.Miranda) V.P.Castro & Chiron*	AFL	-	-	-
<i>H. bahiensis</i> (Schltr.) H.G.Jones*	AFL	-	-	-
<i>H. cinnabarina</i> (Batem. ex Lindl.) van den Berg & M.W.Chase	FOD, AFL	-	-	-
<i>H. gloedeniana</i> (Hoehne) Chiron & V.P.Castro*	FOM, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>H. kautskyana</i> V.P.Castro & Chiron*	AFL	-	-	-
<i>H. mixta</i> (Hoehne) Chiron & V.P.Castro*	AFL	-	-	-
<i>H. munchowiana</i> (F.E.Miranda) V.P.Castro & Chiron*	AFL	-	-	-
<i>Homalopetalum</i> – 1/4				
<i>H. hypoleptum</i> (Lindl.) Soto-Arenas	FOD	-	-	-
<i>Houlletia</i> – 1/9				
<i>H. broklehurstiana</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>Huntleya</i> – 1/13				
<i>H. meleagris</i> Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Ionopsis</i> – 1/6				
<i>I. utricularioides</i> (Sw.) Lindl.	FOM	-	-	-
<i>Isabelia</i> – 3/3				
<i>I. pulchella</i> (Kraenzl.) Senghas & Teuscher*	FOM	-	-	-
<i>I. violacea</i> (Lindl.) van den Berg & M.W.Chase*	FOD, FOM	-	-	-
<i>I. virginalis</i> Barb.Rodr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Isochilus</i> – 1/12				
<i>I. linearis</i> (Jacq.) R.Br.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Jacquinella</i> – 2/6				
<i>J. globosa</i> (Jacq.) Schltr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>J. teretifolia</i> (Sw.) Britton & Wilson	FOD	-	-	-
<i>Koellensteinia</i> – 5/19				
<i>K. altissima</i> Pabst*	FOM, RST	-	-	-
<i>K. florida</i> (Rchb.f.) Garay*	?	-	-	-
<i>K. graminea</i> (Lindl.) Rchb.f.	FOD	-	-	-
<i>K. spiralis</i> Gomes-Ferreira & L.C.Menezes*	FOM	-	-	-
<i>K. tricolor</i> (Lindl.) Rchb.f.	FCA	-	-	-
<i>Lankesterella</i> – 7/11				
<i>L. caespitosa</i> (Lindl.) Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>L. ceracifolia</i> (Barb.Rodr.) Mansf.*	FOD	-	-	-
<i>L. epiphytica</i> (Barb.Rodr.) Mansf.*	FOD	-	-	-
<i>L. gnoma</i> (Kraenzl.) Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>L. longicollis</i> (Cogn.) Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>L. pilosa</i> (Cogn.) Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>L. spannageliana</i> (Hoehne & Brade) Mansf.*	FOD	-	-	-
<i>Lepanthopsis</i> – 3/39				
<i>L. densiflora</i> (Barb.Rodr.) Ames*	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. floripecten</i> (Rchb.f.) Ames	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. vellozicola</i> R.C.Mota <i>et al.</i> *	AFL	-	-	-
<i>Leptotes</i> – 5/6				
<i>L. bicolor</i> Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>L. pauloensis</i> Hoehne*	?	-	-	-
<i>L. pohlitinocoi</i> V.P.Castro & Chiron*	FOD	-	-	-
<i>L. tenuis</i> Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>L. unicolor</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>Ligeophila</i> – 3/9				
<i>L. clavigera</i> (Rchb.f.) Garay	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>L. juruensis</i> (Hoehne) Garay	FOD	-	-	-
<i>L. rosea</i> (Lindl.) Garay	FOD	-	-	-
<i>Liparis</i> – 2/420				
<i>L. nervosa</i> (Thumb.) Lindl.	FOM, FES, RST	-	-	-
<i>L. vexillifera</i> (Llave & Lex.) Cogn.	FOM	-	-	-
<i>Lockhartia</i> – 2/27				
<i>L. ludibunda</i> Rchb.f.*	FOM	-	-	-
<i>L. lunifera</i> (Lindl.) Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>Loefgrenianthus</i> * – 1/1				
<i>L. blanche-amesii</i> (Loefgr.) Hoehne*	FOM	-	-	-
<i>Lophiaris</i> – 2/30				
<i>L. pumila</i> (Lindl.) Braem	FOM	-	-	-
<i>L. schwambachiae</i> (V.P.Castro & Toscano) Braem*	FOD	-	-	-
<i>Lycaste</i> – 1/50				
<i>L. ciliata</i> (Ruiz & Pav.) Lindl. ex Rchb.f.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Lyroglossa</i> – 2/2				
<i>L. grisebachii</i> (Cogn.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>L. spirata</i> (Hoehne) Garay	FCA	-	-	-
<i>Macradenia</i> – 1/10				
<i>M. multiflora</i> (Kraenzl.) Cogn.	FOM	-	-	-
<i>Malaxis</i> – 7/400				
<i>M. cogniauxiana</i> (Schltr.) Pabst*	FOM	-	-	-
<i>M. excavata</i> (Lindl.) Kuntze	FOM	-	-	-
<i>M. jaraguae</i> (Hoehne & Schltr.) Pabst*	FOM	-	-	-
<i>M. parthonii</i> C.Morr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. pubescens</i> (Lindl.) Kuntze*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. sertulifera</i> (Barb.Rodr.) Pabst	FOD	-	-	-
<i>M. warmingii</i> (Rchb.f.) O.Ktze.	FOD, RST	-	-	-
<i>Mapinguari</i> – 1/4				
<i>M. desvauxianus</i> (Rchb.f.) Carnevali & R.Singer	FOD	-	-	-
<i>Masdevallia</i> – 3/510				
<i>M. curtipes</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>M. discoidea</i> Luer & Würstle*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>M. infracta</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>Maxillaria</i> – 7/165				
<i>M. bradei</i> Schltr.*	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>M. leucaimata</i> Barb.Rodr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. lindleyana</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>M. ochroleuca</i> Lodd. ex Lindl.	FOD, FOM, RST, MAN	-	-	-
<i>M. porrecta</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>M. silvana</i> Campacci*	FOD	-	-	-
<i>M. spiritu-sanctensis</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>Maxillariella</i> – 1/46				
<i>M. robusta</i> (Barb.Rodr.) M.A.Blanco & Carnevali	FOD	-	-	-
<i>Mesadenella</i> – 2/7				
<i>M. atroviridis</i> (Barb.Rodr.) Garay*	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. cuspidata</i> Lindl.	FOM, RST	-	-	-
<i>Mesadenus</i> – 1/6				
<i>M. glaziovii</i> (Cogn.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>Microchilus</i> – 6/120				
<i>M. arietinus</i> (Rchb.f. & Warm.) Ormerod	FOM, FES	-	-	-
<i>M. austrobrasiliensis</i> (Porsch) Ormerod*	FOD	-	-	-
<i>M. brachyplectron</i> (Pabst) Ormerod*	FOD	-	-	-
<i>M. densiflorus</i> (Lindl.) D.Dietr.	FOD	-	-	-
<i>M. lamprophyllus</i> (Linden & Rchb.f.) Ormerod*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. pedrojuanensis</i> Ormerod	FOM	-	-	-
<i>Microlaelia</i> – 1/1				
<i>M. lundii</i> (Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro	FOM, FES, FED	-	-	-
<i>Miltonia</i> – 6/10				
<i>M. clowesii</i> Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. flavescens</i> (Lindl.) Lindl.	FOM	-	-	-
<i>M. moreliana</i> A.Rich.*	FOD	-	-	-
<i>M. regnellii</i> Rchb.f.*	FOM	-	-	-
<i>M. russeliana</i> Lindl.*	FOM	-	-	-
<i>M. spectabilis</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>Mormolyca</i> – 3/25				
<i>M. cleistogama</i> (Brieger & Illg) M.A.Blanco	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. ringens</i> (Lindl.) Gentil	FOD	-	-	-
<i>M. rufescens</i> (Lindl.) M.A.Blanco	FOD, FOM	-	-	-
<i>Myoxanthus</i> – 8/45				
<i>M. concepcionensis</i> M.Frey & N.Sanson*	FOD	-	-	-
<i>M. exasperatus</i> (Lindl.) Luer*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. lonchophyllus</i> (Barb.Rodr.) Luer	FOM	-	-	-
<i>M. pulvinatus</i> (Barb.Rodr.) Luer	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>M. punctatus</i> (Barb.Rodr.) Luer*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. ruschii</i> Fraga & L.Kollmann*	FOD	-	-	-
<i>M. scabripes</i> (Lindl.) Luer*	FOM	-	-	-
<i>M. seidelii</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>Neogardneria</i> * – 1/1				
<i>N. murrayana</i> (Gardner ex Hook.) Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>Neoruschia</i> * – 1/1				
<i>N. cogniauxiana</i> (Schltr.) V.P.Castro & Catharino*	FOD	-	-	-
<i>Notylia</i> – 6/58				
<i>N. hemitricha</i> Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
<i>N. longispicata</i> Hoehne & Schltr.*	FOM	-	-	-
<i>N. lyrata</i> S.Moore	FOD, FOM	-	-	-
<i>N. nemorosa</i> Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
<i>N. pubescens</i> Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>N. stenatha</i> Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Octomeria</i> – 56/120				
<i>O. alexandri</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>O. aloefolia</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>O. anceps</i> Porto & Brade*	FOD	-	-	-
<i>O. caetensis</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>O. caldensis</i> Hoehne*	FOM	-	-	-
<i>O. campos-portoi</i> Schltr.*	FOM	-	-	-
<i>O. cariocana</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>O. chamaeleptotes</i> Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>O. cochlearis</i> Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>O. concolor</i> Barb.Rodr.	FOD	-	-	-
<i>O. crassifolia</i> Lindl.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>O. cucullata</i> Porto & Brade*	FOD	-	-	-
<i>O. decumbens</i> Cogn.*	FOM	-	-	-
<i>O. diaphana</i> Lindl.*	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>O. estrellensis</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>O. exchlorophyllata</i> Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>O. exigua</i> C.Schweinf.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>O. fimbriata</i> Porto & Peixoto*	FOD	-	-	-
<i>O. flabellifera</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>O. geraensis</i> Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
<i>O. gracilis</i> Lodd. ex Lindl.*	FOM	-	-	-
<i>O. grandiflora</i> Lindl.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>O. hatschbachii</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>O. helvola</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>O. irrorata</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>O. itatiaiae</i> Brade & Pabst*	FOM	-	-	-
<i>O. juncifolia</i> Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>O. leptophylla</i> Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>O. lichenicola</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>O. linearifolia</i> Barb.Rodr.*	FOD, RST	-	-	-
<i>O. lithophila</i> Barb.Rodr.*	AFL, FOM	-	-	-
<i>O. micrantha</i> Barb.Rodr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>O. minor</i> C.Schweinf.	FOD	-	-	-
<i>O. montana</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>O. multiflora</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>O. ochroleuca</i> Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
<i>O. octomeriantha</i> (Hoehne) Pabst*	FOD	-	-	-
<i>O. pamyrabellae</i> Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>O. praestans</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>O. pusilla</i> Lindl.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>O. riograndensis</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>O. rodeiensis</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>O. rodriguesii</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>O. rohrii</i> Pabst*	FOD, FOM	-	-	-
<i>O. rotundiglossa</i> Hoehne*	FOD, RST	-	-	-
<i>O. rubrifolia</i> Barb.Rodr.	FOM, FES	-	-	-
<i>O. sagittata</i> (Rchb.f.) Garay	FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL	-	-	-
<i>O. sancti-angeli</i> Kraenzl.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>O. sarcophylla</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>O. spannagelii</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>O. tricolor</i> Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>O. truncicola</i> Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>O. unguiculata</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>O. warmingii</i> Rchb.f.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>O. wawrae</i> Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>O. wilsoniana</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>Oeceoclades</i> – 1/38				
<i>O. maculata</i> (Lindl.) Lindl.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>Oncidium</i> – 1/80				
<i>O. baueri</i> Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Ornithidium</i> – 2/55				
<i>O. pendens</i> (Pabst) Senghas	FOD	-	-	-
<i>O. rigidum</i> (Barb.Rodr.) M.A.Blanco & Ojeda*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Ornithocephalus</i> – 2/44				
<i>O. brachystachyus</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>O. myrticola</i> Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Ornithophora</i> * – 1/1				
<i>O. radicans</i> (Rchb.f.) Garay & Pabst*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Pabstia</i> – 4/6				
<i>P. jugosa</i> (Lindl.) Garay*	FOD	-	-	-
<i>P. modestior</i> (Rchb.f.) Garay*	FOD	-	-	-
<i>P. schunkiana</i> V.P.Castro*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>P. viridis</i> (Lindl.) Garay*	FOD	-	-	-
<i>Pabstiella</i> – 2/6				
<i>P. mirabilis</i> (Schltr.) Brieger & Senghas*	FOD	-	-	-
<i>P. tripterantha</i> (Rchb.f.) F.Barros	FOD, FOM	-	-	-
<i>Paradisanthus</i> * – 2/4				
<i>P. bahiensis</i> Rchb.f.*	RST	-	-	-
<i>P. micranthus</i> (Barb.Rodr.) Schltr.*	FOM, RST	-	-	-
<i>Pelexia</i> – 21/80				
<i>P. bonariensis</i> (Lindl.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>P. burgeri</i> Schltr.*	FCA	-	-	-
<i>P. ekmanii</i> (Kraenzl.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>P. itatiayae</i> Schltr.	FCA	-	-	-
<i>P. laminata</i> Schltr.	FCA	-	-	-
<i>P. lindmaniana</i> (Kraenzl.) Schltr.*	FCA	-	-	-
<i>P. lindmanii</i> Kraenzl.	FCA	-	-	-
<i>P. loefgrenii</i> (Porsch) Schltr.*	FCA	-	-	-
<i>P. longibracteata</i> Pabst*	FCA	-	-	-
<i>P. macropoda</i> (Barb.Rodr.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>P. novofriburgensis</i> (Rchb.f.) Garay	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. oestrifera</i> (Rchb.f. & Warm.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>P. orobanchoides</i> (Kraenzl.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>P. orthosepala</i> (Rchb.f. & Warm.) Schltr.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. polyantha</i> Schltr.*	FCA	-	-	-
<i>P. pterygantha</i> (Rchb.f. & Warm.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>P. robusta</i> (Kraenzl.) Hoehne*	FCA	-	-	-
<i>P. sceptrum</i> Schltr.*	FCA	-	-	-
<i>P. tamanduensis</i> (Kraenzl.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>P. tenuior</i> Schltr.*	FCA	-	-	-
<i>P. viridis</i> (Cogn.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>Phloeophila</i> – 1/8				
<i>P. nummularia</i> (Barb.Rodr.) Hoehne & Schltr.	FOD	-	-	-
<i>Phragmipedium</i> – 1/21				
<i>P. sargentianum</i> Rolfe*	AFL, FOM	-	-	-
<i>Phymatidium</i> – 9/9				
<i>P. aquinoi</i> Schltr.*	FOM	-	-	-
<i>P. delicatulum</i> Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. falcifolium</i> Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. glaziovii</i> Toscano*	FOD	-	-	-
<i>P. hysternanthum</i> Barb.Rodr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. limae</i> Porto & Brade*	FOD	-	-	-
<i>P. mellobarretoii</i> Hoehne & Williams*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. microphyllum</i> (Barb.Rodr.) Toscano*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. vogelii</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>Phymatochilum</i> * – 1/1				
<i>P. brasiliense</i> Christenson*	FOD	-	-	-
<i>Platyrrhiza</i> – 1/2				
<i>P. quadricolor</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>Platystele</i> – 1/90				
<i>P. oxyglossa</i> (Schltr.) Garay	FOD, FOM	-	-	-
<i>Platythelys</i> – 3/10				
<i>P. debilis</i> (Lindl.) Garay	FOM	-	-	-
<i>P. paranaensis</i> (Kraenzl.) Garay	FCA	-	-	-
<i>P. schlechteriana</i> (Hoehne) Garay*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Pleurobotryum</i> – 6/6				
<i>P. albopurpureum</i> (Kraenzl.) Garay*	FOM	-	-	-
<i>P. atropurpureum</i> Barb.Rodr.	FOM	-	-	-
<i>P. crepinianum</i> (Cogn.) Hoehne*	FOM	-	-	-
<i>P. hatschbachii</i> (Schltr.) Hoehne	FOM	-	-	-
<i>P. mantiqyranum</i> (Barb.Rodr.) Hoehne*	FOM	-	-	-
<i>P. rhabdosepalum</i> (Schltr.) Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>Pleurothallis</i> – 43/800				
<i>P. arcuata</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>P. armeniaca</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>P. atroglossa</i> Loefergr.*	FOM	-	-	-
<i>P. aurantiaca</i> Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. caroli</i> Schltr.*	FOM	-	-	-
<i>P. colorata</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>P. crassicaulis</i> (Barb.Rodr.) Cogn.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. ephemera</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>P. ghillanyi</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>P. globifera</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>P. gouveiae</i> A.Samp.*	FOD	-	-	-
<i>P. granulosa</i> (Barb.Rodr.) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>P. henrique-aragonii</i> Porto ex Pabst*	FOD	-	-	-
<i>P. hians</i> Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. hymenantha</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>P. hypnicola</i> Lindl.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. imbeana</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>P. laciniata</i> Barb.Rodr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. limbata</i> Cogn.	FOM, FES	-	-	-
<i>P. mentigera</i> Kraenzl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. microtis</i> Schltr.*	FOM	-	-	-
<i>P. myrticola</i> Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
<i>P. parahybunensis</i> (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
<i>P. parva</i> Rolfe	FOM, FES	-	-	-
<i>P. pellioidis</i> (Barb.Rodr.) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>P. per-dusenii</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>P. petropolitana</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>P. piraquarensis</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>P. recurvipetala</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>P. rubrolimbata</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>P. sarcopetala</i> (Barb.Rodr.) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>P. serrulata</i> (Barb.Rodr.) Luer*	FOM	-	-	-
<i>P. subrotundifolia</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>P. sulcata</i> Porsch*	FOM	-	-	-
<i>P. sulphurea</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>P. susanensis</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>P. tabacina</i> (Barb.Rodr.) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>P. tigridentis</i> Loeffer*	FOD	-	-	-
<i>P. trimeropetala</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>P. vellozoana</i> Schltr.*	FOM	-	-	-
<i>P. vitorinoi</i> Luer & Toscano*	FOD	-	-	-
<i>P. wanderbildtiana</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>P. wawreana</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>Pleurothallopsis</i> – 1/30				
<i>P. nemorosa</i> (Barb.Rodr.) Porto & Brade*	FOD	-	-	-
<i>Pogoniopsis</i> – 1/2				
<i>P. schenckii</i> Cogn.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Polycycnis</i> – 1/15				
<i>P. silvana</i> F.Barros*	FOD	-	-	-
<i>Polystachya</i> – 7/220				
<i>P. bradei</i> Schltr.	FOM	-	-	-
<i>P. caespitosa</i> Barb.Rodr.	FOM	-	-	-
<i>P. concreta</i> (Jacq.) Garay & Sweet	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. estrellensis</i> Rchb.f.	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. foliosa</i> (Lindl.) Rchb.f.	FOM	-	-	-
<i>P. micrantha</i> Schltr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. pinicola</i> Schltr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Ponera</i> – 1/8				
<i>P. striata</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>Prescottia</i> – 8/15				
<i>P. densiflora</i> (Brongn.) Cogn.	RST, FCA	-	-	-
<i>P. glazioviana</i> Cogn.*	FCA	-	-	-
<i>P. lancifolia</i> Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. leptostachya</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>P. montana</i> Barb.Rodr.	FCA, AFL	-	-	-
<i>P. oligantha</i> (Sw.) Lindl.	FCA, FOM, RST	-	-	-
<i>P. plantaginifolia</i> Lindl. ex Hook.	FOD, FOM, RST, AFL	-	-	-
<i>P. stachyodes</i> Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Promenaea</i> – 13/20				
<i>P. acuminata</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>P. catharinensis</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>P. dusenii</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>P. fuerstenbergiana</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>P. guttata</i> Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>P. lentiginosa</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>P. ovatiloba</i> (Kingle) Cogn.*	FOM	-	-	-
<i>P. paranaensis</i> Schltr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. riograndensis</i> Schltr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. rollisonii</i> (Lindl.) Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. silvana</i> F.Barros & Catharino*	FOD	-	-	-
<i>P. stapelioides</i> (Link & Otto) Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>P. xanthina</i> Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Prosthechea</i> – 18/95				
<i>P. alagoensis</i> (Pabst) W.E.Higgins*	FOM	-	-	-
<i>P. allemanoides</i> (Hoehne) W.E.Higgins*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. bulbosa</i> (Vell.) W.E.Higgin	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. calamaria</i> (Lindl.) W.E.Higgins	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. campos-portoi</i> (Pabst) W.E.Higgins*	FOD	-	-	-
<i>P. ebanii</i> Chiron & V.P.Castro*	FOD	-	-	-
<i>P. elisae</i> Chiron & V.P.Castro*	AFL	-	-	-
<i>P. fausta</i> (Rchb.f. ex Cogn.) W.E.Higgins*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. fragans</i> (Sw.) W.E.Higgins	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>P. glumacea</i> (Lindl.) W.E.Higgins	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. kautskyi</i> (Pabst) W.E.Higgins*	FOD	-	-	-
<i>P. pachysepala</i> (Klotzsch) Chiron & V.P.Castro*	FOM, AFL	-	-	-
<i>P. papilio</i> (Vell.) W.E.Higgins*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. punctifera</i> (Rchb.f.) W.E.Higgins*	FOD	-	-	-
<i>P. pygmaea</i> (Hook.) W.E.Higgins	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. silvana</i> Catharino & V.P.Castro*	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. suzanensis</i> (Hoehne) W.E.Higgins*	FOM	-	-	-
<i>P. vespa</i> (Vell.) W.E.Higgins	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Pseudolaelia</i> – 8/10				
<i>P. brejetubensis</i> M.Frey*	AFL	-	-	-
<i>P. canaanensis</i> (Ruschi) F.Barros*	AFL	-	VU	ANEXO II
<i>P. corcovadensis</i> Porto & Brade*	AFL	-	-	-
<i>P. dutrae</i> Ruschi*	AFL	-	-	-
<i>P. irwiniana</i> Pabst*	FOD, AFL	-	-	-
<i>P. maquijiensis</i> M.Frey*	AFL	-	-	-
<i>P. pavopolitana</i> M.Frey*	AFL	-	-	-
<i>P. vellozicola</i> (Hoehne) Porto & Brade	FOD, FOM, RST, AFL	-	-	-
<i>Psilochilus</i> – 2/7				
<i>P. dusenianus</i> Kraenzl. ex Dunst. & Garay	FOM, FOD	-	-	-
<i>P. modestus</i> Barb.Rodr.	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>Pteroglossa</i> – 4/9				
<i>P. glazioviana</i> (Cogn.) Garay*	FCA	-	-	-
<i>P. hilariana</i> (Cogn.) Garay*	FCA	-	-	-
<i>P. macrantha</i> (Rchb.f.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>P. roseoalba</i> (Rchb.f.) Salazar & M.W.Chase	FCA	-	-	-
<i>Pteroglossaspis</i> – 1/5				
<i>P. ruwenzoriensis</i> (Rendle) Rolfe	FCA	-	-	-
<i>Pygmaeorchis</i> – 1/2				
<i>P. brasiliensis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>Rauhiella</i> * – 3/3				
<i>R. brasiliensis</i> Pabst & Braga*	RST	-	-	-
<i>R. seehaweri</i> (L.Bock) Toscano & Christenson*	FOD	-	-	-
<i>R. silvana</i> Toscano*	FOM	-	-	-
<i>Rhamphorhynchus</i> * – 1/1				
<i>R. mendoncae</i> (Brade & Pabst) Garay*	?	-	-	-
<i>Rhetinantha</i> – 2/15				
<i>R. cerifera</i> (Barb.Rodr.) M.A.Blanco*	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. notylioglossa</i> (Rchb.f.) M.A.Blanco	FOD, FOM	-	-	-
<i>Rhinocidium</i> – 2/3				
<i>R. longicornu</i> (Mutel) Baptista	FOM	-	-	-
<i>R. macronix</i> (Rchb.f.) Baptista	FOM	-	-	-
<i>Rodriguezia</i> – 11/50				
<i>R. bahiensis</i> Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>R. bifolia</i> Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
<i>R. bracteata</i> (Vell.) Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>R. decora</i> (Lem.) Rchb.f.	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. limae</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>R. obtusifolia</i> (Lindl.) Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. pardina</i> Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>R. pubescens</i> (Lindl.) Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>R. rigida</i> (Lindl.) Rchb.f.*	FOM	-	-	-
<i>R. sucrei</i> Braga*	RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>R. venusta</i> Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Rodrigueziella</i> – 5/6				
<i>R. doeringii</i> (Hoehne) Pabst*	FOD	-	-	-
<i>R. gomezoides</i> (Barb.Rodr.) Pabst*	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. handroi</i> (Hoehne) Pabst*	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. jucunda</i> (Rchb.f.) Garay*	FOM	-	-	-
<i>R. petropolitana</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>Rodrigueziopsis</i> * – 2/2				
<i>R. eleutherosepala</i> (Barb.Rodr.) Schltr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. microphyta</i> (Barb.Rodr.) Schltr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Sacoila</i> – 4/5				
<i>S. duseniana</i> (Kraenzl.) Garay	FCA	-	-	-
<i>S. hassleri</i> (Cogn.) Garay	FCA	-	-	-
<i>S. lanceolata</i> (Aubl.) Garay	RST, FCA	-	-	-
<i>S. pedicellata</i> (Cogn.) Garay	FCA	-	-	-
<i>Sanderella</i> * – 2/2				
<i>S. discolor</i> (Barb.Rodr.) Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>S. riograndensis</i> Dutra ex Pabst*	FOD	-	-	-
<i>Sarcoglottis</i> – 13/40				
<i>S. acaulis</i> (Sm.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>S. alexandri</i> Schltr. ex Mansf.	FCA	-	-	-
<i>S. biflora</i> (Vell.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>S. depinatrix</i> Christenson & Toscano	FCA	-	-	-
<i>S. fasciculata</i> (Vell.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>S. glaucescens</i> Schltr.	FCA	-	-	-
<i>S. grandiflora</i> (Hook.) Klotzsch	FCA	-	-	-
<i>S. itararensis</i> (Kraenzl.) Hoehne	FCA	-	-	-
<i>S. juergensii</i> Schltr.	FCA	-	-	-
<i>S. metallica</i> (Rolfe) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>S. uliginosa</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
<i>S. umbrosa</i> (Barb.Rodr.) Schltr.	FCA	-	-	-
<i>S. ventricosa</i> (Vell.) Hoehne	FCA	-	-	-
<i>Saundersia</i> * – 2/2				
<i>S. mirabilis</i> Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>S. paniculata</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>Sauroglossum</i> – 2/12				
<i>S. nitidum</i> (Vell.) Schltr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. organense</i> Szlach.*	?	-	-	-
<i>Scaphyglottis</i> – 6/65				
<i>S. brasiliensis</i> (Schltr.) Dressler*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. emarginata</i> (Garay) Dressler	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. fusiformis</i> (Griseb.) Schult.	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. livida</i> (Lindl.) Schltr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. modesta</i> (Rchb.f.) Schltr.	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>S. prolifera</i> (R.Br.) Cogn.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Schomburkgia – 1/15				
S. gloriosa Rchb.f.	FOM	-	-	-
Schunkea – 1/1				
S. vierlingii Senghas	FOD	-	-	-
Scuticaria – 4/8				
S. hadwenii Hook.*	FOD	-	-	-
S. kautskyi Pabst*	FOD	-	-	-
S. novaesii F.Barros & Catharino*	FOD	-	-	-
S. strictifolia Hoehne*	FOD	-	-	-
Skeptrostachys – 7/12				
S. arechavaletanii (Barb.Rodr.) Garay*	FCA	-	-	-
S. balanophorostachya (Rchb.f. & Warm.) Garay	FCA	-	-	-
S. congestiflora (Cogn.) Garay	FCA	-	-	-
S. gigantea (Cogn.) Garay	FCA	-	-	-
S. montevidensis (Barb.Rodr.) Garay*	FCA	-	-	-
S. paraguayensis (Rchb.f.) Garay	FCA	-	-	-
S. rupestris (Lindl.) Garay	FCA	-	-	-
Sobralia – 2/120				
S. liliastrum Lindl.	FOM, AFL, RST	-	-	-
S. sessilis Lindl.	FOM, RST, AFL	-	-	-
Sophranitis – 2/3				
S. alagoensis V.P.Castro & Chiron*	FOD	-	-	-
S. cernua Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
Specklinia – 47/100				
S. acutidentata (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
S. bacillaris (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
S. barbosana (De Wild.) Campacci*	FOD	-	-	-
S. bradei (Schltr.) Luer*	FOD	-	-	-
S. calcarata (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
S. campestris (Barb.Rodr.) Luer*	FES, FCA	-	-	-
S. carinifera (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
S. carrisii (Brade) Luer*	RST	-	-	-
S. castellensis (Brade) Luer*	FOD	-	-	-
S. conspersa (Hoehne) Luer*	FOD	-	-	-
S. cordilabia (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
S. curti-bradei (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
S. deltoglossa (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
S. elegantula (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
S. filiformis (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
S. fluminensis (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
S. garayi (Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
S. gomes-ferreirae (Pabst) Luer*	FOM	-	-	-
S. grobyi (Batem. ex Lindl.) F.Barros	FOD, FOM	-	-	-
S. leucosepala (Loefgr.) Luer*	FOD	-	-	-
S. lineolata (Barb.Rodr.) Luer*	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. lingua</i> (Lindl.) Luer*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. marginalis</i> (Rchb.f.) F.Barros	FOD	-	-	-
<i>S. matinhensis</i> (Hoehne) Luer*	FOM	-	-	-
<i>S. miniatolineolata</i> (Hoehne) F.Barros*	FOD	-	-	-
<i>S. miragliae</i> (J.E.Leite) Luer*	FOD	-	-	-
<i>S. mouraeoides</i> (Hoehne) F.Barros*	FOD	-	-	-
<i>S. parvifolia</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. pleurothalloides</i> (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
<i>S. podoglossa</i> (Hoehne) Luer*	FOD	-	-	-
<i>S. pristeoglossa</i> (Rchb.f. & Warm.) Luer	FOM, FES	-	-	-
<i>S. punctatifolia</i> (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
<i>S. quadridentata</i> (Barb.Rodr.) Luer*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. ramphastorhyncha</i> (Barb.Rodr.) F.Barros*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. robertoi</i> Luer & Toscano*	FOD	-	-	-
<i>S. rubrolineata</i> (Hoehne) F.Barros*	FOD	-	-	-
<i>S. ruschii</i> (Hoehne) Luer*	FOD	-	-	-
<i>S. seriata</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. sordida</i> (Kraenzl.) Luer	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. spathuliglossa</i> (Hoehne) Luer*	FOD	-	-	-
<i>S. subpicta</i> (Schltr.) F.Barros*	FOD	-	-	-
<i>S. tenera</i> (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
<i>S. transparens</i> (Schltr.) Luer*	FOD	-	-	-
<i>S. tricolor</i> (Barb.Rodr.) Luer*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. trifida</i> (Lindl.) F.Barros*	FOD	-	-	-
<i>S. uniflora</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. wacketii</i> (Handro & Pabst) Luer*	FOD	-	-	-
<i>Stanhopea</i> – 3/55				
<i>S. guttulata</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>S. insignis</i> Frost ex Hook.*	FOD	-	-	-
<i>S. lietzei</i> (Regel) Schltr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Stelis</i> – 27/400				
<i>S. aprica</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>S. aquinoana</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>S. argentata</i> Lindl.	FOD	-	-	-
<i>S. chlorantha</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>S. deregularis</i> Barb.Rodr.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>S. fraterna</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>S. gigas</i> Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
<i>S. intermedia</i> Poepp. & Endl.	FES	-	-	-
<i>S. itatiayae</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>S. leiningii</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>S. loefgrenii</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>S. meghantha</i> Barb.Rodr.	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. minutiflora</i> (Hoffmanns.) Rchb.f. ex Hoffmanns.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. modesta</i> Barb.Rodr.*	FOM	-	-	-
<i>S. oligantha</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. palmeirensis</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>S. papaquerensis</i> Rchb.f.	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. parvifolia</i> Garay*	FOD	-	-	-
<i>S. parvula</i> Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. pauciflora</i> Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. pauloensis</i> Hoehne & Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>S. peliochyla</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>S. porschiana</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>S. ruprechtiana</i> Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>S. schenkii</i> Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>S. thermophila</i> Schltr.*	FOM	-	-	-
<i>S. triangularis</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>Stenia</i> – 1/12				
<i>S. bohnkiana</i> V.P.Castro & G.F.Carr*	FOD	-	-	-
<i>Stigmatosema</i> – 5/12				
<i>S. garayana</i> Szlach.*	FCA	-	-	-
<i>S. hatschbachii</i> (Pabst) Garay*	FCA	-	-	-
<i>S. odileana</i> Szlach.*	?	-	-	-
<i>S. pedicellata</i> Szlach.*	FOD	-	-	-
<i>S. polyaden</i> (Vell.) Garay	FOD	-	-	-
<i>Thysanoglossa</i> * – 2/2				
<i>T. jordanensis</i> Porto & Brade*	FOD	-	-	-
<i>T. organensis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>Trichocentrum</i> – 2/25				
<i>T. fuscum</i> Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>T. tenuiflorum</i> Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Trichopilia</i> – 1/25				
<i>T. santos-limae</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>Trichosalpinx</i> – 4/120				
<i>T. dura</i> (Lindl.) Luer*	FOD	-	-	-
<i>T. mathildae</i> (Brade) Toscano & Luer*	FOD	-	-	-
<i>T. montana</i> (Barb.Rodr.) Luer*	FOD	-	-	-
<i>T. pterophora</i> (Cogn.) Luer*	FOD	-	-	-
<i>Trigonidium</i> – 4/14				
<i>T. macranthum</i> Barb.Rodr.	FOM, FES	-	-	-
<i>T. acuminatum</i> Batem. ex Lindl.	FOM	-	-	-
<i>T. latifolium</i> Lindl.	FOM, FES	-	-	-
<i>T. obtusum</i> Lindl.	FOM	-	-	-
<i>Trizeuxis</i> – 1/1				
<i>T. falcata</i> Lindl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Uleiorchis</i> – 1/2				
<i>U. ulaei</i> (Cogn.) Handro	FOM	-	-	-
<i>Vanilla</i> – 12/110				
<i>V. angustipetala</i> Schltr.	FOM, RST	-	-	-
<i>V. bahiana</i> Hoehne	FOM, RST	-	-	-
<i>V. bertonensis</i> Bertoni*	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>V. chamissonis</i> Klotzsch	RST, FCA	-	-	-
<i>V. denticulata</i> Pabst*	RST	-	-	-
<i>V. dubia</i> Hoehne	RST, FCA	-	-	-
<i>V. dungsii</i> Pabst*	FOD	-	-	-
<i>V. edwallii</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
<i>V. organensis</i> Rolfe	FOD	-	-	-
<i>V. palmarum</i> (Salzm. ex Lindl.) Lindl.	FES	-	-	-
<i>V. parvifolia</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>V. rojasiana</i> Hoehne*	FOD	-	-	-
Veyretia – 4/9				
<i>V. hassleri</i> (Cogn.) Szlach.	RST, FCA	-	-	-
<i>V. rupicola</i> (Garay) F.Barros	FCA	-	-	-
<i>V. simplex</i> (Griseb.) Szlach.	FCA	-	-	-
<i>V. undulata</i> Szlach.*	FCA	-	-	-
Warczewiczella – 2/12				
<i>W. candida</i> (Lindl.) Rchb.f.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>W. wailesiana</i> (Lindl.) Rchb.f. ex Morren*	FOM, RST	-	-	-
Warmingia – 1/5				
<i>W. eugenii</i> Rchb.f.	FOD, FES	-	-	-
Warrea – 1/4				
<i>W. warreana</i> (Lodd. ex Lindl.) C.Schweinf.	FOD	-	-	-
Wulschlaegelia – 1/3				
<i>W. aphylla</i> Rchb.f.	FOD	-	-	-
Xylobium – 2/32				
<i>X. colleyi</i> (Batem. ex Lindl.) Rolfe	FOD	-	-	-
<i>X. variegatum</i> (Ruiz & Pav.) Mansf.	FOD	-	-	-
Zootrophion – 1/12				
<i>Z. atropurpureum</i> (Lindl.) Luer*	FOD	-	-	-
Zygopetalum – 10/10				
<i>Z. brachypetalum</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>Z. crinitum</i> Lodd.*	FOD	-	-	-
<i>Z. ghillanyi</i> Pabst*	FCA	-	-	-
<i>Z. intermedium</i> Lodd.*	FOM, RST	-	-	-
<i>Z. mackayi</i> Hook.*	FOD	-	-	-
<i>Z. maxillare</i> Lodd.	FOM	-	-	-
<i>Z. pabstii</i> Toscano*	FCA	-	-	-
<i>Z. pedicellatum</i> (Thumb.) Garay*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Z. reginae</i> Pabst*	FCA	-	-	-
<i>Z. triste</i> Barb.Rodr.	FCA	-	-	-
Zygostates – 15/20				
<i>Z. alleniana</i> Kraenzl.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Z. bradei</i> (Schltr.) Garay*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>Z. cornigera</i> (Cogn.) Toscano*	FOD	-	-	-
<i>Z. cornuta</i> Lindl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Z. dazhyrhiza</i> (Kraenzl.) Schltr.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>Z. grandiflora</i> (Lindl.) Mansf.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>Z. kuhlmannii</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>Z. linearisepala</i> (Senghas) Toscano*	FOD	-	-	-
<i>Z. lunata</i> Lindl.*	FOD	-	-	-
<i>Z. multiflora</i> (Rolfe) Schltr.*	FOD	-	-	-
<i>Z. octavioreisii</i> Porto & Brade	FOD, FOM	-	-	-
<i>Z. ovatifetala</i> (Brade) Toscano*	FOD	-	-	-
<i>Z. papillosa</i> Cogn.*	FOD	-	-	-
<i>Z. pellucida</i> Rchb.f.*	FOD	-	-	-
<i>Z. pustulata</i> (Kraenzl.) Schltr.*	FOD	-	-	-

Orobanchaceae

Vinícius Castro Souza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OROBANCHACEAE – 24/2.000				
Agalinis – 6/40				
A. bandeirensis Barringer*	FCA	-	CR	ANEXO II
A. communis (Cham. & Schltdl.) D´Arcy	FCA	-	-	-
A. genistifolia (Cham. & Schltdl.) D´Arcy	FCA	-	-	-
A. linarioides (Cham. & Schltdl.) D´Arcy*	FCA	-	-	-
A. ramosissima (Benth.) D´Arcy*	FCA	-	-	-
A. ramulifera Barringer*	FCA	-	EN	ANEXO II
Buchnera – 7/100				
B. amethystina Cham. & Schltdl.*	FCA	-	-	-
B. integrifolia Larrañaga	FCA	-	-	-
B. juncea Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
B. lavandulacea Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
B. longifolia Kunth	FCA	-	-	-
B. rosea Kunth	FCA	-	-	-
B. ternifolia Kunth	FCA	-	-	-
Castilleja – 1/200				
C. arvensis Schltdl. & Cham.	FCA	-	-	-
Escobedia – 1/15				
E. grandiflora (L.f.) Kuntze	FCA	-	-	-
Esterhazyia – 3/5				
E. eitenorum Barringer*	FCA	-	-	-
E. macrodonta (Cham.) Benth.	FCA	-	-	-
E. splendida J.C.Mikan	FCA	-	-	-
Magdalenaea* – 1/1				
M. limae Brade*	FCA	-	CR	ANEXO I
Melasma – 2/60				
M. melampyroides (Rich.) Pennell	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. rhinanthoides</i> (Cham.) Benth.	FCA	-	-	-
<i>Nothochilus</i> * – 1/1				
<i>N. coccineus</i> Radlk.*	FCA	-	CR	ANEXO I
<i>Velloziella</i> – 2/3				
<i>V. dracocephaloides</i> (Vell.) Baill.*	FCA	-	-	-
<i>V. westermanii</i> Dusén*	FCA	-	-	-

Oxalidaceae

Maria Carolina de Abreu & Pedro Fiaschi

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
OXALIDACEAE – 64/600				
Biophytum – 1/80				
B. mimosoides (A.St.-Hil.) Guillaumin	FOD	-	-	-
Oxalis – 63/500				
O. alata Mart. ex Zucc.*	FOD, FES	-	-	-
O. alvimii Lourteig*	FOD, RST	-	-	-
O. aptera Zucc. ex Progel*	FOD, FES	-	-	-
O. arachnoidea Progel*	FCA	-	VU	ANEXO II
O. articulata Savigny	FOD, FOM, FCA	-	-	-
O. barrelieri L.	FOD, FES	-	-	-
O. bela-vitoriae Lourteig*	FOD	-	VU	ANEXO II
O. bifrons Progel*	FES	-	-	-
O. bipartita A.St.-Hil.	FOM, FES, FCA	-	-	-
O. bisecta Norlind*	FCA	-	-	-
O. blackii Lourteig*	FOD	-	-	-
O. brasiliensis Lodd.	FOD, FCA, AFL	-	-	-
O. calva Progel	FCA, AFL	-	-	-
O. clausenii Lourteig*	FOD	-	-	-
O. confertissima A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
O. conorrhiza Jacq.	FCA	-	-	-
O. corniculata L.	FOD, FOM, FES, FCA, AFL, RST	-	-	-
O. cratensis Hook.	FOD, FES	-	-	-
O. cytisoides Mart. ex Zucc.	FOD, FES	-	-	-
O. debilis Kunth	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
O. divaricata Mart. ex Zucc.	FES, FCA	-	-	-
O. doceana Lourteig*	FOD	-	EN	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>O. floribunda</i> Lehm.	FOM, FCA	-	-	-
<i>O. frutescens</i> L.	FCA, FES, FOD	-	-	-
<i>O. fruticosa</i> Raddi*	FOD, RST	-	-	-
<i>O. geralensis</i> Knuth*	FOD, FES	-	-	-
<i>O. hedysarifolia</i> Raddi	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>O. hepatica</i> Norlind*	FOM, FCA	-	-	-
<i>O. hispidula</i> Zucc.	AFL, FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>O. hyalotricha</i> Lourteig*	FES, FCA	-	-	-
<i>O. impatiens</i> Vell.*	FOD	-	-	-
<i>O. irreperita</i> Lourteig*	FOD	-	-	-
<i>O. kuhlmannii</i> Lourteig*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>O. lasiopetala</i> Zucc.	FES, FCA	-	-	-
<i>O. latifolia</i> Kunth	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>O. linarantha</i> Lourteig*	FES, FOM	-	-	-
<i>O. mandioccana</i> Raddi*	FOD, FES	-	-	-
<i>O. myriophylla</i> A.St.-Hil.*	FCA	-	-	-
<i>O. neuwiedii</i> Zucc.*	FES	-	-	-
<i>O. niederleiniana</i> Hieron. ex Knuth*	FES	-	-	-
<i>O. niederleinii</i> Knuth	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>O. odonellii</i> Lourteig*	FOM, FCA	-	-	-
<i>O. paranaensis</i> Lourteig*	FOD, FOM	-	VU	ANEXO II
<i>O. perdicaria</i> (Molina) Bertero	FES, FCA	-	-	-
<i>O. polymorpha</i> Mart. ex Zucc.*	FOD, FCA	-	-	-
<i>O. potamophila</i> Lourteig*	FES, FOD, AFL	-	-	-
<i>O. praetexta</i> Progel*	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>O. psoraleoides</i> Kunth	FCA, FES, AFL	-	-	-
<i>O. puberula</i> Nees & Mart.	FES	-	-	-
<i>O. refracta</i> A.St.-Hil.	AFL, FCA	-	-	-
<i>O. renifolia</i> Knuth	FES	-	-	-
<i>O. rhombo-ovata</i> A.St.-Hil.	AFL, FES, FOD	-	-	-
<i>O. riparia</i> Norlind*	FOD, AFL	-	-	-
<i>O. rupestris</i> A.St.-Hil.	FES, FOD, FOM, FCA	-	-	-
<i>O. sarmentosa</i> Zucc.*	FOM, FCA	-	-	-
<i>O. sellowii</i> Spreng.*	FES	-	-	-
<i>O. sepium</i> A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-
<i>O. serpens</i> A.St.-Hil.*	FOM, FCA	-	-	-
<i>O. subvillosa</i> Norlind*	FOD, AFL	-	-	-
<i>O. telmatica</i> Lourteig*	FOD, FCA	-	-	-
<i>O. tenerrima</i> Knuth	FOD, FCA	-	-	-
<i>O. triangularis</i> A.St.-Hil.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>O. umbraticola</i> A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-

Passifloraceae

Armando Carlos Cervi, Luís Carlos Bernacci & Dilma Silva Nascimento

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PASSIFLORACEAE – 69/630				
<i>Mitostemma</i> – 1/3				
<i>M. glaziovii</i> Mast.	FOD, FED	-	-	-
<i>Passiflora</i> – 68/450				
<i>P. actinia</i> Hook.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. alata</i> Curtis	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. amethystina</i> J.C.Mikan	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. bahiensis</i> Klotzsch	RST	-	-	-
<i>P. boticarioana</i> Cervi*	FED	-	-	-
<i>P. caerulea</i> L.	FOM	-	-	-
<i>P. campanulata</i> Mast.	FOD	-	-	-
<i>P. capsularis</i> L.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. catharinensis</i> Sacco*	FOD	-	-	-
<i>P. chlorina</i> L.Escobar*	FOD	-	-	-
<i>P. chrysophylla</i> Chodat	FOD	-	-	-
<i>P. cincinnata</i> Mast.	FES, FCA	-	-	-
<i>P. clathrata</i> Mast.	FCA	-	-	-
<i>P. contracta</i> Vitta*	FOD	-	-	-
<i>P. deidamioides</i> Harms*	FOD	-	-	-
<i>P. edmundoi</i> Sacco	FED	-	-	-
<i>P. edulis</i> Sims	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
<i>P. eichleriana</i> Mast.	FOD	-	-	-
<i>P. elegans</i> Mast.	FOD	-	-	-
<i>P. elliptica</i> Gardner*	FOD	-	-	-
<i>P. farneyi</i> Pessoa & Cervi*	RST	-	-	-
<i>P. filamentosa</i> Cav.	FOD, FED	-	-	-
<i>P. foetida</i> L.	FOD	-	-	-
<i>P. galbana</i> Mast.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. glaucescens</i> Killip	FOD, FES	-	-	-
<i>P. haematostigma</i> Mart. <i>ex</i> Mast.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. hatschbachii</i> Cervi*	FES, FED	-	VU	ANEXO I
<i>P. hypoglauca</i> Harms*	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>P. imbeana</i> Sacco*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>P. ischnoclada</i> Harms*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>P. jilekii</i> Wawra*	FOD, RST	-	-	-
<i>P. kermesina</i> Link & Otto*	FOD	-	-	-
<i>P. lepidota</i> Mast.	FCA	-	-	-
<i>P. loefgrenii</i> Vitta	FOD	-	-	-
<i>P. malacophylla</i> Mast.	FOD, FED	-	-	-
<i>P. marginata</i> Mast.*	FOD	-	-	-
<i>P. mendoncae</i> Harms	FOD	-	-	-
<i>P. miersii</i> Mast.	FES, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. misera</i> Kunth	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. morifolia</i> Mast.	FES, FCA	-	-	-
<i>P. mucronata</i> Lam.*	RST	-	-	-
<i>P. odontophylla</i> Harms ex Glaz.*	FOD, RST	-	-	-
<i>P. organensis</i> Gardner	FOD, FES	-	-	-
<i>P. ovalis</i> Vell. ex Roem.*	FOD, RST	-	-	-
<i>P. pardifolia</i> Vanderpl.	FOD	-	-	-
<i>P. pentagona</i> Mast.*	RST	-	-	-
<i>P. pohlii</i> Mast.	FES, FCA	-	-	-
<i>P. racemosa</i> Brot.*	RST, FOD	-	-	-
<i>P. reitzii</i> Sacco*	FOD	-	-	-
<i>P. rhamnifolia</i> Mast.	FOD, FED	-	-	-
<i>P. rubra</i> L.	FOD, RST	-	-	-
<i>P. saccoi</i> Cervi*	FED	-	VU	ANEXO I
<i>P. saxicola</i> Gontsch.*	FOD	-	-	-
<i>P. setacea</i> DC.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>P. setulosa</i> Killip	FOM	-	-	-
<i>P. sidifolia</i> M.Roemer*	FOD, RST	-	-	-
<i>P. speciosa</i> Gardner*	FOD	-	-	-
<i>P. suberosa</i> L.	FOD, FOM, FES, FCA, AFL	-	-	-
<i>P. subrotunda</i> Mast.*	RST	-	-	-
<i>P. tenuifila</i> Killip	FOD, FES	-	-	-
<i>P. tricuspidata</i> Mast.	FES, FCA	-	-	-
<i>P. trintae</i> Sacco*	FOD	-	-	-
<i>P. truncata</i> Regel*	FOD	-	-	-
<i>P. urnifolia</i> Rusby	FES, FCA	-	-	-
<i>P. urubiciensis</i> Cervi*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>P. vellozoi</i> Gardner*	FOD	-	-	-
<i>P. villosa</i> Vell.	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. watsoniana</i> Mast.*	FOD	-	-	-

Pentaphyllacaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PENTAPHYLLACACEAE– 4/337				
<i>Ternstroemia</i> – 4/100				
<i>T. alnifolia</i> Wawra	FOD	-	-	-
<i>T. brasiliensis</i> Cambess.	FOD, RST	-	-	-
<i>T. carnosus</i> Cambess.	FES			
<i>T. cuneifolia</i> Gardner*	FCA, FOD	-	-	-

Peraceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PERACEAE – 6/140				
<i>Chaetocarpus</i> – 2/13				
<i>C. echinocarpus</i> (Baill.) Ducke	FOD	-	-	-
<i>C. myrsinites</i> Baill.	FOD	-	-	-
<i>Pera</i> – 3/ca.30				
<i>P. barbinervis</i> (Mart. ex Klotzsch.) Pax & K.Hoffm.	FES	-	-	-
<i>P. glabrata</i> (Schott) Baill.*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>P. heteranthera</i> I.M.Johnst*	FOD, FES	-	-	-
<i>Pogonophora</i> – 1/3				
<i>P. schomburgkiana</i> Benth.	FOD, FES, RST	-	-	-

Phyllanthaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PHYLLANTHACEAE – 43/1.800				
<i>Amanoa</i> – 1/16				
<i>A. guianensis</i> Aubl.	FOD, RST	-	-	-
<i>Astrocasia</i> – 1/5				
<i>A. jacobinensis</i> (Müll.Arg.) G.L.Webster	FES, FED	-	-	-
<i>Discocarpus</i> – 2/3				
<i>D. essequiboensis</i> Klotzsch	FOD	-	-	-
<i>D. pedicellatus</i> Fiaschi & Cordeiro*	FES	-	-	-
<i>Gonatogyne</i> * – 1/1				
<i>G. brasiliensis</i> (Baill.) Müll.Arg.*	FES	-	-	-
<i>Hieronyma</i> – 2/40				
<i>H. alchorneoides</i> Allemão	FOD, FES	-	-	-
<i>H. oblonga</i> (Tul.) Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>Margaritaria</i> – 1/14				
<i>M. nobilis</i> L.f.	FOD, FES	-	-	-
<i>Meineckia</i> – 1/20				
<i>M. neogranadensis</i> (Müll.Arg.) G.L.Webster	FES	-	-	-
<i>Phyllanthus</i> – 30/ca. 750				
<i>P. acuminatus</i> Vahl	FES, FED	-	-	-
<i>P. acutifolius</i> Spreng.*	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. almadensis</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>P. amarus</i> Schum. & Thonn.	RUD	-	-	-
<i>P. arenicola</i> Casar.*	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. caparoensis</i> G.L.Webster*	FCA	-	-	-
<i>P. caroliniensis</i> Walt.	RUD	-	-	-
<i>P. carvalhoi</i> G.L.Webster*	FOD	-	-	-
<i>P. claussenii</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>P. debilis</i> Willd.	RUD	-	-	-
<i>P. glaziovii</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>P. gradyi</i> M.J.Silva & M.F.Sales*	FOD, FES	-	-	-
<i>P. heteradenius</i> Müll.Arg.	RST	-	-	-
<i>P. hypoleucus</i> Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
<i>P. itatiaiensis</i> Brade*	FCA, AFL	-	-	-
<i>P. juglandifolius</i> Willd.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. klotzschianus</i> Müll.Arg.	RST, AFL	-	-	-
<i>P. lindbergii</i> Müll.Arg.	FCA	-	-	-
<i>P. minutulus</i> Müll.Arg.	FOD, RST	-	-	-
<i>P. mocotensis</i> G.L.Webster*	FOD	-	-	-
<i>P. niruri</i> L.	RUD	-	-	-
<i>P. orbiculatus</i> L.C.Rich.	FOD	-	-	-
<i>P. perpusillus</i> Baill.*	FCA	-	-	-
<i>P. piranii</i> G.L.Webster*	FOD	-	-	-
<i>P. rosellus</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>P. stipulatus</i> (Raf.) Webster	FOD	-	-	-
<i>P. submarginatus</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>P. tenellus</i> Roxb.	RUD	-	-	-
<i>P. umbrathus</i> Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
<i>P. urinaria</i> L.	RUD	-	-	-
<i>Richeria</i> – 1/2				
<i>R. grandis</i> Vahl	FES	-	-	-
<i>Savia</i> – 3/25				
<i>S. brasiliensis</i> Pax & K.Hoffm.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. dictyocarpa</i> Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. sessiliflora</i> (Sw.) Willd.	RST	-	-	-

Phytolaccaceae

Maria Salete Marchioretto

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PHYTOLACCACEAE – 8/65				
<i>Gallesia</i> – 1/1				
<i>G. integrifolia</i> (Spreng.) Harms	FOD	-	-	-
<i>Hillieria</i> – 1/3				
<i>H. latifolia</i> (Lam.) H.Walter	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Phytolacca – 2/25				
P. dioica L.	FES	-	-	-
P. thyrsoiflora Fenzl ex Schmidt	FOM	-	-	-
Seguiera – 3/6				
S. aculeata Jacq.	FOM	-	-	-
S. americana L.	FOD	-	-	-
S. langsdoeffii Moq.	FOD	-	-	-
Trichostigma – 1/3				
T. octandrum (L.) H.Walter	FOD	-	-	-

Picramniaceae

José Rubens Pirani

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PICRAMNIACEAE – 12/50				
<i>Picramnia</i> – 12/50				
<i>P. andrade-limae</i> Pirani*	FOD, RST	-	-	-
<i>P. bahiensis</i> Turcz.*	RST, FES	-	-	-
<i>P. ciliata</i> Mart.*	FOD, FES	-	-	-
<i>P. coccinea</i> W.W.Thomas*	FOD, RST	-	VU	ANEXO I
<i>P. elliptica</i> Kuhlman. ex Pirani	FES	-	-	-
<i>P. excelsa</i> Kuhlman. ex Pirani*	FOM	-	-	-
<i>P. gardneri</i> Planch.*	FOD, FES	-	-	-
<i>P. glazioviana</i> Engl.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>P. grandifolia</i> Engl.*	FOD	-	-	-
<i>P. parvifolia</i> Engl.	FOD, FOM, FED, FES, RST, MAN	-	-	-
<i>P. ramiflora</i> Planch.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. sellowii</i> Planch.	FOD, FED, FES	-	-	-

Picrodendraceae

Flávio Dayrell Gontijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PICRODENDRACEAE – 1/80				
<i>Paradrypetes</i> – 1/2				
<i>P. ilicifolia</i> Kuhlman.*	FOD, FES	-	-	-

Piperaceae

Elsie Franklin Guimarães & Erika von Sohsten Medeiros

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PIPERACEAE – 267/3.615				
Manekia – 1/6				
M. obtusa (Miq.) Arias et al.	FOD	-	-	-
Ottonia – 5/25				
O. albopunctata Trel.	FOD	-	-	-
O. angustifolia Rizzini*	FOD	-	-	-
O. peltata E.F.Guim. & Ichaso*	FOD	-	-	-
O. sampaioi Yunck.	FOD	-	-	-
O. villosa Yunck.*	FOD	-	-	-
Peperomia – 125/1.000				
P. aceroana C.DC.	FES	-	-	-
P. acuminata Ruiz & Pav.	FOD	-	-	-
P. adsurgens Yunck.	FOD	-	-	-
P. alata Ruiz & Pav.	FOD	-	-	-
P. apiahyensis Yunck.*	FOD	-	-	-
P. arbuscula Yunck.*	FOD	-	-	-
P. argyreia (Miq.) E.Morr.	FOD	-	-	-
P. arifolia Miq.	FOD	-	-	-
P. arifolioides Yunck.	FES	-	-	-
P. armondii Yunck.*	FOD	-	-	-
P. augescens Miq.*	FOD	-	-	-
P. balansana C.DC.	FES	-	-	-
P. barbarana C.DC.	FOD	-	-	-
P. blanda (Jacq.) Kunth	FOD	-	-	-
P. bradei Yunck.*	FOD	-	-	-
P. brasiliensis (Miq.) Miq.*	FOD	-	-	-
P. calophylla Yunck.*	FOD	-	-	-
P. campinasana Yunck.*	FOD	-	-	-
P. casteloensis Yunck.	FOD	-	-	-
P. catharinae Miq.	FOD	-	-	-
P. caulibarbis Miq.	FOD	-	-	-
P. choroniana C.DC.*	FOD	-	-	-
P. ciliatocaespitosa Carv.-Silva & E.F.Guim.*	FOD	-	-	-
P. circinnata Link	FOD	-	-	-
P. clivicola Yunck.*	FOD	-	-	-
P. cooperi C.DC.*	FOD	-	-	-
P. corcovadensis Gardner	FOD	-	-	-
P. cordigera Dahlst.	FOD, FCA	-	-	-
P. crinicaulis C.DC.	FOD	-	-	-
P. crypticola C.DC.*	FCA	-	-	-
P. decipiens C.DC.	FOD	-	-	-
P. decora Dahlst.	FCA	-	-	-
P. delicatula Henschen	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. diaphanoides</i> Dahlst.	FOD	-	-	-
<i>P. dichotoma</i> Regel*	FOD	-	-	-
<i>P. distachya</i> (L.) A.Dietr.*	FOD	-	-	-
<i>P. duartei</i> Yunck.*	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. effusa</i> Yunck.	FES	-	-	-
<i>P. elongata</i> Kunth	FOD, FES	-	-	-
<i>P. emarginella</i> (Sw.) C.DC.	RST FOD	-	-	-
<i>P. flexicaulis</i> Wawra	FOD	-	-	-
<i>P. galioides</i> Kunth	FOD	-	-	-
<i>P. gardneriana</i> Miq.	FOD	-	-	-
<i>P. glabella</i> (Sw.) A.Dietr.	FOD	-	-	-
<i>P. glazioui</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. gracilicaulis</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. gracilis</i> Dahlst.*	FOD	-	-	-
<i>P. guarujana</i> C.DC.*	FOD	-	-	-
<i>P. hemmendorffii</i> Yunck.*	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. hernandiifolia</i> (Vahl) A.Dietr.	FOD	-	-	-
<i>P. hilariana</i> Miq.	FOD	-	-	-
<i>P. hispidosa</i> Dahlst.	FOD	-	-	-
<i>P. humifusa</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. hydrocotyloides</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. ibiramana</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. incana</i> (Haw.) Hook.*	FOD	-	-	-
<i>P. itatiaiana</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. loefgrenii</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. loxensis</i> Kunth	FOD	-	-	-
<i>P. lyman-smithii</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. magnoliifolia</i> (Jacq.) A.Dietr.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. mandioccana</i> Miq.	FOD	-	-	-
<i>P. mandonii</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. marcoana</i> C.DC.*	FCA	-	-	-
<i>P. martiana</i> Miq.	FOD	-	-	-
<i>P. megapotamica</i> Dahlst.	FOD	-	-	-
<i>P. minensis</i> Henschen	FOD	-	-	-
<i>P. misionensis</i> Yunck.	FES	-	-	-
<i>P. morungavana</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. mosenii</i> Dahlst.	FOD	-	-	-
<i>P. nitida</i> Dahlst.*	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. obtusifolia</i> (L.) A.Dietr.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. oreophila</i> Henschen	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. ouabiana</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. papillispica</i> C.DC.*	FOD	-	-	-
<i>P. parcifolia</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. pellucida</i> (L.) Kunth	FOD	-	-	-
<i>P. pereirae</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. pereskiiifolia</i> (Jacq.) Kunth	FOD, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. perlongicaulis</i> Yunck.	FOD	-	-	-
<i>P. pernambucensis</i> Miq.	FOD	-	-	-
<i>P. polysachyoides</i> Dahlst.	FOD	-	-	-
<i>P. prostrata</i> Hort.	FCA	-	-	-
<i>P. pseudobcordata</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. pseudoestrellensis</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. psilostachya</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. pubipeduncula</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. punicea</i> Dahlst.*	FOD	-	-	-
<i>P. quadrifolia</i> (L.) Kunth	FOD	-	-	-
<i>P. ramboi</i> Yunck.	FOD	-	-	-
<i>P. renifolia</i> Dahlst.*	FOD	-	-	-
<i>P. retivenulosa</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. rhombea</i> Ruiz & Pav.	FOD	-	-	-
<i>P. riedeliana</i> Regel*	FOD	-	-	-
<i>P. rizzinii</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. rostulatiformis</i> Yunck.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>P. rotundifolia</i> (L.) Kunth	FOD	-	-	-
<i>P. rubricaulis</i> (Nees) A.Dietr.	FOD	-	-	-
<i>P. rufispica</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. rusbyi</i> C.DC.	FES	-	-	-
<i>P. schenkiana</i> Dahlst.	FOD	-	-	-
<i>P. schwackei</i> C.DC.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. serpens</i> (Sw.) Loud.	FOD	-	-	-
<i>P. serpentarioides</i> Miq.*	FOD	-	-	-
<i>P. stenocarpa</i> Regel*	FOD	-	-	-
<i>P. stroemfeltii</i> Dahlst.*	FOD	-	-	-
<i>P. submarginata</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. suboppositifolia</i> Yunck.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>P. subpubistachya</i> Yunck.	FES	-	-	-
<i>P. subretusa</i> Yunck.	FOD	-	-	-
<i>P. subrubricaulis</i> C.DC.	FCA	-	-	-
<i>P. subsetifolia</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. subternifolia</i> Yunck.	FOD	-	-	-
<i>P. tenella</i> (Sw.) A.Dietr.	FOD	-	-	-
<i>P. tetraphylla</i> (G.Forst.) Hook. & Arn.	FOD	-	-	-
<i>P. transparens</i> Miq.	FOD	-	-	-
<i>P. trapezoidalis</i> Yunck.	FES	-	-	-
<i>P. trichocarpa</i> Miq.*	FOD	-	-	-
<i>P. trinervis</i> Ruiz & Pav.	FOD	-	-	-
<i>P. trineura</i> Miq.	FOD	-	-	-
<i>P. trineuroides</i> Dahlst.	FOD	-	-	-
<i>P. turbinata</i> Dahlst.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. urocarpa</i> Fisch. & C.A.Mey.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. velloziana</i> Miq.	FOD	-	-	-
<i>P. warmingii</i> C.DC.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Piper – 135/1.000				
P. abbadianum Yunck.	FCA	-	-	-
P. abutiloides Kunth*	FOD	-	-	-
P. aduncum L.	FOD, FCA	-	-	-
P. aequale Vahl	FOD	-	-	-
P. aequilaterum C.DC.	FOD	-	-	-
P. alatipetiolatum Yunck.	FOD	-	-	-
P. alnoides Kunth*	FOD	-	-	-
P. amalago L.	FOD, RST	-	-	-
P. amparoense Yunck.*	FOD	-	-	-
P. amplum Kunth	FOD	-	-	-
P. anisum (Spreng.) Angely	FOD	-	-	-
P. anostachyum Yunck.	FOD	-	-	-
P. arboreum Aubl.	FOD	-	-	-
P. bahianum Yunck.*	FOD	-	-	-
P. belloi Yunck.*	FOD, FCA	-	-	-
P. bennettianum C.DC.*	FOD	-	VU	ANEXO II
P. bowiei Yunck.*	FOD	-	-	-
P. bradei Yunck.*	FOD	-	-	-
P. cabralanum C.DC.*	FOD	-	-	-
P. caldasianum (Miq.) Yuncker	FCA	-	-	-
P. caldense C.DC.	FOD	-	-	-
P. caracolanum Yunck.*	FOD	-	-	-
P. casteloense Yunck.*	FOD	-	VU	ANEXO II
P. cernuum Vell.	FOD	-	-	-
P. chimonanthifolium Kunth	FOD	-	-	-
P. clausenianum (Miq.) C.DC.	FOD	-	-	-
P. coralfalgense C.DC.*	FOD	-	-	-
P. corcovadensis (Miq.) C.DC.	FOD	-	-	-
P. coruscans Kunth	FOD	-	-	-
P. crassinervium Kunth	FOD, FCA	-	-	-
P. crassistilum Yunck.	FOD	-	-	-
P. crebrinodum C.DC.*	FOD	-	-	-
P. cubataonum C.DC.	FOD	-	-	-
P. cunninghamii Yunck.*	FOD	-	-	-
P. dilatatum Rich.	FOD	-	-	-
P. diospyrifolium Kunth*	FOD	-	-	-
P. divaricatum G.Mey.	FOD	-	-	-
P. edwallii Yunck.*	FOD	-	-	-
P. ellipticifolium Yunck.*	FOD	-	-	-
P. emygdioi Yunck.*	FOD	-	-	-
P. eucalyptophyllum C.DC.	FOD	-	-	-
P. flavicans C.DC.	FOD	-	-	-
P. flavoviride C.DC.*	FOD	-	-	-
P. fuligineum Kunth	FOD, FCA	-	-	-
P. gaudichaudianum Kunth	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. gigantifolium</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. glabratum</i> Kunth	FOD	-	-	-
<i>P. goesii</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. halesiifolium</i> Kunth*	FOD	-	-	-
<i>P. hatschbachii</i> Yunck.	FOD	-	-	-
<i>P. hayneanum</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. hemmendorffii</i> C.DC.*	FOD	-	-	-
<i>P. hexandrum</i> C.DC.*	FOD	-	-	-
<i>P. hillianum</i> C.DC.*	FOD	-	-	-
<i>P. hispidum</i> Sw.	FOD	-	-	-
<i>P. hoehnei</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. hoffmannseggianum</i> Roem. & Schult.	FOD	-	-	-
<i>P. ilheusense</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. itatiaianum</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. jubimarginatum</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. juliflorum</i> Nees & Mart.*	FOD	-	-	-
<i>P. kleinii</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. klotzschianum</i> (Kunth) C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. kuhlmannii</i> Yunck.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>P. laevicarpum</i> Yunck.	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>P. lagoaense</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. lanceolatum</i> Ruiz & Pav.	FOD	-	-	-
<i>P. lepturum</i> Kunth	FOD	-	-	-
<i>P. lhotzkyanum</i> Kunth	FOD	-	-	-
<i>P. limae</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. loefgrenii</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. longipes</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. lucaeum</i> Kunth	FOD	-	-	-
<i>P. lundii</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. macedoi</i> Yunck.	FOD	-	-	-
<i>P. malacophyllum</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. mapirense</i> C.DC.	FES	-	-	-
<i>P. marginatum</i> Jacq.	FOD	-	-	-
<i>P. mikanianum</i> (Kunth) Steud.	FOD	-	-	-
<i>P. miquelianum</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. mollicomum</i> Kunth	FOD	-	-	-
<i>P. morisonianum</i> C.DC.*	FOD	-	-	-
<i>P. mosenii</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. mourae</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. multinodum</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. nervulosum</i> C.DC.*	FOD	-	-	-
<i>P. niteroiense</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. oblacifolium</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. obliquum</i> Ruiz & Pav.	FOD	-	-	-
<i>P. ovatum</i> Vahl	FOD	-	-	-
<i>P. pauciramosum</i> Yunck.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. permucronatum</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. piliovarium</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. piritubanum</i> Yunck.	FOD	-	-	-
<i>P. pseudopothifolium</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. puberulidrupum</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. pubisubmarginalum</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. quadratiovarianum</i> Yunck.	FOD	-	-	-
<i>P. rarum</i> C.DC.*	FOD	-	-	-
<i>P. regnellii</i> (Miq.) C.DC.	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. reitzii</i> Yunck.	FOD	-	-	-
<i>P. rhododendrifolium</i> Kunth	FOD	-	-	-
<i>P. richardiiifolium</i> Kunth	FOD	-	-	-
<i>P. rioense</i> Yunck.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>P. rivinoides</i> Kunth	FOD	-	-	-
<i>P. robustipedunculatum</i> Yunck.	FOD	-	-	-
<i>P. rumicifolium</i> (Miq.) Yuncker	FOD	-	-	-
<i>P. saldanhae</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. sampaioi</i> Yunck.	FOD	-	-	-
<i>P. scabrellum</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. schenckii</i> C.DC.*	FOD	-	-	-
<i>P. scutifolium</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. sebastianum</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. setebarraense</i> E.F.Guim. & L.H.P.Costa	FOD	-	-	-
<i>P. solmsianum</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. sprengelianum</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. subcinereum</i> C.DC.	FOD	-	-	-
<i>P. subrugosum</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. taperanum</i> Yunck.	FOD	-	-	-
<i>P. tectoniifolium</i> Kunth	FOD	-	-	-
<i>P. tenuinerve</i> C.DC.*	FOD	-	-	-
<i>P. translucens</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. trigonodrupum</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. truncatum</i> Yunck.*	FOD	-	-	-
<i>P. tuberculatum</i> Jacq.	FOD	-	-	-
<i>P. tucumanum</i> C.DC.	FES	-	-	-
<i>P. ulei</i> C.DC.*	FOD	-	-	-
<i>P. umbellatum</i> L.	FOD	-	-	-
<i>P. vaginans</i> C.DC.*	FCA	-	-	-
<i>P. vellosi</i> Yunck.	FOD	-	-	-
<i>P. velutinibaccum</i> C.DC.	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>P. vissosanum</i> Yunck.	FOD	-	-	-
<i>P. viminifolium</i> Trel.	FOD	-	-	-
<i>P. weddellii</i> C.DC.*	FOD	-	-	-
<i>P. xylosteoides</i> (Kunth) Steud.	FOD	-	-	-
<i>Sarcorrhachis</i> – 1/4				
<i>S. schwackei</i> Yunck.*	FOD	-	-	-

Plantaginaceae

Vinícius Castro Souza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PLANTAGINACEAE – 51/481				
Achetaria – 3/4				
A. erecta (Spreng.) Wettst.	FOD	-	-	-
A. latifolia V.C.Souza*	RST	-	CR	ANEXO II
A. ocymoides (Cham. & Schltdl.) Wettst.	FOD, RST	-	-	-
Angelonia – 3/25				
A. cornigera Hook.f.	RST	-	-	-
A. integerrima Spreng.	FCA	-	-	-
A. procumbens (Schrad.) Nees & Mart.	FOD	-	-	-
Bacopa – 10/50				
B. aquatica Aubl.	FOD	-	-	-
B. australis V.C.Souza	FOM	-	-	-
B. congesta Chodat & Hassl.	FES, FOD	-	-	-
B. lanigera (Cham. & Schltdl.) Wettst.	FCA	-	-	-
B. monnieri (L.) Pennell	FES, FOD, RST	-	-	-
B. monnierioides (Cham.) Robinson	FOD	-	-	-
B. salzmännii (Benth.) Wettst. ex Edwall	FES	-	-	-
B. scabra (Benth.) Descole & Borsini	FES, FOD	-	-	-
B. serpyllifolia (Benth.) Pennell	FCA	-	-	-
B. stricta (Schrad.) Wettst. ex Edwall	FES, FOD	-	-	-
Conochea – 1/7				
C. scoparioides (Cham. & Schltdl.) Benth.	FOD	-	-	-
Gratiola – 1/20				
G. peruviana L.	FOD	-	-	-
Ildefonsia* – 1/1				
I. bibracteata Gardner*	FOD	-	CR	ANEXO I
Lindernia – 3/50				
L. crustacea (L.) F.Muell.	FOD	-	-	-
L. diffusa (L.) Wettst.	FOD	-	-	-
L. rotundifolia (L.) Alston	FOD	-	-	-
Mecardonia – 4/6				
M. grandiflora (Benth.) Pennell	FOM, FOD	-	-	-
M. procumbens (Mill.) Small	FOM, FOD	-	-	-
M. pubescens Rossow*	FCA	-	-	-
M. serpylloides (Cham. & Schltdl.) Pennell	FES	-	-	-
Micranthemum – 1/3				
M. umbrosum (Walter ex J.F.Gmel.) Blake	FOD	-	-	-
Otacanthus – 4/5				
O. azureus (Linden) Ronse*	FOD	-	-	-
O. caparaoensis Brade*	FCA	-	-	-
O. fernandesii Ronse*	FOD	-	-	-
O. platytilus (Radlk.) Taub.*	FOD, FCA, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Plantago – 5/200				
P. australis Lam.	FES, FOD	-	-	-
P. catharinaea Decne.*	RST	-	-	-
P. guilleminiana Decne.*	FCA	-	-	-
P. lanceolata L.	FOD	-	-	-
P. tomentosa Lam.	FED	-	-	-
Scoparia – 6/10				
S. dulcis L.	FOD, FES, FCA, RST	-	-	-
S. elliptica Cham.*	FOD, FCA	-	-	-
S. ericacea Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
S. hassleriana Chodat	FCA	-	-	-
S. montevidensis (Spreng.) R.E.Fr.	FCA	-	-	-
S. pinnatifida Cham.*	FCA	-	-	-
Stemodia – 8/50				
S. foliosa Benth.	FOD	-	-	-
S. hyptioides Cham. & Schltdl.	FOM, FOD	-	-	-
S. maritima L.	FOD	-	-	-
S. stricta Cham. & Schltdl.	FOM, FOD	-	-	-
S. trifoliata (Link) Reichb.*	FOD	-	-	-
S. vandellioides (Benth.) V.C.Souza*	FOD	-	-	-
S. veronicoides J.A.Schmidt	FCA	-	-	-
S. verticillata (Mill.) Hassl.	FES, FOD, FOM	-	-	-
Torenia – 1/50				
T. thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze	FOD	-	-	-

Plumbaginaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PLUMBAGINACEAE – 2/800				
<i>Limonium</i> – 1/200				
<i>L. brasiliense</i> (Boiss.) Kuntze	RST, AFL	-	-	-
<i>Plumbago</i> – 1/21				
<i>P. scandens</i> L.	RST	-	-	-

Poaceae

Pedro Lage Viana, Fabrício Moreira Ferreira & Tarciso Sousa Filgueiras

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
POACEAE – 782/ca. 10.000				
Acroceras – 2/22				
A. excavatum (Henrard) Zuloaga & Morrone	FCA, FES, FOD	-	-	-
A. zizanioides (Kunth) Dandy	FES, FOD, RST, FCA	-	-	-
Agenium – 2/3				
A. letpocladum (Hack.) Clayton	FCA	-	-	-
A. villosum (Nees) Pilg.	FCA	-	-	-
Agrostis – 5/ca. 200				
A. capillaris L.	FCA	-	-	-
A. lenis Roseng.	FCA	-	-	-
A. longiberbis Hack. ex L.B.Sm.*	FCA	-	-	-
A. montevidensis Spreng. ex Nees	FCA	-	-	-
A. platensis Parodi	FCA	-	-	-
Alvimia* – 3/3				
A. auriculata Soderstr. & Londoño*	RST	-	-	-
A. gracilis Soderstr. & Londoño*	RST	-	-	-
A. lancifolia Soderstr. & Londoño*	RST	-	-	-
Amphibromus – 1/12				
A. quadridentulus (Döll) Swallen	FCA	-	-	-
Andropogon – 17/ca. 100				
A. arenarius Hack.	FCA	-	-	-
A. bicornis L.	FCA, AFL	-	-	-
A. bogotensis (Hack.) A.Zanin	FCA	-	-	-
A. brasiliensis A.Zanin & Longhi-Wagner	FCA, AFL	-	-	-
A. carinatus Nees	AFL	-	-	-
A. fastigiatus Sw.	FCA, AFL	-	-	-
A. glaucophyllus Roseng et al.	FCA	-	-	-
A. glaziovii Hack.	FCA	-	-	-
A. hypogynus Hack.	FCA	-	-	-
A. ingratus Hack.	AFL	-	-	-
A. lateralis Nees	FCA, AFL	-	-	-
A. leucostachyus Kunth	FCA, AFL	-	-	-
A. lindmanii Hack.	FCA	-	-	-
A. macrothrix Triana	AFL, FCA	-	-	-
A. selloanus (Hack.) Hack.	FCA, AFL	-	-	-
A. ternatus (Spreng.) Nees	FCA	-	-	-
A. virgatus Desv. ex Ham.	FCA	-	-	-
Anomochloa* – 1/1				
A. marantoidea Brongn.*	FOD	-	CR	ANEXO I
Anthaenantia – 1/4				
A. lanata (Kunth) Benth.	FCA, AFL	-	-	-
Anthaenantiopsis – 3/5				
A. fiebrigii Parodi	FCA, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>A. perforata</i> (Nees) Parodi	FCA, AFL	-	-	-
<i>A. trachystachya</i> (Nees) Mez ex Pilg.	FCA	-	-	-
<i>Apochloa</i> – 6/15				
<i>A. chnoodes</i> (Triana) Zuloaga & Morrone	AFL	-	-	-
<i>A. euprepes</i> (Renvoize) Zuloaga & Morrone	AFL	-	-	-
<i>A. lorea</i> (Triana) Zuloaga & Morrone	AFL	-	-	-
<i>A. lutzii</i> (Swallen) Zuloaga & Morrone*	AFL	-	-	-
<i>A. poliophylla</i> (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone	AFL	-	-	-
<i>A. tijucae</i> (Renvoize) Zuloaga & Morrone*	AFL	-	-	-
<i>Apoclada</i> * – 1/1				
<i>A. simplex</i> McClure & L.B.Sm.*	FOM	-	-	-
<i>Arberella</i> – 1/7				
<i>A. bahiensis</i> Soderstr. & Zuloaga	FOD	-	-	-
<i>Aristida</i> – 21/ca.280				
<i>A. adscensionis</i> L.	?	-	-	-
<i>A. brasiliensis</i> Longhi-Wagner*	FCA	-	-	-
<i>A. capillacea</i> Lam.	FCA	-	-	-
<i>A. circinalis</i> Lindm.	FCA	-	-	-
<i>A. ekmaniana</i> Henrard	FCA	-	-	-
<i>A. filifolia</i> (Arechav.) Herter	FCA	-	-	-
<i>A. flaccida</i> Triana & Rupr.*	FCA	-	-	-
<i>A. gibbosa</i> (Nees) Kunth	FCA	-	-	-
<i>A. jubata</i> (Arechav.) Herter	FCA	-	-	-
<i>A. laevis</i> (Nees) Kunth	FCA	-	-	-
<i>A. longifolia</i> Triana	FCA, FES	-	-	-
<i>A. macrophylla</i> Hack.	FCA	-	-	-
<i>A. megapotamica</i> Spreng. ex Nees	FCA	-	-	-
<i>A. pallens</i> Cav.	FCA	-	-	-
<i>A. recurvata</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>A. riparia</i> Triana	FCA	-	-	-
<i>A. sanctae-luciae</i> Triana	FCA	-	-	-
<i>A. setifolia</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>A. spegazzinii</i> Arechav.	FCA	-	-	-
<i>A. teretifolia</i> Arechav.	FCA	-	-	-
<i>A. torta</i> (Nees) Kunth	FCA	-	-	-
<i>Arthropogon</i> – 2/6				
<i>A. villosus</i> Nees	FCA	-	-	-
<i>A. xarachne</i> Ekman	FCA	-	-	-
<i>Arundinella</i> – 1/50				
<i>A. hispida</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze	FCA	-	-	-
<i>Athroostachys</i> * – 1/1				
<i>A. capitata</i> (Hook.) Benth.*	FOD, FES	-	-	-
<i>Atractantha</i> – 4/5				
<i>A. aureolanata</i> Judz.*	FOD	-	-	-
<i>A. cardinalis</i> Judz.*	FOD	-	-	-
<i>A. falcata</i> McClure*	FOD	-	-	-
<i>A. radiata</i> McClure*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Aulonemia – 9/ca.40				
A. amplissima (Nees) McClure*	FOD	-	-	-
A. aristulata (Doell) McClure	FOD, FES	-	-	-
A. fimbriatifolia L.G.Clark*	FOD, FCA	-	-	-
A. glaziovii (Hack.) McClure*	FOD, FCA	-	-	-
A. goyazensis (Hack.) McClure*	FOD	-	-	-
A. radiata (Rupr.) McClure & L.B.Sm.*	FOD	-	-	-
A. ramosissima (Hack.) McClure*	FOD	-	-	-
A. setigera (Hack.) McClure*	FOD	-	-	-
A. ulei (Hack.) McClure & L.B.Sm.*	FCA	-	-	-
Axonopus – 25/ca.100				
A. affinis Chase	FCA	-	-	-
A. argentinus Parodi	FCA	-	-	-
A. aureus P.Beauv.	FCA, AFL	-	-	-
A. brasiliensis (Spreng.) Kuhlman.	FCA, AFL	-	-	-
A. capillaris (Lam.) Chase	FCA, FES, FOD, FOM	-	-	-
A. chrysoblepharis (Lag.) Chase	FCA, AFL	-	-	-
A. chrysostachyus (Schrader.) Pilg.	?	-	-	-
A. compressus (Sw.) P.Beauv.	FCA, FES	-	-	-
A. fastigiatus (Nees ex Triana) Kuhlman.	FCA, AFL	-	-	-
A. fissifolius (Raddi) Kuhlman.	FCA, RST, FES, FOD, AFL	-	-	-
A. jesuiticus (Araújo) Valls	FCA	-	-	-
A. laxiflorus (Triana) Chase	AFL, FCA	-	-	-
A. leptostachyus (Flüggé) Hitchc.	FCA	-	-	-
A. marginatus (Triana) Chase	FCA, AFL	-	-	-
A. monticola G.A.Black*	FCA, AFL	-	-	-
A. obtusifolius (Raddi) Chase*	FES, FOD, RST	-	-	-
A. pellitus (Nees ex Triana) Hitchc. & Chase	FCA	-	-	-
A. polydactylus (Steud.) Dedecca	RST, AFL, FCA	-	-	-
A. polystachyus G.A.Black	FCA	-	-	-
A. pressus (Nees ex Steud.) Parodi	FCA, AFL	-	-	-
A. ramboi G.A.Black	FCA, FOD	-	-	-
A. scoparius (Flüggé) Kuhlman.	FCA, FES	-	-	-
A. siccus (Nees) Kuhlman	FCA	-	-	-
A. sulffutis (Triana) Parodi	FCA	-	-	-
A. uninodis (Hack.) G.A.Black	FCA	-	-	-
Bothriochloa – 6/35				
B. alta (Hitchc.) Henrard.	FCA	-	-	-
B. exaristata (Nash) Henrard	FCA	-	-	-
B. laguroides (DC.) Herter	FCA	-	-	-
B. longipaniculata (Gold) Allred & Gold	FCA	-	-	-
B. saccharoides (Sw.) Rydb.	FCA	-	-	-
B. velutina M.Marchi & Longhi-Wagner*	FCA	-	-	-
Bouteloua – 1/ca. 40				
B. aristidoides (Kunth) Griseb.	FCA, AFL	-	-	-
Bromidium – 3/5				
B. hygrometricum (Nees) Nees & Meyen	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. ramboi</i> (Parodi) Rúgulo	FCA	-	-	-
<i>B. tandilense</i> (Parodi) Rúgulo	FCA	-	-	-
<i>Bromus</i> – 3/ca.100				
<i>B. auleticus</i> Trin. ex Nees	FCA	-	-	-
<i>B. brachyanthera</i> Döll*	FCA	-	-	-
<i>B. catharticus</i> Vahl	FCA	-	-	-
<i>Calamagrostis</i> – 4/ca.150				
<i>C. alba</i> (J. Presl.) Steud.	FCA	-	-	-
<i>C. longearistata</i> (Wedd.) Hack. ex Sodiro	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. reitzii</i> Swallen	FCA	-	-	-
<i>C. viridiflavescens</i> (Poir.) Steud.	FCA	-	-	-
<i>Canastra</i> – 1/2				
<i>C. aristella</i> (Döll) Zuloaga & Morrone*	FCA	-	-	-
<i>Cenchrus</i> – 5/20				
<i>C. brownii</i> Roem. & Schult.	FCA	-	-	-
<i>C. ciliaris</i> L.	FCA	-	-	-
<i>C. echinatus</i> L.	FCA	-	-	-
<i>C. myosuroides</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>C. tribuloides</i> L.	FCA	-	-	-
<i>Chaetium</i> – 1/3				
<i>C. festucoides</i> Nees	FCA, RST	-	-	-
<i>Chascolytrum</i> – 2/6				
<i>C. lamarckianum</i> (Nees) Matthei	FCA	-	-	-
<i>C. subaristatum</i> (Lam.) Matthei	FCA	-	-	-
<i>Chloris</i> – 6/40				
<i>C. barbata</i> Sw.	FCA	-	-	-
<i>C. canterae</i> Arechav.	FCA	-	-	-
<i>C. elata</i> Desv.	FCA	-	-	-
<i>C. gayana</i> Kunth	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. orthonoton</i> Döll	FCA	-	-	-
<i>C. pycnothrix</i> Triana	FCA	-	-	-
<i>Chusquea</i> – 37/ca.200				
<i>C. acuminata</i> Döll*	?	-	-	-
<i>C. anelythra</i> Nees*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. anelytroides</i> Rupr. ex Döll*	FES	-	-	-
<i>C. attenuata</i> (Döll) L.G.Clark*	FES	-	-	-
<i>C. baculifera</i> Silveira*	FCA	-	-	-
<i>C. bahiana</i> L.G.Clark*	FOD	-	-	-
<i>C. bambusoides</i> (Raddi) Hack.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. bradei</i> L.G.Clark*	FOD	-	-	-
<i>C. caparaensis</i> L.G.Clark*	FCA	-	-	-
<i>C. capitata</i> Nees*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. capituliflora</i> Triana	FOD, FES	-	-	-
<i>C. erecta</i> L.G.Clark*	FCA	-	-	-
<i>C. fasciculata</i> Döll*	FES	-	-	-
<i>C. gracilis</i> McClure & L.B.Sm.*	FOM	-	-	-
<i>C. heterophylla</i> Nees*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. ibiramae</i> McClure & L.B.Sm.*	FES	-	-	-
<i>C. juergensii</i> Hack.	FOM, FOD, FCA	-	-	-
<i>C. leptophylla</i> Nees*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. meyeriana</i> Rupr. ex Döll*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. microphylla</i> (Döll) L.G.Clark*	FCA	-	-	-
<i>C. mimosa</i> McClure & L.B.Sm.*	FOM, FCA	-	-	-
<i>C. nudiramea</i> L.G.Clark*	FOD, FCA	-	-	-
<i>C. nutans</i> L.G.Clark*	FCA	-	-	-
<i>C. oligophylla</i> Rupr.*	FES	-	-	-
<i>C. oxylepis</i> (Hack.) Ekman*	FES	-	-	-
<i>C. pinifolia</i> (Nees) Nees*	FCA	-	-	-
<i>C. pulchella</i> L.G.Clark*	FES	-	EN	ANEXO I
<i>C. ramosissima</i> Lindm.	FOD, FES	-	-	-
<i>C. riosaltensis</i> L.G.Clark*	FCA	-	-	-
<i>C. sclerophylla</i> Döll*	FCA	-	-	-
<i>C. sellowii</i> Rupr.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. tenella</i> Nees	FES	-	-	-
<i>C. tenuiglumis</i> Döll*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. tenuis</i> Glaz. ex E.G.Camus*	FOD	-	-	-
<i>C. urelythra</i> Hack.*	FES	-	-	-
<i>C. wilkesii</i> Munro*	FAC	-	-	-
<i>C. windischii</i> L.G.Clark*	FAC	-	-	-
<i>Coelorachis</i> – 1/21				
<i>C. aurita</i> (Steud.) A.Camus	FCA, FES	-	-	-
<i>Colanthesia</i> * – 7/7				
<i>C. burchelli</i> (Munro) McClure*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. cingulata</i> (McClure & L.B.Sm.) McClure*	FES	-	-	-
<i>C. distans</i> (Triana) McClure*	FCA	-	-	-
<i>C. intermedia</i> (McClure & L.B.Sm.) McClure*	FES	-	-	-
<i>C. lanciflora</i> (McClure & L.B.Sm.) McClure*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. macrostachya</i> (Nees) McClure*	FOD	-	-	-
<i>C. rhizantha</i> (Hack.) McClure*	FOD, FES	-	-	-
<i>Cortaderia</i> – 3/24				
<i>C. modesta</i> (Döll) Hack.*	FCA	-	-	-
<i>C. selloana</i> (Schult.) Asch.	FCA	-	-	-
<i>C. vaginata</i> Swallen*	FCA	-	-	-
<i>Cryptochloa</i> – 1/8				
<i>C. capillata</i> (Triana) Soderstr.	FOD, FES	-	-	-
<i>Ctenium</i> – 3/20				
<i>C. brevispicatum</i> G.Lon.Sm.	FCA	-	-	-
<i>C. cirrhosum</i> (Nees) Kunth	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. polystachyum</i> Balansa	FCA	-	-	-
<i>Cynodon</i> – 2/8				
<i>C. dactylon</i> (L.) Pers.	FCA	-	-	-
<i>C. maritimus</i> Kunth	FCA, RST	-	-	-
<i>Cyphonanthus</i> – 1/1				
<i>C. discrepans</i> (Döll) Zuloaga & Morrone	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Danthonia – 3/ca.100				
D. cirrata Hack. & Arechav.	FCA	-	-	-
D. montevidensis Hack. & Arechav.	FCA	-	-	-
D. secundiflora J.Presl	FCA	-	-	-
Deschampsia – 1/40				
D. cespitosa (L.) P. Beauv.	FCA	-	-	-
Diandrolyra* – 3/3				
D. bicolor Stapf*	FOD	-	-	-
D. tatianae Soderstr. & Zuloaga*	FOD, FES	-	-	-
D. pygmaea Soderstrom & Zuloaga ex R.P. Oliveira & L.G. Clark*	FOD	-	-	-
Dichanthelium – 16/ca.60				
D. aequivaginum (Swallen) Zuloaga	RST, AFL	-	-	-
D. assurgens (Renvoize) Zuloaga*	AFL	-	-	-
D. caparaense (Zuloaga & Morrone) Zuloaga*	FOD	-	-	-
D. cucaense (Zuloaga & Morrone) Zuloaga*	AFL	-	-	-
D. hebotes (Triana) Zuloaga	FOD, FES	-	-	-
D. heliophilum (Chase ex Zuloaga & Morrone) Zuloaga	FES, AFL	-	-	-
D. itatiaiae (Swallen) Zuloaga*	FOD	-	-	-
D. peristypum (Zuloaga & Morrone) Zuloaga*	FOD	-	-	-
D. petropolitanum (Zuloaga & Morrone) Zuloaga*	AFL	-	-	-
D. pycnocladus (Tutin) Davidse	FES	-	-	-
D. sabulorum (Lam.) Gould & C.A.Clark	FOD, FES, AFL, FCA	-	-	-
D. sciurotis (Triana) Davidse*	RST, FOD, FCA	-	-	-
D. sciurotoides (Zuloaga & Morrone) Davidse	FES, FOM	-	-	-
D. stigmatosum (Triana) Zuloaga*	FOD, FES	-	-	-
D. superatum (Hack.) Zuloaga*	FCA, AFL	-	-	-
D. surrectum (Chase ex Zuloaga & Morrone) Zuloaga*	FES, FOD	-	-	-
Digitaria – 27/ca.300				
D. aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi	FCA	-	-	-
D. balansae Henrard	FCA	-	-	-
D. bicornis (Lam.) Roem. & Schult.	FCA, RST	-	-	-
D. bonplandii Henrard	FCA	-	-	-
D. ciliaris (Retz.) Koel	FCA, RST	-	-	-
D. connivens (Triana) Henrard*	RST	-	-	-
D. corynotricha (Hack.) Henrard	FCA	-	-	-
D. eriantha Steud.	FCA	-	-	-
D. eriostachya Mez	FCA, AFL	-	-	-
D. filiformis (L.) Koeler	FCA	-	-	-
D. fuscescens (J. Presl) Henrard	FCA	-	-	-
D. gerdesii (Hack.) Parodi	FCA	-	-	-
D. horizontalis Willd.	FCA	-	-	-
D. insularis (L.) Fedde	FCA	-	-	-
D. laxa (Rchb.) Parodi	FCA	-	-	-
D. leiantha (Hack.) Parodi	FCA	-	-	-
D. myriostachya (Hack.) Henrard*	RST	-	-	-
D. phaeothrix (Trin.) Parodi	FCA	-	-	-
D. purpurea Swallen	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>D. sacchariflora</i> (Nees) Henrard	FCA	-	-	-
<i>D. sanguinalis</i> (L.) Scop.	FCA	-	-	-
<i>D. sejunta</i> (Hack.) Henrard*	FCA	-	-	-
<i>D. sellowiana</i> Henrard	FCA	-	-	-
<i>D. similis</i> Beetle ex Gould	FCA	-	-	-
<i>D. singularis</i> Mez	FCA	-	-	-
<i>D. tenuis</i> (Nees) Henrard	AFL	-	-	-
<i>D. violascens</i> Link	FCA	-	-	-
<i>Echinochloa</i> – 5/30				
<i>E. colona</i> (L.) Link	FCA	-	-	-
<i>E. crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	FCA	-	-	-
<i>E. crus-pavonis</i> (Kunth) Schult.	FCA	-	-	-
<i>E. polystachya</i> (Kunth) Hitchc.	FCA	-	-	-
<i>E. walteri</i> (Pursh) Heller	FCA	-	-	-
<i>Echinolaena</i> – 2/8				
<i>E. inflexa</i> (Poir.) Chase	FCA	-	-	-
<i>E. minarum</i> (Ness) Pilg.	FES, FOD	-	-	-
<i>Eleusine</i> – 1/9				
<i>E. tristachya</i> (Lam.) Lam.	FCA, RST	-	-	-
<i>Elionurus</i> – 4/15				
<i>E. ciliaris</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>E. lividus</i> Hack.	FCA	-	-	-
<i>E. muticus</i> (Spreng.) Kuntze	FCA	-	-	-
<i>E. tripsacoides</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	FCA	-	-	-
<i>Eragrostis</i> – 33/ca.300				
<i>E. airoides</i> Nees	FCA	-	-	-
<i>E. amabilis</i> (L.) Wight & Arn.	FCA	-	-	-
<i>E. apiculata</i> Döll*	FCA	-	-	-
<i>E. articulata</i> (Schränk) Nees	FCA	-	-	-
<i>E. bahiensis</i> Schrad. ex Schult.	FCA, AFL	-	-	-
<i>E. cataclasta</i> Nicora	RST, FCA	-	-	-
<i>E. ciliaris</i> (L.) R.Br.	FCA	-	-	-
<i>E. curvula</i> (Schränk) Nees	FCA	-	-	-
<i>E. japonica</i> (Thunb.) Trin.	FCA	-	-	-
<i>E. glomerata</i> (Walter) L.H.Dewey	FCA	-	-	-
<i>E. hypnoides</i> (Lam.) Britton et al.	FCA	-	-	-
<i>E. leucosticta</i> Nees ex Döll	FCA, RST	-	-	-
<i>E. lugens</i> Nees	FCA	-	-	-
<i>E. macrothyrsa</i> Hack.	FCA	-	-	-
<i>E. mokensis</i> Pilg.	FCA	-	-	-
<i>E. neesii</i> Triana	FCA, RST	-	-	-
<i>E. perennis</i> Döll	FCA	-	-	-
<i>E. petrensis</i> Renvoize & Longhi-Wagner	AFL, RST	-	-	-
<i>E. pilosa</i> (L.) P.Beauv.	FCA	-	-	-
<i>E. plana</i> Nees	FCA	-	-	-
<i>E. polytricha</i> Nees	FCA	-	-	-
<i>E. prolifera</i> (Sw.) Steud.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>E. rojasii</i> Hack.	FCA	-	-	-
<i>E. rufescens</i> Schrad. ex Schult.	AFL, FCA, RST	-	-	-
<i>E. scaligera</i> Salzm. ex Steud.	RST, FCA	-	-	-
<i>E. secundiflora</i> J.Presl	AFL, FCA, RST	-	-	-
<i>E. seminuda</i> Triana	AFL, FAC	-	-	-
<i>E. solida</i> Nees	AFL	-	-	-
<i>E. tenuifolia</i> (A.Rich) Hochst. ex Steud.	FCA, AFL	-	-	-
<i>E. trachicolea</i> Hack. & Arechav.	RST, FCA	-	-	-
<i>E. triangularis</i> Henrard	FCA	-	-	-
<i>E. trichocolea</i> Hack. & Arechav.	FCA	-	-	-
<i>E. vernix</i> Boechat & Longhi-Wagner*	FES, FCA	-	-	-
<i>Eremitis</i> * – 1/1				
<i>E. parviflora</i> (Triana) Calderón & Soderstr.*	FOD	-	-	-
<i>Eremocaulon</i> – 3/5				
<i>E. asymmetricum</i> (Soderstr. & Londoño) Londoño*	FOD	-	-	-
<i>E. aureofimbriatum</i> Soderstr. & Londoño*	FOD, FES	-	-	-
<i>E. setosum</i> Londoño & L.G.Clark*	FOD, FES	-	-	-
<i>Eriochloa</i> – 4/30				
<i>E. distachya</i> Kunth		-	-	-
<i>E. grandiflora</i> (Trin.) Benth.		-	-	-
<i>E. polystachya</i> Kunth	FES, FCA	-	-	-
<i>E. punctata</i> (L.) Desv. ex Ham.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>Eriochrysis</i> – 4/7				
<i>E. cayennensis</i> P.Beauv.	FCA, AFL	-	-	-
<i>E. filiformis</i> (Hack.) Filg.	FCA	-	-	-
<i>E. holcoides</i> (Nees) Kuhlman	FCA	-	-	-
<i>E. laxa</i> Swallen	FCA	-	-	-
<i>Eustachys</i> – 5/11				
<i>E. calvescens</i> (Hack.) Caro & E.A. Sánchez	FCA	-	-	-
<i>E. distichophylla</i> (Lag.) Nees	FCA	-	-	-
<i>E. paranensis</i> A.M. Molina	FCA	-	-	-
<i>E. retusa</i> (Lag.) Kunth	FCA	-	-	-
<i>E. uliginosa</i> (Hack.) Herter	FCA	-	-	-
<i>Festuca</i> – 2/ca.400				
<i>F. fimbriata</i> Nees	FCA	-	-	-
<i>F. ulochaeta</i> Nees ex Steud.	FCA, FOM	-	-	-
<i>Glaziophyton</i> * – 1/1				
<i>G. mirabile</i> Franch.*	FCA	-	VU	ANEXO I
<i>Glyceria</i> 1/ca.30				
<i>G. multilora</i> Steud.	FCA	-	-	-
<i>Guadua</i> – 7/ca.25				
<i>G. angustifolia</i> Kunth	FES	-	-	-
<i>G. calderoniana</i> Londoño & Judz.*	FOD	-	-	-
<i>G. chacoensis</i> (Rojas) Londoño & P.M.Peterson	FES	-	-	-
<i>G. paniculata</i> Munro	FES	-	-	-
<i>G. paraguayana</i> Döll	FES	-	-	-
<i>G. tagoara</i> (Nees) Kunth*	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>G. trinii</i> (Nees) Nees ex Rupr.	FES	-	-	-
<i>Gymnopogon</i> – 4/14				
<i>G. burchellii</i> (Munro ex Döll) Eckman	FCA	-	-	-
<i>G. foliosus</i> (Willd.) Nees	FCA, AFL	-	-	-
<i>G. grandiflorus</i> Roseng., B.R. Arrill & Izag.	FCA	-	-	-
<i>G. spicatus</i> (Spreng.) Kuntze	FCA	-	-	-
<i>Gynerium</i> – 1/1				
<i>G. sagittatum</i> (Aubl.) P.Beauv.	FCA	-	-	-
<i>Holcus</i> – 1/9				
<i>H. lanatus</i> L.	FCA, AFL	-	-	-
<i>Homolepis</i> – 3/5				
<i>H. glutinosa</i> (Sw.) Zuloaga & Soderstr.	FES, FOD, FOM	-	-	-
<i>H. isocalycia</i> (G.Mey.) Chase	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>H. villaricensis</i> (Mez) Zuloaga & Soderstr.	FCA	-	-	-
<i>Hordeum</i> – 1/ca. 40				
<i>H. stenostachys</i> Godr.	FCA	-	-	-
<i>Hymenachne</i> – 4/4				
<i>H. amplexicaulis</i> (Rudge) Nees	FCA	-	-	-
<i>H. donacifolia</i> (Raddi) Chase	FCA	-	-	-
<i>H. grumosa</i> (Nees) Zuloaga	FOD, FOM	-	-	-
<i>H. pernambucensis</i> (Spreng.) Zuloaga	FCA	-	-	-
<i>Hyparrhenia</i> – 1/55				
<i>H. bracteata</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Stapf.	FCA	-	-	-
<i>Ichnanthus</i> – 15/ca.30				
<i>I. bambusiflorus</i> (Triana) Döll	FES, FOD, AFL	-	-	-
<i>I. calvescens</i> (Nees) Döll	FES, RST	-	-	-
<i>I. dasycoleus</i> Tutin	FOD, RST	-	-	-
<i>I. glaber</i> (Raddi) Hitchc.*	FOD	-	-	-
<i>I. grandifolius</i> (Döll) Zuloaga & Soderstr.*	FOD	-	-	-
<i>I. hirtus</i> (Raddi) Chase*	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>I. inconstans</i> (Triana ex Nees) Döll	FES, AFL, FCA	-	-	-
<i>I. leiocarpus</i> (Spreng.) Kunth	FOD, FES, AFL	-	-	-
<i>I. longiglumis</i> Mez	AFL	-	-	-
<i>I. nemoralis</i> (Schrader ex Schult.) Hitchc. & Chase	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
<i>I. pallens</i> (Sw.) Munro ex Benth.	FOD, FES, FED, FOM, RST	-	-	-
<i>I. procurrens</i> (Nees ex Triana) Swallen	FES, FED, AFL, FCA	-	-	-
<i>I. riedelii</i> (Triana) Döll	FOD, RST	-	-	-
<i>I. ruprechtii</i> Döll	FOD, FES	-	-	-
<i>I. tenuis</i> (J.Presl) Hitchc. & Chase	FOD, AFL	-	-	-
<i>Imperata</i> – 3/9				
<i>I. brasiliensis</i> Triana	FCA, RST	-	-	-
<i>I. contracta</i> (Kunth) Hitchc.	FCA	-	-	-
<i>I. tenuis</i> Hack.	FCA	-	-	-
<i>Isachne</i> – 2/ca. 100				
<i>I. polygonoides</i> (Lam.) Döll	FCA, RST	-	-	-
<i>I. salzmannii</i> (Trin. ex Steud.) Renvoize	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>Ischaemum</i> – 1/65				
<i>I. minus</i> J.Presl	RST, FCA	-	-	-
<i>Lasiacis</i> – 3/ca.20				
<i>L. divaricata</i> (L.) Hitchc.	FES, FOD	-	-	-
<i>L. ligulata</i> Hitchc. & Chase	FES, FOD	-	-	-
<i>L. sorghoidea</i> (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase	FES, FOD	-	-	-
<i>Leersia</i> – 3/18				
<i>L. hexandra</i> Sw.	FCA	-	-	-
<i>L. ligularis</i> Triana	FES, FOD	-	-	-
<i>L. virginica</i> Willd.	FCA	-	-	-
<i>Leptochloa</i> – 7/ca.40				
<i>L. barbata</i> (Desv.) Parodi ex Nicora	FCA	-	-	-
<i>L. fusca</i> (L.) Kunth	FCA	-	-	-
<i>L. procera</i> Nees	FCA	-	-	-
<i>L. scabra</i> Nees	RST, FCA	-	-	-
<i>L. uninervia</i> (J.Presl) Hitchc. & Chase	FCA	-	-	-
<i>L. virgata</i> (L.) P.Beauv.	FCA	-	-	—
<i>Lithachne</i> – 2/4				
<i>L. horizontalis</i> Chase*	FES	-	-	-
<i>L. pauciflora</i> (Sw.) P. Beauv.	FOD	-	-	-
<i>Loudetiopsis</i> – 1/11				
<i>L. chrysotrix</i> (Nees) Conert	FCA, AFL	-	-	-
<i>Luziola</i> – 3/12				
<i>L. bahiensis</i> (Steud.) Hitchc.	FCA	-	-	-
<i>L. brasiliensis</i> (Triana) Swallen*	FCA	-	-	-
<i>L. peruviana</i> J.F.Gmel.	FCA	-	-	-
<i>Melica</i> – 11/90				
<i>M. argyrea</i> Hack,	FCA	-	-	-
<i>M. arzivencoi</i> Valls & Barcelos*	FCA, AFL	-	-	-
<i>M. brasiliiana</i> Ard.	FCA	-	-	-
<i>M. eremophila</i> Torres	FCA	-	-	-
<i>M. hunzikeri</i> Nicora	?	-	-	-
<i>M. hyalina</i> Döll	FCA	-	-	-
<i>M. macra</i> Nees	FCA	-	-	-
<i>M. rigida</i> Cav.		-	-	-
<i>M. sarmentosa</i> Nees	FCA, AFL	-	-	-
<i>M. spartinoides</i> L.B.Sm.	FCA	-	-	-
<i>M. tenuis</i> Hack & Arechav.	FCA	-	-	-
<i>Merostachys</i> – 38/ca.60				
<i>M. abadiana</i> Send.*	FES	-	-	-
<i>M. annulifera</i> Send.*	FOD	-	-	-
<i>M. argentea</i> Send.*	FOD	-	-	-
<i>M. argyronema</i> Lindm.*	FES	-	-	-
<i>M. bifurcata</i> Send.*	FOD	-	-	-
<i>M. bradei</i> Pilg.*	FES	-	-	-
<i>M. brevigluma</i> Send.*	FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. burmanii</i> Send.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. calderoniana</i> Send.*	FOD	-	-	-
<i>M. caucaiana</i> Send.*	FES	-	-	-
<i>M. ciliata</i> McClure & L.B.Sm.*	FES	-	-	-
<i>M. claussenii</i> Munro	FES	-	-	-
<i>M. fischeriana</i> Rupr. ex Döll*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. fistulosa</i> Döll*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. glauca</i> McClure & L.B.Sm.*	FES	-	-	-
<i>M. kleinii</i> Send.*	FES	-	-	-
<i>M. kunthii</i> Rupr.*	FOD	-	-	-
<i>M. lanata</i> Send.*	FOD	-	-	-
<i>M. leptophylla</i> Send.*	FOD	-	-	-
<i>M. magellanica</i> Send.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. magnispicula</i> Send.*	FOD	-	-	-
<i>M. medullosa</i> Send.*	FOD	-	-	-
<i>M. multiramea</i> Hack.*	FOM, FES	-	-	-
<i>M. neesii</i> Rupr.*	FES	-	-	-
<i>M. petiolata</i> Döll*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. pilifera</i> Send.*	FOM	-	-	-
<i>M. pluriflora</i> Munro ex E.G.Camus*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. polyantha</i> McClure*	FES	-	-	-
<i>M. procerrima</i> Send.*	FOD	-	-	-
<i>M. ramosissima</i> Send.*	FOD	-	-	-
<i>M. riedeliana</i> Rupr. ex Döll*	FES	-	-	-
<i>M. scandens</i> Send.*	FES	-	-	-
<i>M. sellovii</i> Munro	?	-	-	-
<i>M. skvortzovii</i> Send.*	FES	-	-	-
<i>M. sparsiflora</i> Rupr.*	FOD	-	-	-
<i>M. speciosa</i> Spreng.*	FES, FOM	-	-	-
<i>M. ternata</i> Nees*	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>M. vestita</i> McClure & L.B.Sm.*	FOM	-	-	-
<i>Mesosetum</i> – 2/25				
<i>M. ferrugineum</i> (Triana) Chase	FCA	-	-	-
<i>M. loliiforme</i> (Hochst. ex Steud.) Chase	FCA	-	-	-
<i>Microchloa</i> – 1/3				
<i>M. indica</i> (L.f.) P.Beauv.	FCA	-	-	-
<i>Mnesithea</i> – 3/5				
<i>M. balansae</i> (Hack.) de Koning & Sosef	FCA	-	-	-
<i>M. selloana</i> (Hack.) de Koning & Sosef	FCA	-	-	-
<i>M. subgibbosa</i> (Winkl. ex Hack.) de Koning & Sosef	FCA	-	-	-
<i>Muhlenbergia</i> – 1/160				
<i>M. schreberi</i> J.F. Gmel.	FCA	-	-	-
<i>Nassella</i> – 16/ca.80				
<i>N. airoides</i> (Ekman) Barkworth	FCA	-	-	-
<i>N. brasiliensis</i> (A.Zanin & Longhi-Wagner) Barkworth*	FCA	-	-	-
<i>N. filiculmis</i> Delile	FCA, AFL	-	-	-
<i>N. juergensii</i> Hack.	FCA, AFL	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>N. megapotamica</i> Spreng. ex Trin.	FCA, AFL	-	-	-
<i>N. melanosperma</i> J. Presl	FCA, AFL	-	-	-
<i>N. neesiana</i> Trin. & Rupr.	FCA	-	-	-
<i>N. nutans</i> (Hack) Barkworth.	FCA, AFL	-	-	-
<i>N. planaltina</i> (A.Zanin & Longhi-Wagner) Peñailillo*	FCA	-	-	-
<i>N. quiqueciliata</i> (Roseng. & Izag.) A.Zanin & Izag.	FCA	-	-	-
<i>N. rhizomata</i> A.Zanin & Longhi-Wagner*	FCA	-	-	-
<i>N. sellowiana</i> Nees ex Triana & Rupr.*	FCA	-	-	-
<i>N. setigera</i> J.Presl	FCA	-	-	-
<i>N. spegazzinii</i> (Arechav.) Barkworth	FCA	-	-	-
<i>N. tenuiculmis</i> (Phil.) Barkworth	FCA	-	-	-
<i>N. vallsii</i> A.Zanin & Longhi-Wagner*	FCA	-	-	-
<i>Neesiochloa</i> – 1/1				
<i>N. barbata</i> (Nees) Pilg.	FCA	-	-	-
<i>Olyra</i> –9/24				
<i>O. bahiensis</i> R.P.Oliveira & Longhi-Wagner*	FOD	-	-	-
<i>O. ciliatifolia</i> Raddi	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>O. ecaudata</i> Döll	FOD	-	-	-
<i>O. fasciculata</i> Triana	FOD	-	-	-
<i>O. filiformis</i> Triana*	FOD	-	-	-
<i>O. glaberrima</i> Raddi	FOD, FES	-	-	-
<i>O. humilis</i> Nees	FOD, FES	-	-	-
<i>O. latifolia</i> L.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>O. latispicula</i> Soderstr. & Zuloaga*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>Oplismenus</i> – 1/ca.15				
<i>O. hirtellus</i> (L.) P.Beauv.	FES, FED, FOD, FOM	-	-	-
<i>Orthoclada</i> – 1/1				
<i>O. laxa</i> (Rich.) P.Beauv.	FES, FOD	-	-	-
<i>Oryza</i> – 1/25				
<i>O. latifolia</i> Desv.	FCA	-	-	-
<i>Otachyrium</i> – 1/7				
<i>O. versicolor</i> (Döll) Henrard	FCA	-	-	-
<i>Panicum</i> – 47/ca.400				
<i>P. aquaticum</i> Poir.	FCA	-	-	-
<i>P. bergii</i> Arechav.	FCA	-	-	-
<i>P. bresolini</i> L.B.Sm. & Wassh.*	FOD, RST	-	-	-
<i>P. caaguazuense</i> Henrard	FCA	-	-	-
<i>P. campestre</i> Lam.	FCA	-	-	-
<i>P. cayennense</i> Lam.	FCA	-	-	-
<i>P. chasei</i> Roseng.	FCA	-	-	-
<i>P. complanatum</i> Gulghieri et al.	FCA	-	-	-
<i>P. consensatum</i> Bertol*	FOD, FES	-	-	-
<i>P. cyanescens</i> Nees ex Triana	FCA, AFL	-	-	-
<i>P. dichotomiflorum</i> Michx.	FCA	-	-	-
<i>P. elephantipes</i> Nees ex Trin.	FCA	-	-	-
<i>P. exiguum</i> Mez	FCA	-	-	-
<i>P. ghiesbreghtii</i> E. Fourn.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. glabripes</i> Döll	FCA	-	-	-
<i>P. gouinii</i> E.Fourn.	FCA	-	-	-
<i>P. hylaecium</i> Mez	FOD	-	-	-
<i>P. latissimum</i> Mik. ex Triana*	FES, FOD	-	-	-
<i>P. leptachne</i> Döll*	FCA	-	-	-
<i>P. longipedicellatum</i> Swallen	FCA	-	-	-
<i>P. magnispicula</i> Zuloaga et al.*	FCA	-	-	-
<i>P. mertensii</i> Roth	FCA, RST	-	-	-
<i>P. millegrana</i> Poir.	FES, FOD, FOM, FCA	-	-	-
<i>P. mucronulatum</i> Mez	FCA	-	-	-
<i>P. olyroides</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>P. parvifolium</i> Lam.	FCA, FES, FOD	-	-	-
<i>P. peladoense</i> Henrard	FCA	-	-	-
<i>P. pilosum</i> Sw.	FOD, FES, FOM, AFL, FCA, RST	-	-	-
<i>P. polygonatum</i> Schrad.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>P. prionitis</i> Nees	FCA	-	-	-
<i>P. pseudisachne</i> Mez	FCA	-	-	-
<i>P. pulchellum</i> Raddi	FES, FOD	-	-	-
<i>P. quadriglume</i> (Döll) Hitchc.	FCA	-	-	-
<i>P. racemosum</i> (P.Beauv.) Spreng.*	RST	-	-	-
<i>P. repens</i> L.	FCA, AFL, FES	-	-	-
<i>P. rude</i> Nees	AFL, FES, FOD	-	-	-
<i>P. rudgei</i> Roem. & Schult.	FCA, RST	-	-	-
<i>P. schwackeanum</i> Mez	FCA, FES, FOD	-	-	-
<i>P. sellowii</i> Nees	FES, FOD	-	-	-
<i>P. stoloniferum</i> Poir.	FES, FOD, FOM	-	-	-
<i>P. stramineum</i> Hitchc. & Chase	FCA	-	-	-
<i>P. subulatum</i> Spreng.	FCA	-	-	-
<i>P. trichanthum</i> Nees	FED, FES, FCA	-	-	-
<i>P. trichidiachne</i> Döll	FCA, FES, FOD	-	-	-
<i>P. tricholaenoides</i> Steud.	FCA	-	-	-
<i>P. thinophilum</i> Renvoize*	RST	-	-	-
<i>P. wettsteinii</i> Hack.	AFL	-	-	-
<i>Pappophorum</i> – 3/8				
<i>P. harsleri</i> Hack.	FCA	-	-	-
<i>P. mucronulatum</i> Nees	FCA	-	-	-
<i>P. pappiferum</i> (Lam.) Kuntze	FCA	-	-	-
<i>Paratheria</i> – 1/2				
<i>P. prostrata</i> Griseb.	FCA, AFL	-	-	-
<i>Pariana</i> – 3/ca.40				
<i>P. carvalhoi</i> R.P.Oliveira & Longhi-Wagner*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>P. lanceolata</i> Triana*	FOD, RST	-	-	-
<i>P. multiflora</i> R.P.Oliveira et al.*	FOD	-	-	-
<i>Parodiolyra</i> – 2/5				
<i>P. micrantha</i> (Kunth) Davidse & Zuloaga	FOD, FES, FED, FCA, AFL, RST	-	-	-
<i>P. ramosissima</i> (Triana) Soderstr. & Zuloaga*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Parodiophyllochloa – 6/6				
P. cordovensis (E.Fourn.) Zuloaga & Morrone	FES, FOD	-	-	-
P. missiona (Ekman) Zuloaga & Morrone*	FES, FOD	-	-	-
P. ovulifera (Triana) Zuloaga & Morrone	FES, FOD	-	-	-
P. pantricha (Hack.) Zuloaga & Morrone	FES, FOD	-	-	-
P. penicillata (Nees ex Triana) Zuloaga & Morrone*	FES, FED	-	-	-
P. rhizogona (Hack.) Zuloaga & Morrone*	FOD	-	-	-
Paspalidium - 1/27				
P. geminatum (Forssk.) Stapf	RST, FCA	-	-	-
Paspalum – 116/ca.400				
P. acuminatum Raddi	FCA	-	-	-
P. alnum Chase	FCA	-	-	-
P. ammodes Triana	FCA, AFL	-	-	-
P. arenarium Schrad.	RST	-	-	-
P. arundinellum Mez	FCA	-	-	-
P. atratum Swallen	FCA	-	-	-
P. bahianum R.C.Oliveira & Valls*	RST	-	-	-
P. barretoii Canto-Dorow et al.*	FCA	-	-	-
P. bertonii Hack.	FCA	-	-	-
P. boscianum Flüggé	FCA	-	-	-
P. brachytrichum Hack.*	AFL	-	-	-
P. calliferum S. Denham	FCA	-	-	-
P. carinatum Humb. & Bonpl. ex Flüggé	FCA	-	-	-
P. ceresia (Kuntze) Chase	FCA	-	-	-
P. clavuliferum C.Wright	FCA, AFL	-	-	-
P. commutatum Nees	FCA	-	-	-
P. compressifolium Swallen	FCA	-	-	-
P. conduplicatum Canto-Dorow et al.*	FCA	-	-	-
P. conjugatum P.J.Bergius	FCA, FES, FOD, FOM	-	-	-
P. conspermum Schrad.	FCA, FES, FOD, FOM	-	-	-
P. convexum Humb. & Bonpl. ex Flüggé	FCA	-	-	-
P. corcovadense Raddi*	FES, FOD, FOM	-	-	-
P. cordatum Hack.	FCA	-	-	-
P. coryphaeum Triana	FCA, AFL	-	-	-
P. dasytrichum Dusén ex Swallen	FCA	-	-	-
P. decumbens Sw.	FES, FOD, FOM, FCA, AFL	-	-	-
P. dedeccae Quarín	FCA	-	-	-
P. densum Poir.	FCA	-	-	-
P. denticulatum Trin.	FCA	-	-	-
P. dilatatum Poir.	FCA	-	-	-
P. distichum L.	FCA	-	-	-
P. divergens Döll	FCA	-	-	-
P. durifolium Mez	FCA	-	-	-
P. ellipticum Döll	FCA	-	-	-
P. equitans Mez	FCA	-	-	-
P. erianthoides Lindm.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. erianthum</i> Nees ex Triana	FCA, AFL	-	-	-
<i>P. eucomum</i> Nees ex Triana	FCA	-	-	-
<i>P. exaltatum</i> J. Presl.	FCA	-	-	-
<i>P. falcatum</i> Nees ex Steud.	FCA	-	-	-
<i>P. filifolium</i> Nees ex Steud.	FCA	-	-	-
<i>P. fimbriatum</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>P. flaccidum</i> Nees	FCA	-	-	-
<i>P. formosum</i> Swallen	FCA	-	-	-
<i>P. gardnerianum</i> Nees	FCA, AFL	-	-	-
<i>P. geminiflorum</i> Steud.	FCA	-	-	-
<i>P. glabrinode</i> (Hack.) Morrone & Zuloaga		-	-	-
<i>P. glaucescens</i> Hack.	FCA	-	-	-
<i>P. guenoarum</i> Arechav.	FCA	-	-	-
<i>P. guttatum</i> Triana	AFL, FCA	-	-	-
<i>P. haumanii</i> Parodi	FCA	-	-	-
<i>P. hemicryptum</i> Wright	FCA, FES, RST	-	-	-
<i>P. hyalinum</i> Nees ex Triana	FCA, AFL	-	-	-
<i>P. indecorum</i> Mez	FCA	-	-	-
<i>P. inaequivalve</i> Raddi	FCA	-	-	-
<i>P. intermedium</i> Munro ex Morong & Britton	FCA	-	-	-
<i>P. ionanthum</i> Chase	FCA	-	-	-
<i>P. jesuiticum</i> Parodi	FCA	-	-	-
<i>P. juergensii</i> Hack.	FES, FOD, FCA	-	-	-
<i>P. lenticulare</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>P. leptum</i> Schult.	FCA	-	-	-
<i>P. lilloi</i> Hack.		-	-	-
<i>P. limbatum</i> Henrard	FCA	-	-	-
<i>P. lineare</i> Triana	FCA	-	-	-
<i>P. lividum</i> Trin.	FCA	-	-	-
<i>P. maculosum</i> Triana	FCA	-	-	-
<i>P. malacophyllum</i> Triana	FCA, FES	-	-	-
<i>P. mandiocanum</i> Triana	FCA	-	-	-
<i>P. maritimum</i> Triana	?	-	-	-
<i>P. melanospermum</i> Desv. ex Ham.	FCA	-	-	-
<i>P. millegrana</i> Schrad.	FCA	-	-	-
<i>P. minus</i> E. Fourn.	FCA	-	-	-
<i>P. molle</i> Poir.	FCA	-	-	-
<i>P. multicaule</i> Poir.	FCA	-	-	-
<i>P. nicorae</i> Parodi	FCA	-	-	-
<i>P. notatum</i> Flügge	FCA	-	-	-
<i>P. nutans</i> Lam.	FCA, FES	-	-	-
<i>P. nummularium</i> Chase ex Send. & A.G. Burm.	FCA	-	-	-
<i>P. oligostachyum</i> Salzm. ex Steud.	FCA	-	-	-
<i>P. orbiculatum</i> Poir.	FCA	-	-	-
<i>P. ovale</i> Nees ex Steud.	FCA	-	-	-
<i>P. pallens</i> Swallen	FCA	-	-	-
<i>P. paniculatum</i> L.	FCA, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. parviflorum</i> Rhode ex Fluggé	FCA, AFL, RST	-	-	-
<i>P. pauciciliatum</i> (Parodi) Herter	FCA	-	-	-
<i>P. paucifolium</i> Swallen	FCA	-	-	-
<i>P. pectinatum</i> Nees ex Triana	FCA	-	-	-
<i>P. phyllorhachis</i> Hack.	FCA	-	-	-
<i>P. pilosum</i> Lam.	FES, FOD, FOM, FCA	-	-	-
<i>P. plenum</i> Chase	FCA	-	-	-
<i>P. pleostachyum</i> Döll	FCA	-	-	-
<i>P. plicatulum</i> Michx.	FCA	-	-	-
<i>P. polyphyllum</i> Nees	FCA	-	-	-
<i>P. proximum</i> Mez	FCA	-	-	-
<i>P. pumilum</i> Nees	FCA	-	-	-
<i>P. quadrifarium</i> Lam.	FCA	-	-	-
<i>P. quarinii</i> Morrone & Zuloaga	FCA	-	-	-
<i>P. ramboi</i> I.L. Barreto	FCA	-	-	-
<i>P. redondense</i> Swallen	FCA	-	-	-
<i>P. regnellii</i> Mez	FCA, FES	-	-	-
<i>P. repens</i> P.J.Bergius	FCA	-	-	-
<i>P. rhodopedum</i> L.B.Sm. & Wassh.	FCA, FOD	-	-	-
<i>P. riparium</i> Nees	FCA	-	-	-
<i>P. rojasii</i> Hack.	FCA, FES	-	-	-
<i>P. rufum</i> Nees ex Steud.	FCA	-	-	-
<i>P. scalare</i> Triana	AFL	-	-	-
<i>P. setiglume</i> Chase	?	-	-	-
<i>P. simplex</i> Morong	FCA	-	-	-
<i>P. stellatum</i> Humb. & Bonpl. ex Flügge	FCA	-	-	-
<i>P. telmatum</i> Swallen	FCA	-	-	-
<i>P. umbrosum</i> Triana*	FES, FOD	-	-	-
<i>P. urvillei</i> Steud.	FCA	-	-	-
<i>P. usterii</i> Hack.	FCA, FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>P. vaginatum</i> Sw.	RST, FOD	-	-	-
<i>P. virgatum</i> L.	FCA	-	-	-
<i>P. wrightii</i> Hitchc. & Chase	FCA	-	-	-
<i>Pennisetum</i> – 2/80				
<i>P. latifolium</i> Spreng.	FCA	-	-	-
<i>P. setosum</i> (Sw.) Rich.	FCA	-	-	-
<i>Pereilema</i> – 1/3				
<i>P. beyrichianum</i> (Kunth) Hitchc.	FED, FCA	-	-	-
<i>Phalaris</i> – 1/15				
<i>P. angusta</i> Nees ex Triana	FCA	-	-	-
<i>Pharus</i> – 4/7				
<i>P. lappulaceus</i> Aubl.	FOD, FES, FED, AFL, RST	-	-	-
<i>P. latifolius</i> L.	FOD, FES, FED, AFL, RST	-	-	-
<i>P. parvifolius</i> Nash	FOD, FES	-	-	-
<i>P. virescens</i> Döll	FOD	-	-	-
<i>Piptochaetium</i> – 9/35				
<i>P. alpinum</i> L.B.Sm.*	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. bicolor</i> (Vahl) E. Desv.	FCA	-	-	-
<i>P. lasianthum</i> Griseb.	FCA	-	-	-
<i>P. montevidense</i> (Spreng.) Parodi	FCA	-	-	-
<i>P. palustre</i> Mujica & Longhi-Wagner	FCA	-	VU	ANEXO I
<i>P. panicoides</i> (Lam.) E.Desv.	FCA	-	-	-
<i>P. ruprechtianum</i> Desv.	FCA	-	-	-
<i>P. stipoides</i> (Trin. & Rupr.) Hack ex Arechav.	FCA	-	-	-
<i>P. uruguense</i> Griseb.	FCA	-	-	-
<i>Piresia</i> – 3/4				
<i>P. leptophylla</i> Soderstr.	FOD	-	-	-
<i>P. macrophylla</i> Soderstr.	FOD	-	-	-
<i>P. sympodica</i> (Döll) Swallen	FOD	-	-	-
<i>Plagiantha</i> – 1/1				
<i>P. tenella</i> Renvoize	FES, FCA	-	-	-
<i>Poa</i> – 6/200				
<i>P. bradei</i> Pilg.*	FCA	-	-	-
<i>P. lanigera</i> Nees	FCA, AFL	-	-	-
<i>P. nemoralis</i> L.	FCA	-	-	-
<i>P. reitzii</i> Swallen*	FCA	-	-	-
<i>P. sellowii</i> Nees	FCA	-	-	-
<i>P. umbrosa</i> Trin.	FCA	-	-	-
<i>Poidium</i> – 10/10				
<i>P. ambiguum</i> (Hack.) Matthei	FCA, AFL	-	-	-
<i>P. brasiliense</i> Nees ex Steud.*	FCA	-	-	-
<i>P. brachychaetum</i> (Ekman) Matthei	FCA	-	-	-
<i>P. calotheca</i> (Trin.) Matthei	FCA	-	-	-
<i>P. itatiaiae</i> (Ekman) Nicora & Rúgolo*	FCA, AFL	-	-	-
<i>P. juergensii</i> (Hack) Matthei	FCA	-	-	-
<i>P. monandrum</i> (Hack.) Matthei	FCA	-	-	-
<i>P. poimorphum</i> (J.Presl.) Matthei	FCA	-	-	-
<i>P. rufum</i> (J.Presl.) Matthei	FCA	-	-	-
<i>P. uniolae</i> (Nees) Matthei	FCA, AFL, FOM	-	-	-
<i>Polypogon</i> – 4/ca.15				
<i>P. chilensis</i> (Kunth) Pilg.	FCA	-	-	-
<i>P. elongatus</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>P. exasperatus</i> (Trin.) Renvoize	FCA	-	-	-
<i>P. monspeliensis</i> (L.) Desf.	FCA	-	-	-
<i>Pseudechinolaena</i> – 1/6				
<i>P. polystachya</i> (Kunth) Stapf	FES, FOD, FOM	-	-	-
<i>Raddia</i> – 9/10				
<i>R. angustifolia</i> Soderstr. & Zuloaga*	FOD, FED	-	CR	ANEXO I
<i>R. brasiliensis</i> Bertol.	FOD, FED	-	-	-
<i>R. distichophylla</i> (Schrader ex Nees) Chase*	FOD, FED	-	EN	ANEXO II
<i>R. guianensis</i> (Brongn.) Hitchc.	FOD	-	-	-
<i>R. lancifolia</i> R.P.Oliveira & Longhi-Wagner*	FOD	-	-	-
<i>R. megaphylla</i> R.P.Oliveira & Longhi-Wagner*	FOD	-	-	-
<i>R. portoi</i> Kuhlmann*	FOD, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>R. soderstromii</i> R.P.Oliveira <i>et al.</i> *	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>R. stolonifera</i> R.P.Oliveira & Longhi-Wagner*	FOD, FES	-	-	-
<i>Raddiella</i> – 1/8				
<i>R. esenbeckii</i> (Steud.) Calderón & Soderstr.	FES, RST	-	-	-
<i>Reitzia</i> * – 1/1				
<i>R. smithii</i> Swallen*	FES, FOM	-	-	-
<i>Renvoizea</i> – 6/10				
<i>R. glaziovii</i> (Hack.) Zuloaga & Morrone*	AFL	-	-	-
<i>R. marauense</i> (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone*	RST	-	-	-
<i>R. restingae</i> (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone*	RST	-	-	-
<i>R. saccolepoides</i> (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone*	RST	-	-	-
<i>R. teretifolia</i> (Hack.) Zuloaga & Morrone*	RST	-	-	-
<i>R. trinii</i> (Kunth) Zuloaga & Morrone	AFL, RST	-	-	-
<i>Rhipidocladum</i> – 2/17				
<i>R. parviflorum</i> (Triana) McClure	FES, FED	-	-	-
<i>R. racemiflorum</i> (Steud.) McClure	FES	-	-	-
<i>Rhomboelytrum</i> – 1/2				
<i>R. monandrum</i> (Hack.) Nicora & Rúgolo	FCA	-	-	-
<i>Rhytachne</i> – 1/12				
<i>R. rottboellioides</i> Desv. <i>ex</i> Ham.	FCA	-	-	-
<i>Saccharum</i> – 4/25				
<i>S. angustifolium</i> (Nees) Trin.	FCA	-	-	-
<i>S. asperum</i> (Nees) Steud.	FCA	-	-	-
<i>S. trinii</i> (Hack.) Renvoize	FCA	-	-	-
<i>S. villosum</i> Steud.	FCA	-	-	-
<i>Sacciolepis</i> – 2/ca.30				
<i>S. myuros</i> (Lam.) Chase	FCA	-	-	-
<i>S. vilvoides</i> (Triana) Chase	FCA	-	-	-
<i>Schizachyrium</i> – 9/ca.60				
<i>S. gracilipes</i> (Hack.) A.Camus	FCA	-	-	-
<i>S. hatschbachii</i> Peichoto	FCA	-	-	-
<i>S. imberbe</i> (Hack.) A. Camus	FCA	-	-	-
<i>S. microstachyum</i> (Desv. <i>ex</i> Ham.) Roseng. <i>et al.</i>	FCA	-	-	-
<i>S. salzmännii</i> (Triana <i>ex</i> Steud.) Nash	FCA, FES	-	-	-
<i>S. sanguineum</i> (Retz.) Alston	FCA, AFL	-	-	-
<i>S. scabriflorum</i> (Rupr. <i>ex</i> Hack.) A.Camus	FCA	-	-	-
<i>S. spicatum</i> (Spreng.) Herter	FCA	-	-	-
<i>S. tenerum</i> Nees	FCA	-	-	-
<i>Setaria</i> – 17/ca.125				
<i>S. barbata</i> (Lam.) Kunth	?	-	-	-
<i>S. fiebrigii</i> Herrm.	FCA	-	-	-
<i>S. globulifera</i> (Steud.) Griseb.	FCA	-	-	-
<i>S. lachnea</i> (Nees) Kunth	FCA, FES, FOD, FOM	-	-	-
<i>S. macrostachya</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>S. magna</i> Griseb.	FES, FCA	-	-	-
<i>S. parviflora</i> (Poir.) Kerguelén	FES, FCA, AFL	-	-	-
<i>S. paucifolia</i> (Morong) Lindm.	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. scabrifolia</i> (Nees) Kunth*	FES, FOD	-	-	-
<i>S. scandens</i> Schrad.	FES, FOD, FCA	-	-	-
<i>S. setosa</i> (Sw.) P.Beauv.	FCA	-	-	-
<i>S. sphacelata</i> (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb.	FES, FOD, FOM, FCA	-	-	-
<i>S. sulcata</i> Raddi	FES, FOD, FOM, FCA	-	-	-
<i>S. tenacissima</i> Schrad. ex Schult.	FCA	-	-	-
<i>S. tenax</i> (Rich.) Desv.	FCA, AFL, FES	-	-	-
<i>S. vaginata</i> Spreng.	FCA	-	-	-
<i>S. vulpiseta</i> (Lam.) Roem. & Schult.	FES, FCA, AFL	-	-	-
<i>Sorghastrum</i> – 7/17				
<i>S. minarum</i> (Nees) Hitchc.	FCA, AFL	-	-	-
<i>S. nutans</i> (L.) Nash	FCA	-	-	-
<i>S. pellitum</i> (Hack.) Parodi	FCA	-	-	-
<i>S. scaberrimum</i> (Nees) Herter*	FCA	-	-	-
<i>S. setosum</i> (Griseb.) Hitchc.	FCA	-	-	-
<i>S. stipoides</i> (Kunth) Nash	FCA, FES	-	-	-
<i>S. viride</i> Swallen	FCA	-	-	-
<i>Spartina</i> – 3/18				
<i>S. alterniflora</i> Loisel	RST	-	-	-
<i>S. ciliata</i> Brongn.	RST	-	-	-
<i>S. densiflora</i> Brongn.	RST	-	-	-
<i>Sporobolus</i> – 19/ca. 160				
<i>S. acuminatus</i> (Triana) Hack.	FCA, AFL	-	-	-
<i>S. adustus</i> (Triana) Roseng.	FCA	-	-	-
<i>S. aeneus</i> (Triana) Kunth	AFL	-	-	-
<i>S. camporum</i> Swallen	FCA, AFL	-	-	-
<i>S. ciliatus</i> J.Presl	FCA	-	-	-
<i>S. cubensis</i> Hitchc.	FCA	-	-	-
<i>S. eximius</i> (Nees) Ekman	FCA	-	-	-
<i>S. hians</i> G.B.van Schaak*	FCA	-	-	-
<i>S. indicus</i> (L.) R.Br.	FCA	-	-	-
<i>S. linearifolius</i> Nicora	FCA, AFL	-	-	-
<i>S. metallicolus</i> Longhi-Wagner & Boechat	AFL, FCA	-	-	-
<i>S. minarum</i> Boechat & Longhi-Wagner*	FCA	-	-	-
<i>S. nudiramus</i> Boechat & Longhi-Wagner*	FCA	-	-	-
<i>S. pseudairoides</i> Parodi	FCA	-	-	-
<i>S. purpurascens</i> (Sw.) Ham.	FCA	-	-	-
<i>S. pyramidatus</i> (Lam.) Hitchc.	FCA	-	-	-
<i>S. reflexus</i> Boechat & Longhi-Wagner	FCA, AFL	-	-	-
<i>S. tenuissimus</i> (Schrunk) Kuntze	AFL, FCA	-	-	-
<i>S. virginicus</i> (L.) Kunth	FCA	-	-	-
<i>Steinchisma</i> – 5/7				
<i>S. decipiens</i> (Nees ex Triana) W.V.Br.	FCA	-	-	-
<i>S. hians</i> (Elliott) Nash	FCA	-	-	-
<i>S. laxa</i> (Sw.) Zuloaga	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>S. spathellosa</i> (Döll) Renvoize*	FCA	-	-	-
<i>S. stenophylla</i> (Hack.) Zuloaga & Morrone	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Stenotaphrum – 1/7				
S. secundatum (Walter) Kuntze	RST	-	-	-
Streptochaeta – 2/3				
S. angustifloia Soderstr.*	FOD, FES	-	-	-
S. spicata Schrad. ex Nees	FOD, FES	-	-	-
Streptostachys – 1/6				
S. asperifolia Desv.	FES, FCA	-	-	-
Sucrea* – 3/3				
S. maculata Soderstr.*	FOD	-	VU	ANEXO II
S. monophylla Soderstr.*	FOD	-	-	-
S. sampaiana Soderstr.*	FOD	-	CR	ANEXO I
Thrasyopsis – 2/2				
T. juergensii (Hack.) Soderstr. & A.G.Burm	FCA	-	VU	ANEXO I
T. repanda (Nees ex Triana) Parodi	FCA	-	-	-
Trachypogon – 3/ca.15				
T. macroglossus Triana	FCA, AFL, RST	-	-	-
T. spicatus (L.f.) Kuntze	FCA, AFL, RST	-	-	-
T. vestitus Andersson	FCA	-	-	-
Tripogon – 1/ca. 30				
T. spicatus Nees (Ekman)	FCA, AFL	-	-	-
Trisetum – 1/ca. 85				
T. juergensii Hack.	FCA	-	-	-
Tristachya – 1/22				
T. leiostachya Nees	FCA	-	-	-
Vulpia – 1/23				
V. australis (Nees ex Steud.) C.H.Blom	FCA	-	-	-
Zizaniopsis – 1/5				
Z. microstachya (Nees) Döll*	FES, FCA, FOD	-	-	-

Podostemaceae

Cláudia Petean Bove & C. Thomas Philbrick

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PODOSTEMACEAE – 25/ca. 280				
<i>Apinagia</i> – 6/50				
<i>A. fucoides</i> Tul.	FOD, FOM, FED,	-	-	-
<i>A. glaziovii</i> (Warm.) P.Royen*	FES, FAQ	-	-	-
<i>A. guairaensis</i> Fiebrig-Gertz*	FES, FAQ	-	-	-
<i>A. richardiana</i> (Tul.) P.Royen	FOD, FAQ	-	-	-
<i>A. riedelii</i> Tul.	FOD, FAQ	-	-	-
<i>A. yguazuensis</i> Chodat & Vischer*	FES, FAQ	-	-	-
<i>Castelnavia</i> – 1/5				
<i>C. princeps</i> Tul. & Wedd.	FES, FAQ	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Cipoia – 1/2				
C. inserta C.T.Philbrick <i>et al.</i> *	FES, FAQ	-	-	-
Lophogyne – 2/2				
L. arculifera Tul. & Wedd.*	FOD, FES, FAQ	-	-	-
L. helicandra Tul.*	FOD, FES, FAQ	-	-	-
Marathrum – 1/25				
M. azarense Tur*	FED, FAQ	-	-	-
Mourera – 1/6				
M. aspera Tul.	FOD, FES, FAQ	-	-	-
Podostemum – 9/11				
P. comatum Hicken	FOM, FES, FED, FAQ	-	-	-
P. distichum (Cham.) Wedd.	FOM, FES, FED, FAQ	-	-	-
P. irgangii C.T.Philbrick & Novelo*	FOM, FAQ	-	-	-
P. muelleri Warm.	FOM, FES, FED, FAQ	-	-	-
P. ovatum C.T.Philbrick & Novelo*	FOD, FAQ	-	-	-
P. rutifolium Warm.	FOM, FES, FED, FAQ	-	-	-
P. saldanhanum (Warm.) C.T.Philbrick & Novelo*	FOD, FAQ	-	EN	ANEXO I
P. scaturiginum (Mart.) C.T.Philbrick & Novelo	FOD, FES, FAQ	-	-	-
P. weddellianum (Tul.) C.T.Philbrick & Novelo	FOD, FES, FAQ	-	-	-
Tristicha – 1/2				
T. trifaria (Bory <i>ex</i> Willd.) Spreng.	FOM, FES, FED, FAQ	-	-	-
Wettsteiniola* – 3/3				
W. accorsii (Toledo) P.Royen*	FOD, FAQ	-	-	-
W. apipensis Tur*	FES, FAQ	-	-	-
W. pinnata Suess.*	FES, FAQ	-	-	-

Polygalaceae

Maria do Carmo Mendes Marques

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
POLYGALACEAE – 105/940				
<i>Bredemeyera</i> – 8/60				
<i>B. autranii</i> Chodat*	FOD	-	-	-
<i>B. brevifolia</i> Klotzsch <i>ex</i> A.W.Benn.	FOD	-	-	-
<i>B. floribunda</i> Willd.	FOD	-	-	-
<i>B. isabelliana</i> Barb.Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>B. kunthiana</i> A.St.-Hil.	RST, FOD	-	-	-
<i>B. laurifolia</i> A.W.Benn.	FOD	-	-	-
<i>B. martiana</i> A.W.Benn.	FOD	-	-	-
<i>B. velutina</i> A.W.Benn.	FOD	-	-	-
<i>Diclidanthera</i> – 2/4				
<i>D. elliptica</i> Miers*	FOD	-	-	-
<i>D. laurifolia</i> Mart.*	RST, FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Monnina – 8/200				
M. cardiocarpa A.St.-Hil. & Moq.	FOD	-	-	-
M. cuneata A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
M. itapoanensis Vianna & Marques	RST	-	-	-
M. oblongifolia Arechav.	FOD	-	-	-
M. resedoides A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
M. richardiana A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
M. stenophylla A.St.-Hil.	FOM	-	-	-
M. tristaniana A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
Polygala – 76/ca.500				
P. acuminata Willd.	FOD, FCA	-	-	-
P. adenophylla A.St.-Hil. & Moq.	FOD, FCA	-	-	-
P. albicans (A.W.Benn.) Grondona	FOD, RST	-	-	-
P. alfredii Chodat	FOD	-	-	-
P. angulata DC.	FOD	-	-	-
P. aphylla A.W.Benn.	FCA	-	-	-
P. appressa Benth.	FOD	-	-	-
P. aspalatha L.	FOD, FCA, RST	-	-	-
P. bocainensis Brade*	FOD	-	-	-
P. bonariensis Grondona	FOD	-	-	-
P. brasiliensis L.*	FOD, FCA	-	-	-
P. campestris Gardner*	FOD, FCA	-	-	-
P. celosioides A.W.Benn.	FOD, FCA	-	-	-
P. cneorum A.St.-Hil.*	FOD, FCA	-	-	-
P. cuspidata DC.	FOD	-	-	-
P. cyparissias A.St.-Hil. & Moq.	RST, FOD	-	-	-
P. decumbens A.W.Benn.	FOD	-	-	-
P. duarteana A.St.-Hil. & Moq.	FED, FCA	-	-	-
P. dusenii Norl.	FCA	-	-	-
P. equisetoides A.St.-Hil. & Moq.	FOD, FCA	-	-	-
P. exigua Hassk.	FOD	-	-	-
P. extraaxillaris Chodat	FOD	-	-	-
P. fimbriata A.W.Benn.	FOD, FCA	-	-	-
P. galioides Poir.	FOM, FCA	-	-	-
P. glaziovii Chodat*	FOD, FCA	-	-	-
P. glochidiata Kunth	FOD, AFL	-	-	-
P. grandifolia A.St.-Hil. & Moq.*	RST, FOD	-	-	-
P. hebeclada DC.	FCA, AFL	-	-	-
P. hirsuta A.St.-Hil. & Moq.	FCA	-	-	-
P. hygrophila Kunth	FOM, FCA	-	-	-
P. ilheotica Wawra	FOD, FCA	-	-	-
P. insignis Klotzsch*	FOD	-	-	-
P. klotzchii Chodat	FOD	-	-	-
P. lancifolia A.St.-Hil. & Moq.*	FOD, FES, FCA	-	-	-
P. laureola A.St.-Hil. & Moq.*	FOD	-	-	-
P. leptocaulis Torr. & A.Gray	RST, FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. linoides</i> Poir.	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. longicaulis</i> Kunth	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. lycopodioides</i> Chodat	FCA, AFL	-	-	-
<i>P. martiana</i> A.W.Benn.	FOD	-	-	-
<i>P. martinellii</i> Marques & E.F.Guim.*	RST, FOD	-	-	-
<i>P. minima</i> Pohl ex A.W.Benn.	FOD	-	-	-
<i>P. mollis</i> Kunth	FOD	-	-	-
<i>P. molluginifolia</i> A.St.-Hil. & Moq.	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. moquiniana</i> A.St.-Hil. & Moq.*	FOD	-	-	-
<i>P. multiceps</i> A.W.Benn.	FOD	-	-	-
<i>P. obovata</i> A.St.-Hil. & Moq.	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. oxyphylla</i> DC.	FOD	-	-	-
<i>P. paniculata</i> L.	FOD, FES, FCA, RST, RUD	-	-	-
<i>P. pulchella</i> A.St.-Hil. & Moq.	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. pulcherrima</i> Kuhlmann.*	FOD	-	-	-
<i>P. pumila</i> Norl.*	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. punctata</i> A.W.Benn.	FOD	-	-	-
<i>P. remota</i> A.W.Benn.	FCA	-	-	-
<i>P. resedoides</i> A.St.-Hil. & Moq.	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. revoluta</i> Gardner*	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. rhodoptera</i> Mart. ex A.W.Benn.	FOM	-	-	-
<i>P. rojasii</i> Chodat	FOD	-	-	-
<i>P. roubienna</i> A.St.-Hil. & Moq.	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. sabulosa</i> A.W.Benn.	FCA	-	-	-
<i>P. santosii</i> Wurdack*	FOD	-	-	-
<i>P. sedoides</i> A.W.Benn.	RST, FOD	-	-	-
<i>P. selaginoides</i> A.W.Benn.	FOD	-	-	-
<i>P. selloi</i> (Spreng.) Bernardi*	FOD	-	-	-
<i>P. spectabilis</i> DC.	FOD	-	-	-
<i>P. stricta</i> A.St.-Hil. & Moq.	FOM, FCA	-	-	-
<i>P. subverticillata</i> Chodat*	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. tamarisceae</i> A.W.Benn.	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. tenella</i> Willd.	FCA	-	-	-
<i>P. tenuis</i> DC.	FOD, FOM, FCA	-	-	-
<i>P. timoutoides</i> Chodat	FOD	-	-	-
<i>P. urbani</i> Chodat	FOD	-	-	-
<i>P. variabilis</i> Kunth	RST, FOD	-	-	-
<i>P. violacea</i> Aubl.	FOD	-	-	-
<i>P. violoides</i> A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
<i>P. wettsteinii</i> Chodat*	FOD	-	-	-
<i>Securidaca</i> – 11/80				
<i>S. acrostichoides</i> Cham.*	FES	-	-	-
<i>S. acuminata</i> A.St.-Hil. & Moq.	FOD	-	-	-
<i>S. diversifolia</i> (L.) S.F.Blake	RST, FOD	-	-	-
<i>S. falcata</i> Chodat	FOD, FES	-	-	-
<i>S. lanceolata</i> A.St.-Hil. & Moq.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. leiocarpa</i> S.F.Blake	FOD	-	-	-
<i>S. macrocarpa</i> A.W.Benn.*	FOD	-	-	-
<i>S. ovalifolia</i> A.St.-Hil. & Moq.	FOD	-	-	-
<i>S. revoluta</i> (A.W.Benn.) Marques*	RST, FOD	-	-	-
<i>S. rivinifolia</i> A.St.-Hil.	FOD	-	-	-
<i>S. tomentosa</i> A.St.-Hil.	FOD	-	-	-

Polygonaceae

Efigênia de Melo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
POLYGONACEAE – 41/538				
Coccoloba – 22/170				
C. alnifolia Casar.	RST, FED, AFL	-	-	-
C. arborescens (Vell.) R.A Howard	FOD, RST	-	-	-
C. cordata Cham.	FOD, FES	-	-	-
C. declinata (Vell.) Mart.	RST, FED	-	-	-
C. fastigiata Meisn.	RST	-	-	-
C. glaziovii Lindau*	FOD	-	-	-
C. laevis Casar.*	RST	-	-	-
C. lucidula Benth.	RST, FES	-	-	-
C. marginata Benth.	FOD, FES	-	-	-
C. mollis Casar.	FOD, RST, FED	-	-	-
C. mosenii Lindau*	FOD, RST	-	-	-
C. oblonga Lindau*	FOD, RST	-	-	-
C. parimensis Benth.	FED, FES, RST	-	-	-
C. peltata Schott*	FOD, RST	-	-	-
C. persicaria Wedd.*	FOD	-	-	-
C. ramosissima Wedd.*	RST	-	-	-
C. rigida Meisn.*	RST	-	-	-
C. rosea Meisn.*	FOD, RST	-	-	-
C. scandens Casar.	FOD	-	-	-
C. striata Benth.	FOD, FED, RST	-	-	-
C. tenuiflora Lindau	FOD	-	-	-
C. warmingii Meisn.	FOD, FES	-	-	-
Polygonum – 12/200				
P. acuminatum Kunth	FOM	-	-	-
P. aviculare L.	FOM	-	-	-
P. diospyrifolium Cham.	FOM	-	-	-
P. ferrugineum Wedd.	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. glabrum</i> Willd.	FOM	-	-	-
<i>P. hispidum</i> Kunth	FOM	-	-	-
<i>P. hydropiperoides</i> Michx.	FOM	-	-	-
<i>P. meisnerianum</i> Cham.	FOM	-	-	-
<i>P. persicaria</i> L.	FOM	-	-	-
<i>P. punctatum</i> Elliott	FOM	-	-	-
<i>P. rubricaulis</i> Cham.	FOM	-	-	-
<i>P. stelligerum</i> Cham.	FOM	-	-	-
<i>Rumex</i> – 4/130				
<i>R. acetosella</i> L.	FOM	-	-	-
<i>R. brasiliensis</i> Link	FOD	-	-	-
<i>R. crispus</i> L.	FOM	-	-	-
<i>R. obtusifolius</i> L.	FOM	-	-	-
<i>Ruprechtia</i> – 2/20				
<i>R. laxiflora</i> Meisn.	FES, FED	-	-	-
<i>R. paranensis</i> Pendry*	FOD, FES	-	-	-
<i>Triplaris</i> – 1/18				
<i>T. americana</i> L.	FOD	-	-	-

Pontederiaceae

Marco Otávio Pivari

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PONTEDERIACEAE – 10/35				
<i>Eichhornia</i> – 3/7				
<i>E. azurea</i> (Sw.) Kunth	FAQ	-	-	-
<i>E. crassipes</i> (Mart.) Solms	FAQ	-	-	-
<i>E. paniculata</i> (Spreng.) Solms	FAQ	-	-	-
<i>Heteranthera</i> – 3/11				
<i>H. limosa</i> Willd.	FAQ	-	-	-
<i>H. reniformis</i> Ruiz & Pav.	FAQ	-	-	-
<i>H. zosterifolia</i> Mart.	FAQ	-	-	-
<i>Pontederia</i> – 4/6				
<i>P. cordata</i> L.	FAQ	-	-	-
<i>P. rotundifolia</i> L.f.	FAQ	-	-	-
<i>P. sagittata</i> C. Presl.	FAQ	-	-	-
<i>P. subovata</i> (Seub.) Lowden	FAQ	-	-	-

Portulacaceae

Alexa Araujo de Oliveira Paes Coelho

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PORTULACACEAE –15/450-500				
Portulaca – 13/40				
P. amilis Speg.	FCA, RST	-	-	-
P. elatior Mart.	FCA, AFL	-	-	-
P. frieseana Poelln.	FCA	-	-	-
P. grandiflora Hook.	FCA, RST	-	-	-
P. halimoides L.	FCA, AFL	-	-	-
P. hatschbachii D.Legrand*	FCA	-	-	-
P. hirsutissima Cambess.	FCA	-	-	-
P. minensis D.Legrand	FCA, AFL	-	-	-
P. mucronata Link	FCA, FOM, RST	-	-	-
P. oleracea L.	FCA, FOD, FOM, FES, FED, FCA, AFL, RST	-	-	-
P. pilosa L.	FCA, FOM	-	-	-
P. umbraticola Kunth	FCA, RST, AFL, FOM	-	-	-
P. werdermannii Poelln.	FCA	-	-	-
Talinum – 2/14				
T. paniculatum (Jacq.) Gaertn.	FOM, FCA, AFL, RST, FES, FED	-	-	-
T. triangulare (Jacq.) Willd.	FOM, FCA, AFL, RST, FES, FED	-	-	-

Potamogetonaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
POTAMOGETONACEAE – 7/100				
Potamogeton – 7/95				
P. ferrugineus Hagström	FAQ	-	-	-
P. gayi A.Bennett	FAQ	-	-	-
P. illinoensis Morong	FAQ	-	-	-
P. montevidensis A.Bennett	FAQ	-	-	-
P. polygonus Cham. & Schltdl.	FAQ	-	-	-
P. pusillus L.	FAQ	-	-	-
P. spirilliformis Hagström	FAQ	-	-	-

Proteaceae

Ary Teixeira de Oliveira-Filho

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PROTEACEAE – 23/83				
<i>Euplassa</i> – 11/20				
<i>E. bahiensis</i> (Meisn.) I.M.Johnst.*	FES	-	-	-
<i>E. cantareirae</i> Sleumer*	FOD, FOM	-	-	-
<i>E. hoehnei</i> Sleumer*	FOD	-	-	-
<i>E. inaequalis</i> (Pohl) Engl.	FES, FCA	-	-	-
<i>E. incana</i> (Klotzsch) I.M.Johnst.*	FES	-	-	-
<i>E. itatiaiae</i> Sleumer*	FOM, FES	-	-	-
<i>E. legalis</i> (Vell.) I.M.Johnst.	FOD, FES	-	-	-
<i>E. nebularis</i> Rambo & Sleumer*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>E. organensis</i> (Gardner) I.M.Johnst.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>E. rufa</i> (Loes.) Sleumer*	FOD, FES	-	-	-
<i>E. semicostata</i> Plana*	FES	-	VU	ANEXO II
<i>Panopsis</i> – 2/11				
<i>P. multiflora</i> (Schott) Ducke*	FOD	-	-	-
<i>P. rubescens</i> (Pohl) Rusby	FOD, FES	-	-	-
<i>Roupala</i> – 10/52				
<i>R. asplenoides</i> Sleumer*	FOD, FOM	-	-	-
<i>R. consimilis</i> Mez ex Taub.*	FOD	-	-	-
<i>R. cyclocarpa</i> K.S.Edwards & Prance*	FOD	-	-	-
<i>R. gracilis</i> Meisn.*	FOD	-	-	-
<i>R. longepetiolata</i> Pohl*	FOD	-	-	-
<i>R. montana</i> Aubl.	FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>R. pallida</i> K.Schum.*	FOD	-	-	-
<i>R. paulensis</i> Sleumer*	FOD, FES	-	-	-
<i>R. sculpta</i> Sleumer*	FOD	-	-	-
<i>R. thomesiana</i> Moric.*	FES, FCA	-	-	-

Putranjivaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
PUTRANJIVACEAE – 1/218				
<i>Drypetes</i> – 1/211				
<i>D. sessiliflora</i> Allemão*	FOD, FES	-	-	-

Quiinaceae

Claudio Nicoletti de Fraga & Ary Teixeira de Oliveira-Filho

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
QUIINACEAE – 3/55				
Lacunaria – 1/45				
L. decastyla (Radlk.) Ducke*	FOD, FES	-	-	-
Quiina – 2/10				
Q. glaziovii Engl.*	FOD	-	-	-
Q. magallanogomesii Schwacke*	FES	-	-	-

Quillajaceae

Rafaella Cardoso Ribeiro

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
QUILLAJACEAE – 1/3				
<i>Quillaja</i> – 1/3				
<i>Q. brasiliensis</i> (A.St.-Hil. & Tul.) Mart.	FOD, FOM	-	-	-

Ranunculaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
RANUNCULACEAE – 10/2.000				
Anemone – 2/150				
A. decapetala Arduino	FAC	-	-	-
A. sellowii Pritzel*	FOD, FOM	-	-	-
Clematis – 5/300				
C. affinis A.St.-Hil.	FCA, FOD, FES	-	-	-
C. bonariensis A.Juss.	FOD, FES	-	-	-
C. brasiliana DC.	FES	-	-	-
C. campestris A.St.-Hil.	FCA	-	-	-
C. ulbrichiana Pilg.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>Ranunculus</i> – 3/400				
<i>R. apiifolius</i> Pers.	FCA	-	-	-
<i>R. bonariensis</i> Poir.	FCA	-	-	-
<i>R. flagelliformis</i> Sm.	FCA, FAQ	-	-	-

Rapateaceae

Rafaela Campostrini Forzza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
RAPATEACEAE – 1/ca.100				
<i>Rapatea</i> – 1/18				
<i>R. paludosa</i> Aubl.	FOD	-	-	-

Rhamnaceae

Luciana H. Yoshino Kamino & Rafaella Cardoso Ribeiro

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
RHAMNACEAE – 25/925				
<i>Alvimiantha</i> – 1/1				
<i>A. tricamerata</i> Grey-Wilson	?	-	-	-
<i>Colletia</i> – 2/5				
<i>C. exserta</i> Klotzsch <i>ex</i> Reissek*	FCA, FOM	-	-	-
<i>C. paradoxa</i> (Spreng.) Escal.	FCA, FOM	-	-	-
<i>Colubrina</i> – 2/32				
<i>C. glandulosa</i> Perkins	FES, FOD	-	-	-
<i>C. retusa</i> (Pittier) Cowan	FES, FOD	-	-	-
<i>Condalia</i> – 1/20				
<i>C. buxifolia</i> Reissek	FOD	-	-	-
<i>Crumenaria</i> – 1/6				
<i>C. polygaloides</i> Reissek	FCA	-	-	-
<i>Discaria</i> – 1/8				
<i>D. americana</i> Gill. <i>ex</i> Hook.	FCA, AFL	-	-	-
<i>Gouania</i> – 8/50				
<i>G. blanchetiana</i> Miq.	FES, FOD	-	-	-
<i>G. colurnifolia</i> Reissek	FES, FOD, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>G. corylifolia</i> Raddi*	FES, FOD	-	-	-
<i>G. inornata</i> Reissek	FES	-	-	-
<i>G. latifolia</i> Reissek	FES, FED	-	-	-
<i>G. ulmifolia</i> Hook. & Arn.	FES, FOM, FOD	-	-	-
<i>G. velutina</i> Reissek	?	-	-	-
<i>G. virgata</i> Reissek	FES	-	-	-
<i>Reissekia</i> – 1/1				
<i>R. smilacina</i> (Sm.) Steud.	FES, FOD, RST	-	-	-
<i>Rhamnidium</i> – 2/22				
<i>R. elaeocarpum</i> Reissek	FES, FCA	-	-	-
<i>R. glabrum</i> Reissek	FOM, FOD	-	-	-
<i>Rhamnus</i> – 1/100				
<i>R. sphaerosperma</i> Sw.	FOM, FOD	-	-	-
<i>Scutia</i> – 2/5				
<i>S. arenicola</i> (Casar.) Reissek	RST	-	-	-
<i>S. buxifolia</i> Reissek	FOD	-	-	-
<i>Ziziphus</i> – 3/100				
<i>Z. glaziovii</i> Warm.*	RST	-	-	-
<i>Z. platyphylla</i> Reissek	RST, FES, FOD	-	-	-
<i>Z. undulata</i> Reissek	RST, FOD, FES	-	-	-

Rhizophoraceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
RHIZOPHORACEAE – 1/ca. 150				
<i>Rhizophora</i> – 1/9				
<i>R. mangle</i> L.	MAN	-	-	-

Rosaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ROSACEAE – 17/2.520				
<i>Acaena</i> – 1/100				
<i>A. eupatoria</i> Cham. & Schltldl.	FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Agrimonia – 3/15				
A. hirsuta Bong. ex C.A.Mey.	FOM	-	-	-
A. parviflora Soland.	FOM	-	-	-
A. villosa Cham. & Schltld.	FOM	-	-	-
Aphanes – 2/20				
A. arvensis L.	FOM, FCA	-	-	-
A. parodii (I.M.Johnst.) Rothm.	FOM, FCA	-	-	-
Geum – 2/40				
G. boliviense Focke	FOM	-	-	-
G. parviflorum Sm.	FOM	-	-	-
Margyricarpus – 1/1				
M. setosus Ruiz & Pav.	FCA, FOM, RST	-	-	-
Prunus – 1/200				
P. myrtifolia (L.) Urb.	FOD, FOM, FES	-	-	-
Rubus – 7/250				
R. brasiliensis Mart.	FOD, FOM	-	-	-
R. erythrocladus Mart. ex Hook.f.	FOD, FOM	-	-	-
R. imperialis Cham. & Schltld.	FOD, FOM	-	-	-
R. rosifolius J.E.Sm.	FOD, FOM	-	-	-
R. schottii Pohl ex Focke	FOD, FOM	-	-	-
R. sellowii Cham. & Schltld.	FOD, FOM	-	-	-
R. urticifolius Poir.	FOD, FOM	-	-	-

Rubiaceae

Daniela Zappi, Maria Regina de Vasconcellos Barbosa, Maria Fernanda Calió,
Jomar Gomes Jardim, Maria do Socorro Pereira & Elnatan Bezerra de Souza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
RUBIACEAE – 463/10.700				
Alibertia – 1/5				
A. rotunda (Cham.) K.Schum.*	AFL	-	-	-
Alseis – 3/20				
A. floribunda Schott	FOD	-	-	-
A. involuta K.Schum.*	FOD	-	-	-
A. pickelii Pilg. & Schmale	FES	-	-	-
Amaioua – 3/9				
A. guianensis Aubl.	FOD	-	-	-
A. intermedia Mart. ex Schult. & Schult.f.	FES	-	-	-
A. pilosa K.Schum.	FOD	-	-	-
Augusta – 1/1				
A. longifolia (Spreng.) Rehder	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Bathysa – 7/13				
B. australis (A.St.-Hil.) K.Schum.	FOD	-	-	-
B. cuspidata (A.St.-Hil.) Hook.f. ex K.Schum.*	FOD, FOM	-	-	-
B. gymnocarpa K.Schum.*	FOD	-	-	-
B. mendoncae K.Schum.*	FOD, FES	-	-	-
B. nicholsonii K.Schum.*	FOD, FES	-	-	-
B. stipulata (Vell.) C.Presl*	FOD, FOM	-	-	-
B. sylvestrae Germano-Filho & M.Gomes *	FOD, FOM	-	-	-
Bradea* – 5/5				
B. anomala Brade*	FOM, AFL	-	-	-
B. bicornuta Brade*	FOM, AFL	-	-	-
B. brasiliensis Standl.*	FOM, AFL	-	-	-
B. kuhlmannii Brade*	FOM, AFL	-	-	-
B. montana Brade*	FOM, AFL	-	-	-
Calycophyllum – 1/11				
C. papillosum J.H.Kirkbr.*	FOD	-	-	-
Carapichea – 2/4				
C. ipecacuanha (Brot.) L.Andersson	FES	-	-	-
C. lucida J.G.Jardim & Zappi*	FOD	-	-	-
Cephalanthus – 1/6				
C. glabratus (Spreng.) K.Schum.	FED	-	-	-
Chiococca – 3/23				
C. alba (L.) Hitchc.	FOD, RST, FED	-	-	-
C. nitida Benth.	RST, FOD, FES	-	-	-
C. plowmanii Delprete*	RST	-	-	-
Chomelia – 16/160				
C. angustifolia Benth.	FOD	-	-	-
C. anisomeris Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
C. bahiae J.H.Kirkbr.*	FOD	-	-	-
C. brasiliiana A.Rich.	FOD	-	-	-
C. estrellana Müll.Arg.*	FES	-	-	-
C. hirsuta Gardner	FOD	-	-	-
C. intercedens Müll.Arg.	FES	-	-	-
C. martiana Müll.Arg.	FES	-	-	-
C. modesta (Standl.) Steyerl.*	FES	-	-	-
C. obtusa Cham. & Schltdl.	FED	-	-	-
C. oligantha Müll.Arg.*	FES	-	-	-
C. parvifolia (Standl.) Govaerts	FOD	-	-	-
C. pedunculosa Benth.	FOD	-	-	-
C. pubescens Cham. & Schltdl.	FOD, FES	-	-	-
C. sessilis Müll.Arg.	FES	-	-	-
C. transiens Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
Coccocypselum – 13/20				
C. aureum (Spreng.) Cham. & Schltdl.	FOD, FES	-	-	-
C. bahiense C.B.Costa*	FOD	-	-	-
C. capitatum (Graham) C.B.Costa & Mamede	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. condalia</i> Pers.	FOD	-	-	-
<i>C. cordifolium</i> Nees & Mart.	FOD	-	-	-
<i>C. erythrocephalum</i> Cham. & Schltdl.	FOD	-	-	-
<i>C. geophiloides</i> Wawra	FOD	-	-	-
<i>C. glabrifolium</i> Standl.	FOD	-	-	-
<i>C. hasslerianum</i> Chodat	FOD	-	-	-
<i>C. lanceolatum</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. lymansmithii</i> Standl.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. pedunculare</i> Cham. & Schltdl.*	AFL	-	-	-
<i>C. pulchellum</i> Cham.	FOM	-	-	-
<i>Cordia</i> – 3/35				
<i>C. concolor</i> (Cham.) Kuntze	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. elliptica</i> (Cham.) Kuntze	FES	-	-	-
<i>C. myrcifolia</i> (K.Schum.) C.H.Perss. & Delprete	FOD, FES	-	-	-
<i>Coussarea</i> – 20/115				
<i>C. accedens</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>C. bocainae</i> M.Gomes*	FOD	-	-	-
<i>C. capitata</i> (Benth.) Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. coffeoides</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>C. congestiflora</i> Müll.Arg.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. contracta</i> (Walp.) Benth. & Hook.f. ex Müll.Arg.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. friburgensis</i> M.Gomes*	FOD	-	-	-
<i>C. graciliflora</i> (Mart.) Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. hydrangeifolia</i> (Benth.) Benth. & Hook.f. ex Müll.Arg.	FOM, FES	-	-	-
<i>C. ilheotica</i> Müll.Arg.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. leptopus</i> Müll.Arg.*	FES	-	-	-
<i>C. megistophylla</i> Standl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. meridionalis</i> (Vell.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>C. nodosa</i> (Benth.) Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. speciosa</i> K.Schum. ex Glaz.*	FOD	-	-	-
<i>C. strigosipes</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>C. triflora</i> Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. verticillata</i> Müll.Arg.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. violacea</i> Aubl.*	FOD	-	-	-
<i>C. viridis</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>Coutarea</i> – 1/2				
<i>C. hexandra</i> (Jacq.) K.Schum.	FOD, FED, FES	-	-	-
<i>Declieuxia</i> – 7/27				
<i>D. coerulea</i> Gardner	FCA	-	-	-
<i>D. cordigera</i> Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f.	AFL	-	-	-
<i>D. dusenii</i> Standl.*	FCA	-	-	-
<i>D. fruticosa</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze	FCA	-	-	-
<i>D. lysimachioides</i> Zucc. ex Schult. & Schult.f.	AFL, FCA	-	-	-
<i>D. saturejoides</i> Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f.	AFL, FCA	-	-	-
<i>D. tenuiflora</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Steyererm.	FCA	-	-	-
<i>Denscantia</i> * – 4/4				
<i>D. andrei</i> (E.L.Cabral & Bacigalupo) E.L.Cabral & Bacigalupo*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>D. cymosa</i> (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo*	FOD, RST	-	-	-
<i>D. macrobracteata</i> (E.L.Cabral & Bacigalupo) E.L.Cabral & Bacigalupo*	FOD, RST	-	-	-
<i>D. monodon</i> (K.Schum.) E.L.Cabral & Bacigalupo *	FOD, RST	-	-	-
<i>Deppea</i> – 1/25				
<i>D. blumenaviensis</i> (K.Schum.) Lorence	FED, FES	-	-	-
<i>Diodella</i> – 3/7				
<i>D. apiculata</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete	FOD, FCA	-	-	-
<i>D. radula</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete	FOD, RST	-	-	-
<i>D. teres</i> (Walter) Small	FCA	-	-	-
<i>Diodia</i> – 1/5				
<i>D. saponariifolia</i> (Cham. & Schltdl.) K.Schum.	FOD, FCA	-	-	-
<i>Emmeorrhiza</i> – 1/1				
<i>E. umbellata</i> (Spreng.) K.Schum.	FOD	-	-	-
<i>Erithalis</i> – 1/10				
<i>E. insularis</i> (Ridley) Zappi & T.Sena*	RST	-	CR	ANEXO I
<i>Faramea</i> – 57/200				
<i>F. affinis</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. anisodonta</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. aristata</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. atlantica</i> J.G.Jardim & Zappi*	FOD	-	-	-
<i>F. axilliflora</i> DC.*	FOD	-	-	-
<i>F. bahiensis</i> Müll.Arg.*	FOD	-	VU	ANEXO I
<i>F. bicolor</i> J.G.Jardim & Zappi*	FOD	-	-	-
<i>F. biflora</i> J.G.Jardim & Zappi*	FOD	-	-	-
<i>F. brachyloba</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. calyciflora</i> A.Rich. ex DC.*	FOD	-	-	-
<i>F. campanella</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. campanularis</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. cardiophylla</i> Standl.*	FOD	-	-	-
<i>F. coerulea</i> (Nees & Mart.) DC.*	FOD	-	EN	ANEXO I
<i>F. cordifolia</i> Glaz.*	FOD	-	-	-
<i>F. dichotoma</i> K.Schum. ex Glaz.*	FOM	-	-	-
<i>F. eichleri</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. fallax</i> Müll.Arg.*	FOM	-	-	-
<i>F. filamentosa</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. glaziovii</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. heteromera</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. hyacinthina</i> Mart.	FOD, FED	-	-	-
<i>F. hymenocalyx</i> M.Gomes*	FOD	-	-	-
<i>F. includens</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. intercedens</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. involuclata</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. latifolia</i> (Cham. & Schltdl.) DC.	FOD	-	-	-
<i>F. leucocalyx</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. macrocalyx</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. martiana</i> Müll.Arg.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>F. megalophylla</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>F. micrantha</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>F. monantha</i> Müll.Arg.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>F. montevidensis</i> (Cham. & Schltdl.) DC.	FOD	-	-	-
<i>F. morsoniana</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. multiflora</i> A.Rich.	FOD	-	-	-
<i>F. nigrescens</i> Mart.	FES	-	-	-
<i>F. nitida</i> Benth.	FES	-	-	-
<i>F. nocturna</i> J.G.Jardim & Zappi*	FOD	-	-	-
<i>F. oligantha</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. oxyclada</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>F. pachyantha</i> Müll.Arg.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>F. paratiensis</i> M.Gomes*	FOD	-	-	-
<i>F. pinguabae</i> M.Gomes*	FOD	-	-	-
<i>F. platyclada</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. platypoda</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. pohliana</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. sellowiana</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>F. stenantha</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>F. stipulacea</i> (Cham. & Schltdl.) DC.	FOD	-	-	-
<i>F. subbasilaris</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>F. tenuiflora</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. tetragona</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>F. tinguana</i> Müll.Arg.*	FOM	-	-	-
<i>F. truncata</i> (Vell.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. urophylla</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>F. vidensis</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>Ferdinandusa</i> – 3/24				
<i>F. edmundoi</i> Sucre*	FES	-	-	-
<i>F. elliptica</i> (Pohl) Pohl	FOD, RST	-	-	-
<i>F. ovalis</i> (Pohl) Pohl	FOD, RST	-	-	-
<i>Galianthe</i> – 21/49				
<i>G. angustifolia</i> (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral	FCA	-	-	-
<i>G. brasiliensis</i> (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo	FOM, FED, FOD	-	-	-
<i>G. centranthoides</i> (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral	FOD	-	-	-
<i>G. cymosa</i> (Cham.) E.L.Cabral & Bacigalupo	FCA	-	-	-
<i>G. elegans</i> E.L.Cabral	FCA	-	-	-
<i>G. equisetoides</i> (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral	FES	-	-	-
<i>G. fastigiata</i> Griseb.	FED	-	-	-
<i>G. gertii</i> E.L.Cabral*	FCA, AFL	-	-	-
<i>G. hispidula</i> (A.Rich. ex DC.) E.L.Cabral & Bacigalupo	FED, FOM	-	-	-
<i>G. latistipula</i> E.L.Cabral	FCA	-	-	-
<i>G. laxa</i> (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral	FED, FOD	-	-	-
<i>G. liliifolia</i> (Standl.) E.L.Cabral*	FCA	-	-	-
<i>G. longifolia</i> (Standl.) E.L.Cabral	FCA	-	-	-
<i>G. peruviana</i> (Pers.) E.L.Cabral	FOM	-	-	-
<i>G. polygonoides</i> E.L.Cabral & Bacigalupo*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>G. pseudopeciolata</i> E.L.Cabral	FOD	-	-	-
<i>G. reitzii</i> E.L.Cabral*	FCA	-	-	-
<i>G. souzae</i> E.L.Cabral & Bacigalupo	FCA	-	CR	ANEXO I
<i>G. thalictroides</i> (K.Schum.) E.L.Cabral	FCA	-	-	-
<i>G. vaginata</i> E.L.Cabral & Bacigalupo*	FCA	-	-	-
<i>G. verbenoides</i> (Cham. & Schltdl.) Griseb.	FOD?	-	-	-
<i>Galium</i> – 21/400				
<i>G. atherodes</i> Spreng.	?	-	-	-
<i>G. bigeminum</i> Griseb.	FOD	-	-	-
<i>G. diphyllum</i> (K.Schum.) Dempster	FOD	-	-	-
<i>G. equisetoides</i> (Cham. & Schltdl.) Standl.	FOD	-	-	-
<i>G. ericoides</i> Lam.	FCA	-	-	-
<i>G. espinaciicum</i> Dempster*	AFL	-	-	-
<i>G. hatschbachii</i> Dempster*	FCA	-	-	-
<i>G. hirtum</i> Lam.	?	-	-	-
<i>G. humile</i> Cham. & Schltdl.	FOM, FCA	-	-	-
<i>G. hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	FOD, FOM	-	-	-
<i>G. latoramosum</i> Clos	FOD, FOM	-	-	-
<i>G. megapotamicum</i> Spreng.	FOM	-	-	-
<i>G. muelleri</i> (K.Schum.) Dempster	FOM	-	-	-
<i>G. nigroramosum</i> (Ehrend.) Dempster	FOM	-	-	-
<i>G. noxium</i> (A.St.-Hil.) Dempster	FOD	-	-	-
<i>G. ostenianum</i> (Standl.) Dempster	?	-	-	-
<i>G. ramboi</i> Dempster*	FCA	-	-	-
<i>G. richardianum</i> (Gillespie ex Hook. & Arn.) Endl.	FCA	-	-	-
<i>G. rubidiflorum</i> Dempster	FCA	-	-	-
<i>G. sellowianum</i> (Cham.) Walp.	FCA	-	-	-
<i>G. shepherdii</i> Jung-Mend.	FOM	-	-	-
<i>Genipa</i> – 2/3				
<i>G. americana</i> L.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>G. infundibuliformis</i> Zappi & Semir*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>Geophila</i> – 2/30				
<i>G. macropoda</i> (Ruiz & Pav.) DC.	FED	-	-	-
<i>G. repens</i> (L.) I.M.Johnst.	FOD	-	-	-
<i>Gonzalagunia</i> – 1/40				
<i>G. dicocca</i> Cham. & Schltdl.	FOD, FES	-	-	-
<i>Guettarda</i> – 5/200				
<i>G. grazielae</i> M.R.Barbosa*	FED, FES	-	-	-
<i>G. platyphylla</i> Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
<i>G. platypoda</i> DC.	FES, RST	-	-	-
<i>G. uruguensis</i> Cham. & Schltdl.	FES	-	-	-
<i>G. viburnoides</i> Cham. & Schltdl.	FOD, FES	-	-	-
<i>Hamelia</i> – 1/16				
<i>H. patens</i> Jacq.	FED, FES	-	-	-
<i>Hillia</i> – 3/24				
<i>H. illustris</i> (Vell.) K.Schum.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>H. parasitica</i> Jacq.	FOD, FES	-	-	-
<i>H. ulei</i> K.Krause	FOD	-	-	-
<i>Hindsia</i> – 7/11				
<i>H. arianeae</i> Di Maio*	FCA	-	-	-
<i>H. cucullata</i> Di Maio*	FCA	-	-	-
<i>H. glabra</i> K.Schum.*	FCA	-	CR	ANEXO I
<i>H. ibitipocensis</i> Di Maio*	AFL	-	CR	ANEXO I
<i>H. longiflora</i> (Cham.) Benth. ex Lindl.*	FCA	-	-	-
<i>H. ramosissima</i> Gardner*	FOM	-	-	-
<i>H. republicana</i> Di Maio*	FCA	-	-	-
<i>Hoffmannia</i> – 2/100				
<i>H. dusenii</i> Standl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>H. peckii</i> K.Schum.	FOD	-	-	-
<i>Ixora</i> – 8/350				
<i>I. bahiensis</i> Benth.*	FOD	-	-	-
<i>I. bracteolaris</i> Müll.Arg.	?	-	-	-
<i>I. brevifolia</i> Benth.	FOD, FES	-	-	-
<i>I. densiflora</i> Müll.Arg.*	?	-	-	-
<i>I. gardneriana</i> Benth.*	FOD, FES	-	-	-
<i>I. heterodoxa</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>I. syringiflora</i> (Schltdl.) Müll.Arg.*	FED	-	-	-
<i>I. venulosa</i> Benth.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Ladenbergia</i> – 1/34				
<i>L. hexandra</i> (Pohl) Klotzsch	RST, FES	-	-	-
<i>Machaonia</i> – 1/30				
<i>M. brasiliensis</i> (Hoffmanns. ex Humb.) Cham. & Schltdl.	FOD, FOM	-	-	-
<i>Malanea</i> – 4/60				
<i>M. evenosa</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>M. forsteronioides</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>M. harleyi</i> J.H.Kirkbr.*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. martiana</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>Manettia</i> – 16/120				
<i>M. beyrichiana</i> K.Schum.*	?	-	-	-
<i>M. campanulacea</i> Standl.*	?	-	-	-
<i>M. chrysoderma</i> Sprague*	FOD	-	-	-
<i>M. congesta</i> (Vell.) K.Schum.*	FCA	-	-	-
<i>M. cordifolia</i> Mart.	FOD	-	-	-
<i>M. glazioviana</i> (K.Schum.) Sucre*	FOD	-	-	-
<i>M. glaziovii</i> Wernham*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. gracilis</i> Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
<i>M. luteorubra</i> (Vell.) Benth.	?	-	-	-
<i>M. mitis</i> (Vell.) K.Schum.	?	-	-	-
<i>M. paraguariensis</i> Chodat	FCA	-	-	-
<i>M. pauciflora</i> Dusén*	FCA	-	-	-
<i>M. pubescens</i> Cham. & Schltdl.*	FOD	-	-	-
<i>M. riedelii</i> Wernham*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. tweediana</i> K.Schum.	FOD	-	-	-
<i>M. verticillata</i> Wernham*	FOD	-	-	-
<i>Margaritopsis</i> – 5/50				
<i>M. astrellantha</i> (Wernham) L.Andersson*	FOD	-	-	-
<i>M. cephalantha</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor	FOD, FES	-	-	-
<i>M. chaenotricha</i> (DC.) C.M.Taylor	FOD, FES	-	-	-
<i>M. cymuligera</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor*	FOD, FES	-	-	-
<i>M. schuechiana</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor*	FOD, FES	-	-	-
<i>Melanopsidium</i> * – 1/1				
<i>M. nigrum</i> Colla*	FOD, RST	-	VU	ANEXO I
<i>Mitracarpus</i> – 4/30				
<i>M. anthospermoides</i> K.Schum.*	RST	-	VU	ANEXO II
<i>M. eichleri</i> K.Schum.*	RST	-	-	-
<i>M. frigidus</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) K.Schum.	FOM	-	-	-
<i>M. lhotzkyanus</i> Cham.*	RST	-	-	-
<i>Molopanthra</i> – 1/1				
<i>M. paniculata</i> Turcz.	FOD, FES	-	-	-
<i>Notopleura</i> – 2/80				
<i>N. bahiensis</i> C.M.Taylor*	FOD	-	-	-
<i>N. tapajozensis</i> (Standl.) Bremek.	FOD	-	-	-
<i>Oldenlandia</i> – 3/100				
<i>O. corymbosa</i> L.	?	-	-	-
<i>O. dusenii</i> Standl.*	?	-	-	-
<i>O. salzmännii</i> (DC.) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks.	?	-	-	-
<i>Pagamea</i> – 2/20				
<i>P. guianensis</i> Aubl.	RST	-	-	-
<i>P. harleyi</i> Steyerl.*	RST	-	EN	ANEXO II
<i>Palicourea</i> – 11/200				
<i>P. australis</i> C.M.Taylor	FOM	-	-	-
<i>P. blanchetiana</i> Schltdl.*	FOD	-	-	-
<i>P. croceoides</i> Ham.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. fulgens</i> (Müll.Arg.) Standl.*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>P. guianensis</i> Aubl.	FOD, RST	-	-	-
<i>P. macrobotrys</i> (Ruiz & Pav.) Schult.	FED	-	-	-
<i>P. marcgravii</i> A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. radians</i> (Müll.Arg.) Standl.*	FOD	-	-	-
<i>P. rudgeoides</i> (Müll.Arg.) Standl.	FOD	-	-	-
<i>P. tetraphylla</i> Cham. & Schltdl.*	FOD, FES	-	-	-
<i>P. veterinariorum</i> J.H.Kirkbr.*	FOD	-	-	-
<i>Perama</i> – 1/14				
<i>P. hirsuta</i> Aubl.	RST, FCA	-	-	-
<i>Posoqueria</i> – 5/14				
<i>P. acutifolia</i> Mart.*	FOD	-	-	-
<i>P. bahiensis</i> Macias & Kin.-Gouv.*	FOD	-	-	-
<i>P. latifolia</i> (Rudge) Schult.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. macropus</i> Mart.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. palustris</i> Mart.*	FOD	-	-	-
<i>Psychotria</i> – 75/1.000				
<i>P. anceps</i> Kunth	FES	-	-	-
<i>P. appendiculata</i> Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
<i>P. ararum</i> C.M.Taylor*	FOD?	-	-	-
<i>P. bahiensis</i> DC.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. beyrichiana</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>P. brachyceras</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>P. brachygyna</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>P. brachypoda</i> (Müll.Arg.) Britton*	FOD	-	-	-
<i>P. bracteocardia</i> (DC.) Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. bradei</i> Standl.*	FCA	-	-	-
<i>P. brevicollis</i> Müll.Arg.	FES, FOD	-	-	-
<i>P. capillacea</i> (Müll.Arg.) Standl.	FES	-	-	-
<i>P. carthagenensis</i> Jacq.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. colorata</i> (Willd. ex Schult.) Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. cupularis</i> (Müll.Arg.) Standl.	FES	-	-	-
<i>P. deflexa</i> DC.	FES	-	-	-
<i>P. dusenii</i> Standl.*	FOD	-	-	-
<i>P. exannulata</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>P. fissistipula</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>P. fluminensis</i> Vell.*	FOD	-	-	-
<i>P. fractistipula</i> L.B.Sm. et al.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>P. friburgensis</i> Standl.*	FOD	-	-	-
<i>P. glaziovii</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>P. gracilentia</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>P. hastisepala</i> Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. hoffmannseggiana</i> (Willd. ex Schult.) Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>P. inaequifolia</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>P. insolens</i> Standl.*	FOD	-	-	-
<i>P. intermedia</i> Gardner*	FOD	-	-	-
<i>P. iodotricha</i> Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. jambosioides</i> Schltdl.*	FOD, RST	-	-	-
<i>P. jasmínoides</i> Standl.*	FOD	-	-	-
<i>P. laciniata</i> Vell.	FOM	-	-	-
<i>P. leiocarpa</i> Cham. & Schltdl.	FOD, FED, FES	-	-	-
<i>P. leitana</i> C.M.Taylor*	FOD	-	-	-
<i>P. loefgrenii</i> Standl.*	FOD, RST	-	-	-
<i>P. longipedunculata</i> (Gardner) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>P. lupulina</i> Benth.	FES	-	-	-
<i>P. malaneoides</i> Müll.Arg.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. megalocalyx</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>P. microcarpa</i> Müll.Arg.	?	-	-	-
<i>P. mima</i> Standl.*	FES, FOM	-	-	-
<i>P. minutiflora</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>P. myriantha</i> Müll.Arg.*	FED, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. nemorosa</i> Gardner*	FOD, FES	-	-	-
<i>P. niveobarbata</i> (Müll.Arg.) Britton	FED	-	-	-
<i>P. nuda</i> (Cham. & Schltdl.) Wawra*	FOD, FES	-	-	-
<i>P. octocuspis</i> Müll.Arg.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. opaca</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>P. pallens</i> Gardner*	FOM, FES	-	-	-
<i>P. paludosa</i> Müll.Arg.*	FES, FOM	-	-	-
<i>P. patentinervia</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>P. phyllocalymma</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>P. platypoda</i> DC.	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. pleiocephala</i> Müll.Arg.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. racemosa</i> Rich.	FES, FOM	-	-	-
<i>P. rhytidocarpa</i> Müll.Arg.*	FES	-	-	-
<i>P. ruelliiifolia</i> (Cham. & Schltdl.) Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>P. rupestris</i> Müll.Arg.*	FES, FOM	-	-	-
<i>P. schlechtendaliana</i> (Müll.Arg.) Müll.Arg.*	FES, FOM,	-	-	-
<i>P. schottiana</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>P. setulifera</i> C.M.Taylor*	FOM	-	-	-
<i>P. spathicalyx</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>P. stachyoides</i> Benth.	FOD	-	-	-
<i>P. stenocalyx</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>P. strigosa</i> Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
<i>P. subspathacea</i> Müll.Arg.*	FOM, RST	-	-	-
<i>P. subspathulata</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor	?	-	-	-
<i>P. subtriflora</i> Müll.Arg.	FES	-	-	-
<i>P. suterella</i> Müll.Arg.*	FOD, FES	-	-	-
<i>P. tenerior</i> (Cham.) Müll.Arg.	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. trichophora</i> Müll.Arg.	FOD	-	-	-
<i>P. ulei</i> Standl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. vellosiana</i> Benth.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. warmingii</i> Müll.Arg.*	FES	-	-	-
<i>Randia</i> – 4/90				
<i>R. armata</i> (Sw.) DC.	FOD, FES	-	-	-
<i>R. calycina</i> Cham.	FOD	-	-	-
<i>R. ferox</i> (Cham. & Schltdl.) DC.*	FOD, FED	-	-	-
<i>R. itatiaiae</i> Silva-Neto & Ávila Jr. *	FOD, FES	-	-	-
<i>Richardia</i> – 7/15				
<i>R. brasiliensis</i> Gomes	FOD, FCA	-	-	-
<i>R. grandiflora</i> (Cham. & Schltdl.) Steud.	FOM, FCA, FES	-	-	-
<i>R. humistrata</i> (Cham. & Schltdl.) Steud.	FOD, FCA	-	-	-
<i>R. pedicellata</i> (K.Schum.) Kuntze	FED, FCA	-	-	-
<i>R. scabra</i> L.	FED, FCA	-	-	-
<i>R. schumannii</i> W.H.Lewis & R.L.Oliv.*	FOM	-	-	-
<i>R. stellaris</i> (Cham. & Schltdl.) Steud.	FOD?	-	-	-
<i>Riodoclea</i> * – 1/1				
<i>R. pulcherrima</i> Delprete*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Ronabea – 1/3				
R. latifolia Aubl.	FOD	-	-	-
Rudgea – 26/150				
R. coriacea (Spreng.) K.Schum.*	FOD	-	-	-
R. coronata (Vell.) Müll.Arg.	FOD	-	-	-
R. corymbulosa Benth.	FCA	-	-	-
R. crassifolia Zappi & E.Lucas*	RST, FOD	VU	VU	ANEXO II
R. discolor Benth.*	FCA	-	-	-
R. erythrocarpa Müll.Arg.*	FOD	-	EN	ANEXO II
R. francavillana Müll.Arg.*	FES	-	VU	ANEXO II
R. gardenioides (Cham.) Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
R. insignis Müll.Arg.*	FOD	-	EN	ANEXO II
R. interrupta Benth.	RST	-	EN	ANEXO I
R. jasminoides (Cham.) Müll.Arg.	FOD	-	-	-
R. macrophylla Benth.*	FOD	-	EN	ANEXO I
R. minor (Cham.) Standley*	RST	-	-	-
R. nobilis Müll.Arg.*	FOM	-	EN	ANEXO II
R. nodosa (Cham.) Benth.	FES	-	-	-
R. pachyphylla Müll.Arg.*	RST	-	EN	ANEXO I
R. parquioides (Cham.) Müll.Arg.*	FOM	-	-	-
R. parvifolia (Cham.) Müll.Arg.*	FOM?	-	CR	ANEXO I
R. recurva Müll.Arg.*	FOD	-	-	-
R. reflexa Zappi	FOD, FOM	-	EN	ANEXO II
R. reticulata Benth.*	FOD, FOM	-	-	-
R. sessilis (Vell.) Müll.Arg.	FOM, FES	-	-	-
R. subcordata Müll.Arg.*	?	-	-	-
R. triflora Benth.*	FOM	-	-	-
R. umbrosa Müll.Arg.*	FOD	-	VU	ANEXO II
R. vellerea Müll.Arg.*	FOD	-	EN	ANEXO II
Rustia – 4/14				
R. angustifolia K.Schum.*	FOD	-	-	-
R. formosa (Cham. & Schltldl.) Klotzsch*	FOD, RST, FES	-	-	-
R. gracilis K.Schum.*	FOD	-	-	-
R. simpsonii Delprete*	FOD	-	-	-
Sabicea – 2/106				
S. grisea Cham. & Schltldl.	FOD, FOM	-	-	-
S. villosa Willd. ex Schult.	FOD	-	-	-
Salzmannia* – 1/1				
S. nitida DC.*	FOD, FES, RST	-	-	-
Schradera – 1/50				
S. polycephala DC.	FOD	-	-	-
Schwendenera* – 1/1				
S. tetrapyxis K.Schum.*	FOD		-	-
Simira – 9/42				
S. corumbensis (Standl.) Steyererm.	FES	-	-	-
S. eliezeriana Peixoto*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. glaziovii</i> (K.Schum.) Steyererm.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>S. grazielae</i> Peixoto*	FOD	-	-	-
<i>S. hatschbachiorum</i> J.H.Kirkbr.*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>S. pikia</i> (K.Schum.) Steyererm.	FOD	-	-	-
<i>S. sampaioana</i> (Standl.) Steyererm.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. viridiflora</i> (Allemão & Saldanha) Steyererm.*	FOD	-	-	-
<i>S. walteri</i> Silva Netto & Callado *	FOD	-	-	-
<i>Sipanea</i> – 2/10				
<i>S. biflora</i> (L.f.) Cham. & Schltdl.	FCA, FOD	-	-	-
<i>S. hispida</i> Benth.	FOD	-	-	-
<i>Spermacoce</i> – 28/300				
<i>S. alata</i> Aubl.	FOD	-	-	-
<i>S. brachystemonoides</i> (Cham. & Schltdl.) Kuntze	FOM?	-	-	-
<i>S. bradei</i> (Standl.) Govaerts*	FOM, FCA	-	-	-
<i>S. brownii</i> Standl.	FOD	-	-	-
<i>S. capitata</i> Ruiz & Pav.	FOM	-	-	-
<i>S. casmae</i> Govaerts*	FOD	-	-	-
<i>S. cupularis</i> (DC.) Kuntze	RST	-	-	-
<i>S. dasycephala</i> (Cham. & Schltdl.) Delprete	FCA	-	-	-
<i>S. eryngioides</i> (Cham. & Schltdl.) Kuntze	FOM?, RST	-	-	-
<i>S. glabra</i> Michx.	FOD	-	-	-
<i>S. humifusa</i> Willd. ex Roem. & Schult.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. latifolia</i> Aubl.	FCA	-	-	-
<i>S. martirovettiana</i> (E.L.Cabral) Govaerts	RST	-	-	-
<i>S. noronhensis</i> (Sucre) Govaerts*	RST	-	-	-
<i>S. ocymifolia</i> Willd. ex Roem. & Schult.	FCA	-	-	-
<i>S. ocymoides</i> (Burm.f.) DC.	FOD	-	-	-
<i>S. palustris</i> (Cham. & Schltdl.) Delprete	FOD	-	-	-
<i>S. paranaensis</i> (E.L.Cabral & Bacigalupo) Delprete	FCA	-	-	-
<i>S. quadrifaria</i> (E.L.Cabral) Govaerts	?	-	-	-
<i>S. remota</i> Lam.	FOD	-	-	-
<i>S. schumanniana</i> (Taub. ex Ule) Govaerts	FOM	-	-	-
<i>S. schumannii</i> (Standl. ex Bacigalupo)	RST	-	-	-
<i>S. suaveolens</i> (G.Mey.) Kuntze	RST	-	-	-
<i>S. tenella</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>S. valens</i> (Standl.) Govaerts	FOM	-	-	-
<i>S. verticillata</i> L.	FOD	-	-	-
<i>S. warmingii</i> (K.Schum.) Kuntze	FCA	-	-	-
<i>S. weygartii</i> Govaerts*	FOM	-	-	-
<i>Sphinctanthus</i> – 1/8				
<i>S. insignis</i> Steyererm.*	FOD	-	-	-
<i>Stachyarrhena</i> – 2/13				
<i>S. harleyi</i> J.H.Kirkbr.	FOD	-	-	-
<i>S. reflexa</i> Standl.*	FES	-	-	-
<i>Staelia</i> – 2/15				
<i>S. galioides</i> DC.*	RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. virgata</i> (Link <i>ex</i> Roem. & Schult.) K.Schum.	FCA	-	-	-
<i>Standleya</i> * – 4/4				
<i>S. erecta</i> Brade*	FOM, FCA	-	-	-
<i>S. kuhlmannii</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>S. limae</i> Brade*	FOM	-	-	-
<i>S. prostrata</i> (K.Schum.) Brade*	FOM	-	-	-
<i>Tocoyena</i> – 4/24				
<i>T. brasiliensis</i> Mart.	FES	-	-	-
<i>T. bullata</i> (Vell.) Mart.	FES	-	-	-
<i>T. formosa</i> (Cham. & Schltdl.) K.Schum.	FOD, FES	-	-	-
<i>T. sellowiana</i> (Cham. & Schltdl.) K.Schum.*	FOD, FES	-	-	-

Ruppiaceae

Flávio Dayrell Gontijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
RUPPIACEAE – 1/15				
<i>Ruppia</i> – 1/15				
<i>R. maritima</i> L.	FAQ	-	-	-

Rutaceae

José Rubens Pirani

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
RUTACEAE – 92/1.815				
Almeidea – 5/5				
A. coerulea (Nees & Mart.) A.St.-Hil.*	FOD	-	EN	ANEXO I
A. lilacina A.St.-Hil.*	FOD, FES, RST	-	-	-
A. limae I.M.Silva*	FOD	-	-	-
A. longifolia A.St.-Hil.*	FOD, FES	-	-	-
A. rubra A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Andreadoxa* – 1/1				
A. flava Kallunki*	FOD	-	CR	ANEXO II
Angostura – 1/7				
A. bracteata (Nees & Mart.) Kallunki*	FOD	-	-	-
Balfourodendron – 1/2				
B. riedelianum (Engl.) Engl.*	FOD, FES	EN	-	-
Conchocarpus – 37/48				
C. adenantherus (Rizzini) Kallunki*	FOD	-	-	-
C. bellus Kallunki*	FOD	-	CR	ANEXO I
C. cauliflorus Pirani*	FOD	-	EN	ANEXO II
C. concinnus Kallunki*	RST	-	-	-
C. cuneifolius Nees & Mart.*	FOD, FES	-	-	-
C. cyrtanthus Kallunki*	FOD	-	-	-
C. dasyanthus Kallunki*	FOD	-	-	-
C. diadematus Pirani*	FOD, RST	-	-	-
C. elegans (A.St.-Hil.) Kallunki & Pirani*	FOD, RST	-	-	-
C. fissicalyx Pirani*	FOD	-	-	-
C. fontesianus (A.St.-Hil.) Kallunki & Pirani*	FOD, RST	-	-	-
C. furcatus Kallunki*	FOD	-	-	-
C. gaudichaudianus (A.St.-Hil.) Kallunki & Pirani*	FOD, FES	-	-	-
C. grandiflorus (Engl.) Kallunki & Pirani*	FOD	-	-	-
C. heterophyllus (A.St.-Hil.) Kallunki & Pirani	FOD, FES, RST	-	-	-
C. hirsutus Pirani*	RST	-	-	-
C. inopinatus Pirani*	FOD, FES	-	-	-
C. insignis Pirani*	RST	-	-	-
C. longifolius (A.St.-Hil.) Kallunki & Pirani	FOD, RST	-	-	-
C. longipes Kallunki*	FOD	-	-	-
C. macrocarpus (Engl.) Kallunki & Pirani*	FOD	-	-	-
C. macrophyllus J.C.Mikan*	FOD, FES	-	-	-
C. marginatus (Rizzini) Kallunki & Pirani*	FOD	-	-	-
C. mastigophorus Kallunki*	FOD	-	-	-
C. minutiflorus Groppo & Pirani*	FOD	-	-	-
C. modestus Kallunki*	FOD	-	-	-
C. obovatus (Nees & Mart.) Kallunki & Pirani*	FOD	-	-	-
C. odoratissimus (Lindl.) Kallunki & Pirani*	FOD, FES	-	-	-
C. oppositifolius Kallunki*	FES	-	-	-
C. ovatus (A.St.-Hil.) Kallunki & Pirani*	FOD	-	-	-
C. paniculatus (Engl.) Kallunki & Pirani*	FOD	-	-	-
C. pentandrus (A.St.-Hil.) Kallunki & Pirani	FES	-	-	-
C. punctatus Kallunki*	FES	-	-	-
C. racemosus (A.St.-Hil.) Kallunki & Pirani*	FES	-	-	-
C. santosii Pirani & Kallunki*	FOD	-	-	-
C. silvestris (Nees & Mart.) Kallunki & Pirani*	FOD	-	-	-
C. sordidus Kallunki*	FOD	-	-	-
Dictyoloma – 1/2				
D. vandellianum A.Juss.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Ertela – 2/2				
E. bahiensis (Engl.) Kuntze*	FOD, FES	-	-	-
E. trifolia (L.) Kuntze	FOD, FES	-	-	-
Erythrochiton – 1/6				
E. brasiliensis Nees & Mart.	FOD, FES	-	-	-
Esenbeckia – 6/29				
E. densiflora (Chodat & Hassl.) Hassl.*	FOD, FES	-	-	-
E. febrifuga (A.St.-Hil.) A.Juss. ex Mart.*	FOD, FES, RST	-	-	-
E. grandiflora Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
E. hieronymii Engl.*	FES	-	-	-
E. leiocarpa Engl.*	FOD, FES	VU	-	-
E. pilocarpoides Kunth	FOD, FES	-	-	-
Galipea – 4/15				
G. carinata Pirani*	FOD	-	EN	ANEXO II
G. jasminiflora (A.St.-Hil.) Engl.	FOD, FES	-	-	-
G. laxiflora Engl.*	FOD, RST	-	-	-
G. revoluta Pirani*	FOD, RST	-	-	-
Helietta – 1/8				
H. apiculata Benth.	FES	-	-	-
Hortia – 1/10				
H. brasiliana Vand. ex DC.	FOD, FES	-	-	-
Metrodorea – 3/5				
M. maracasana Kaastra*	FOD, RST	-	EN	ANEXO I
M. nigra A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-
M. stipularis Mart.	FES	-	-	-
Neoraputia – 5/6				
N. alba (Nees & Mart.) Emmerich*	FOD, FES	-	-	-
N. calliantha Kallunki*	FOD, FES	-	-	-
N. magnifica (Engl.) Emmerich*	FOD	-	-	-
N. micrantha Kallunki	FOD	-	-	-
N. trifoliata (Engl.) Emmerich*	FOD	-	-	-
Pilocarpus – 7/17				
P. giganteus Engl.*	FOD, FES, RST	-	-	-
P. grandiflorus Engl.*	FOD, RST	-	-	-
P. jaborandi Holmes*	FES	-	VU	ANEXO I
P. pauciflorus A.St.-Hil.*	FOD, FES, RST	-	-	-
P. pennatifolius Lem.	FOD, FOM, FES	-	-	-
P. riedelianus Engl.*	RST	-	-	-
P. spicatus A.St.-Hil.*	FOD, FES, RST	-	-	-
Rauia – 2/7				
R. nodosa (Engl.) Kallunki*	RST	-	-	-
R. resinosa Nees & Mart.	FOD, FES	-	-	-
Raulinoa* – 1/1				
R. echinata Cowan*	FES	-	EN	ANEXO I
Ravenia – 1/14				
R. infelix Vell.*	FOD, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>Spiranthera</i> – 1/4				
<i>S. atlantica</i> Pirani*	FOD	-	-	-
<i>Zanthoxylum</i> – 11/200				
<i>Z. acuminatum</i> (Sw.) Sw.	FOD, FES	-	-	-
<i>Z. caribaeum</i> Lam.	FOD, FES	-	-	-
<i>Z. fagara</i> (L.) Sarg.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Z. kleinii</i> (R.S.Cowan) P.G.Waterman*	FOM	-	-	-
<i>Z. monogynum</i> A.St.-Hil.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Z. nemorale</i> Mart.*	FOD	-	-	-
<i>Z. petiolare</i> A.St.-Hil. & Tul.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Z. retusum</i> (Albuq.) P.G.Waterman*	FOD	-	-	-
<i>Z. rhoifolium</i> Lam.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>Z. riedelianum</i> Engl.	FES	-	-	-
<i>Z. tingoassuiba</i> A.St.-Hil.	FOD, FES, RST	-	-	-

Sabiaceae

Julio Antonio Lombardi

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SABIACEAE – 3/3				
<i>Meliosma</i> – 3/> 50				
<i>M. chartacea</i> Lombardi*	FOD	-	-	-
<i>M. itatiaiae</i> Urb.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>M. sellowii</i> Urb.	FES, FOD, FOM	-	-	-

Salicaceae

Ronaldo Marquete

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SALICACEAE – 43/2.806				
Abatia – 4/21				
A. americana (Gardner) Eichler*	FOD	-	-	-
A. angeliana M.H.Alford	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. glabra Sleumer*	FOD	-	-	-
A. microphylla Taub.*	FOD	-	-	-
Azara – 1/30				
A. uruguayensis (Speg.) Sleumer	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Banara – 5/65				
B. brasiliensis (Schott) Benth.*	FOD	VU	-	-
B. guianensis Aubl.	FOD	-	-	-
B. parviflora (A.Gray) Benth.	FOD	-	-	-
B. serrata (Vell.) Warb.	FOD	-	-	-
B. tomentosa Clos	FOD	-	-	-
Casearia – 23/353				
C. aculeata Jacq.	FOD	-	-	-
C. arborea (L.C.Rich.) Urb.	FOD	-	-	-
C. bahiensis Sleumer*	FOD	-	-	-
C. catharinensis Sleumer*	FOD	-	-	-
C. commersoniana Cambess.	FOD	-	-	-
C. decandra Jacq.	FOD	-	-	-
C. eichleriana Sleumer	FCA	-	-	-
C. gossypiosperma Briq.	FOD	-	-	-
C. grandiflora Cambess.	FOD	-	-	-
C. guianensis (Aubl.) Urb.	FOD	-	-	-
C. javitensis Kunth	FCA	-	-	-
C. lasiophylla Eichler	FOD	-	-	-
C. luetzelburgii Sleumer	FOD	-	-	-
C. mariquitensis Kunth	FOD	-	-	-
C. melliodora Eichler	FOD	-	-	-
C. mestrensis Sleumer	FCA	-	-	-
C. obliqua Spreng.	FOD	-	-	-
C. oblongifolia Cambess.	FOD	-	-	-
C. paranaensis Sleumer*	FOD	-	-	-
C. pauciflora Cambess.	FOD	-	-	-
C. selloana Eichler	FOD	-	-	-
C. sessiliflora Cambess.*	FOD	-	-	-
C. sylvestris Sw.	FOD, FCA	-	-	-
Laetia – 1/32				
L. americana L.	FOD	-	-	-
Macrothumia* – 1/1				
M. kuhlmannii (Sleumer) M.H.Alford*	FOD	-	-	-
Prockia – 1/33				
P. crucis L.	FOD, FES	-	-	-
Salix – 1/2128				
S. humboldtiana Willd.	FCA	-	-	-
Xylosma – 6/142				
X. ciliatifolium (Clos) Eichler	FOD	-	-	-
X. glaberrimum Sleumer	FOD	-	-	-
X. prockia (Turcz.) Turcz.	FOD	-	-	-
X. pseudosalzmannii Sleumer	FOD	-	-	-
X. tweedianum (Clos) Eichler	FOD	-	-	-
X. venosum N.E.Br.	FOD	-	-	-

Santalaceae

Claudenir Simões Caires

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SANTALACEAE – 48/484				
<i>Acanthosyris</i> – 1/3				
<i>A. spinescens</i> (Mart. & Eichler) Griseb.	FOD	-	-	-
<i>Antidaphne</i> – 2/9				
<i>A. glaziovii</i> (Tiegh.) Kuijt*	FOD	-	-	-
<i>A. schottii</i> (Eichler) Kuijt*	FOD	-	-	-
<i>Arjona</i> – 1/8				
<i>A. megapotamica</i> Malme	AFL	-	-	-
<i>Dendrophthora</i> – 2/124				
<i>D. elliptica</i> (Gardn.) Krug & Urb.	FOD	-	-	-
<i>D. warmingii</i> (Eichler) Kuijt	FOD	-	-	-
<i>Eubrachion</i> – 1/2				
<i>E. ambiguum</i> (Hook. & Arn.) Engl.	FOD, FCA	-	-	-
<i>Jodina</i> – 1/1				
<i>J. rhombifolia</i> Hook. & Arn.	FOM	-	-	-
<i>Phoradendron</i> – 38/237				
<i>P. affine</i> (Pohl ex DC.) Engl. & K.Krause	FES	-	-	-
<i>P. bathyoryctum</i> Eichler	FES	-	-	-
<i>P. berteruanum</i> (DC.) Griseb.	FOD	-	-	-
<i>P. caripense</i> Eichler	FES, AFL	-	-	-
<i>P. chrysocladon</i> A.Gray	FES	-	-	-
<i>P. congestum</i> Trel.	FES	-	-	-
<i>P. coriaceum</i> Mart.	FES	-	-	-
<i>P. craspedophyllum</i> Eichler*	FOD	-	-	-
<i>P. crassifolium</i> (Pohl ex DC.) Eichler	FOD	-	-	-
<i>P. dipterum</i> Eichler	FOD, FES	-	-	-
<i>P. ensifolium</i> (Pohl ex DC.) Eichler	FOD	-	-	-
<i>P. falcifrons</i> (Hook. & Arn.) Eichler	FOD	-	-	-
<i>P. fragile</i> Urb.	FOD	-	-	-
<i>P. habrostachyum</i> Eichler	FOD	-	-	-
<i>P. hexastichum</i> (DC.) Griseb.	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. inaequidentatum</i> Rusby	FOD, FES	-	-	-
<i>P. interruptum</i> (DC.) B.D.Jack.	FOD	-	-	-
<i>P. liga</i> (Gill. ex Hook. & Arn.) Eichler	FOD, FED	-	-	-
<i>P. lindemanii</i> Kuijt	FES	-	-	-
<i>P. linearifolium</i> Eichler	FED	-	-	-
<i>P. microphyllum</i> (Pohl ex DC.) Trel.	FOD, FED	-	-	-
<i>P. mucronatum</i> (DC.) Krug & Urb.	FES, FOM	-	-	-
<i>P. nigricans</i> Rizzini	FED	-	-	-
<i>P. nitidum</i> (Gardn.) Eichler	FED	-	-	-
<i>P. obtusissimum</i> (Miq.) Eichler	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. pachyneuron</i> Kuijt	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. paraguari</i> Kuijt	FES	-	-	-
<i>P. pellucidulum</i> Eichler	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. perrottetii</i> (DC.) Eichler	FOD, FED	-	-	-
<i>P. piperoides</i> (Kunth) Trel.	FOD	-	-	-
<i>P. platycaulon</i> Eichler	FOD	-	-	-
<i>P. pteroneuron</i> Eichler	FOD	-	-	-
<i>P. quadrangulare</i> (Kunth) Griseb.	FES, FED	-	-	-
<i>P. racemosum</i> (Aubl.) Krug & Urb.	FOD, FOM	-	-	-
<i>P. reductum</i> Trel.	FES	-	-	-
<i>P. strongylocados</i> Eichler	FOD, FED	-	-	-
<i>P. tunaeforme</i> (DC.) Eichler	FOD	-	-	-
<i>P. undulatum</i> (Pohl ex DC.) Eichler	FOD, FES	-	-	-
<i>Thesium</i> – 2/100				
<i>T. aphyllum</i> Mart. ex A.DC.	FCA	-	-	-
<i>T. brasiliense</i> A.DC.	FCA, AFL	-	-	-

Sapindaceae

Genise Somner & María Silvia Ferrucci

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SAPINDACEAE – 164/1.021				
<i>Allophylus</i> – 15/217				
<i>A. chrysoneurus</i> Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>A. dioicus</i> (Nees & Mart.) Radlk.	FOD	-	-	-
<i>A. edulis</i> (A.St.-Hil. <i>et al.</i>) Radlk.	FES, FOD	-	-	-
<i>A. guaraniticus</i> (A.St.-Hil.) Radlk.	FOD, FES	-	-	-
<i>A. heterophyllus</i> (Cambess.) Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>A. laevigatus</i> (Turcz.) Radlk.	FOD	-	-	-
<i>A. leucoclados</i> Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>A. leucophloeus</i> Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>A. melanophloeus</i> Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>A. membranifolius</i> Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>A. petiolulatus</i> Radlk.	FES, FOD, RST	-	-	-
<i>A. puberulus</i> (Cambess.) Radlk.	FOD, RST	-	-	-
<i>A. quercifolius</i> (Mart.) Radlk.	FES	-	-	-
<i>A. semidentatus</i> (Miq.) Radlk.	FOD, FES	-	-	-
<i>A. sericeus</i> (Cambess.) Radlk.	FOD, FES	-	-	-
<i>Averrhoidium</i> – 1/4				
<i>A. paraguayense</i> Radlk.	FES	-	-	-
<i>Cardiospermum</i> – 5/14				
<i>C. corindum</i> L.	AFL, FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. grandiflorum</i> Sw.	FOD, FES	-	-	-
<i>C. halicacabum</i> L.	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>C. heringeri</i> Ferrucci*	FOD	-	-	-
<i>C. integerrimum</i> Radlk.*	FOD, FES	-	-	-
<i>Cupania</i> – 15/77				
<i>C. bracteosa</i> Radlk.	FOD, RST	-	-	-
<i>C. concolor</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>C. crassifolia</i> Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>C. emarginata</i> Cambess.	FOD, RST	-	-	-
<i>C. fluminensis</i> Acev.-Rodr.	FOD, RST	-	-	-
<i>C. furfuracea</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>C. impressinervia</i> Acev.-Rodr.	FOD	-	-	-
<i>C. ludowigii</i> Somner & Ferrucci	FOD, FES	-	-	-
<i>C. oblongifolia</i> Mart.	FOD, FES	-	-	-
<i>C. platycarpa</i> Radlk.	FOD, FES	-	-	-
<i>C. racemosa</i> (Vell.) Radlk.	FOD, FES	-	-	-
<i>C. schizoneura</i> Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>C. tenuivalvis</i> Radlk.	FOD, FES	-	-	-
<i>C. vernalis</i> Cambess.	FOD, FES	-	-	-
<i>C. zanthoxyloides</i> Cambess.	FOD, FES	-	-	-
<i>Diatenopteryx</i> – 1/2				
<i>D. sorbifolia</i> Radlk.	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>Dilodendron</i> – 1/3				
<i>D. bipinnatum</i> Radlk.	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>Dodonaea</i> – 1/68				
<i>D. viscosa</i> Jacq.	FES; RST	-	-	-
<i>Magonia</i> – 1/1				
<i>M. pubescens</i> A.St.-Hil.	FES	-	-	-
<i>Matayba</i> – 15/65				
<i>M. cristae</i> Reitz	FOD	-	-	-
<i>M. discolor</i> (Spreng.) Radlk.*	RST	-	-	-
<i>M. elaeagnoides</i> Radlk.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. grandis</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>M. guianensis</i> Aubl.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>M. intermedia</i> Radlk.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>M. juglandifolia</i> (Cambess.) Radlk.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. leucodictya</i> Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>M. marginata</i> Radlk.	FOD, FES	-	-	-
<i>M. mollis</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>M. pallens</i> Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>M. paucijuga</i> Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>M. stenodictya</i> Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>M. sylvatica</i> (Casar.) Radlk.	FOD	-	-	-
<i>M. talisioides</i> Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>Melicoccus</i> – 2/10				
<i>M. espiritosantensis</i> Acev.-Rodr.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>M. oliviformis</i> Kunth	FOD	-	-	-
<i>Paullinia</i> – 25/225				
<i>P. bicorniculata</i> Somner	FOD	-	-	-
<i>P. carpopoda</i> Cambess.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. castaneifolia</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>P. coriacea</i> Casar.	RST	-	-	-
<i>P. cristata</i> Radlk.	FOD, RST	-	-	-
<i>P. elegans</i> Cambess.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. ferruginea</i> Casar.	FOD, RST	-	-	-
<i>P. fusiformis</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>P. livescens</i> Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>P. marginata</i> Casar.*	FOD	-	-	-
<i>P. meliifolia</i> Radlk.	FOD, RST	-	-	-
<i>P. micrantha</i> Cambess.	FOD	-	-	-
<i>P. pinnata</i> L.	FOD	-	-	-
<i>P. racemosa</i> Wawra	FOD, RST	-	-	-
<i>P. revoluta</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>P. rhomboidea</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>P. rubiginosa</i> Cambess.	FOD	-	-	-
<i>P. seminuda</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>P. spicata</i> Benth.	FOD, FES	-	-	-
<i>P. ternata</i> Radlk.	RST	-	-	-
<i>P. thalictrifolia</i> A.Juss.	FOD	-	-	-
<i>P. trigonia</i> Vell.	FOD, RST	-	-	-
<i>P. uloptera</i> Radlk.	FOD, RST	-	-	-
<i>P. weinmanniifolia</i> Mart.	RST	-	-	-
<i>P. xestophylla</i> Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>Pseudima</i> – 1/3				
<i>P. frutescens</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>Sapindus</i> – 1/8				
<i>S. saponaria</i> L.	FOD, FES	-	-	-
<i>Scyphonychium</i> – 1/1				
<i>S. multiflorum</i> (Mart.) Radlk.	FOD	-	-	-
<i>Serjania</i> – 55/233				
<i>S. acoma</i> Radlk.	FES	-	-	-
<i>S. bradeana</i> Somner	FOD	-	-	-
<i>S. caracasana</i> (Jacq.) Willd.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. clematidifolia</i> Cambess.	FOD, RST	-	-	-
<i>S. comata</i> Radlk.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. communis</i> Cambess.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. confertiflora</i> Radlk.	FOD, RST	-	-	-
<i>S. corrugata</i> Radlk.	FOD, RST	-	-	-
<i>S. cuspidata</i> Cambess.	FOD, RST	-	-	-
<i>S. decemstriata</i> Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>S. deflexa</i> Gardner	FOD, FES	-	-	-
<i>S. dentata</i> (Vell.) Radlk.	FES; RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. divaricocca</i> Somner & Acev.-Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>S. dura</i> Radlk.*	RST	-	-	-
<i>S. elegans</i> Cambess.	FOD	-	-	-
<i>S. erecta</i> Radlk.	FCA	-	-	-
<i>S. erythrocaulis</i> Acev.-Rodr. & Somner*	FOD	-	-	-
<i>S. espiritosantensis</i> Somner*	FOD	-	-	-
<i>S. eucardia</i> Radlk.	FOD, RST	-	-	-
<i>S. faveolata</i> Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>S. fuscifolia</i> Radlk.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. glabrata</i> Kunth	FOD, FES	-	-	-
<i>S. glutinosa</i> Radlk.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. gracilis</i> Radlk.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. hatschbachii</i> Ferrucci*	FES	-	-	-
<i>S. hebecarpa</i> Benth.	FES	-	-	-
<i>S. ichtyoctona</i> Radlk.	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
<i>S. itatiaiensis</i> Somner*	FOD	-	-	-
<i>S. lamprophylla</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>S. lancistipula</i> Acev.-Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>S. laruoiteana</i> Cambess.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. lethalis</i> A.St.-Hil.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. macrostachya</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>S. magnistipulata</i> Acev.-Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>S. mansiana</i> Mart.	FES	-	-	-
<i>S. marginata</i> Casar.	FES	-	-	-
<i>S. meridionalis</i> Cambess.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. morii</i> Acev.-Rodr.*	FOD	-	-	-
<i>S. multiflora</i> Cambess.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. noxia</i> Cambess.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. obtusidentata</i> Radlk.	FES	-	-	-
<i>S. ovalifolia</i> Radlk.	FES	-	-	-
<i>S. oxytoma</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>S. paradoxa</i> Radlk.	FES	-	-	-
<i>S. paucidentata</i> DC.	FOD	-	-	-
<i>S. pernambucensis</i> Radlk.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>S. perulacea</i> Radlk.	FES	-	-	-
<i>S. pinnatifolia</i> Radlk.	FES	-	-	-
<i>S. piscatoria</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>S. platycarpa</i> Benth.	FES	-	-	-
<i>S. regnellii</i> Schtdl.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. reticulata</i> Cambess.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. salzmänniana</i> Schtdl.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>S. scopulifera</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>S. tenuis</i> Radlk.*	FOD, RST	-	-	-
Talisia – 5/52				
<i>T. angustifolia</i> Radlk.	FES	-	-	-
<i>T. cerasina</i> (Benth.) Radlk.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>T. coriacea</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>T. cupularis</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>T. esculenta</i> (Cambess.) Radlk.	FES, FED	-	-	-
<i>Thinouia</i> – 6/9				
<i>T. mucronata</i> Radlk.	FES	-	-	-
<i>T. paraguayensis</i> (Britton) Radlk.	FOD	-	-	-
<i>T. restingae</i> Ferrucci & Somner	FES; RST	-	-	-
<i>T. scandens</i> (Cambess.) Triana & Planch.	FOD, FES	-	-	-
<i>T. ternata</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>T. ventricosa</i> Radlk.	FES	-	-	-
<i>Toulícia</i> – 4/14				
<i>T. laevigata</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>T. stans</i> (Schott) Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>T. subsquamulata</i> Radlk.	FOD	-	-	-
<i>T. tomentosa</i> Radlk.	FES	-	-	-
<i>Tripterodendron</i> * – 1/1				
<i>T. filicifolium</i> (Linden) Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>Urvillea</i> – 9/17				
<i>U. glabra</i> Cambess.	RST	-	-	-
<i>U. intermedia</i> Radlk.*	FOD	-	-	-
<i>U. laevis</i> Radlk.	FOD, FES	-	-	-
<i>U. rufescens</i> Cambess.	FES; RST	-	-	-
<i>U. stipitata</i> Radlk.	FOD, RST	-	-	-
<i>U. stipularis</i> Ferrucci*	FOD	-	-	-
<i>U. triphylla</i> (Vell.) Radlk.	FOD	-	-	-
<i>U. ulmacea</i> Kunth	FOD, FES	-	-	-
<i>U. uniloba</i> Radlk.	FOD, FES	-	-	-

Sapotaceae

Eduardo Bezerra de Almeida Jr., Carmen Sílvia Zickel, Cláudia Elena Carneiro & Maria Helena Durães Alves Monteiro

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SAPOTACEAE – 65/325				
Chrysophyllum – 13/43				
C. flexuosum Mart.	RST, FOM, FOD	-	-	-
C. gonocarpum (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl.	FES	-	-	-
C. imperiale (Linden ex K.Koch & Fintelm.) Benth. & Hook.*	FES	EN	EN	ANEXO II
C. inornatum Mart.	FOD	-	-	-
C. januariense Eichler	RST	EX	-	-
C. lucentifolium Cronquist	FOD, RST	-	-	-
C. marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.	FES, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. paranaense</i> T.D.Penn.	FES	VU	-	-
<i>C. rufum</i> Mart.	FOD	-	-	-
<i>C. sparsiflorum</i> Klotzsch ex Miq.	FOD	-	-	-
<i>C. splendens</i> Spreng.	FOD	VU	-	-
<i>C. subspinosum</i> Monach.*	FOD	EN	-	-
<i>C. viride</i> Mart. & Eichler	FOD	-	-	-
<i>Diploon</i> – 1/1				
<i>D. cuspidatum</i> (Hoehne) Cronquist	FOD	-	-	-
<i>Ecclinusa</i> – 1/11				
<i>E. ramiflora</i> Mart.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>Manilkara</i> – 11/30				
<i>M. bella</i> Monach.*	FOD	EN	-	-
<i>M. dardanoi</i> Ducke*	FES	EN	EN	ANEXO II
<i>M. decrescens</i> T.D.Penn.*	RST	EN	-	-
<i>M. elata</i> (Allemão ex Miq.) Monach.*	FOD	EN	-	-
<i>M. longifolia</i> (A.DC.) Dubard*	FOD	EN	-	-
<i>M. maxima</i> T.D.Penn.*	RST	VU	-	-
<i>M. multifida</i> T.D.Penn.*	RST	EN	-	-
<i>M. rufula</i> (Miq.) Lam.	FOD, FED	-	-	-
<i>M. salzmännii</i> (A.DC.) Lam.	RST, FOD	-	-	-
<i>M. subsericea</i> (Mart.) Dubard*	FOD, RST	-	-	-
<i>M. triflora</i> (Allemão) Monach.*	RST	-	-	-
<i>Micropholis</i> – 6/38				
<i>M. compta</i> Pierre*	FOD	VU	-	-
<i>M. crassipedicellata</i> (Mart. & Eichler ex Miq.) Pierre*	FOD	-	-	-
<i>M. emarginata</i> T.D.Penn.*	AFL	EN	-	-
<i>M. gardneriana</i> (A.DC.) Pierre	FOD	-	-	-
<i>M. guyanensis</i> (A.DC.) Pierre	FOD	-	-	-
<i>M. venulosa</i> (Mart. & Eichler) Pierre	FOD	-	-	-
<i>Pouteria</i> – 27/179				
<i>P. andarahiensis</i> T.D.Penn.*	FOM, AFL	EN	-	-
<i>P. bangii</i> (Rusby) T.D.Penn.	FOD	-	-	-
<i>P. bapeba</i> T.D.Penn.*	FOD	VU	-	-
<i>P. beaurepairei</i> (Glaz. & Raunk.) Baehni	FOM, RST	-	-	-
<i>P. bullata</i> (S.Moore) Baehni*	FOD	VU	-	-
<i>P. butyrocarpa</i> (Kuhl.) T.D.Penn.*	FOD	EN	-	-
<i>P. caimito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	FOD, FOM, RST	-	-	-
<i>P. coelomatica</i> Rizzini*	FOM	EN	-	-
<i>P. filipes</i> Eyma	RST	-	-	-
<i>P. gardneri</i> (Mart. & Miq.) Baehni	FOM, FES, FCA, AFL	-	-	-
<i>P. gardneriana</i> (A.DC.) Radlk.	FOM	-	-	-
<i>P. glomerata</i> (Miq.) Radlk.	FOD	-	-	-
<i>P. grandiflora</i> (A.DC.) Baehni*	RST	-	-	-
<i>P. guianensis</i> Aubl.	FOD	-	-	-
<i>P. macahensis</i> T.D.Penn.*	FOM, RST	-	-	-
<i>P. macrophylla</i> (Pierre ex Dubard) Baehni	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>P. microstrigosa</i> T.D.Penn.*	FOD	VU	-	-
<i>P. oxypetala</i> T.D.Penn.*	FOD	EN	-	-
<i>P. pachycalyx</i> T.D.Penn.*	FOD	CR	-	-
<i>P. peduncularis</i> (Mart. & Eichler ex Miq.) Baehni*	FOD	-	-	-
<i>P. procera</i> (Mart.) T.D.Penn.	FOD	-	-	-
<i>P. psammophila</i> (Mart.) Radlk.*	FOD, FOM, RST	EN	-	-
<i>P. reticulata</i> (Engl.) Eyma	FOM, FES	-	-	-
<i>P. salicifolia</i> (Spreng.) Radlk.	FOD, FCA	-	-	-
<i>P. stenophylla</i> Baehni*	FOD	-	-	-
<i>P. torta</i> (Mart.) Radlk.	FOD, FOM, FCA	-	-	-
<i>P. venosa</i> (Mart.) Baehni	FOD, FOM, RST	-	-	-
Pradosia – 6/23				
<i>P. bahiensis</i> Texeira*	FOD	-	-	-
<i>P. brevipes</i> (Pierre) T.D.Penn.	FOD	-	-	-
<i>P. glaziovii</i> (Pierre) T.D.Penn.*	FOD	EX	-	-
<i>P. kuhlmannii</i> Toledo	FOD	EN	-	-
<i>P. lactescens</i> (Vell.) Radlk.	FOD	-	-	-
<i>P. verrucosa</i> (Vell.) Radlk.	FES	CR	-	-

Schlegeliaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SCHLEGELIACEAE – 1/ca. 30				
<i>Schlegelia</i> – 1/10				
<i>S. parviflora</i> (Oerst.) Monach.	FOD	-	-	-

Schoepfiaceae

Milton Groppo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SCHOEPFIACEAE – 1/50				
<i>Schoepfia</i> – 1/23				
<i>S. brasiliensis</i> A.DC.	FES, FOD, FOM	-	-	-

Scrophulariaceae

Vinícius Castro Souza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SCROPHULARIACEAE – 12/100				
Buddleja – 12/100				
B. brachiata Cham. & Schltdl.	FOD, FES	-	-	-
B. cestriflora Cham.*	FOM, FCA	-	-	-
B. cuneata Cham.*	FCA	-	-	-
B. elegans Cham. & Schltdl.	FOD, FOM, FCA	-	-	-
B. grandiflora Cham. & Schltdl.	FCA	-	-	-
B. hatschbachii E.M.Norman & L.B.Sm.*	FCA	-	-	-
B. kleinii E.M.Norman & L.B.Sm.*	FOM	-	-	-
B. longiflora Brade*	FCA	-	EN	ANEXO II
B. oblonga Benth.*	FOM	-	-	-
B. ramboi L.B.Sm.*	FCA	-	-	-
B. speciosissima Taub.*	FCA	-	EN	ANEXO I
B. stachyoides Cham. & Schltdl.	FES, FOD, FOM, FCA	-	-	-

Simaroubaceae

José Rubens Pirani

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SIMAROUBACEAE – 11/56				
<i>Castela</i> – 1/15				
<i>C. twedii</i> Planch.	FES, FED	-	-	-
<i>Picrasma</i> – 1/9				
<i>P. crenata</i> (Vell.) Engl.*	FOD, FED, FES, RST	-	-	-
<i>Simaba</i> – 8/26				
<i>S. cedron</i> Planch.	RST	-	-	-
<i>S. cuneata</i> A.St.-Hil. & Tul.*	FOD, RST	-	-	-
<i>S. docensis</i> Franceschinelli & K.Yamam.*	FES	-	-	-
<i>S. ferruginea</i> A.St.-Hil.	FOD, RST	-	-	-
<i>S. guianensis</i> Aubl.	FOD	-	-	-
<i>S. insignis</i> A.St.-Hil. & Tul.*	FOD, RST	-	-	-
<i>S. subcymosa</i> A.St.-Hil. & Tul.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. trichilioides</i> A.St.-Hil.	RST	-	-	-
<i>Simarouba</i> – 1/6				
<i>S. amara</i> Aubl.	FOD, RST	-	-	-

Siparunaceae

Ariane Luna Peixoto

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SIPARUNACEAE – 7/53-60				
<i>Siparuna</i> –7/53-60				
<i>S. bifida</i> (Poepp. & Endl.) A.DC.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. brasiliensis</i> (Spreng.) A.DC.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. cymosa</i> Tolm.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. glycyarpa</i> (Ducke) Renner & Haussner	FOD	-	-	-
<i>S. guianensis</i> Aubl.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. poeppigii</i> (Tul.) A.DC.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. reginae</i> (Tul.) A.DC.	FOD, FES	-	-	-

Smilacaceae

Regina Helena Potsch Andreato

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SMILACACEAE – 20/300				
<i>Smilax</i> – 20/300				
<i>S. campestris</i> Griseb.	FOD, RST	-	-	-
<i>S. cissoides</i> Mart. ex Griseb.	FOD	-	-	-
<i>S. cognata</i> Kunth	FOD, RST	-	-	-
<i>S. elastica</i> Griseb.	FOD, RST, FCA	-	-	-
<i>S. fluminensis</i> Steud.	FOD	-	-	-
<i>S. hilariana</i> A.DC.	RST	-	-	-
<i>S. japicanga</i> Griseb.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>S. lappacea</i> Willd.	FOD	-	-	-
<i>S. larvata</i> Griseb.	FOD	-	-	-
<i>S. lutescens</i> Vell.*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>S. muscosa</i> Toledo*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>S. pilosa</i> Andreato & Leoni*	FES, FCA	-	-	-
<i>S. quinquenervia</i> Vell.	FOD, RST	-	-	-
<i>S. remotinervis</i> Hand.-Mazz.*	FOD	-	-	-
<i>S. salicifolia</i> Griseb.*	FOD	-	-	-
<i>S. spicata</i> Vell.*	FOD	-	-	-
<i>S. staminea</i> Griseb.	FOD	-	-	-
<i>S. stenophylla</i> A.DC.*	FOD	-	-	-
<i>S. subsessiliflora</i> Duhamel*	FOD	-	-	-
<i>S. syphilitica</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	FOD	-	-	-

Solanaceae

João Renato Stehmann

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SOLANACEAE – 297/ca.2.400				
Acnistus – 1/1				
A. arborescens (L.) Schltndl.	FOD, FES	-	-	-
Athenaea* – 7/7				
A. anonacea Sendtn.*	FOD	-	-	-
A. cuspidata Witasek*	FOD	-	-	-
A. martiana Sendtn.*	FOD, FES	-	-	-
A. micrantha Sendtn.*	FOD	-	-	-
A. pereirae Barboza & Hunz.*	FOD, FES, FCA	-	-	-
A. picta (Mart.) Sendtn.*	FOD, FES	-	-	-
A. pogogena (Moric.) Sendtn.*	FOD	-	-	-
Aureliana – 8/8				
A. angustifolia R.C.Almeida-Lafetá*	FOD, FES	-	-	-
A. brasiliana (Hunz.) Barboza & Hunz.*	FOD	-	-	-
A. darcyi Carvalho & Bovini*	FOD	-	-	-
A. fasciculata (Vell.) Sendtn.	FOD, FES	-	-	-
A. glomuliflora Sendtn.*	FOD	-	-	-
A. tomentosa Sendtn.*	FOD	-	-	-
A. velutina Sendtn.*	FES	-	-	-
A. wettsteineana (Witasek) Hunz. & Barboza*	FOD, FOM	-	-	-
Browallia – 1/6				
B. americana L.	FOD, FCA	-	-	-
Brugmansia – 1/6				
B. suaveolens (Willd.) Bercht. & C. Presl	FOD, FES, RUD	-	-	-
Brunfelsia – 12/46				
B. australis Benth.	FOD, FES	-	-	-
B. bonodora (Vell.) J.F.Macbr.*	FOD	-	-	-
B. brasiliensis (Spreng.) L.B.Sm. & Downs	FOD, FES	-	-	-
B. clandestina Plowman*	FOD	-	-	-
B. cuneifolia J.A.Schmidt*	FOD, FOM	-	-	-
B. hydrangeiformis (Pohl) Benth.*	FOD, FES	-	-	-
B. latifolia (Pohl) Benth.*	RST	-	-	-
B. martiana Plowman	FOD	-	-	-
B. obovata Benth.	FOD	-	-	-
B. pauciflora (Cham. & Schltndl.) Benth.*	FOD, FES	-	-	-
B. pilosa Plowman*	FOD, FOM, FED	-	-	-
B. uniflora (Pohl) D.Don	FOD, FES	-	-	-
Calibrachoa – 15/25				
C. caesia (Sendtn.) Wijsman*	FOM, FCA	-	-	-
C. cordifolia Stehmann & L.Aguiar*	FCA	-	-	-
C. dusenii (R.E.Fr.) Stehmann & Semir*	FCA	-	-	-
C. eglandulata Stehmann & Semir*	FOM, FCA, AFL	-	VU	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. ericifolia</i> (R.E.Fr.) Wijsman*	FCA	-	-	-
<i>C. excellens</i> (R.E.Fr.) Wijsman	FCA	-	-	-
<i>C. heterophylla</i> (Sendtn.) Wijsman	RST	-	-	-
<i>C. linoide</i> s (Sendtn.) Wijsman*	FCA	-	-	-
<i>C. micrantha</i> (R.E.Fr.) Stehmann & Semir*	FCA	-	-	-
<i>C. missionica</i> Stehmann & Semir*	FED	-	-	-
<i>C. paranensis</i> (Dusén) Wijsman*	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. sellowiana</i> (Sendtn.) Wijsman*	FCA, AFL	-	-	-
<i>C. sendtneriana</i> (R.E.Fr.) Stehmann & Semir*	FCA	-	-	-
<i>C. serrulata</i> (L.B.Sm. & Downs) Stehmann & Semir*	AFL	-	VU	ANEXO II
<i>C. spathulata</i> (L.B.Sm. & Downs) Stehmann & Semir*	FCA, AFL	-	-	-
<i>Capsicum</i> – 12/20				
<i>C. baccatum</i> L.	FES, FED	-	-	-
<i>C. campylopodium</i> Sendtn.*	FOD	-	-	-
<i>C. cornutum</i> (Hiern) Hunz.*	FOD	-	-	-
<i>C. flexuosum</i> Sendtn.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>C. friburgense</i> Barboza & Bianchetti*	FOD	-	-	-
<i>C. hunzikerianum</i> Barboza & Bianchetti*	FOD	-	-	-
<i>C. mirabile</i> Mart.*	FOD	-	-	-
<i>C. parvifolium</i> Sendtn.	FED	-	-	-
<i>C. pereirae</i> Barboza & Bianchetti*	FOD	-	-	-
<i>C. recurvatum</i> Witassek*	FOD	-	-	-
<i>C. schottianum</i> Sendtn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. villosum</i> Sendtn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Cestrum</i> – 20/150				
<i>C. axillare</i> Vell.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>C. bracteatum</i> Link & Otto*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. corcovadense</i> Miers*	FOD	-	-	-
<i>C. corymbosum</i> Schltldl.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>C. euanthes</i> Schltldl.	FOM, FED	-	-	-
<i>C. gardneri</i> Sendtn.	FES, FED	-	-	-
<i>C. intermedium</i> Sendtn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>C. mariquitense</i> Kunth	FOD, FES	-	-	-
<i>C. martii</i> Sendtn.	FED	-	-	-
<i>C. pauciflorum</i> Spreng.*	FOD	-	-	-
<i>C. pedicellatum</i> Sendtn.	FES	-	-	-
<i>C. reflexum</i> Sendtn.	FOD	-	-	-
<i>C. retrofractum</i> Dunal	FOD, FES	-	-	-
<i>C. salzmännii</i> Dunal*	FOD, FES, FED, RST	-	-	-
<i>C. schlehtendalii</i> G.Don	FOD, FES	-	-	-
<i>C. strictum</i> Schott	FOD	-	-	-
<i>C. strigilatum</i> Ruiz & Pav.	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>C. subpulverulentum</i> Mart.*	FOD	-	-	-
<i>C. tenuifolium</i> Francey*	FOD, FES	-	-	-
<i>C. viminale</i> Sendtn.*	FOD	-	-	-
<i>Datura</i> – 1/11				
<i>Datura stramonium</i> L.	RUD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
Dysochroma* – 2/2				
D. longipes (Sendtn.) Miers*	FOD, FOM, RST	-	-	-
D. viridiflorum (Sims) Miers*	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
Heteranthia* – 1/1				
H. decipiens Nees & Mart.*	FOD, FES	-	-	-
Lycianthes – 3/150				
L. pauciflora (Vahl) Bitter	FOD, FES, FED	-	-	-
L. rantonnei (Carrière) Bitter	FES, FED	-	-	-
L. repens (Spreng.) Bitter	FOD, FES	-	-	-
Lycium – 1/80				
L. glomeratum Sendtn.	FES	-	-	-
Melananthus – 2/5				
M. cubensis Urb.	FED	-	-	-
M. fasciculatus (Benth.) Soler.*	FOD	-	-	-
Metternichia – 1/1				
M. principis J.G. Mikan	FOD, FES, FED	-	-	-
Nicotiana – 7/67				
N. alata Link & Otto	FOD, FED, FOM, FCA, AFL	-	-	-
N. azambujae L.B.Sm. & Downs*	FOD	-	-	-
N. bonariensis Lehm.	FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST, AFL	-	-	-
N. forgetiana Hemsl.*	FOD, FOM	-	-	-
N. langsdorffii Weinm.	FOD, FOM, FES	-	-	-
N. longiflora Cav.	FCA, RST	-	-	-
N. mutabilis Stehmann & Semir*	FOD	-	EN	ANEXO I
Nierembergia – 4/20				
N. hatschbachii A.A.Cocucci & Hunz.	FCA	-	-	-
N. micrantha Cabrera	FCA	-	-	-
N. repens L.	FCA, FAQ	-	-	-
N. scoparia Sendtn.	FCA	-	-	-
Petunia – 9/14				
P. altiplana T.Ando & Hashim.*	FOM, FCA	-	-	-
P. bonjardinensis T.Ando & Hashim.*	FOM, FCA	-	EN	ANEXO II
P. inflata R.E.Fr.	FED, FCA	-	-	-
P. interior T.Ando & Hashim.	FED, FCA	-	-	-
P. integrifolia (Hook.) Schinz & Thell.	FCA, RST	-	-	-
P. mantiqueirensis T.Ando & Hashim.*	FOD, FOM, FCA	-	VU	ANEXO II
P. reitzii L.B.Sm. & Downs*	FOM, FCA	-	CR	ANEXO I
P. saxicola L.B.Sm. & Downs*	AFL	-	CR	ANEXO I
P. scheideana L.B.Sm. & Downs*	FOM, FCA	-	-	-
Physalis – 5/90				
P. angulata L.	FES, RUD	-	-	-
P. cordata Mill.	FES, RUD	-	-	-
P. peruviana L.	FOD, RUD	-	-	-
P. pubescens L.	FOD, FES, FED, RUD	-	-	-
P. viscosa L.	FOD, RUD	-	-	-
Schwenckia – 8/25				
S. americana L.	RUD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. curviflora</i> Benth.	FOD, FES, FOM, FAQ	-	-	-
<i>S. juncoides</i> Chodat	FES	-	-	-
<i>S. lateriflora</i> (Vahl) Carvalho	FOD, RST	-	EN	ANEXO I
<i>S. mollissima</i> Nees & Mart.	FES	-	-	-
<i>S. novaveneciana</i> Carvalho*	FOD, FES	-	EN	ANEXO I
<i>S. paniculata</i> (Raddi) Carvalho	FOD	-	-	-
<i>S. volubilis</i> Benth.	FOD, FES	-	-	-
<i>Sessea</i> – 3/38				
<i>S. brasiliensis</i> Toledo*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. regnellii</i> Taub.*	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>S. vestioides</i> (Schltdl.) Hunz.	FES, FED	-	-	-
<i>Solandra</i> – 1/10				
<i>S. grandiflora</i> Sw.	FOD, FES, FED, AFL	-	-	-
<i>Solanum</i> – 171/1.500				
<i>S. acerifolium</i> Dunal	FOD, FES	-	-	-
<i>S. aculeatissimum</i> Jacq.	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. adscendens</i> Sendtn.	FES, FED	-	-	-
<i>S. adpersum</i> Witasek*	FOD, RST	-	-	-
<i>S. affine</i> Sendtn.*	FOD	-	-	-
<i>S. agrarium</i> Sendtn.	FED, RST	-	-	-
<i>S. alatirameum</i> Bitter*	FOD	-	-	-
<i>S. alternatopinnatum</i> Steud.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>S. americanum</i> Mill.	RUD	-	-	-
<i>S. amygdalifolium</i> Steud.	FAQ	-	-	-
<i>S. anoacanthum</i> Sendtn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. aparadense</i> L.A.Mentz & Nee*	FOM	-	-	-
<i>S. apiahyense</i> Witasek*	FOD	-	-	-
<i>S. arenarium</i> Sendtn.*	FOD, RST	-	VU	ANEXO I
<i>S. argenteum</i> Dunal*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>S. asperum</i> Rich.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. asterophorum</i> Mart.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. atropurpureum</i> Schrank	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>S. bahianum</i> S.Knapp*	FOD	-	CR	ANEXO I
<i>S. bistellatum</i> L.B.Sm. & Downs*	FOD, FOM, FCA	-	-	-
<i>S. bullatum</i> Vell.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. caavurana</i> Vell.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>S. caldense</i> Carvalho*	FES	-	-	-
<i>S. calvescens</i> Bitter*	FES	-	-	-
<i>S. campaniforme</i> Roem. & Schult.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. capsicoides</i> All.	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>S. carautae</i> Carvalho*	FOD, RST	-	-	-
<i>S. cassioides</i> L.B.Sm. & Downs*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. castaneum</i> Carvalho*	FOD	-	-	-
<i>S. cernuum</i> Vell.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. chacoense</i> Bitter	FOM, FES	-	-	-
<i>S. cinnamomeum</i> Sendtn.*	FOD, FES, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. cladotrichum</i> Dunal*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. commersonii</i> Dunal	FOD, FED, FCA	-	-	-
<i>S. compressum</i> L.B.Sm. & Downs*	FOM, FED	-	-	-
<i>S. concinnum</i> Schott ex Sendtn.*	FOD, FES, FOM, RST	-	-	-
<i>S. cordifolium</i> Dunal*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. cordioides</i> S.Knapp*	FOD, RST	-	-	-
<i>S. corumbense</i> S.Moore	FES	-	-	-
<i>S. corymbiflorum</i> (Sendtn.) Bohs*	FOM	-	-	-
<i>S. crinitum</i> Lam.	FOD	-	-	-
<i>S. decompositiflorum</i> Sendtn.	FES	-	-	-
<i>S. decorum</i> Sendtn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. delicatulum</i> L.B.Sm. & Downs*	FOD	-	-	-
<i>S. depauperatum</i> Dunal*	FOD	-	-	-
<i>S. didymum</i> Dunal	FOM, FOD, FES	-	-	-
<i>S. diploconos</i> (Mart.) Bohs*	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>S. echidnaeforme</i> Dunal*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. enantiophyllum</i> Bitter*	FOD, FCA	-	-	-
<i>S. evonymoides</i> Sendtn.*	FOD	-	-	-
<i>S. flaccidum</i> Vell.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. flagellare</i> Sendtn.*	RST	-	-	-
<i>S. fusiforme</i> L.B.Sm. & Downs*	FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. gardneri</i> Sendtn.	FES, FED	-	-	-
<i>S. gertii</i> S.Knapp*	FOD	-	-	-
<i>S. glaucophyllum</i> Desf.	FOM, FCA, RST	-	-	-
<i>S. glomuliflorum</i> Sendtn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. gnaphalocarpon</i> Vell.*	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>S. granulosoleprosum</i> Dunal	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. graveolens</i> Bunbury*	FOD, FES	-	EN	ANEXO II
<i>S. guaraniticum</i> A.St.-Hil.*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. hasslerianum</i> Chodat	FOM, FED, FCA	-	-	-
<i>S. hexandrum</i> Vell.*	FOD	-	-	-
<i>S. hirtellum</i> (Spreng.) Hassl.*	FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. hoehnei</i> C.V.Morton*	FOD	-	-	-
<i>S. incarcerationum</i> Ruiz & Pav.	FES	-	-	-
<i>S. inodorum</i> Vell.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. inornatum</i> Witasek*	FOD	-	-	-
<i>S. insidiosum</i> Mart.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. intermedium</i> Sendtn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. ipomoea</i> Sendtn.	FES	-	-	-
<i>S. iraniense</i> L.B.Sm. & Downs*	FOM, FED	-	-	-
<i>S. itatiaiae</i> Dusén*	FOD, FCA	-	-	-
<i>S. jabrense</i> Agra & M.Nee*	FOD	-	EN	ANEXO II
<i>S. jamaicense</i> Mill.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. jasminifolium</i> Sendtn.	FES, FED	-	-	-
<i>S. johannae</i> Bitter*	FOM, FED	-	-	-
<i>S. jussiae</i> Dunal*	FOD, FES, RST	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. kleinii</i> L.B.Sm. & Downs*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. lacerdae</i> Dusén*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. lacteum</i> Vell.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. lantana</i> Sendtn.*	FOD	-	-	-
<i>S. latiflorum</i> Bohs*	FOD	-	-	-
<i>S. laxum</i> Spreng.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. leptostachys</i> Dunal*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. leucocarpon</i> Dunal	FOD	-	-	-
<i>S. leucodendron</i> Sendtn.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. lhotskianum</i> Dunal*	FOD	-	-	-
<i>S. luridifuscescens</i> Bitter	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>S. lycocarpum</i> A.St.-Hil.	FES, FCA	-	-	-
<i>S. maranguapense</i> Bitter*	FOD	-	-	-
<i>S. martii</i> Sendtn.*	FOD	-	-	-
<i>S. matadori</i> L.B.Sm. & Downs*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. mauritianum</i> Scop.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. megalochiton</i> Mart.*	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>S. melissarum</i> Bohs*	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>S. murinum</i> Sendtn.*	FOD	-	-	-
<i>S. nigrescens</i> M.Martens & Galeotti	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. odoriferum</i> Vell.	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. oliveirae</i> Carvalho*	FOD	-	-	-
<i>S. oocarpum</i> Sendtn.	FES	-	-	-
<i>S. pabstii</i> L.B.Sm. & Downs*	FOM, FED	-	-	-
<i>S. pachimatium</i> Dunal*	FOD	-	-	-
<i>S. palinacanthum</i> Dunal	FOD, FES, FOM, FCA	-	-	-
<i>S. paludosum</i> Moric.	FOD, RST	-	-	-
<i>S. paniculatum</i> L.	FOD, FES, FOM, FCA, RST	-	-	-
<i>S. paraibanum</i> Agra*	RST	-	-	-
<i>S. paralum</i> Bohs*	FOD, RST	EN	-	-
<i>S. paranense</i> Dusén*	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>S. pauciflorum</i> Sendtn.	FED	-	-	-
<i>S. pelagicum</i> Bohs*	FOD, RST	-	-	-
<i>S. pensile</i> Sendtn.	FES	-	-	-
<i>S. pereirae</i> Carvalho*	FOD	-	-	-
<i>S. piluliferum</i> Dunal*	FOD	-	-	-
<i>S. pinetorum</i> (L.B.Sm. & Downs) Bohs*	FOM	-	-	-
<i>S. platense</i> Dieckm.	FED, FCA, RST	-	-	-
<i>S. polytrichum</i> Moric.	FOD	-	-	-
<i>S. premnifolium</i> (Miers) Bohs*	FOD	-	-	-
<i>S. pseudocapsicum</i> L.	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>S. pseudodaphnopsis</i> L.A.Mentz & Stehmann*	RST	-	-	-
<i>S. pseudoquina</i> A.St.-Hil.	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>S. pycnanthemum</i> Mart.*	FES	-	-	-
<i>S. ramulosum</i> Sendtn.*	FOM, FED	-	-	-
<i>S. reflexiflorum</i> Moric.*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. reflexum</i> Schrank*	FOD, FOM, FCA	-	-	-
<i>S. reineckii</i> Briq.	RST, AFL	-	-	-
<i>S. reitzii</i> L.B.Sm. & Downs*	FOD, FOM, FED	-	-	-
<i>S. reptans</i> Bunbury*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. restingae</i> S.Knapp*	FOD, RST	-	EN	ANEXO II
<i>S. robustum</i> H.L.Wendl.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. rufescens</i> Sendtn.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>S. rugosum</i> Dunal	FOD, FES, FED	-	-	-
<i>S. rupicola</i> Sendtn.*	FOD	-	-	-
<i>S. saldanhaei</i> Glaz.	FES	-	-	-
<i>S. sambuciflorum</i> Sendtn.*	FOD	-	-	-
<i>S. sanctaechatharinae</i> Dunal	FOD, FOM, FES, FED, RST	-	-	-
<i>S. santosii</i> S.Knapp*	FOD	-	VU	ANEXO II
<i>S. schizandrum</i> Sendtn.*	FOD	-	-	-
<i>S. schlechtendalium</i> Walp.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. schwackei</i> Glaz.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>S. sciadostylis</i> (Sendtn.) Bohs*	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>S. scuticum</i> M.Nee	FES	-	-	-
<i>S. sellowianum</i> Sendtn.*	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>S. sellowii</i> Dunal*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>S. setosissimum</i> Bitter ex L.A.Mentz & M.Nee*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. sisymbriifolium</i> Lam.	FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST, AFL	-	-	-
<i>S. sooretamum</i> Carvalho*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. spissifolium</i> Sendtn.*	FOD	-	EX	ANEXO I
<i>S. stagnale</i> Moric.*	RST	-	-	-
<i>S. stipulaceum</i> Willd. ex Roem. & Schult.	FOD, FES, FED, FCA, RST	-	-	-
<i>S. stipulatum</i> Vell.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. stramoniifolium</i> Jacq.	FOD	-	-	-
<i>S. subhastatum</i> L.B.Sm. & Downs*	FOM	-	-	-
<i>S. sublentum</i> Hiern	FOD, FES	-	-	-
<i>S. subsylvestris</i> L.B.Sm. & Downs*	FOM	-	-	-
<i>S. subumbellatum</i> Vell.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. swartzianum</i> Roem. & Schult.	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>S. sycocarpum</i> Mart. & Sendtn.*	RST	EN	-	-
<i>S. symmetricum</i> Rusby	FOD, FES	-	-	-
<i>S. tetricum</i> Dunal*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. thomasiifolium</i> Sendtn.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. torvum</i> Sw.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. trachytrichium</i> Bitter*	FOD, FOM, FES, FED	-	-	-
<i>S. vaillantii</i> Dunal*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>S. variabile</i> Mart.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>S. velleum</i> Thunb.*	FES	-	-	-
<i>S. vellozianum</i> Dunal*	FOD	-	-	-
<i>S. viarum</i> Dunal	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
<i>S. viscosissimum</i> Sendtn.*	FOM	-	-	-
<i>S. wacketii</i> Witasek*	FOD, FOM	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>S. warmingii</i> Hiern*	FOD, FES	-	-	-
<i>Vassobia</i> – 1/2		-		
<i>V. breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	FOD, FOM, FED	-	-	-

Sphenocleaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SPHENOCLEACEAE – 1/2				
<i>Sphenoclea</i> – 1/2				
<i>S. zeylanica</i> Gaertn.	FOD, FAQ	-	-	-

Stemonuraceae

Flávio Dayrell Gontijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
STEMONURACEAE – 1/80				
<i>Discophora</i> – 1/4				
<i>D. guianensis</i> Miers	FED, FOD, FOM	-	-	-

Styracaceae

Milton Groppo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
STYRACACEAE – 3/160				
<i>Styrax</i> – 3/120				
<i>S. ambiguum</i> Seub.	FOD	-	-	-
<i>S. glabratus</i> Schott	FOD	-	-	-
<i>S. leprosus</i> Hook. & Arn.	FOD, FOM	-	-	-

Surianaceae

Márcio de Souza Werneck

ESPÉCIE		VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
			IUCN	Biodiversitas	MMA
SURIANACEAE – 1/8					
Suriana – 1/1					
S. maritima L.		RST	-	-	-

Symplocaceae

João Luiz Mazza Aranha Filho & Leonardo Dias Meireles

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
SYMPLOCACEAE – 28/320				
<i>Symplocos</i> – 28/318				
<i>S. altissima</i> Brand*	FOD	-	EX	ANEXO I
<i>S. angulata</i> Brand*	AFL	-	-	-
<i>S. bidana</i> Aranha*	FOD, FCA	-	-	-
<i>S. celastrinea</i> Mart.*	FOD, FES	-	-	-
<i>S. corymboclados</i> Brand*	FOD, FCA	-	CR	ANEXO II
<i>S. falcata</i> Brand*	FOD, FOM, FCA	-	-	-
<i>S. glandulosomarginata</i> Hoehne*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>S. glaziovii</i> Brand*	FOD	-	-	-
<i>S. incrassata</i> Aranha*	FOD, FCA	-	-	-
<i>S. insignis</i> Brand*	FOD	-	-	-
<i>S. itatiaiae</i> Wawra*	FOD, FCA	-	-	-
<i>S. lanceolata</i> A.DC.	FOM, FES	-	-	-
<i>S. laxiflora</i> Benth.*	FOD, RST	-	-	-
<i>S. microstyla</i> Aranha <i>et al.</i> *	AFL	-	-	-
<i>S. mosenii</i> Brand	FOD, FES	-	-	-
<i>S. neglecta</i> Brand*	FOD	-	EX	ANEXO I
<i>S. nitens</i> (Pohl) Benth.	FES	-	-	-
<i>S. nitidiflora</i> Brand*	FOD	-	-	-
<i>S. organensis</i> Brand*	FOD, FCA	-	EN	ANEXO II
<i>S. platyphylla</i> (Pohl) Benth.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. pubescens</i> Klotzsch <i>ex</i> Benth.	FOD, FES	-	-	-
<i>S. pycnobotrya</i> Mart. <i>ex</i> Miq.*	FOD	-	-	-
<i>S. rizzinii</i> Occhioni*	FOD	-	-	-
<i>S. tenuifolia</i> Brand	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>S. tetrandra</i> Mart.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. trachycarpus</i> Brand*	FOD	-	-	-
<i>S. uniflora</i> (Pohl) Benth.	FOD, FOM	-	-	-
<i>S. variabilis</i> Mart. <i>ex</i> Miq.*	FOD	-	-	-

Theaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
THEACEAE – 4/200				
Laplacea – 4/15-20				
L. acutifolia (Wawra) Kobuski*	FOD	-	-	-
L. fruticosa (Schrad.) Kobuski	FOD	-	-	-
L. obovata (Wawra) Kobuski*	FCA, FOD	-	-	-
L. tomentosa (Mart. & Zucc.) G.Don*	FCA, FOD	-	-	-

Theophrastaceae

Flávio Dayrell Gontijo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
THEOPHRASTACEAE – 9/108				
Clavija – 6/50				
C. caloneura Mart.*	FOD	-	-	-
C. integrifolia Mart. & Miq.	FED, FOD, FES	-	-	-
C. macrophylla (Link ex Roem. & Schult.) Miq.	FOD	-	-	-
C. nutans (Vell.) B.Stahl	FES	-	-	-
C. schwackeana Mez*	FES	-	-	-
C. spinosa (Vell.) Mez*	FOD	-	-	-
Jacquinia – 1/23				
J. armillaris Jacq.*	FOD, RST	-	-	-
Samolus – 2/35				
S. subnudicaulis A.St.-Hil.*	FOM	-	-	-
S. valerandi L.*	FOM	-	-	-

Thismiaceae

Paul J. M. Maas & Hiltje Maas - van de Kamer

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
THISMIACEAE – 8/32				
<i>Thismia</i> – 8/14				
<i>T. caudata</i> H.Maas & Maas*	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>T. espirito-santensis</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>T. fungiformis</i> (Taub. ex Warm.) H.Maas & Maas*	FOD	-	-	-
<i>T. glaziovii</i> Poulsen	FOD	-	-	-
<i>T. hyalina</i> (Miers) F. Müll.	FOD	-	-	-
<i>T. janeirensis</i> Warm.*	FOD	-	-	-
<i>T. luetzelburgii</i> Goebel & Suess.	FOD	-	-	-
<i>T. macahensis</i> (Miers) F. Müll.*	FOD	-	-	-

Thymelaeaceae

Lucia Rossi

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
THYMELAEACEAE – 13/ca. 500				
<i>Daphnopsis</i> – 10/66				
<i>D. alpestris</i> (Gardner) Benth. & Hook.*	FOD	-	-	-
<i>D. brasiliensis</i> Mart.*	FOD, FES	-	-	-
<i>D. coriacea</i> Taub.*	FOD	-	-	-
<i>D. fasciculata</i> (Meisn.) Nevling	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>D. martii</i> Meisn.*	FOD	-	-	-
<i>D. pseudosalix</i> Domke*	FOD	-	-	-
<i>D. racemosa</i> Griseb.	FOD, FES, FOM	-	-	-
<i>D. schwackeana</i> Taub.*	FOD	-	-	-
<i>D. sellowiana</i> Taub.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>D. utilis</i> Warm.	FOD, FES	-	-	-
<i>Funifera</i> – 3/4				
<i>F. brasiliensis</i> (Raddi) Mansf.*	FOD	-	-	-
<i>F. grandifolia</i> Domke*	FOD	-	-	-
<i>F. insulae</i> Nevling*	FOD	-	-	-

Trigoniaceae

Elsie Franklin Guimarães & João Rodrigues Miguel

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
TRIGONIACEAE – 14/57				
<i>Trigonia</i> – 13/24				
<i>T. bahiensis</i> E.F.Guim. & Miguel*	FOD	-	-	-
<i>T. boliviana</i> Warm.	FOD	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>T. eriosperma</i> (Lam.) Fromm & Santos*	FOD	-	-	-
<i>T. floccosa</i> Rusby*	FOD	-	-	-
<i>T. laevis</i> Aubl.*	FOD	-	-	-
<i>T. littoralis</i> Miguel & E.F.Guim.*	FOD	-	-	-
<i>T. microcarpa</i> Sagot	FOD	-	-	-
<i>T. nivea</i> Cambess.	FOD	-	-	-
<i>T. paniculata</i> Warm.	FOD	-	-	-
<i>T. rotundifolia</i> Lleras	FOD	-	-	-
<i>T. rytidocarpa</i> Casar.	FOD	-	-	-
<i>T. simplex</i> Warm.	FOD	-	-	-
<i>T. villosa</i> Aubl.	FOD	-	-	-
<i>Trigoniodendron</i> * – 1/1				
<i>T. spiritusantense</i> E.F.Guim. & Miguel*	FOD	-	EN	ANEXO I

Triuridaceae

Paul J. M. Maas & Hiltje Maas - van de Kamer

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
TRIURIDACEAE – 6/102				
<i>Peltophyllum</i> – 2/2				
<i>P. caudatum</i> (Poulsen) R.Schmid & M.D.Turner*	FOD	-	-	-
<i>P. luteum</i> Gardner	FOD	-	-	-
<i>Sciaphila</i> – 2/67				
<i>S. purpurea</i> Benth.	FOD	-	-	-
<i>S. schwackeana</i> Johow*	FOD	-	-	-
<i>Triuris</i> – 2/9				
<i>T. alata</i> Brade*	FOD	-	-	-
<i>T. hyalina</i> Miers	FOD	-	-	-

Tropaeolaceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
TROPAEOLACEAE – 4/100				
<i>Tropaeolum</i> – 4/97				
<i>T. brasiliense</i> Casar.*	FOD	-	-	-
<i>T. pentaphyllum</i> Lam.	FOD	-	-	-
<i>T. sanctae-catharinae</i> Sparre*	FOD	-	-	-
<i>T. warmingianum</i> Rohrb.	FOD, FES	-	-	-

Turneraceae

María Mercedes Arbo

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
TURNERACEAE – 49/226				
Piriqueta – 13/45				
<i>P. aurea</i> (Cambess.) Urb.	FCA	-	-	-
<i>P. cistoides</i> (L.) Griseb.	RST	-	-	-
<i>P. duarteana</i> (Cambess.) Urb.	AFL	-	-	-
<i>P. guianensis</i> N.E.Br.	RST	-	-	-
<i>P. morongii</i> Rolfe	AFL, FCA	-	-	-
<i>P. nitida</i> Urb.	FCA	-	-	-
<i>P. ochroleuca</i> Urb.*	AFL	-	-	-
<i>P. racemosa</i> Jacq.	RST	-	-	-
<i>P. rosea</i> (Cambess.) Urb.	FCA	-	-	-
<i>P. subsessilis</i> Urb.*	FCA	-	-	-
<i>P. tamberlikii</i> Urb.	FCA	-	-	-
<i>P. taubatensis</i> (Urb.) Arbo	FCA	-	-	-
<i>P. viscosa</i> Griseb.	AFL	-	-	-
Turnera – 36/142				
<i>T. albicans</i> Urb.*	RST	-	-	-
<i>T. annularis</i> Urb.	FES	-	-	-
<i>T. aurelii</i> Arbo	FCA	-	-	-
<i>T. blanchetiana</i> Urb.	Floresta	-	-	-
<i>T. calyptrocarpa</i> Urb.	Floresta	-	-	-
<i>T. candida</i> Arbo	RST	-	-	-
<i>T. capitata</i> Cambess.	Floresta	-	-	-
<i>T. cearensis</i> Urb.	Floresta	-	-	-
<i>T. chamaedrifolia</i> Cambess.	Floresta	-	-	-
<i>T. coerulea</i> DC.	Floresta	-	-	-
<i>T. concinna</i> Arbo	FCA	-	-	-
<i>T. cuneiformis</i> Poir.	RST	-	-	-
<i>T. dasystyla</i> Urb.	Floresta	-	-	-
<i>T. diffusa</i> Willd. ex Schult.	Floresta	-	-	-
<i>T. fernandezii</i> Arbo	FCA	-	-	-
<i>T. grandidentata</i> (Urb.) Arbo*	AFL, FCA	-	-	-
<i>T. grandiflora</i> (Urb.) Arbo	FCA	-	-	-
<i>T. hassleriana</i> Urb.	FCA, AFL,	-	-	-
<i>T. hatschbachii</i> Arbo*	Floresta, AFL	-	-	-
<i>T. hermannioides</i> Cambess.	AFL, Floresta	-	-	-
<i>T. hilaireana</i> Urb.	AFL, FCA	-	-	-
<i>T. lanceolata</i> Cambess.	AFL	-	-	-
<i>T. lucida</i> Urb.*	RST	-	-	-
<i>T. luetzelburgii</i> Sleumer	AFL	-	-	-
<i>T. maracasana</i> Arbo*	Floresta	-	-	-
<i>T. marmorata</i> Urb.*	RST	-	-	-
<i>T. melochioides</i> Cambess.	Floresta, FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>T. oblongifolia</i> Cambess.	FCA	-	-	-
<i>T. opifera</i> Mart.	AFL	-	-	-
<i>T. orientalis</i> (Urb.) Arbo	Floresta, FCA	-	-	-
<i>T. pernambucensis</i> Urb.*	FOD	-	-	-
<i>T. pumilea</i> L.	FCA	-	-	-
<i>T. rubrobracteata</i> Arbo*	AFL	-	-	-
<i>T. sancta</i> Arbo*	Floresta	-	-	-
<i>T. scabra</i> Mill.	Floresta, RST	-	-	-
<i>T. serrata</i> Vell.*	FOD, AFL	-	-	-

Typhaceae

Marco Otávio Pivari

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
TYPHACEAE – 2/15				
Typha – 2/15				
T. domingensis Pers.	FAQ	-	-	-
T. latifolia L.	FAQ	-	-	-

Urticaceae

Sergio Romaniuc Neto & André Luiz Gaglioti

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
URTICACEAE – 37/947				
<i>Boehmeria</i> –3/80				
<i>B. caudata</i> Sw.	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>B. cylindrica</i> (L.) Sw.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>B. ramiflora</i> Jacq.	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>Cecropia</i> – 4/61				
<i>C. glaziovii</i> Snethl.	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>C. hololeuca</i> Miq.*	FOD, FOM, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>C. pachystachya</i> Trécul	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
<i>C. palmata</i> Willd.	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>Coussapoa</i> – 4/46				
<i>C. curranii</i> Blake	FOD, FOM, FES	VU	-	-
<i>C. floccosa</i> Akkermans & C.C.Berg	FOD, FOM, FES	VU	-	-
<i>C. microcarpa</i> (Schott) Rizzini	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
<i>C. pachyphylla</i> Akkermans & C.C.Berg	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>Laportea</i> – 1/23				
<i>L. aestuans</i> (L.) Chew	FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
<i>Myriocarpa</i> – 2/8				
<i>M. cordifolia</i> Liebm.	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>M. stipitata</i> Benth.	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>Parietaria</i> – 2/14				
<i>P. debilis</i> G.Forst.	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>P. officinalis</i> L.	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>Phenax</i> – 2/15				
<i>P. laevigatus</i> Wedd.	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>P. sonneratii</i> (Poir.) Wedd.	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>Pilea</i> – 11/600				
<i>P. aparadensis</i> Brack*	FOM, FES, FCA	-	EN	ANEXO II
<i>P. apiculata</i> Killip	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>P. flammula</i> Brack*	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>P. hilariana</i> Wedd.	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>P. hyalina</i> Fenzl	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>P. hydra</i> Brack*	FOM, FES, FCA	-	EN	ANEXO II
<i>P. microphylla</i> (L.) Liebm.	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>P. parietaria</i> (L.) Blume	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>P. pubescens</i> Liebm.	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>P. rhizobola</i> Miq.	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>Pourouma</i> – 2/25				
<i>P. guianensis</i> Aubl.	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>P. molis</i> Trécul	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>Urera</i> – 4/40				
<i>U. aurantiaca</i> Wedd.	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
<i>U. baccifera</i> (L.) Gaudich. ex Wedd.	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>U. caracasana</i> (Jacq.) Gaudich. ex Griseb.	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>U. nitida</i> (Vell.) Brack	FOD, FOM, FES, FCA, RST	-	-	-
<i>Urtica</i> – 3/35				
<i>U. circularis</i> (Hicken) Soraru	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>U. dioica</i> L.	FOM, FES, FCA	-	-	-
<i>U. urens</i> L.	FOM, FES, FCA	-	-	-

Valerianaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
VALERIANACEAE – 15/300				
Valeriana – 15/200				
V. bornmuelleri Pilg.	FCA	-	-	-
V. catharinensis Graebn.*	FCA	-	-	-
V. chamaedryfolia Cham.	FCA	-	-	-
V. eichleriana (Müll.Arg.) Graebn.*	FCA	-	-	-
V. eupatoria Sobral*	FOM, FCA	-	-	-
V. gilgiana (Müll.Arg.) Graebn.*	FCA	-	-	-
V. glaziovii Taub.*	FCA	-	-	-
V. glechomifolia F.G.Meyer*	FCA	-	-	-
V. organensis Gardner*	FCA	-	-	-
V. polystachya Sm.	FCA	-	-	-
V. reitziana Borsini*	FCA	-	-	-
V. salicariifolia Vahl	FCA	-	-	-
V. scandens L.	FOD, FOM	-	-	-
V. tajuvensis Sobral*	FOD, FCA	-	-	-
V. ulei Graebn.*	FCA	-	-	-

Velloziaceae

Renato de Mello-Silva

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
VELLOZIACEAE – 22/240				
Barbacenia – 15/100				
B. brevifolia Taub.*	AFL	-	-	-
B. burlemarxii L.B.Sm. & Ayensu*	AFL	-	-	-
B. culta L.B.Sm. & Ayensu	AFL	-	-	-
B. fanniae (N.L.Menezes) Mello-Silva*	AFL	-	-	-
B. flava Mart. ex Schult. & Schult.f.	FCA	-	-	-
B. gaveensis Goethart & Henrard*	AFL	-	-	-
B. gounelleana Beauverd*	AFL, FCA	-	-	-
B. irwiniana L.B.Sm.*	FCA	-	-	-
B. mantiqueirae Goethart & Henrard*	AFL, FCA	-	-	-
B. pabstiana L.B.Sm. & Ayensu*	AFL	-	-	-
B. purpurea Hook.*	AFL	-	-	-
B. rogieri Hortus ex Moore & Ayres	AFL	-	VU	ANEXO II

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>B. seubertiana</i> Goethart & Henrard*	AFL, FCA	-	-	-
<i>B. spectabilis</i> L.B.Sm. & Ayensu*	AFL	-	CR	ANEXO II
<i>B. tomentosa</i> Mart.	FCA	-	-	-
<i>Vellozia</i> – 7/110				
<i>V. albiflora</i> Pohl	AFL, FCA	-	-	-
<i>V. bahiana</i> L.B.Sm. & Ayensu*	AFL	-	-	-
<i>V. candida</i> J.C.Mikan*	AFL	-	-	-
<i>V. dasypus</i> Seub.	RST	-	-	-
<i>V. plicata</i> Mart.	AFL	-	-	-
<i>V. pulchra</i> L.B.Sm.*	AFL	-	-	-
<i>V. variegata</i> Goethart & Henrard*	AFL, FCA	-	-	-

Verbenaceae

Fatima Regina Gonçalves Salimena, Maria Ema Múlgura de Romero, Nataly O' Leary, Paola Peralta & Verônica A. Thode

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
VERBENACEAE – 94/1.200				
Aloysia – 9/30				
A. brasiliensis Moldenke	FOM	-	-	-
A. chamaedryfolia Cham.	FED	-	-	-
A. dusenii Moldenke	FOM, FES	-	-	-
A. gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc.	FOM, FES, FED	-	-	-
A. hatschbachii Moldenke	FOM, AFL	-	-	-
A. polygalifolia Cham.	FOD, FOM, FES	-	-	-
A. pulchra (Briq.) Moldenke	FOM, FES	-	-	-
A. ternifolia Moldenke	FOM	-	-	-
A. virgata (Ruiz & Pav.) Juss.	FES, FED	-	-	-
Bouchea – 1/9				
B. fluminensis (Vell.) Moldenke	FOM, FOD, FCA, FES	-	-	-
Citharexylum – 8/130				
C. glaziovii Moldenke	FOD, FES, FED	-	-	-
C. krukovii Moldenke	FOD, FES, FED	-	-	-
C. laetum Hiern	FOD, FES, FED	-	-	-
C. montevidense (Spreng.) Moldenke	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. myrianthum Cham.	FOD, FES, FED	-	-	-
C. obtusifolium Kuhlm.	FOD	-	-	-
C. pernambucense Moldenke	FOD, FES	-	-	-
C. solanaceum Cham.*	FOM, FES, FED	-	-	-
Duranta – 3/20				
D. erecta L.	FES, FED	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>D. parvifolia</i> Moldenke	FES, FED	-	-	-
<i>D. vestita</i> Cham.	FOM, FES	-	-	-
<i>Glandularia</i> – 22/100				
<i>G. aristigera</i> (S.Moore) Tronc.	FCA, AFL	-	-	-
<i>G. balansae</i> (Briq.) O'Leary	FCA	-	-	-
<i>G. catharinae</i> (Moldenke) O'Leary & P.Peralta	FCA, AFL	-	-	-
<i>G. corymbosa</i> (Ruiz & Pav.) O'Leary & P.Peralta	FCA	-	-	-
<i>G. dusenii</i> (Moldenke) O'Leary & P.Peralta*	FCA	-	-	-
<i>G. guaranítica</i> Tronc.	FCA	-	-	-
<i>G. hasslerana</i> (Briq.) Tronc.	FCA, AFL	-	-	-
<i>G. hatschbachii</i> (Moldenke) O'Leary & P.Peralta*	FCA	-	-	-
<i>G. humifusa</i> (Cham.) Botta	FCA	-	-	-
<i>G. jordanensis</i> (Moldenke) O'Leary & P.Peralta	FCA	-	-	-
<i>G. marrubioides</i> (Cham.) Tronc.	FCA, AFL	-	-	-
<i>G. megapotamica</i> (Spreng.) Cabrera & G.Dawson	FCA	-	-	-
<i>G. nana</i> (Moldenke) Tronc.	FCA	-	-	-
<i>G. paulensis</i> (Moldenke) P.Peralta*	FCA	-	-	-
<i>G. peruviana</i> (L.) Small	FCA, AFL	-	-	-
<i>G. phlogiflora</i> (Cham.) Schnack & Covas	FCA	-	-	-
<i>G. pulchra</i> (Moldenke) Botta*	FCA	-	-	-
<i>G. selloi</i> (Spreng.) Tronc.	FCA	-	-	-
<i>G. tessmanii</i> (Moldenke) P.Peralta	FCA	-	-	-
<i>G. thymoides</i> (Cham.) O'Leary	FCA	-	-	-
<i>G. tomophylla</i> (Briq.) P.Peralta	FCA	-	-	-
<i>G. tweediana</i> (Niven ex Hook.) P.Peralta	FCA, AFL	-	-	-
<i>Lantana</i> – 6/ca. 150				
<i>L. camara</i> L.	FOM	-	-	-
<i>L. canescens</i> Kunth	FOM	-	-	-
<i>L. fucata</i> Lindl.	FOM	-	-	-
<i>L. montevidensis</i> (Spreng.) Briq.	FOM	-	-	-
<i>L. trifolia</i> L.	FOM	-	-	-
<i>L. undulata</i> Schrank	FOM	-	-	-
<i>Lippia</i> – 13/200				
<i>L. alba</i> (Mill.) N.E.Br.	AFL, FCA	-	-	-
<i>L. angustifolia</i> Cham.	AFL, FCA	-	-	-
<i>L. arechavaletae</i> Moldenke	AFL, FCA	-	-	-
<i>L. brasiliensis</i> (Link) T.Silva	FOM	-	-	-
<i>L. hirta</i> (Cham.) Schauer	AFL, FCA	-	-	-
<i>L. lasiocalycina</i> Cham.	AFL, FCA	-	-	-
<i>L. lippoides</i> (Cham.) Rusby	FOM	-	-	-
<i>L. lupulina</i> Cham.	AFL, FCA	-	-	-
<i>L. paranensis</i> (Moldenke) T.Silva & Salimena*	?	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>L. pumila</i> Cham.*	AFL, FCA	-	-	-
<i>L. pusilla</i> T.Silva & Salimena	AFL, FCA	-	-	-
<i>L. recolletae</i> Morong	FCA	-	-	-
<i>L. turnerifolia</i> Cham.	AFL, FCA	-	-	-
<i>Petrea</i> – 1/11				
<i>P. volubilis</i> L.	FES	-	-	-
<i>Phyla</i> – 1/15				
<i>P. betulifolia</i> (Kunth) Greene	FES	-	-	-
<i>Priva</i> – 2/20				
<i>P. bahiensis</i> DC. ex Schauer*	RST	-	-	-
<i>P. lapullaceae</i> (L.) Pers.	FOD, RST	-	-	-
<i>Stachytarpheta</i> – 11/90				
<i>S. amplexicaule</i> Moldenke*	FES	-	-	-
<i>S. angustifolia</i> (Mill.) Vahl	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>S. hirsutissima</i> Link	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>S. jamaicensis</i> (L.) Vahl	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>S. laevis</i> Moldenke	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>S. maximiliani</i> Schauer*	FOD, FES, RST	-	-	-
<i>S. paraguariensis</i> Moldenke	FOD	-	-	-
<i>S. restinguensis</i> Moldenke*	RST	-	-	-
<i>S. scaberrima</i> Cham.*	FES	-	-	-
<i>S. schottiana</i> Schauer*	RST	-	-	-
<i>S. speciosa</i> Pohl ex Schauer*	FOD	-	-	-
<i>Verbena</i> – 15/200-250				
<i>V. alata</i> Otto & Sweet*	FCA	-	-	-
<i>V. bonariensis</i> L.	FCA	-	-	-
<i>V. caniuensis</i> Moldenke*	FCA	-	-	-
<i>V. ephedroides</i> Cham.	FCA	-	-	-
<i>V. filicaulis</i> Schauer	FCA	-	-	-
<i>V. hirta</i> Spreng.	FCA	-	-	-
<i>V. lindbergii</i> Moldenke*	FCA	-	-	-
<i>V. litoralis</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>V. lobata</i> Vell.	FCA	-	-	-
<i>V. montevidensis</i> Spreng.	FCA	-	-	-
<i>V. ovata</i> Cham.	FCA	-	-	-
<i>V. paulensis</i> Moldenke*	FOD	-	-	-
<i>V. rigida</i> Spreng.	FCA	-	-	-
<i>V. sagittalis</i> Cham.	FCA	-	-	-
<i>V. subpetiolata</i> N.O'Leary*	FCA	-	-	-
<i>V. tessmanii</i> Moldenke	FCA	-	-	-
<i>Verbenoxylum</i> * – 1/1				
<i>V. reitzii</i> (Moldenke) Tronc.*	FOD	-	-	-

Violaceae

Juliana de Paula-Souza

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
VIOLACEAE – 26/ca. 800				
Amphirrhex – 1/1				
A. longifolia (A.St.-Hil.) Spreng.	FOD	-	-	-
Anchietea – 3/8				
A. exalata Eichler	FES	-	-	-
A. pyrifolia (Mart.) G.Don	FES, FOD, RST	-	-	-
A. selloviana Cham. & Schltdl.	FED, FOD	-	-	-
Hybanthus – 11/70				
H. atropurpureus (A.St.-Hil.) Taub.	FES, FOD	-	-	-
H. bicolor (A.St.-Hil.) Baill.	FCA	-	-	-
H. bigibbosus (A.St.-Hil.) Hassl.	FES, FOD	-	-	-
H. brevicaulis (Mart.) Baill.*	FES	-	-	-
H. calceolaria (L.) Oken	FOD, RST	-	-	-
H. communis (A.St.-Hil.) Taub.	FES, FOD	-	-	-
H. heterosepalus (Eichler) Hassl.	FED, FOD	-	-	-
H. oppositifolius (L.) Taub.	FOD	-	-	-
H. parviflorus (Mutis ex L.f.) Baill.	FCA, FES, FOD, FOM	-	-	-
H. setigerus (A.St.-Hil.) Baill.	FOD	-	-	-
H. velutinus Schulze-Menz	FCA	-	-	-
Noisetia – 1/1				
N. orchidiflora (Rudge) Ging.	FOD	-	-	-
Paypayrola – 1/8				
P. blanchetiana Tul.*	FOD	-	-	-
Rinorea – 5/160				
R. bahiensis (Moric.) Kuntze*	FOD	-	-	-
R. guianensis Aubl.	FOD	-	-	-
R. laevigata (Sol. ex Ging.) Hekking	FOD	-	-	-
R. maximiliani (Eichler) Kuntze*	FOD	CR	-	-
R. ramiziana Glaz. ex Hekking*	FOD	-	VU	ANEXO II
Schweiggeria – 1/1				
S. fruticosa Spreng.	FES	-	-	-
Viola – 3/525				
V. cerasifolia A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
V. gracillima A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-
V. subdimidiata A.St.-Hil.*	FOD	-	-	-

Vitaceae

Julio Antonio Lombardi

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
VITACEAE – 19/850				
Cissus – 19/ca. 350				
C. albida Cambess.	FCA, FES	-	-	-
C. blanchetiana Planch.*	FES, FOD, FOM	-	-	-
C. coccinea (Baker) Planch.*	FES, FOD	-	-	-
C. erosa Rich.	FES, FOD, FOM, FCA	-	-	-
C. gongylodes (Baker) Planch.	FES, FOD, FOM	-	-	-
C. nobilis Kuhlman.*	FOD, FES	-	-	-
C. paucinervia Lombardi*	FOD	-	-	-
C. pauliniifolia Vell.*	FOD, FOM	-	-	-
C. pinnatifolia Lombardi*	RST	-	-	-
C. pulcherrima Vell.*	FOD, FOM	-	-	-
C. serroniana (Glaz.) Lombardi*	FOD, FES, FOM	-	-	-
C. simsiana Schult. & Schult.f.	FOM, FES, AFL	-	-	-
C. stipulata Vell.*	FOD, FOM	-	-	-
C. striata Ruiz & Pav.	FOD, FOM, FES	-	-	-
C. subrhomboidea (Baker) Planch.	FES, FOM	-	-	-
C. sulcicaulis (Baker) Planch.	FES, FOD, FOM, FCA	-	-	-
C. tinctoria Mart.	FES, FOD, FOM	-	-	-
C. trianae Planch.	FOD	-	-	-
C. verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	FES, FOD, FOM, FCA, RST	-	-	-

Vivianiaceae

Marcos Sobral

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
VIVIANIACEAE – 1/6				
<i>Caesarea</i> – 1/1				
<i>C. albiflora</i> Cambess.	FCA, FOM	-	-	-

Vochysiaceae

Ary Teixeira de Oliveira-Filho

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
VOCHYSIACEAE – 47/179				
Callisthene – 6/7				
C. dryadum A.P.Duarte*	FOD	-	-	-
C. fasciculata (Spreng.) Mart.	FES, FED, FCA	-	-	-
C. inundata O.L.Bueno et al.*	FOM, FES	-	-	-
C. major Mart.	FES, FCA	-	-	-
C. microphylla Warm.	FED, FCA	-	-	-
C. minor Mart.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
Erisma – 1/16				
E. arietinum M.L.Kawas.*	FOD	-	-	-
Qualea – 14/59				
Q. cordata (Mart.) Spreng.	FOD, FOM, FES, FED, FCA	-	-	-
Q. cryptantha (Spreng.) Warm.*	FOD, FES, RST	-	-	-
Q. densiflora Warm.	FES, FCA	-	-	-
Q. dichotoma (Mart.) Warm.	FOD, FES, FED, FCA	-	-	-
Q. gestasiana A.St.-Hil.*	FOD, FES	-	-	-
Q. glaziovii Warm.*	FOD, FOM	-	-	-
Q. grandiflora Mart.	FES, FED, FCA	-	-	-
Q. hannekesaskiarum Marc.-Berti	FES, FCA	-	-	-
Q. jundiahy Warm.*	FOD, FES.	-	-	-
Q. magna Kuhlman.*	FOD	-	-	-
Q. megalocarpa Stafleu*	FOD, FES	-	-	-
Q. multiflora Mart.	FES, FED, FCA	-	-	-
Q. parviflora Mart.	FES, FED, FCA	-	-	-
Q. selloi Warm.	FOD, FES	-	-	-
Vochysia – 26/97				
V. acuminata Bong.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
V. angelica M.C.Vianna & Fontella*	FOD	-	-	-
V. bifalcata Warm.*	FOD, FOM, FES, RST	-	-	-
V. cinnamomea Pohl	FES, FCA	-	-	-
V. dasyantha Warm.*	FOD, FES	-	-	-
V. elliptica (Spreng.) Mart.	FES, FED, FCA	-	-	-
V. emarginata Vahl	FES, FCA	-	-	-
V. gardneri Warm.	FES, FED, FCA	-	-	-
V. glaberrima Warm.	FOD, FES	-	-	-
V. glazioviana Warm.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
V. gummifera Mart. ex Warm.*	FOD, FES	-	-	-
V. magnifica Warm.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
V. oblongifolia Warm.*	FOD, FES	-	-	-
V. oppugnata Warm.*	FOD, FES	-	-	-
V. pygmaea Bong.*	FCA	-	-	-
V. pyramidalis Mart.	FOD, FES	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>V. rectiflora</i> Warm.*	FOD, FOM	-	-	-
<i>V. riedeliana</i> Stafleu*	FOD	-	-	-
<i>V. rotundifolia</i> Mart.*	FES, FCA	-	-	-
<i>V. rufa</i> Mart.	FES, FED, FCA	-	-	-
<i>V. saldanhana</i> Warm.*	FOD, FES	-	-	-
<i>V. schwackeana</i> Warm.*	FOD, FOM, FES	-	-	-
<i>V. selloi</i> Warm.*	FOD	-	-	-
<i>V. spathulata</i> Warm.*	FOD	-	-	-
<i>V. thyrsoides</i> Pohl	FOD, FES, FCA	-	-	-
<i>V. tucanorum</i> Mart.	FOD, FOM, FES, FCA	-	-	-

Winteraceae

Caetano Troncoso Oliveira

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
WINTERACEAE – 2/60				
<i>Drimys</i> – 2/4				
<i>D. angustifolia</i> Miers*	FOM, FOD	-	-	-
<i>D. brasiliensis</i> Miers*	FOM, FOD	-	-	-

Xyridaceae

Maria das Graças Lapa Wanderley, Nara Furtado de Oliveira Mota
& Gisele Oliveira Silva

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
XYRIDACEAE – 49/ca. 320				
<i>Abolboda</i> – 3/ca. 20				
<i>A. americana</i> (Aubl.) Lanjouw	RST	-	-	-
<i>A. poarchon</i> Seub.	FCA	-	-	-
<i>A. pulchella</i> Humb. & Bonpl.	FCA	-	-	-
<i>Xyris</i> – 46/ca. 300				
<i>X. acrophila</i> Malme	FCA	-	-	-
<i>X. anceps</i> Lam.	FCA	-	-	-
<i>X. asperula</i> Mart.	FCA	-	-	-
<i>X. augusto-coburgii</i> Szyszyl	FCA	-	VU	ANEXO I
<i>X. aurea</i> L.B.Sm.	FCA	-	-	-

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
<i>X. bialata</i> Malme	FCA, RST	-	-	-
<i>X. blanchetiana</i> Malme	FCA	-	-	-
<i>X. brevifolia</i> Michx.	FCA, RST	-	-	-
<i>X. capensis</i> Thunb.	FCA	-	-	-
<i>X. ciliata</i> Thunb.	FCA, RST	-	-	-
<i>X. consanguinea</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>X. fallax</i> Malme	FCA	-	-	-
<i>X. filifolia</i> L.A.Nilsson	FCA	-	-	-
<i>X. fusca</i> L.A.Nilsson*	FCA	-	-	-
<i>X. glandacea</i> L.A.Nilsson	FCA, RST	-	-	-
<i>X. guaranitica</i> Malme	FCA	-	-	-
<i>X. hatschbachii</i> L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
<i>X. hymenachne</i> Mart.	FCA	-	-	-
<i>X. itatyaiensis</i> (Malme) Wand.	FCA	-	-	-
<i>X. jupicai</i> Rich.	FCA, RST	-	-	-
<i>X. laevigata</i> L.A.Nilsson	FCA	-	-	-
<i>X. laxifolia</i> Mart.	FCA	-	-	-
<i>X. longifolia</i> Mart.	FCA	-	VU	ANEXO II
<i>X. lucida</i> Malme*	FCA	-	-	-
<i>X. mertesiana</i> Koern. ex Malme*	RST	-	-	-
<i>X. metallica</i> Klotzsch & Seub.	FCA	-	-	-
<i>X. neglecta</i> L.A. Nilsson	FCA	-	-	-
<i>X. obtusiuscula</i> L.A.Nilsson	FCA	-	-	-
<i>X. organensis</i> Malme*	FCA	-	-	-
<i>X. piraquarae</i> L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
<i>X. ramboi</i> L.B.Sm. & Downs	FCA	-	-	-
<i>X. regnellii</i> L.B.Sm. & Downs	FCA, RST	-	-	-
<i>X. reitzii</i> L.B.Sm. & Downs*	FCA	-	-	-
<i>X. rigida</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>X. savanensis</i> Miq.	FCA	-	-	-
<i>X. schizachne</i> Mart.	FCA	-	-	-
<i>X. seubertii</i> L.A.Nilsson	FCA	-	-	-
<i>X. sororia</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>X. stenocephalla</i> Malme	FCA	-	-	-
<i>X. stenophylla</i> L.A.Nilsson*	FCA	-	-	-
<i>X. tenella</i> Kunth	FCA	-	-	-
<i>X. teres</i> L.A.Nilsson	FCA	-	-	-
<i>X. tortula</i> Mart.	FCA	-	-	-
<i>X. trachyphylla</i> Mart.	FCA	-	-	-
<i>X. vacillans</i> Malme	FCA	-	-	-
<i>X. wawrae</i> Heimerl*	FCA	-	-	-

Zingiberaceae

João Marcelo Alvarenga Braga

ESPÉCIE	VEGETAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA		
		IUCN	Biodiversitas	MMA
ZINGIBERACEAE – 7/ca. 1.300				
<i>Hedychium</i> – 1/ca. 50				
<i>H. coronarium</i> J.König	FOD, FOM, FES, FED, AFL, RST	-	-	-
<i>Renealmia</i> – 6/ca. 75				
<i>R. alpinia</i> (Rottb.) Maas	FOD, FES	-	-	-
<i>R. brasiliensis</i> K.Schum. <i>emend.</i> Maas*	FOD, FES	-	-	-
<i>R. chrysotricha</i> Petersen*	FOD	-	-	-
<i>R. guianensis</i> Maas	FOD	-	-	-
<i>R. petasites</i> Gagnep.*	FOD	-	-	-
<i>R. reticulata</i> Gagnep.*	FOD	-	-	-

Lista de Autores

Adriana Quintella Lobão - Universidade Federal do Espírito Santo - adrianalobao@ceunes.ufes.br
Alain Chautems - Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève - alain.chautems@ville-ge.ch
Alessandra dos Santos - Instituto de Botânica - IBt/SP - ale.san.bot@gmail.com
Alessandro Rapini - Universidade Estadual de Feira de Santana - rapinibot@yahoo.com.br
Alexa Araujo de Oliveira Paes Coelho - Universidade do Estado da Bahia - alexabio@yahoo.com.br
Alexandre Quinet - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - aquinet@jbrj.gov.br
Alexandre Salino - Universidade Federal de Minas Gerais - salino@icb.ufmg.br
Amauri Cesar Marcato - Universidade de São Paulo - marcato@ib.usp.br
Ana Cláudia Araújo - Royal Botanic Gardens - Kew - anachludia@yahoo.com.br
Ana Claudia Pereira de Oliveira - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - acpolive@gmail.com
Ana Maria G. Azevedo Tozzi - Universidade Estadual de Campinas - anatozzi@unicamp.br
Ana Maria Giuliatti Harley - Universidade Estadual de Feira de Santana - anagiulietti@hotmail.com
Ana Odete Santos Vieira - Universidade Estadual de Londrina - aovieira@uel.br
Ana Paula Fortuna-Perez - Universidade Estadual de Campinas - anaforperez@bol.com.br
André Luiz Gaglioti - Instituto de Botânica - IBt/SP - agaglioti@gmail.com
André Márcio Araujo Amorim - Universidade Estadual de Santa Cruz - aamorimm@terra.com.br
André Olmos Simões - Universidade de São Paulo - aosimoes@usp.br
Andrea Ferreira da Costa - Universidade Federal do Rio de Janeiro - afcosta@acd.ufrj.br
Andréa Pereira Luiz-Ponzo - Universidade Federal de Juiz de Fora - luizi.ponzo@ufjf.edu.br
Andréia Silva Flores - Museu Integrado de Roraima - andreiasflores@gmail.com
Ângela Maria Studart Fonseca Vaz - Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - JBRJ- avaz@jbrj.gov.br
Anna Luiza Ilkiu-Borges - Museu Paraense Emílio Goeldi - ilkiuborges@yahoo.com.br
Antoniela Morais Marinho - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - antonielamorais@hotmail.com
Ariane Luna Peixoto - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - ariane@jbrj.gov.br
Aristônio Magalhães Teles - Universidade Federal de Goiás - aristonio@hotmail.com
Armando Carlos Cervi - Universidade Federal do Paraná - accervi@ufpr.br
Ary Teixeira de Oliveira-Filho - Universidade Federal de Minas Gerais - ary.oliveira.filho@gmail.com
Benoit Loeuille - Universidade de São Paulo - benoit_loeuille@yahoo.fr
Bente B. Klitgaard - Royal Botanic Gardens - Kew - B.Klitgaard@kew.org
C. Thomas Philbrick - Western Connecticut State University - philbrickt@wcsu.edu
Caetano Troncoso Oliveira - Universidade Federal de Minas Gerais - caetano.to@hotmail.com
Caio Amitrano Alencar Imbassahy - Universidade Federal do Rio de Janeiro - caioimba@hotmail.com
Carmen Sílvia Zickel - Universidade Federal Rural de Pernambuco - zickelbr@yahoo.com
Cássia Mônica Sakuragui - Universidade Federal do Rio de Janeiro - cmsakura12@gmail.com
Cecília Carmen Xifreda - Universidad de La Plata - cxifreda@museo.fcnym.unlp.edu.ar
Cid José Passos Bastos - Universidade Federal da Bahia - cid-bastos@uol.com.br
Cíntia Kameyama - Instituto de Botânica - IBt/SP - ckameyama@uol.com.br
Claudenir Simões Caires - Universidade de Brasília - cscaires@hotmail.com
Cláudia Elena Carneiro - Universidade Estadual de Feira de Santana - carneiro@uefs.br

Cláudia Magalhães Vieira – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Cláudia Petean Bove - Universidade Federal do Rio de Janeiro - cpbove@hotmail.com

Claudine Mynssen - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - cmynssen@jbrj.gov.br

Cláudio Nicoletti Fraga - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - cnfraga@jbrj.gov.br

Cyl Farney Catarino de Sá - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - cfarney@jbrj.gov.br

Daniela Sampaio - Universidade Estadual de Campinas - sampaio.dani@gmail.com

Daniela Zappi - Royal Botanic Gardens - Kew - D.Zappi@kew.org

Dayane Tarabay - Universidade de São Paulo - dayanetarabay@gmail.com

Denise Pinheiro da Costa - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - dcosta@jbrj.gov.br

Diego Soares Lara - Universidade Federal de Minas Gerais - diego2513@yahoo.com.br

Dilma Silva Nascimento - Universidade Federal do Paraná - dilmika@hotmail.com

Domingos B. O. S. Cardoso - Universidade Estadual de Feira de Santana - cardosobot@gmail.com

Douglas C. Daly - New York Botanical Garden - ddaly@nybg.org

Douglas Junqueira Lopes - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Eduardo Bezerra de Almeida Jr. - Universidade Federal Rural de Pernambuco - ebaj25@yahoo.com.br

Eduardo da Silva Leal – Jardim Botânico do Rio de Janeiro - eduardoleal@jbrj.gov.br

Eduardo Gomes Gonçalves - Instituto Inhotim - eduardo.goncalves@inhotim.org.br

Efigênia de Melo - Universidade Estadual de Feira de Santana - efidemelo@hotmail.com

Eliane de Lima Jacques - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - ejacques@ufrj.br

Élide Santos Jimena - Universidade Federal do Paraná - elide@ufpr.br

Elnatan Bezerra de Souza - Universidade Estadual Vale do Acaraú - elbezsouza@yahoo.com.br

Elsie Franklin Guimarães - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - eguimar@jbrj.gov.br

Enrique Forero - Universidad Nacional de Colombia - enriqueforero2003@yahoo.com

Eric Hattori - Universidade Federal de Minas Gerais - erichattori@yahoo.com.br

Erika von Sohsten Medeiros - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - emedeiro@jbrj.gov.br

Eve J. Lucas - Royal Botanic Gardens – Kew - e.lucas@kew.org

Evelin Andrade Manoel - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - evelin@jbrj.gov.br

Fabiana R. Filardi - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - ffilardi@jbrj.gov.br

Fábio de Barros - Instituto de Botânica - IBt/SP - fdebarros@pq.cnpq.br

Fabrizio Moreira Ferreira - Universidade Estadual de Feira de Santana - fmoreiraf@yahoo.com.br

Fátima Regina Gonçalves Salimena - Universidade Federal de Juiz de Fora - fatima.salimena@ufff.edu.br

Fernando Alves Ferreira - Universidade Estadual de Maringá - ferreira_bot@yahoo.com.br

Flavia Cristina P. Garcia - Universidade Federal de Viçosa - fcgarcia@ufv.br

Flávio Dayrell Gontijo - Universidade Federal de Minas Gerais - gontijo10@hotmail.com

Flávio França - Universidade Estadual de Feira de Santana - flaviofranca@hotmail.com

Genise Somner - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - somner@ufrj.br

Gerson Oliveira Romão - Universidade de São Paulo - ESALQ - goromao@esalq.usp.br

Gisela Pelissari - Instituto de Botânica - IBt/SP - pelissari.gi@gmail.com

Gisele Oliveira Silva - Instituto de Botânica - IBt/SP - g.silva_bot@yahoo.com.br

Gustavo Heiden - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - gustavo.heidengmail.com

Gustavo Heringer - Universidade Federal de Minas Gerais - gustavoheringer@hotmail.com

Gustavo Martinelli - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - gmartine@jbrj.gov.br

Gwilym P. Lewis - Royal Botanic Gardens - Kew - g.lewis@kew.org

Haroldo Cavalcante de Lima - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - hlima@jbrj.gov.br

Hélio Boudet Fernandes - Museu de Biologia Mello Leitão - hboudet@terra.com.br
 Hiltje Maas - van de Kamer - Nationaal Herbarium Nederland - paul.maas@wur.nl
 Hortênsia Pousada Bautista - Universidade do Estado da Bahia - bvbautis@hotmail.com
 Ingrid Koch - Universidade Federal de São Carlos - ingrid@ufscar.br
 Jarênio Rafael Ozeas de Santana - Universidade Federal de Goiás - jarenios@gmail.com
 João Aguiar Nogueira Batista - Universidade Federal de Minas Gerais - janb@icb.ufmg.br
 João Luiz Mazza Aranha Filho - Universidade Estadual de Campinas - aranhafilho@gmail.com
 João Marcelo Alvarenga Braga - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - jmabraga@jbrj.gov.br
 João Renato Stehmann - Universidade Federal de Minas Gerais - stehmann@ufmg.br
 João Ricardo Vieira Iganci - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - joaoiganci@gmail.com
 João Rodrigues Miguel - Universidade do Grande Rio - jmiguel@unigranrio.com.br
 Jomar Gomes Jardim - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - j.jardim@yahoo.com.br
 Jorge Fontella Pereira - Universidade Federal do Rio de Janeiro- jofope@mn.ufrj.br
 José Eduardo Meireles - Duke University/Instituto de Pesquisas Jardim Botânico de Rio de Janeiro - jemeireles@gmail.com
 José F. M. Valls - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - CENARGEN - valls@cenargen.embrapa.br
 José Rubens Pirani - Universidade de São Paulo - pirani@usp.br
 Juliana de Paula Souza - Universidade de São Paulo - jupsouza@esalq.usp.br
 Juliana Souza Marques - Instituto Agrônômico de Pernambuco - july_cabral@hotmail.com
 Julie H. A. Dutilh - Universidade Estadual de Campinas - judutilh@yahoo.com
 Julio Antonio Lombardi - Universidade Estadual de São Paulo - UNESP-Rio Claro - cissus@rc.unesp.br
 Kátia Cavalcanti Porto - Universidade Federal de Pernambuco - kporto@ufpe.br
 Lana da Silva Sylvestre - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - lana@ufrj.br
 Larissa Grokoviski - Universidade Federal do Paraná - leblumen@bol.com.br
 Laura Cristina Pires Lima - Universidade Estadual de Feira de Santana - lcplima@yahoo.com.br
 Leonardo Dias Meireles - Universidade Estadual de Campinas - ldmeireles@yahoo.com.br
 Leslie Landrum - Arizona State University - les.landrum@asu.edu
 Lidyanne Yuriko Saleme Aona - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - lidyanne.aona@gmail.com
 Lívia Echternacht - Universidade de São Paulo - livia.echter@gmail.com
 Lívia Godinho Temponi - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - liviatemponi@yahoo.com.br
 Lúcia G. Lohmann - Universidade de São Paulo - llohmann@usp.br
 Lúcia Helena Soares-Silva - Universidade de Brasília - Isoares@unb.br
 Lucia Rossi - Instituto de Botânica - IBt/SP - lrossi@ibot.sp.gov.br
 Luciana Cláudia Neves Melo - Universidade Federal de Minas Gerais - cailu.melo@gmail.com
 Luciana Hiromi Yoshino Kamino - Universidade Federal de Minas Gerais - lukamino@yahoo.com.br
 Luciano Paganucci de Queiroz - Universidade Estadual de Feira de Santana - luciano_paganucci@yahoo.com.br
 Luís Carlos Bernacci - Instituto Agrônômico de Campinas - bernacci@iac.sp.gov.br
 Luiz Carlos da Silva Giordano - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - giordano@jbrj.gov.br
 Mara Rejane Ritter - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - mara.ritter@ufrgs.br
 Marccus Alves - Universidade Federal de Pernambuco - sedges@terra.com.br
 Marcela Firens da Silveira - Universidade Estadual de Campinas - marcela.firens@gmail.com
 Marcela Maia Viana - Universidade Federal de Minas Gerais
 Marcelo Ferreira de Vasconcelos - Associação Montanhas do Espinhaço - mfvasconcelos@gmail.com
 Marcelo Trovó - Universidade de São Paulo - martrovo@gmail.com
 Márcio de Souza Werneck - Universidade Federal do ABC - marciosw@yahoo.com.br

Marco Otávio Pivari - Universidade Federal de Minas Gerais - marcopivari@yahoo.com.br
 Marcos José da Silva - Universidade Estadual de Campinas - marcos_agrorural@hotmail.com
 Marcos Sobral - Universidade Federal de São João del-Rey - marcos_sobral@hotmail.com
 Marcus Alberto Nadruz Coelho - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - mnadruz@jbrj.gov.br
 Maria Bernadete Costa-e-Silva - Instituto Agrônomo de Pernambuco - m.berna@globo.com
 Maria Carolina Abreu - Universidade Federal Rural de Pernambuco - mariacarolinabreu@hotmail.com
 Maria das Graças Lapa Wanderley - Instituto de Botânica - IBt/SP - gracaw@terra.com.br
 Maria de Fátima Freitas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - ffreitas@jbrj.gov.br
 Maria do Carmo Estanislau do Amaral - Universidade Estadual de Campinas - volker@unicamp.br
 Maria do Carmo Mendes Marques - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - mmarques@jbrj.gov.br
 Maria do Socorro Pereira - Universidade Federal de Campina Grande - mariaspereirabio@hotmail.com
 Maria Ema Múlgura de Romero - Instituto Darwinion - mmulgura@darwin.edu.ar
 Maria Fernanda Calió - Universidade de São Paulo - mfernanda_calió@yahoo.com.br
 Maria Helena Durães Alves Monteiro - Universidade Santa Úrsula - mhduraes@yahoo.com.br
 Maria Iracema Bezerra Loiola - Universidade Federal do Ceará - iloiola@ufc.br
 María Mercedes Arbo - Instituto de Botánica del Nordeste - arbo@agr.unne.edu.ar
 Maria Regina de Vasconcellos Barbosa - Universidade Federal da Paraíba - mregina@dse.ufpb.br
 Maria Salete Marchioretto - Instituto Anchietano de Pesquisas/UNISINOS - herbariopaca@unisinos.br
 María Silvia Ferrucci - Universidad Nacional del Nordeste - msferrucci@yahoo.com.ar
 Mariana Machado Saavedra - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - mariana@jbrj.gov.br
 Marli P. Morim - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - mpieres@jbrj.gov.br
 Marta Camargo de Assis - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Meio Ambiente - marta@cnpma.embrapa.br
 Massimo Bovini - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - mbovini@jbrj.gov.br
 Matheus Fortes Santos - Universidade de São Paulo - matheus_fs@yahoo.com.br
 Michel J. F. Barros - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - michel@jbrj.gov.br
 Milton Groppo - Universidade de São Paulo - groppo@ffclrp.usp.br
 Mizué Kirizawa - Instituto de Botânica - IBt/SP - mkirizawa@ig.com.br
 Nádia Roque - Universidade Federal da Bahia - nroque@ufba.br
 Nadia Said Chukr - Prefeitura de Cotia - Parque Teresa Maia - chukravila@gmail.com
 Nara Furtado de Oliveira Mota - Universidade Federal de Minas Gerais - bhznara@yahoo.com.br
 Nataly O'Leary - Instituto Darwinion - noleary@darwin.edu.ar
 Nathan Smith - nathansmit@gmail.com
 Nilda Marquete Ferreira da Silva - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico de Rio de Janeiro - nmarquete@jbrj.gov.br
 Nívea Dias dos Santos - Universidade Estadual de Campinas - nivea.dias@gmail.com
 Paola Peralta - Instituto Darwinion - paofperalta@gmail.com
 Patrícia Aparecida de São José - Instituto de Botânica - IBt/SP - paparecida31@gmail.com
 Paul J. M. Maas - Nationaal Herbarium Nederland - paul.maas@wur.nl
 Paula Moraes Leitman - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - leitman@jbrj.gov.br
 Paulo Eduardo Aguiar Saraiva Câmara - Universidade de Brasília - pcamara@unb.br
 Paulo José F. Guimarães - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - paulo@jbrj.gov.br
 Paulo Takeo Sano - Universidade de São Paulo - ptsano@usp.br
 Pedro Fiaschi - Virginia Commonwealth University - pedrofiaschi@hotmail.com
 Pedro Lage Viana - Universidade Federal de Minas Gerais - vianapl@yahoo.com.br
 Polyana Noronha Soares - Universidade Federal de Uberlândia - polyananoronha@yahoo.com.br

Rafael Augusto Xavier Borges - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - borgesrafael@gmail.com
 Rafaela Campostrini Forzza - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - rafaella@jbrj.gov.br
 Rafaela Cardoso Ribeiro - Universidade Federal de Minas Gerais - rafinhabio@yahoo.com.br
 Regina Helena Potsch Andreato - Universidade Santa Úrsula - regina.andreato@gmail.com
 Renata Moura de Liro - Universidade Federal da Bahia - mouradeliro@gmail.com
 Renato de Mello-Silva - Universidade de São Paulo - mellosil@usp.br
 Renato Goldenberg - Universidade Federal do Paraná - renato.goldenberg@pq.cnpq.br
 Renée H. Fortunato - Instituto de Recursos Biológicos - rhfortunato2002@yahoo.com.ar
 Ricardo Kriebel - New York Botanical Garden - kriebelr@gmail.com
 Richard Toby Pennington - Royal Botanic Gardens - Edinburgh - t.pennington@rbge.org.uk
 Rodrigo Teófilo Valadares - Centro Universitário de Vila Velha - rodrigoteofilo669@hotmail.com
 Ronaldo Marquete - Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - JBRJ- rmarquet@jbrj.gov.br
 Rosana Romero - Universidade Federal de Uberlândia - romero@inbio.ufu.br
 Rosângela Simão-Bianchini - Instituto de Botânica - IBT/SP - bianchiniibot@yahoo.com.br
 Rubens Teixeira Queiroz - Universidade Estadual de Campinas - rtbio@yahoo.com.br
 Scott Mori - New York Botanical Garden - smori@nybg.org
 Sergio Romaniuc Neto - Instituto de Botânica - IBT/SP - sromaniuc@gmail.com
 Silvana Vilas Bôas-Bastos - Universidade Federal da Bahia - silvana-vbbastos@uol.com.br
 Silvia T. Miotto - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - stsmiotto@bol.com.br
 Taciana Barbosa Cavalcanti - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - CENARGEN - taciana@cenargen.embrapa.br
 Tânia Maria Moura - Universidade Estadual de Campinas - tmourabr@yahoo.com.br
 Tânia Regina dos Santos Silva - Universidade Estadual de Feira de Santana - tsilva@uefs.br
 Tarciso Sousa Filgueiras – Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – tfig@uol.com
 Tatiana Tavares Carrijo - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - tcarrijo@gmail.com
 Thais de Freitas Vaz-Imbassahy - Universidade Federal do Rio de Janeiro - vazimbassahy@gmail.com
 Thais Elias Almeida - Universidade Federal de Minas Gerais - blotiella@gmail.com
 Valquíria Ferreira Dutra - Universidade Federal de Viçosa - valdutra2@yahoo.com.br
 Vera Lúcia Gomes Klein - Universidade Federal de Goiás - vlgomes.ufg@gmail.com
 Verônica A. Thode - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - veronicathode@hotmail.com
 Vidal Freitas Mansano - Jardim Botânico do Rio de Janeiro - Vidal@jbrj.gov.br
 Vinicius Antonio de Oliveira Dittrich - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - vinaro@gmail.com
 Vinícius Castro Souza - Universidade de São Paulo - ESALQ - vcsouza@esalq.usp.br
 Vinícius Trettel Rodrigues - Instituto de Botânica - IBT/SP - rodriguesvt@yahoo.com.br
 Viviane Renata Scalón - Universidade Federal de Ouro Preto - vrscalon@yahoo.com.br
 Volker Bittrich - Universidade Estadual de Campinas - volker@unicamp.br
 William Rodrigues - Universidade Federal do Paraná - william@bio.ufpr.br