BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-001

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 54957

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL: ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS QUE ENVOLVAM COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ANÁLISE DE MERCADO PARA PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	5 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	0 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Hydrolaetare_capuru; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_perlata; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Inia geoffrensis boliviensis; Alouatta caraya; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FB MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Guaporé; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Paragua;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:*
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Guaporé; Rio Guaporé; Rio Paragua;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GRANDE POTENCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA; GRANDE POTENCIAL PESQUEIRO E DE OBSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA, QUE ABRANGE COMUNIDADES TÍPICAS DOS BIOMAS PANTANAL E AMAZÔNIA, COM ÊNFASE NO BIRD WATCHING (OBSERVAÇÃO DE AVES); NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADES TRADICIONAIS
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-002

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 52914

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	27 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	4 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	4 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	6 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_vilasboasi; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Mico leucippe; Ateles marginatus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; S MADEIRA-TAPAJÓS; S TAPAJÓS-XINGÚ; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SA TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Juruena; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain São Manoel; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Cururu ou Cururu-ri;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Tapajos / Floodplain Juruena; Rios Ordem 7 a 11 - Rio Tapajos / Floodplain São Manoel; Rios Ordem 7 a 11 - Rio Tapajos / Floodplain Tapajós; Rios Ordem 7 a 11 - Rio Tapajos / Rio Cururu ou Cururu-ri;
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; Ds Quaternario Tapajós-Xingú; S Madeira-Tapajós; S Tapajós-Xingú; Sa Madeira-Tapajós; Sa Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruena; Floodplain São Manoel; Floodplain Tapajós; Rio Cururu ou Cururu-ri;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA

- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* PAE Benedito. Área com SIGEF e com assentamento
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (jusante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-003

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 36448

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	0 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Dendrocolaptes_retentus; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes satanas; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DA QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; DA TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DB CRETACEO TOCANTINS-*

Meari; Db Quaternario Tocantins-Meari; Db Terciario Litora Tocantins-Meari; La Tocantins-Meari;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Lower Tocantins floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:*
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Terciario Litora Tocantins-Meari; Db Cretaceo Tocantins-Meari; Db Quaternario Tocantins-Meari; Db Terciario Litora Tocantins-Meari; La Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Lower Tocantins floodplain;

Caracterização

- *Características Gerais:*
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Necessidade de reconhecer terras quilombolas; já está em andamento, estando o povoado certificado, mas falta reconhecer.
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação Fragmentação de rios (montante de UHE)

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-004

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 33355

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	27 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	0 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus rubicundus; Cebuella pygmaea niveiventris; Coendou bicolor; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia monachus; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Lagothrix poeppigii; Leontocebus nigricollis; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; PAA JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Subandean Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Subandean Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:*
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Paa Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Subandean Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* ÁREA DE USO DO POVO TIKUNA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-005

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 73360

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): AMPLIAÇÃO DE UC

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	14 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	0 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Bolitoglossa_caldwellae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; A CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; A QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; LD JAVARÍ-JURUÁ; LG JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:*
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá; Ld Javarí-Juruá; Lg Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AMPLIAÇÃO ÁREA JAPIIM PENTECOSTE
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: AS CAMPINARANAS É O ÚNICO ECOSSISTEMA NÃO PROTEGIDO HOJE NO ACRE E ESTÁ CONTEMPLADO COMO ÁREA PRIORITÁRIA NO ZEE DO ESTADO.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-006

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 40382

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	12 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	0 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus RR; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Boana_xerophylla; cnemidophorus lemniscatus RR; coleodactylus septentrionalis; Dendrobates_leucomelas; gymnophthalmus leucomystax; gymnophthalmus vanzoi; kentropyx striata RR; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; FA NEGRO-BRANCO; FS NEGRO-BRANCO; SA NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uraricoera;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:*
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Ds Proterozoico Negro-Branco; Fa Negro-Branco; Fs Negro-Branco; Sa Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TEPEQUEM, ÚNICO TEPUI TOTALMENTE DENTRO DE RORAIMA, ÁREA TURÍSTICA, ANTIGO GARIMPO. TENTATIVA DE CRIAR UC MUNICIPAL, MAS NÃO FOI ADIANTE.; POTENCIAL TURÍSTICO. TEPEQUEM, ÚNICO TEPUI TOTALMENTE DENTRO DE RORAIMA.; AGRICULTURA E PECUÁRIA EM CAMPOS NATURAIS; CAÇA; APOIO AO GARIMPO; DEGRADAÇÃO EM APP.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: TENTATIVA DE CRIAR UC MUNICIPAL, MAS NÃO FOI ADIANTE.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-007

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 31037

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	12 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	0 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_medius; Guaruba_guarouba; Lophornis_gouldii; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CRETACEO TOCANTINS-MEARI; A TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; P TOCANTINS-MEARI; SO TOCANTINS-MEARI; SP TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:*
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* A Cretaceo Tocantins-Meari; A Terciario Litora Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; P Tocantins-Meari; SO Tocantins-Meari; Sp Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* INSERIR ESTA ÁREA NA APA BAIXADA MARANHENSE;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADES DE PESCADORES
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-008

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 70250

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	12 ESPÉCIES
AVES	33 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	0 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus PA; Dendropsophus_sarayacuensis; kentropyx striata AP PA; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; D CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DB CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DB CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá-uná;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:*
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; D Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* É NECESSÁRIO RECUPERAR AS ÁREAS QUE JÁ FORAM DESMATADAS E APOIAR A AGRICULTURA FAMILIAR COM DIVERSIDADE DE PRODUTOS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PEQUENOS/MÉDIOS AGRICULTORES/EXTRATIVISTAS.
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO COM TERRITÓRIO QUILOMBOLA EM ESTUDO (SOBREPOSIÇÃO MANTIDA)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-009

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 639878

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	8 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	0 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Dendropsophus_sarayacuensis; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_anerythra; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F XINGÚ-ARAGUAIA; FA XINGÚ-ARAGUAIA; FS XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA; PAA XINGÚ-ARAGUAIA; PAH XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Suiá-miçu ou Suiazão; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:*
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* F Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; Pah Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Suiá-miçu ou Suiazão;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 1584 - SOBREPÕE O ASSENTAMENTO PA SÃO MANOEL E PA PINGOS D'ÁGUA; 15566 - SOBREPÕE AO ASSENTAMENTO PA PINGOS D'ÁGUA; 15567 - SOBREPÕE AO ASSENTAMENTO PA CANAÃ I*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-010

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 22002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	0 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; A PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ;*

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá-uná;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:*
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; A Paleozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* UP ADJACENTE A TERRA INDÍGENA EXIGINDO MAIOR FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ILEGAIS E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO ENTORNO DA TI
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-011

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 51208

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); MONITORAMENTO E MANEJO: ESPÉCIES ENVOLVIDAS DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE; PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	0 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Purus;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:*
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Purus;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-012

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 285627

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	9 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GRANDES BLOCOS DE VEGETAÇÃO PRIMÁRIA.; REGIÃO DE VIOLÊNCIA NO CAMPO ENTRE CORUMBIARA E CHUPINGUAIA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; PCH/CGH; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: VILHENA (ID 155)*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-013

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 52554

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): COMITÊS DE BACIA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jarina; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Abunã; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Abunã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-014

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 160435

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	6 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus septemcinctus; Alouatta caraya; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F MADEIRA-TAPAJÓS; FA MADEIRA-TAPAJÓS; FB MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Paragua;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PESQUISA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS NATURAIS E A CULTURA DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DA REGIÃO.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADES QUILOMBOLAS CAPÃO NEGRO, VALE DO ALEGRE MANGA E BELA COR.
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS: ÁREA INDICADA NO MAPEAMENTO SOCIAL, 28 (UFMT)*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-015

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 15888

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO; RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA; CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL: CRIAÇÃO DE RESEX

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	3 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Pithecia irrorata; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Purus;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR ECOLÓGICO NO INTERFLÚVIO IACO-MARACANÃ; AMPLIAÇÃO DA RESEX CHICO MENDES;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-016

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 167624

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO/ PROTEÇÃO DE FORMAÇÃO GEOLÓGICAS RELEVANTES: CAVERNAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	27 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	28 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Hopliancistrus tricornis / Floodplain Tapajós;*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Mico leucippe; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; A PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; D CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; D*

Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Tapajós-Xingú; D Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Tapajós-Xingú; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Paleozoico Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; Ds Quaternario Tapajós-Xingú; Pah Madeira-Tapajós; Pah Tapajós-Xingú;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Tapajós; A Cretaceo Tapajós-Xingú; A Paleozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; As Quaternario Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Paleo
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cretaceo Tapajós-Xingú; A Paleozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; As Quaternario Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Tapajós-Xingú; D Quaternario Madeira-Tapajós;

D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Tapajós-Xingú; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Paleozoico Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; Ds Quaternario Tapajós-Xingú; Pah Madeira-Tapajós; Pah Tapajós-Xingú;

- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tapajós;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE OCORRÊNCIA DE CAVERNAS E ÁREA DE AGRICULTURA FAMILIAR AO LONGO DA BR-23, BASTANTE DEGRADADAGRANDE PRESENÇA DE ASSENTAMENTOS E EXPANSÃO DA PECUÁRIA / DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA. EXPANSÃO DA PECUÁRIA EM GRANDES PROPRIEDADES.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* AGRICULTURA FAMILIAR
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE R

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-017

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 47936

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE; PESQUISA: MONITORAMENTO DE ESPÉCIES

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	15 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	16 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios

(Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Marmelos; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jiparaná ou Machado; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Marmelos;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Jiparaná ou Machado; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapa
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jiparaná ou Machado; Rio Marmelos;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM VEGETAÇÃO NATURAL E REGIÃO COM ASSENTAMENTOSPROXIMIDADE COM O PARNA CAMPOS AMAZÔNICOS, POTENCIALIDADE PARA GERAÇÃO DE IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (jusante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-018

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 12551

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: LEVANTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO POR COMUNIDADES RESIDENTES; MONITORAMENTO E MANEJO: PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* RECONHECIMENTO DO POTENCIAL DE PFNMS PARA O MANEJO; O PROCESSO DE CRIAÇÃO DESSA UC DEVE PREVÊ A CATEGORIA RBS POIS POSSUI MUITAS ÁREAS PRIVADAS E A DEMANDA DE CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL POR POSSEIROS LOCAIS.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-019

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 102102

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA; MONITORAMENTO E MANEJO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tapauá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tapauá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tapauá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* INCORPORAÇÃO DA UP EM TI VIZINHA (PAUMARI)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* OS INDÍGENAS PAUMARI DO RIO TAPAUÁ ESTÃO REQUERENDO A REVISÃO DOS ATUAIS LIMITES DAS TRÊS TERRAS INDÍGENAS DADO OS TAMANHOS REDUZIDOS. ELES REQUEREM A UNIÃO DAS TRÊS TIS E A INCORPORAÇÃO DE ÁREAS DE USO VIZINHAS ATUAL E HISTORICAMENTE FORA DOS LIMITES ATU
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-020

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 39588

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO/ PROTEÇÃO DE FORMAÇÃO GEOLÓGICAS RELEVANTES: GEOPARQUES; CAVERNAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE; MONITORAMENTO DE ESPÉCIES; CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	1 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Scobinancistrus aureatus / Floodplain Xingu;*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA;*

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Xingu / Floodplain Xingu;
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Xingu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE PEDRAL, IMPORTÂNCIA POR FAUNA ENDÊMICA E PARA PROTEÇÃO DE ÁREAS GEOLÓGICAS RELEVANTES; IMPORTÂNCIA POR FAUNA ENDÊMICA E PARA PROTEÇÃO DE ÁREAS GEOLÓGICAS RELEVANTES; ESSA ÁREA POSSUI UMA ESPÉCIE DE MORCEGO QUE JÁ SE SABE QUE DURANTE A SECA ELE UTILIZA ESSA ÁREA COMO ABRIGO. NA CHEIA NÃO SE SABE PARA ONDE ELES VÃO; PROTEÇÃO DOS MORCEGOS E DA ICTIOFAUNA DOS PEDRAIS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações: Essa área está contígua com uma "área analisada"*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-021

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 136302

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Aripuanã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Aripuanã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-022

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 15302

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO; RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO; RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Bolitoglossa_caldwellae; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia inusta; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR ECOLÓGICO;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-023

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 11344

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Bolitoglossa_caldwellae; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Pithecia inusta; Sotalia fluviatilis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quatern
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-024

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 440533

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes nascimentoi S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides);

Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Bacajá; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Pacajá; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Pacajá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA NAS PROXIMIDADES DA BR-163, ONDE TEM UMA GRANDE REGIÃO DE CONFLITO, QUE JÁ FORAM BASTANTE EXPLORADAS E NECESSITAM DE RECUPERAÇÃO; FORTALECER O USO ONDE TEM ASSENTAMENTO PARA QUE HAJA O DESENVOLVIMENTO DE UMA ATIVIDADE SUSTENTÁVEL;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-025

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 231603

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	26 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	4 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	26 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	8 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; A CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; A QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; D CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; LB PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos);

Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Purus; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Acre; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Purus; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Sepatini; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Acre; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Sepatini;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Japurá-Purús; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Japurá-Purús; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Japurá-Purús; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Purús-Madeira; Lb Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Purus; Rio Acre; Rio Inauini; Rio Purus;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ESTA ÁREA TEM GRANDE PRESSÃO PECUÁRIA (DESMATAMENTO) E O USO EXTRATIVISTA DEVE SER FORTALECIDO POIS HÁ MUITAS COMUNIDADES QUE VIVEM DA EXTRAÇÃO DA CASTANHA. FALTA ORGANIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES EXTRATIVISTAS POIS VIVEM ISOLADAS. POR EXEMPLO, APOIO PARA ESTABELECIMENTO DE ASSOCIAÇÕES.; FORTALECER A CADEIA DE CASTANHAS E APOIO PARA ESTABELECIMENTO DE ASSOCIAÇÕES.PECUÁRIA (DESMATAMENTO)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* EXTRAÇÃO DE CASTANHAS
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADES EXTRATIVISTAS (CASTANHAS)
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: EXISTEM GLEBAS REGULARIZADAS E OUTRAS COM PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-026

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 327600

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_retentus; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Piculus_paraensis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; D PALEOZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO*

Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Cretaceo Xingú-Araguaia; Ds Paleozoico Xingú-Araguaia;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tocantins; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Itacaiúnas;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Paleozoico Xingú-Araguaia; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Prote
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Paleozoico Xingú-Araguaia; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Cretaceo Xingú-Araguaia; Ds Paleozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tocantins; Rio Itacaiúnas;

Caracterização

- *Características Gerais:* Fortalecimento da agricultura familiar. Região com grande incidência de assentamento e muito alterada. Necessidade de estabelecimento de politicas publicas para fortalecimento do sistema produtivo familiar.
- *Usos Sustentáveis:* Agricultura familiar
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Gasoduto; Ferrovias; Mineração com até 50ha de área; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-027

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 21006

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: HABITAT CRÍTICO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	24 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; D TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA; LA XINGÚ-ARAGUAIA; LG XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios

(Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta South;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; La Xingú-Araguaia; Lg Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; La Xingú-Araguaia; Lg Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta South;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS COM CAMPINARANAS (DISPERSAS) E CAMPINAS; COM RETIRADA DE AREIA (PELO POVO QUILOMBOLA)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* ÁREA UTILIZADA COM RETIRADA DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS DOS QUILOMBOLAS
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ENTORNO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA TITULADO (SOBREPOSIÇÃO ELIMINADA)*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-028

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 79982

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: ESPÉCIES ENVOLVIDAS DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_retentus; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO TOCANTINS-MEARI; D CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; D QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tocantins; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Itacaiúnas;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tocantins; Rio Itacaiúnas;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM REGIÃO DE PESCA; ASSENTAMENTOS; AO LADO DE TI; PEDRAL DO LOURENÇO; EXPLORAÇÃO DE PALMITO (AÇAÍ), ALÉM DO FATO QUE E UMA REGIÃO DE UM BERÇÁRIO DAS ESPÉCIES ICTIOLÓGICAS; NECESSITA FORTALECER A ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO DE PALMITO PARA QUE HAJA UMA EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL, VISTO HAVER NA REGIÃO EMPRESAS E ASSENTAMENTOS QUE UTILIZAM ESSE RECURSO;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* ÁREA DE REGIÃO DE PESCA E EXPLORAÇÃO DE PALMITO (AÇAÍ)
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-029

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 168760

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO; PESQUISA: RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Contopus_nigrescens; Malacoptila_striata; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Conepatus semistriatus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO TOCANTINS-MEARI; A CRETACEO TOCANTINS-MEARI; A QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; D PROTEROZOICO TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; SN TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Tocantins-Meari; A Cretaceo Tocantins-Meari; A Quaternario Tocantins-Meari; D Proterozoico Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; SN Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Tocantins-Meari; A Cretaceo Tocantins-Meari; A Quaternario Tocantins-Meari; D Proterozoico Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; SN Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Mearim; Rio Itapicuru;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE RELEVÂNCIA PARA AS QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU, ENVOLVENDO ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA, TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS, QUE SEJAM CRIADOS TERRITÓRIOS COLETIVOS DE USO SUSTENTÁVEL
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; FERROVIAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO COM TERRITÓRIO QUILOMBOLA EM ESTUDO (SOBREPOSIÇÃO MANTIDA)*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-030

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 790255

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO; PESQUISA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	1 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	14 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	14 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis planiceps; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles belzebuth; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus macrocephalus; Sotalia fluviatilis; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari; Trichechus inunguis;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO NEGRO-BRANCO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; L JAPURÁ-NEGRO; LA JAPURÁ-NEGRO; LB JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO; LG JAPURÁ-NEGRO; LG NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Unini; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Cuiuni;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Negro / Floodplain Negro;

- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Negro-Branco; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Db Quaternario Japurá-Negro; L Ja
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Negro-Branco; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Db Quaternario Japurá-Negro; L Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Lb Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro; Lg Japurá-Negro; Lg Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Negro; Rio Cuiuni;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* ATIVIDADE PESQUEIRA (ESPORTIVA); EXTRATIVISMO
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ÁREA POUCO CONHECIDA*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-031

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 33186

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO; PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; HABITAT CRÍTICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	26 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes eladioi; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Itacaiúnas;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA ESTA NO ENTORNO DA TI COM AÇÕES DE MINERAÇÃO LEGAL E ILEGAL
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-032

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 74250

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	21 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Arapiuns;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Arapiuns;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* UP COM ASSENTAMENTOS E ÁREA BEM PRESERVADA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: INCLUI UP NO MEIO (AO LADO DO UARINI)*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-033

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 41322

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL: CRIAÇÃO DE RESEX

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO; RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO; ESPÉCIES ENVOLVIDAS DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	24 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	1 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Trichechus inunguis; Trichechus manatus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; PF TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:* Manguezais;
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Pf Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Pf Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA EM PROCESSO DE CRIAÇÃO DE RESEX, SALIENTA-SE NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO. COLOCAR EM PAUTA NA PRÓXIMA OFICINA DE BELÉM
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-034

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 61067

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao calvus calvus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: KULINA; QUELÔNIOS*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-035

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 30929

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: KULINA; QUELÔNIOS*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-036

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 10326

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO; RECONHECIMENTO DE TI

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus rubicundus; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; D QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; D QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jandiatuba; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Subandean Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Western Amazon floodplain;

Alvo 2 - Macrófitas / Subandean Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Western Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; D Quaternario Javarí-Juruá; D Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; D Quaternario Javarí-Juruá; D Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jandiatuba; Subandean Amazon floodplain; Western Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* MANEJO DE PIRARUCU
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* RECONHECIMENTO DE TI POVO TIKUNA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-037

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 53740

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: MONITORAMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: MADEIRA EMPRESARIAL; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tarauca; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tarauca;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NA BACIA DO RIO MACACO, DIVISA DE MUNICÍPIO DE FEIJÓ E MANOEL ESTÁ EM CRIAÇÃO UMA FLORESTA ESTADUAL COM URBANO. NOME AFLUENTE E ELA É PRÓXIMO AS UPS DESSA FICHA. NECESSITA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS POR ESTAR PRÓXIMO A BR.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* EXISTEM PROJETOS DE MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO EMPRESARIAL
- *OPORTUNIDADES:* ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: POSSIVELMENTE ESSA ÁREA ENCONTRA-SE NA BACIA DO JURUPARI E DESENVOLVEM UM PROJETO PRIVADO DE CARBONO EM ANDAMENTO.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-038

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 113592

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: USO E OCUPAÇÃO POR COMUNIDADES RESIDENTES; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; A CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tarauca; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tarauca;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tarauca;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE TI PARA KAXINAWAS EM ÁREA CONHECIDA COMO SERINGAL CURRALINHO, JÁ EM TRAMITAÇÃO PELA FUNAI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: EXISTE PA E RAMAL QUE CULMINAM NO RIO*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-039

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 205312

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	20 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Contopus_nigrescens; Crax_fasciolata_pinima; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Lophornis_gouldii; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO TOCANTINS-MEARI; D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D PALEOZOICO TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; PAH TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Paleozoico Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Pah Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Paleozoico Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Pah Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Coastal wetland S; Rio Gurupi;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* EXISTÊNCIA DE TERRAS MARINHAS AO NORTE E AO SUL TERRAS QUILOMBOLAS E ASSENTAMENTOS; FLORESTA PRIMÁRIA (DEGRADADA QUE NECESSITA SER PRESERVADA).; PRESSÃO PARA A EXPLORAÇÃO FLORESTAL ILEGAL
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; ATIVIDADES MINERADORAS NÃO OFICIAIS (CLANDESTINAS); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ÁREA COM ASSENTAMENTOS; ENTORNO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA TITULADO (SOBREPOSIÇÃO ELIMINADA)*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-040

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 58991

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	21 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Mamuru;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MUITO PRÓXIMO AO PARNA DA AMAZÔNIA E TI ANDIR-MARAU E AINDA MUITO PRESERVADA, MAS COM RISCO DE EXPLORAÇÃO (MADEIREIRA), POIS PELAS IMAGENS DE SATÉLITE FORAM IDENTIFICADOS MUITOS PÁTIOS (NO ENTORNO DA UP); FLORESTA NATIVA MUITO BEM PRESERVADA; FOI IDENTIFICADO ALGUNS PONTOS DE DESMATAMENTO, POSSÍVEIS PÁTIOS DE EXPLORAÇÃO MADEIREIRA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ÁREA COM SIGEF*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-041

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 183438

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	12 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus RR; anolis chrysolepis; anolis planiceps; Anomaloglossus_apiau; Atelopus_hoogmoedi; cnemidophorus lemniscatus RR; coleodactylus septentrionalis; gymnophthalmus leucomystax; gymnophthalmus vanzoi; kentropyx striata RR; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; DS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; LA NEGRO-BRANCO; ON NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Mucajaí;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Mucajaí; As Proterozoico Negro-Branco; Ds Proterozoico Negro-Branco; La Negro-Branco; ON Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Negro-Branco; Ds Proterozoico Negro-Branco; La Negro-Branco; ON Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Rio Mucajaí;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FAZENDAS GRANDES, SERRA DO APUÍ COM UMA NOVA ESPÉCIE RECÉM DESCRITA (NECESSIDADE DE PROTEGER A ÁREA); ÁREA DE FLORESTA.; OCORRÊNCIA DE ESPÉCIE ENDÊMICA. INDICAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO BASEADO EM PESQUISA.; ATIVIDADES ILEGAIS DE DESMATAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASTO PARA CRIAÇÃO DE GADO DE CORTE.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-042

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 108300

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus RR; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; cnemidophorus lemniscatus RR; coleodactylus septentrionalis; Dendrobates_leucomelas; gymnophthalmus leucomystax; kentropyx striata RR; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; FA NEGRO-BRANCO; FS NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uraricoera;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Uraricoera; Ds Proterozoico Negro-Branco; Fa Negro-Branco; Fs Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ds Proterozoico Negro-Branco; Fa Negro-Branco; Fs Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Rio Uraricoera;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ (AÇÃO JÁ EM CURSO).; GARIMPO INTENSO, O MAIS CRÍTICO DE RORAIMA, SEM FISCALIZAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-043

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 58485

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDOS DE PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL; PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; AB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jaú; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Manacapuru;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Ab Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Ab Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA VIZINHA AO PARNA JAÚ; NECESSIDADE DE PROTEGER AS MICROBACIAS DO CARABINANI, QUE DRENAM PARA O PARQUE;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: INCLUIR O POLÍGONO EM BRANCO ENTRE A ÁREA E O PARNA JAÚ*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-044

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 135050

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO; DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL: ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS QUE ENVOLVAM COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	21 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus PA; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Arapiuns; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Arapiuns;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Arapiuns;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA ENTRE O ARAPIUNS E O AMAZONAS, COM PRAIAS, ILHAS E TRILHAS COM ALTO POTENCIAL TURÍSTICO; PRESSÃO DE EXPLORAÇÃO MADEIREIRA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; PCH/CGH

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-045

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 15232

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECONHECIMENTO DE TI;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus rubicundus; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; D QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; D QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Subandean Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Western Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Subandean Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Western Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; D Quaternario Javarí-Juruá; D Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; D Quaternario Javarí-Juruá; D Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jandiatuba; Subandean Amazon floodplain; Western Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* MANEJO DE PIRARUCU
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* RECONHECIMENTO DE TI POVO TIKUNA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-046

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 436202

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECONHECIMENTO DE TI;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Cebus albifrons albifrons; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix poeppigii; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Pithecia monachus; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus macrocephalus; Sotalia fluviatilis; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari; Trichechus inunguis;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jandiatuba; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jandiatuba;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jandiatuba; Subandean Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA RICA EM QUELÔNIOS, CAÇA PREDATÓRIA, PESCA IMPORTANTE, PROXIMIDADE COM ÁREA DE ISOLADOS E USADA POR ESTES PARA CAÇA E PESCA, CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS QUE CHEGA ÀS TIS PELO GARIMPO.GARIMPO ILEGAL E CAÇA PREDATÓRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRESERVAÇÃO DE ETNIAS INDÍGENAS (XAMBEBA E TIKUNA)
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-047

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 34128

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECONHECIMENTO DE TI; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	28 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DB QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO DE ENTORNO IMEDIATO DA FLONA CAXIUANA COM PRESENÇA DE ASSENTAMENTOS E PONTOS DE EXTRAÇÃO SELETIVA DE MADEIRA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* EXTRAÇÃO SELETIVA DE MADEIRA
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: COMENTÁRIOS SOBRE ATIVIDADES DE CAMPO DA FUNAI NA ÁREA - POSSÍVEIS ISOLADOS (?); SOBREPOSIÇÃO COM PAE COM/INCRA (?)*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-048

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 104807

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis bombiceps; anolis planiceps; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; LA JAPURÁ-NEGRO; LB JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO; LG JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uneiuxi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Lb Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro; Lg Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Lb Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro; Lg Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Negro; Rio Uneiuxi;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* HÁ UMA CONECTIVIDADE ÉTNICA E ECOSSISTÊMICA. ÁREAS QUE DEVEM TER GESTÃO INTEGRADA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-049

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 40799

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	11 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Guaruba_guarouba; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Penelope_pileata; Piculus_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; SA TOCANTINS-MEARI; SP TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Sa Tocantins-Meari; Sp Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Sa Tocantins-Meari; Sp Tocantins-Meari;

- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA MUITO DEGRADADA ENTRE TI
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-050

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 36302

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL: CRIAÇÃO DE RESEX

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC); FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jiparaná ou Machado;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jiparaná ou Machado; Floodplain Madeira;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CRIAÇÃO DE RESEX/RDS (UMA RDS FOI RECENTEMENTE CRIADA E SUA ANULAÇÃO FOI DECRETADA EM FINS DE MARÇO/18); CORREDOR ECOLÓGICO - ENTRE ÁREAS PRIORITÁRIAS/UC;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-051

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 51928

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; D QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; PAH JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; Pah Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; Pah Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* IG DA FARINHA DE UARINI; AGRICULTORES TRADICIONAIS BASTANTE ENVOLVIDOS; ATIVIDADE AGRÍCOLA PODE EXPANDIR; CUIDADO PARA O INSTRUMENTO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NÃO FOMENTAR A ESPECIALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE AGRICULTURA (PERDA DA AGROBIODIVERSIDADE); FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DO PIRARUCU; AÇÕES VOLTADAS PARA O FORTALECIMENTO DO ACORDO DE PESCA; EXPANSÃO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* MANEJO DE PIRARUCU; AGRICULTURA TRADICIONAL
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* AGRICULTURA TRADICIONAL
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-052

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 85684

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): COMITÊS DE BACIA; ACORDO DE PESCA; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; A CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tarauca; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tarauca;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tarauca;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* COMITÊ DE BACIA E ACORDO DE PESCA; REFLORESTAMENTOS MARGENS DO RIO ENVIRA; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-053

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 47818

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; amapasaurus tetradactylus; anolis auratus AP PA; Atelopus_hoogmoedi; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N;
- *Aves:* Aburria_cujubi;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus castaneus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Neusticomys oyapocki; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO TROMBETAS-JARÍ; AS PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; DS PROTEROZOICO TROMBETAS-JARÍ; DS PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; SP TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Curuá; As Proterozoico Trombetas-Jarí; As Paleozoico Trombetas-Jarí; Ds Proterozoico Trombetas-Jarí; Ds Paleozoico Trombetas-Jarí; Sp Trombetas-Jarí;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Trombetas-Jarí; As Paleozoico Trombetas-Jarí; Ds Proterozoico Trombetas-Jarí; Ds Paleozoico Trombetas-Jarí; Sp Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água: Rio Curuá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PDS PARAÍSO SOFRE PRESSÃO DE MADEIREIROS, NESTE SENTIDO DEVE SER FORTALECIDO O INSTRUMENTO DE GESTÃO PREEXISTENTE NO ASSENTAMENTO. ISSO FORTALECE AS COMUNIDADES CONTRA O ALICIAMENTO EM FAVOR DAS ATIVIDADES DEGRADANTESPRESSÃO DE EXPLORAÇÃO MADEIREIRA

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-054

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 27472

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jarina; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Db

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Acre;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PROPRIEDADE PRIVADA COM ALTO ÍNDICE DE CONVERSÃO EM PASTAGENS, NECESSÁRIO DO REESTABELECIMENTO DE SE.; PRÓXIMO AO XAPURI PECUÁRIA (DESMATAMENTO)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-055

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 225380

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO/ PROTEÇÃO DE FORMAÇÃO GEOLÓGICAS RELEVANTES

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	13 ESPÉCIES
AVES	40 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	14 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	1 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	14 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	15 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus E; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; gonatodes nascimentoi S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_retentus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_paraensis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Hypancistrus zebra / Floodplain Xingu; Megadontognathus kaitukaensis / Floodplain Xingu; Ossubtus xinguense / Floodplain Xingu; Parancistrus nudiventris / Floodplain Xingu; Pituna xinguensis / Floodplain Xingu; Plesiolebias almtamira / Floodplain Xingu; R*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Trichechus

inunguis; Ateles marginatus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;

- *Ambientes Terrestres: As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; D Paleozoico Xingú-Araguaia; D Quaternario Tapajós-Xingú; D Quaternario Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Xingu / Floodplain Xingu;
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Xingu; As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; D Paleozoico Xingú-Araguaia; D Quaternario Tapajós-Xingú; D
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D

Paleozoico Tapajós-Xingú; D Paleozoico Xingú-Araguaia; D Quaternario Tapajós-Xingú; D Quaternario Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;

- *Interface Terra*-Água: Floodplain Xingu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FORMAÇÃO GEOLÓGICA RELEVANTE COM PRESENÇA DE FAUNA ESPECÍFICA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: FICHAS 32 E 33 FORAM UNIFICADAS, ATRIBUINDO-SE A MESMA IDENTIDADE DA ÁREA (32).*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: ILHA DO ARAPUJÁ - BELO MONTE (ID 52)*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-056

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 26633

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL: CRIAÇÃO DE RESEX

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PROPOSTA CRIAÇÃO RESEX RIOZINHO DO ROLA; RECUPERAÇÃO DE COBERTURA FLORESTAL
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-057

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 33095

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; arthrosaura kockii N; Atelopus_hoogmoedi; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus olivaceus castaneus; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Neusticomys oyapocki; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZO; S JARÍ-FOZ AMAZON; SP JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; S Jarí-Foz Amazon; Sp Jarí-Foz Amazon;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Db Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; S Jarí-Foz Amazon; Sp Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE EXPANSÃO URBANA (CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS) COM PROBLEMA DE GESTÃO DO LIXO E AMBIENTES DEGRADADOSÁREA DE EXPANSÃO URBANA (CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS) COM PROBLEMA DE GESTÃO DO LIXO E AMBIENTES DEGRADADOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; FERROVIAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ENTORNO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA TITULADO (SOBREPOSIÇÃO ELIMINADA)/SOBREPOSIÇÃO COM TERRITÓRIO QUILOMBOLA EM ESTUDO (SOBREPOSIÇÃO MANTIDA)*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-058

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 300547

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; PESQUISA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	4 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; anolis tandai; anolis transversalis; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Mico chrysoleucus; Mico saterei; Plecturocebus baptista; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Abacaxis; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Abacaxi; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Canumã; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Abacaxis; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Abacaxi;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Floodplain Abacaxis; Rio Abacaxi; Rio Canumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE ALTA DIVERSIDADE COM POTENCIAL DE DESCOBERTA DE NOVAS ESPÉCIES, ALTO POTENCIAL DE PESQUISA E GESTÃO DO CONHECIMENTO.; REGULARIZAÇÃO EXPLORAÇÃO FLORESTAL, PECUÁRIA, MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-059

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 52645

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL: CRIAÇÃO DE RESEX

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO; DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE; RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tarauca; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tarauca;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AMPLIAÇÃO DA RESEX TAUARACÁ (EXISTE DEMANDA NO ICMBIO/CNPT); PESQUISA PARA JUSTIFICAR AMPLIAÇÃO DE UC OU TI; NECESSITA ACORDO DE PESCA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-060

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 79693

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE; DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO; RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Bolitoglossa_caldwellae; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Pithecia inusta; Sotalia fluviatilis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; A CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-061

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 77733

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO; RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO; DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis chrysolepis; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; cnemidophorus lemniscatus AM; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Saguinus martinsi martinsi; Saguinus martinsi ochraceus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; PAA BRANCO-TROMBETA; SP BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Nhamundá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Nhamundá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Paa Branco-Trombeta; Sp Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Paa Branco-Trombeta; Sp Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Nhamundá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSÁRIO FORTALECER AS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; NECESSÁRIO REALIZAR PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS, SOBRE PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS, E SOBRE RECURSOS PESQUEIROS; AVALIAR A CONECTIVIDADE COM OUTRAS ÁREAS. EXISTEM PROPOSTAS DE CRIAÇÃO DE UCS NAS ÁREAS PRÓXIMAS; EXISTE HISTÓRICO DE EXTRAÇÃO DE SEIXO NO LEITO DO RIO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-062

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 73713

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; amapasaurus tetradactylus; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; arthrosaura kockii N; Atelopus_hoogmoedi; gonatodes nascimentoi N; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus castaneus; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Neusticomys oyapocki; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; D QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DA PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DB PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DB QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DS PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DS QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DS TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Db Quaternario Jarí-Foz

Amazon; Ds Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Ds Quaternario Jarí-Foz Amazon; Ds Terciario Litora Jarí-Foz

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon; Ds Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Ds Quaternario Jarí-Foz Amazon; Ds Terciario Litora Jarí-Foz Amazo;
- *Interface Terra*-Água: Rio Araguari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* CASTANHAIS
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; ; FERROVIAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-063

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 794733

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Crax_fasciolata_pinima; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Trichechus inunguis; Trichechus manatus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D PALEOZOICO TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; PAH TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Paleozoico Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Pah Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Paleozoico Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Pah Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guamá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E RECONHECIMENTO DAS NECESSIDADES DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS PRESTADOS PELO SISTEMA HIDROGRÁFICO.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* INCLUI POPULAÇÕES TRADICIONAIS, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações: Entorno de território quilombola titulado (sobreposição eliminada)/Sobreposição com território quilombola em estudo (sobreposição mantida)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-064

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 23467

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; RECONHECIMENTO DE TI

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus RR; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; cnemidophorus lemniscatus RR; coleodactylus septentrionalis; Dendrobates_leucomelas; gymnophthalmus leucomystax; gymnophthalmus vanzoi; kentropyx striata RR; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; FA NEGRO-BRANCO; FS NEGRO-BRANCO; SP NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uraricoera;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ds Proterozoico Negro-Branco; Fa Negro-Branco; Fs Negro-Branco; Sp Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Ds Proterozoico Negro-Branco; Fa Negro-Branco; Fs Negro-Branco; Sp Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA PRESERVADA, NÃO IDEAL PARA AGRICULTURA. MUITO AFLORAMENTO ROCHOSO.AGRICULTURA E PECUÁRIA EM CAMPOS NATURAIS. CAÇA, APOIO AO GARIMPO, DEGRADAÇÃO EM APP. TERRA DE LAVRADO, ANTERIORMENTE PROPOSTA COMO UC.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* ÁREA UTILIZADA POR INDÍGENAS
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-065

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 20887

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	1 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis chrysolepis; arthrosaura kockii N; Atelopus_hoogmoedi; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus castaneus; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Neusticomys oyapocki; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DB QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DB TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZO; PAH JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:* Manguezais;
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Pah Jarí-Foz Amazon;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Pah Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água: Rio Oiapoque;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FORTALECER O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NÃO MADEIREIROS; APOIO PARA ATIVIDADES PRODUTIVAS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA E MINIMIZAR OS IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS NATURAIS; ACORDOS DE PESCA; REGIÃO DE FRONTEIRA DE GRANDE IMPACTO AMBIENTAL; PRÁTICAS DE CAÇA E PESCA PREDATÓRIAS (NOS IGARAPÉS E NO RIO OIAPOQUE) E INVASÃO NAS TERRAS INDÍGENAS PARA A RETIRADA ILEGAL DOS RECURSOS NATURAIS. PREJUÍZO PARA TI E UCS ADJACENTES.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ÁREA DE FRONTEIRA. PARA OS ACORDOS SÃO NECESSÁRIOS DIÁLOGOS COM A GUIANA.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-066

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 98235

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	17 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	17 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PA JAPURÁ-PURÚS; PA PURÚS-MADEIRA; PAA PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Purus; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Ituxi; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tapauá; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Ituxi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Purús-Madeira; Pa Japurá-Purús; Pa Purús-Madeira; Paa Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Purus; Rio Ituxi;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* CASTANHA
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-067

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 38213

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maderinha;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água:

Caracterização

- *Características Gerais:* Existe processo para criação de área indígena (Kamayná) ou incorporar na UC de uso sustentável RDS AmapáExploração ilegal de madeira
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Área utilizada por indígenas
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: Está próxima da RDS Amapá e Parque Jari*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-068

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 28633

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	3 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Purus; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Purus;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Purus;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PA SANTA ROSA NECESSÁRIO RECUPERAÇÃO DE APPS E RLS; CAR E PRA PARA REGULARIZAR AMBIENTALMENTE
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-069

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 56318

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis chrysolepis; anolis planiceps; Anomaloglossus_apiau; Atelopus_hoogmoedi; cnemidophorus lemniscatus RR; coleodactylus septentrionalis; kentropyx striata RR; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; DS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera publifora Benth.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Branco;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Negro-Branco; Ds Proterozoico Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Negro-Branco; Ds Proterozoico Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FAZENDAS GRANDES, SERRA DO APUÍ COM UMA NOVA ESPÉCIE RECÉM DESCRITA (NECESSIDADE DE PROTEGER A ÁREA); ÁREA DE FLORESTA.; OCORRÊNCIA DE ESPÉCIE ENDÊMICA. INDICAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO BASEADO EM PESQUISA.; ATIVIDADES ILEGAIS DE DESMATAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASTO PARA CRIAÇÃO DE GADO DE CORTE.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-070

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 39679

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; LIMITAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Aripuanã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Rio Aripuanã; A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Aripuanã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS PARA CONTER DESMATAMENTO; ÁREA DE INCIDÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-071

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 973941

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	14 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	6 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Callibella humilis; Cebus albifrons albifrons; Mico manicorensis; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; D CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS; PA PURÚS-MADEIRA; PAA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios

(Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Manicoré; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Marmelos; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Manicoré; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Marmelos;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Manicoré; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Proterozoico Madeira-Tapajós; Db Cenoz
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Proterozoico Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós; Pa Purús-Madeira; Paa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira; Rio Manicoré; Rio Marmelos;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO ESTRATEGICAMENTE LOCALIZADA AO REDOR DE UCS FEDERAIS RECENTEMENTE CRIADAS; ÁREA DE INTERESSE PARA CORREDORES ECOLÓGICOS E ONDE JÁ EXISTEM PROPOSTAS DE CRIAÇÃO DE RDS PRÓXIMAS À MANICORÉ. ALÉM DISSO, POSSUI SÍTIOS DE RELEVÂNCIA PARA A PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO ECOLÓGICO-HISTÓRICO (E.G. TERRAS PRETAS DE ÍNDIO E VEGETAÇÕES ASSOCIADAS).; DEMANDA DE CRIAÇÃO DE RDS, ONDE EXISTE EXPLORAÇÃO DE CASTANHA. RDS PODE TAMBÉM ATUAR COMO CORREDOR ECOLÓGICO PARA UCS RECÉM CRIADAS NO ENTORNO DA BR-319; REGULARIZAÇÃO ATIVIDADES DE

EXTRATIVISMO, GARIMPO; GESTÃO INTEGRADA DE MOSAICO DE UCS FEDERAIS, ESTADUAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS.;

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-072

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 91026

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	15 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	15 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Purus;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cen
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Acre; Rio Inauini; Rio Purus;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO INTEGRADA; EXPLORAÇÃO MADEIREIRA E PECUÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-073

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 147901

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; A CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Abunã; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Acre; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Abunã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Acre; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Abunã;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Abunã; Rio Acre;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PROJETOS DE ASSENTAMENTO, PROPRIEDADES PRIVADAS QUE POSSUEM ÁREAS CONSOLIDADAS; DEVE-SE FISCALIZAR ABERTURA DE ÁREAS DESMATADAS; ÁREAS CONSOLIDADAS COM NECESSIDADES DE RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-074

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 21250

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA); FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	18 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Mamuru; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Mamuru;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Mamuru;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* COMO TEM MUITA ÁREA ANTRÓPICA É NECESSÁRIO REGULAMENTAR AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS.EXPLORAÇÃO MADEIREIRA E AGROPECUÁRIA NÃO-LICENCIADAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-075

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 108500

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	16 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	16 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Bolitoglossa_caldwellae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; A CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; A QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; D CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; D CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; D QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; LD JAVARÍ-JURUÁ; LG JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; D Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá; Ld Javarí-Juruá; Lg Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PA COM ALTO GRAU DE CONVERSÃO DO SOLO; LIMITES COM TI E UC, SENDO AS ÁREAS PROTEGIDAS ALVOS DE INVASÃO CONSTANTE; PROJETO DE ASSENTAMENTO SÃO SALVADOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* COLETA DE ÁRVORES PARA LENHA E PARA PRODUÇÃO DE FARINHA
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-076

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 235768

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	26 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Crax_fasciolata_pinima; Dendrocolaptes_medius; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Psophia_obscura; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI; P TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; P Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; P Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Pindaré;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CONFLITO MADEIREIRO, CARVOARIAS E TRABALHO ESCRAVO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; FERROVIAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-077

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 215741

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÃO (SOBREPOSIÇÃO COM ÁREA MILITAR)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_vilasboasi; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Mico leucippe; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; CS TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ; PAA TAPAJÓS-XINGÚ; RM TAPAJÓS-XINGÚ; S TAPAJÓS-XINGÚ; SA TAPAJÓS-XINGÚ; SN TAPAJÓS-XINGÚ;*

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain São Manoel; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São Benedito;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; Cs Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú; rm Tapajós-Xingú; S Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú; SN Tapajó
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; Cs Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú; rm Tapajós-Xingú; S Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain São Manoel; Rio São Benedito;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA MILITAR (SERRA DO CACHIMBO)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações: Sobreposição de bordas da UP (<5%) com área militar*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-078

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 535526

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÃO (SOBREPOSIÇÃO COM ÁREA MILITAR)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	33 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	14 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	14 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; gonatodes eladioi; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lepidothrix_vilasboasi; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Mico leucippe; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; CS TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; F TAPAJÓS-XINGÚ;*

Fs Tapajós-Xingú; La Tapajós-Xingú; Ld Tapajós-Xingú; Lg Tapajós-Xingú; LO Tapajós-Xingú; rm Tapajós-Xingú; S Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São Benedito;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; Cs Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; La Tapajós-Xingú; Ld Tapajós-Xingú; Lg Tapajós-Xingú; LO Tapajós-Xingú; rm Tapajós-
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; Cs Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; La Tapajós-Xingú; Ld Tapajós-Xingú; Lg Tapajós-Xingú; LO Tapajós-Xingú; rm Tapajós-Xingú; S Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

Caracterização

- *Características Gerais:*
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;

- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas Mineração com até 50ha de área; Mineração com mais de 50ha de área; ; Mudança do Clima - Precipitação; PCH/CGH ; ;

- *Referências:*

- *Outras Observações: UP sobrepondo (+5%) a área militar*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-079

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 159911

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÃO (SOBREPOSIÇÃO COM ÁREA MILITAR)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lepidothrix_vilasboasi; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Mico leucippe; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: CS TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; RM TAPAJÓS-XINGÚ; S TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios

(Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain São Manoel; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São Benedito;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Cs Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; rm Tapajós-Xingú; S Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Cs Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; rm Tapajós-Xingú; S Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: UP SOBREPONDO (+5%) A ÁREA MILITAR*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-080

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 19451

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÃO (SOBREPOSIÇÃO COM ÁREA MILITAR)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_vilasboasi; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Mico leucippe; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: CS TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; RM TAPAJÓS-XINGÚ; S TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Cs Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; rm Tapajós-Xingú; S Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Cs Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; rm Tapajós-Xingú; S Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: UP SOBREPONDO (+5%) A ÁREA MILITAR*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-081

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 55017

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÃO (SOBREPOSIÇÃO COM ÁREA MILITAR)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PAA PURÚS-MADEIRA; SO PURÚS-MADEIRA; SP PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Paa Purús-Madeira; SO Purús-Madeira; Sp Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Paa Purús-Madeira; SO Purús-Madeira; Sp Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* BR 3/9 - BLOCO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: UP SOBREPONDO (+5%) A ÁREA MILITAR*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-082

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 40377

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÃO (SOBREPOSIÇÃO COM ÁREA MILITAR)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; gonatodes tapajonicus; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jamaxim;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FORTE OCUPAÇÃO; ALTAS TAXAS DE DESMATAMENTO; ÁREAS TITULADAS (TERRA LEGAL - SIGEF); GARIMPOGARIMPO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: UP SOBREPONDO (+5%) A ÁREA MILITAR*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-083

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 37631

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; cnemidophorus lemniscatus AM; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus castaneus; Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Saguinus martinsi martinsi; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; D QUATERNARIO TROMBETAS-JARÍ; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; DB PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; DB QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DB QUATERNARIO TROMBETAS-JARÍ; DS CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; DS PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; DS QUATERNARIO TROMBETAS-JARÍ; PAA BRANCO-TROMBETA; PAA TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Paru do Oeste ou Erepecuru ou Cumin; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Trombetas; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio

Trombetas; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Paru do Oeste ou Erepecuru ou Cumin; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Trombetas;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Paru do Oeste ou Erepecuru ou Cumin; D Paleozoico Trombetas-Jarí; D Quaternario Trombetas-Jarí; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Paleozoico Trombetas-Jarí; Db Quaternario Branco-Trombeta; Db Quaternario Trombetas-Jarí; Ds Cr
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Paleozoico Trombetas-Jarí; D Quaternario Trombetas-Jarí; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Paleozoico Trombetas-Jarí; Db Quaternario Branco-Trombeta; Db Quaternario Trombetas-Jarí; Ds Cretaceo Trombetas-Jarí; Ds Paleozoico Trombetas-Jarí; Ds Quaternario Trombetas-Jarí; Paa Branco-Trombeta; Paa Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água: Rio Paru do Oeste ou Erepecuru ou Cumin; Floodplain Trombetas; Rio Trombetas;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TRATA-SE DE UMA ÁREA QUILOMBOLA CRIADA RECENTEMENTE (EREPECURU) QUE JÁ EXISTE UM NÍVEL DE PROTEÇÃO GERADO PELAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações: Entorno de território quilombola titulado (sobreposição eliminada)/Sobreposição com território quilombola em estudo (sobreposição mantida)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-084

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 147573

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÃO (SOBREPOSIÇÃO COM ÁREA MILITAR)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; arthrosaura kockii N; Atelopus_hoogmoedi; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus olivaceus castaneus; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Neusticomys oyapocki; Trichechus manatus; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZON; DA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DA TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZO; DB TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZO; PAH JARÍ-FOZ AMAZON; S JARÍ-FOZ AMAZON; SG JARÍ-FOZ AMAZON; SP JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta North;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Db Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Pah Jarí-Foz Amazon; S Jarí-Foz Amazon; Sg Jarí-Foz Amazon; Sp Jarí-Foz Amazon;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Db Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Pah Jarí-Foz Amazon; S Jarí-Foz Amazon; Sg Jarí-Foz Amazon; Sp Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North; Rio Araguari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* A UNIDADE DE PLANEJAMENTO ESTÁ TOTALMENTE INSERIDA NA ÁREA PRIVADA DA EMPRESA AMCEL DESTINADA À RESERVA LEGAL. NESTE CASO, A EMPRESA JÁ É RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DESTA LOCALIDADE.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; FERROVIAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-085

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 60714

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÃO (SOBREPOSIÇÃO COM ÁREA MILITAR)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; LA NEGRO-BRANCO; LD NEGRO-BRANCO; LG NEGRO-BRANCO; LO NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Branco; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Catrimani; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Demini;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Branco; Ds Cenozoico Terc2 Negro-Branco; La Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco; LO Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ds Cenozoico Terc2 Negro-Branco; La Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco; LO Negro-Branco;

- *Interface Terra*-Água: Floodplain Branco; Rio Catrimani; Rio Demini;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: UP SOBREPONDO (+5%) A ÁREA MILITAR*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-086

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 20067

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): SEM AÇÃO (SOBREPOSIÇÃO COM ÁREA MILITAR)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: LD NEGRO-BRANCO; LG NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Branco;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* INSERIDAS EM GLEBA DO EXÉRCITO; CONTÍGUA AO P.N SERRA DA MOCIDADE; USO NÃO IDENTIFICADO/CONHECIDO.

- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Estoque de carbono (biomassa)
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: UP sobrepondo (+5%) a área militar*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-087

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 155933

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	0 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:*
- *Aves:* Hylexetastes_uniformis; Pyrrhura_perlata;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: C MADEIRA-TAPAJÓS; CB MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; S PARAGUAY; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SN PARAGUAY; SP MADEIRA-TAPAJÓS; T MADEIRA-TAPAJÓS; TN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* C Madeira-Tapajós; Cb Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; S Paraguay; SN Madeira-Tapajós; SN Paraguay; Sp Madeira-Tapajós; T Madeira-Tapajós; TN Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* C Madeira-Tapajós; Cb Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; S Paraguay; SN Madeira-Tapajós; SN Paraguay; Sp Madeira-Tapajós; T Madeira-Tapajós; TN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA INDICADA NO ZSEE DE 218.; CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARA REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE - ÁREA DO PANTANAL DO RIO GUAPORÉ;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-088

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 298349

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	1 ESPÉCIES
AVES	4 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni;
- *Aves:* Hylexetastes_uniformis; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus septemcinctus; Alouatta caraya; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: C MADEIRA-TAPAJÓS; CB MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FA MADEIRA-TAPAJÓS; FB MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS; ST MADEIRA-TAPAJÓS; TN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* C Madeira-Tapajós; Cb Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós; ST Madeira-Tapajós; TN Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* C Madeira-Tapajós; Cb Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa

Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós; ST Madeira-Tapajós; TN Madeira-Tapajós;

- *Interface Terra*-Água: Rio Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA INDICADA NO ZSEE DE 218.; CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARA REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE - ÁREA DO PANTANAL DO RIO GUAPORÉ;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-089

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 91858

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	1 ESPÉCIES
AVES	20 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São Manuel ou Teles Pires;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio São Manuel ou Teles Pires;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE UCS DE PROTEÇÃO SUSTENTÁVEL INSERIDA NO ZSEE DE MATO GROSSO (MUNICÍPIO DE ITAÚBA / CASTANHAIS)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ÁREA PROPOSTA DO ZSEE SE SOBREPÕE AS ÁREAS PRIORITÁRIAS 15515, 15518 E 1573.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-090

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 64810

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Manissauá-miçu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Manissauá-miçu;

Caracterização

- *Características Gerais:* Área proposta para criação de UCs de Proteção Sustentável inserida no ZSEE de Mato Grosso (Município de Itaúba / Castanhais)
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: Área proposta do ZSEE se sobrepõe as áreas prioritárias 15515, 15518 e 1573.*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-091

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 53555

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Manissauá-miçu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE UCS DE PROTEÇÃO SUSTENTÁVEL INSERIDA NO ZSEE DE MATO GROSSO (MUNICÍPIO DE ITAÚBA / CASTANHAIS)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ÁREA PROPOSTA DO ZSEE SE SOBREPÕE AS ÁREAS PRIORITÁRIAS 15515, 15518 E 1573.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-093

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 220920

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Aripuanã; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Roosevelt;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Aripuanã; Rio Roosevelt;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AMPLIAÇÃO DA RESEX; AMPLIAÇÃO DA RESEX GUARIBA ROOSEVELT PREVISTA COMO ÁREA PROTEGIDA PROPOSTA NO ZSEE DE 218.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-095

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 144068

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL: CRIAÇÃO DE RESEX

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Pauini; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tapauá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Pauini;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá; Rio Pauini; Rio Tapauá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* RESEX; EXISTE PROPOSTA DE ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE UMA REBIO PELO GOVERNO DO ESTADO. POTENCIAL: CASTANHA, CACAU NATIVO, RAPÉ;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-096

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 536847

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL: CRIAÇÃO DE RESEX

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	6 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; PAA JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Purus; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Pauini; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tapauá; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Pauini; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tapauá;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; Paa Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Purus; Rio Pauini; Rio Tapauá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* RESEX; EXISTE PROPOSTA DE ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE UMA REBIO PELO GOVERNO DO ESTADO. POTENCIAL: CASTANHA, CACAU NATIVO, RAPÉ;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-097

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 45280

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	21 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Piculus_paraensis; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CRETACEO ARAGUAIA-TOCANT; A PALEOZOICO ARAGUAIA-TOCANT; A PALEOZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; F ARAGUAIA-TOCANT;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cretaceo Araguaia-Tocant; A Paleozoico Araguaia-Tocant; A Paleozoico Xingú-Araguaia; F Araguaia-Tocant;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cretaceo Araguaia-Tocant; A Paleozoico Araguaia-Tocant; A Paleozoico Xingú-Araguaia; F Araguaia-Tocant;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* APA MUNICIPAL RIO TAQUARI; JÁ E UMA ÁREA DEFINIDA COMO APA MUNICIPAL
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-098

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 17611

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL: CRIAÇÃO DE RESEX

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus ucayalli; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Javari; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Javari;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Javari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* POSSÍVEL DEMANDA DE UC PRÓXIMA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-099

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 56468

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DB PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Uatumã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Uatumã; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Db Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Paleozoico Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Db Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Paleozoico Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Uatumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AMPLIAÇÃO OU CRIAÇÃO DE UC;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; UHE; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-100

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 12592

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AMPLIAÇÃO OU CRIAÇÃO DE UC;

- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas;; Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Área de desmatamento (até 2016); Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (montante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-101

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 10136

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DB PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Db Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Db Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AMPLIAÇÃO OU CRIAÇÃO DE UC;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; UHE; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-102

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 51321

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	14 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus RR; anolis planiceps; Anomaloglossus_tepequem; Atelopus_hoogmoedi; Boana_xerophylla; cnemidophorus lemniscatus RR; coleodactylus septentrionalis; Dendrobates_leucomelas; gymnophthalmus leucomystax; gymnophthalmus vanzoi; kentropyx striata RR; neusticurus racenisi; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; FS NEGRO-BRANCO; ON NEGRO-BRANCO; SA NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uraricoera;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ds Proterozoico Negro-Branco; Fs Negro-Branco; ON Negro-Branco; Sa Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ds Proterozoico Negro-Branco; Fs Negro-Branco; ON Negro-Branco; Sa Negro-Branco;

- *Interface Terra*-Água: Rio Uraricoera;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TEPEQUEM, ÚNICO TEPUI TOTALMENTE DENTRO DE RORAIMA, ÁREA TURÍSTICA, ANTIGO GARIMPO. TENTATIVA DE CRIAR UC MUNICIPAL, MAS NÃO FOI ADIANTE.; POTENCIAL TURÍSTICO. TEPEQUEM, ÚNICO TEPUI TOTALMENTE DENTRO DE RORAIMA.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: TENTATIVA DE CRIAR UC MUNICIPAL, MAS NÃO FOI ADIANTE.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-103

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 83469

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	8 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; manciola guaporicola;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: C PARAGUAY; F PARAGUAY; FA PARAGUAY; SA PARAGUAY; SN PARAGUAY; SP PARAGUAY;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* C Paraguay; F Paraguay; Fa Paraguay; Sa Paraguay; SN Paraguay; Sp Paraguay;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* C Paraguay; F Paraguay; Fa Paraguay; Sa Paraguay; SN Paraguay; Sp Paraguay;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DE APP E DE RESERVA LEGAL, MELHORIA DE MANEJO DE SOLO E ÁGUA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 1485 - SOBREPOSTO ASSENTAMENTO PA FLOR DA MATA; 14811 - SOBREPOSTO ASSENTAMENTO PA CABAÇAS; 1486 - SOBREPOSTO PA SILVIO RODRIGUES.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-104

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 38661

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	5 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Hylexetastes_uniformis; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus septemcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F MADEIRA-TAPAJÓS; FA MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM DESMATAMENTOS ANTIGOS DEVEM SER IMPLEMENTADAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E MELHORIA DE MANEJO DAS ÁREAS DE PASTAGEM E DE AGRICULTURA FAMILIAR.; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E MELHORIA DE MANEJO DAS ÁREAS DE PASTAGEM E DE AGRICULTURA FAMILIAR.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-105

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 100729

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus septemcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: C MADEIRA-TAPAJÓS; C PARAGUAY; F MADEIRA-TAPAJÓS; F PARAGUAY; FA MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SA PARAGUAY; SN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* C Madeira-Tapajós; C Paraguay; F Madeira-Tapajós; F Paraguay; Fa Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; Sa Paraguay; SN Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* C Madeira-Tapajós; C Paraguay; F Madeira-Tapajós; F Paraguay; Fa Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; Sa Paraguay; SN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM DESMATAMENTOS ANTIGOS DEVEM SER IMPLEMENTADAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E MELHORIA DE MANEJO DAS ÁREAS DE PASTAGEM E DE AGRICULTURA FAMILIAR.; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E MELHORIA DE MANEJO DAS ÁREAS DE PASTAGEM E DE AGRICULTURA FAMILIAR.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE R

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-106

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 286073

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	1 ESPÉCIES
AVES	9 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F PARAGUAY; FA PARAGUAY; FB PARAGUAY; S PARAGUAY; SA PARAGUAY; SN PARAGUAY; SP PARAGUAY;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Paraguay; Fa Paraguay; Fb Paraguay; S Paraguay; Sa Paraguay; SN Paraguay; Sp Paraguay;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* F Paraguay; Fa Paraguay; Fb Paraguay; S Paraguay; Sa Paraguay; SN Paraguay; Sp Paraguay;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DE APP E DE RESERVA LEGAL, MELHORIA DE MANEJO DE SOLO E ÁGUA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 1485 - SOBREPOSTO ASSENTAMENTO PA FLOR DA MATA; 14811 - SOBREPOSTO ASSENTAMENTO PA CABAÇAS; 1486 - SOBREPOSTO PA SILVIO RODRIGUES; SOBREPOSIÇÃO COM TERRITÓRIO QUILOMBOLA EM ESTUDO (SOBREPOSIÇÃO MANTIDA)*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-107

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 283218

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	10 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	0 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:*
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio do Sangue; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Juruena;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio do Sangue; As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapaj

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio do Sangue;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MELHORIA NO MANEJO DO SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; PCH/CGH; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-108

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 41649

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	18 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Juruena;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruena;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MELHORIA NO MANEJO DO SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-109

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 133847

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Psophia_interjecta; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; FA XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Javaés;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia; Rio Javaés;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DEGRADADA COM EXPANSÃO DE SOJA QUE NECESSITA DE RECUPERAÇÃO

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-110

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 180946

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno

(Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jiparaná ou Machado;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Ma
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jiparaná ou Machado;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS JÁ DEFINIDAS E USO CONSOLIDADO DE GADO E EUCALIPTO. MAJORITARIAMENTE DE ASSENTAMENTOS.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-111

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 90379

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Penelope_pileata; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÃO ÁREAS COM EXPANSÃO DA MINERAÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA, SEM A PRESENÇA DE VEGETAÇÃO PRIMARIA NOS LOCAISEXPANSÃO DA MINERAÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-112

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 15941

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	26 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus E; Adelphobates_galactonotus W; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Ateles marginatus; Chiropotes utahickae; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; SA TAPAJÓS-XINGÚ; SA XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Xingu;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú; Sa Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú; Sa Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Xingu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS PRÓXIMAS DE TIS, UCS E APAS QUE DEVEM SER PROTEGIDAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-113

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 37857

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	21 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes eladioi; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Dendrocolaptes_retentus; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Fresco;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Fresco; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Xingu; Rio Fresco;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS PRÓXIMAS DE TIS, UCS E APAS QUE DEVEM SER PROTEGIDAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-114

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 257181

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	28 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes eladioi; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Procnias_albus_wallacei; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; A CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; RM XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Itacaiúnas;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; A Cretaceo Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Cretaceo Xingú-Araguaia; rm X
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; A Cretaceo Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Cretaceo Xingú-Araguaia; rm Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÃO ÁREAS COM EXPANSÃO DA MINERAÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA, SEM A PRESENÇA DE VEGETAÇÃO PRIMARIA NOS LOCAISEXPANSÃO DA MINERAÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-115

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 20715

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus E; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Xingu; As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Quaternario Tapajós-Xingú; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Quaternario Tapajós-Xingú; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Xingu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS PRÓXIMAS DE TIS, UCS E APAS QUE DEVEM SER PROTEGIDAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-116

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 219986

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes eladioi; gonatodes nascimentoi S; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Procnias_albus_wallacei; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Itacaiúnas;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Itacaiúnas; A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Itacaiúnas;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÃO ÁREAS COM EXPANSÃO DA MINERAÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA, SEM A PRESENÇA DE VEGETAÇÃO PRIMARIA NOS LOCAISEXPANSÃO DA MINERAÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; FERROVIAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO DE BORDAS DA UP (<5%) COM ÁREA MILITAR*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: SERRA PELADA (ID 150)*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-117

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 32183

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes eladioi; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Itacaiúnas;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Itacaiúnas;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÃO ÁREAS COM EXPANSÃO DA MINERAÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA, SEM A PRESENÇA DE VEGETAÇÃO PRIMARIA NOS LOCAISEXPANSÃO DA MINERAÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; FERROVIAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-118

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 111957

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tocantins;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÃO ÁREAS COM EXPANSÃO DA MINERAÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA, SEM A PRESENÇA DE VEGETAÇÃO PRIMARIA NOS LOCAISEXPANSÃO DA MINERAÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-119

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 64361

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÃO ÁREAS COM EXPANSÃO DA MINERAÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA, SEM A PRESENÇA DE VEGETAÇÃO PRIMARIA NOS LOCAISEXPANSÃO DA MINERAÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-120

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 46294

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	28 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes nascimentoi S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ds Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Terciario Litora Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ds Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Terciario Litora Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÃO ÁREAS COM EXPANSÃO DA MINERAÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA, SEM A PRESENÇA DE VEGETAÇÃO PRIMARIA NOS LOCAISEXPANSÃO DA MINERAÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-121

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 82936

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	28 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* E UMA ÁREA COM POUCO REMANESCENTE FLORESTAL E POSSUI BASTANTE EXPANSÃO DE REFLORESTAMENTO E AGRICULTURA, ALÉM DE SER COMPOSTA POR ÁREAS PRIVADAS; REFLORESTAMENTO; EXPANSÃO AGRÍCOLA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-122

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 52307

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Contopus_nigrescens; Malacoptila_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Conepatus semistriatus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; P TOCANTINS-MEARI; SN TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; P Tocantins-Meari; SN Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; P Tocantins-Meari; SN Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Mearim;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MATA AMAZÔNICA DEGRADADA (VEGETAÇÃO SECUNDARIA); TRANSIÇÃO DA AMAZÔNIA PARA O CERRADO; A ÁREA ENCONTRA-SE DEGRADADA, NECESSITANDO DE RECUPERAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-123

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 128518

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Crax_fasciolata_pinima; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; AS CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; As Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; As Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REMANESCENTE AMAZÔNICO ALTAMENTE DEGRADADO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; FERROVIAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-124

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 169087

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO TOCANTINS-MEARI; D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tocantins; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS COM PRESSÃO DE PECUÁRIA E SEM VEGETAÇÃO, DE MODO QUE NECESSITA RECUPERAR AS ÁREAS DE RESERVA LEGAL; RECUPERAR AS RLS; PRESSÃO DE PECUÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-125

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 55091

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	28 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Crax_fasciolata_pinima; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; AS CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; As Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; As Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REMANESCENTE AMAZÔNICO ALTAMENTE DEGRADADO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-126

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 169861

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	8 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Contopus_nigrescens; Malacoptila_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Conepatus semistriatus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; A CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; P TOCANTINS-MEARI; PAH TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; A Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; P Tocantins-Meari; Pah Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; A Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; P Tocantins-Meari; Pah Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Mearim; Rio Mearim;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MATA AMAZÔNICA DEGRADADA (VEGETAÇÃO SECUNDARIA); TRANSIÇÃO DA AMAZÔNIA PARA O CERRADO; A ÁREA ENCONTRA-SE DEGRADADA, NECESSITANDO DE RECUPERAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-127

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 373892

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DB CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DB TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Db Cretaceo Tocantins-Meari; Db Terciario Litora Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Db Cretaceo Tocantins-Meari; Db Terciario Litora Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS COM PRESSÃO DE PECUÁRIA E SEM VEGETAÇÃO, DE MODO QUE NECESSITA RECUPERAR AS ÁREAS DE RESERVA LEGAL; RECUPERAR AS RLS; PRESSÃO DE PECUÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-128

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 556722

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	33 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Crax_fasciolata_pinima; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Psophia_obscura; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Chiropotes satanas; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus apella; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* E UMA ÁREA COM POUCO REMANESCENTE FLORESTAL E POSSUI BASTANTE EXPANSÃO DE REFLORESTAMENTO E AGRICULTURA, ALÉM DE SER COMPOSTA POR ÁREAS PRIVADAS; REFLORESTAMENTO; EXPANSÃO AGRÍCOLA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; FERROVIAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-129

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 177753

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	12 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Contopus_nigrescens; Guaruba_guarouba; Lophornis_gouldii; Malacoptila_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Piculus_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; A CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; P TOCANTINS-MEARI; PAA TOCANTINS-MEARI; PAH TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; A Cretaceo Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; P Tocantins-Meari; Paa Tocantins-Meari; Pah Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; A Cretaceo Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; P Tocantins-Meari; Paa Tocantins-Meari; Pah Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MATA AMAZÔNICA DEGRADADA (VEGETAÇÃO SECUNDARIA); TRANSIÇÃO DA AMAZÔNIA PARA O CERRADO; A ÁREA ENCONTRA-SE DEGRADADA, NECESSITANDO DE RECUPERAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ENTORNO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA TITULADO (SOBREPOSIÇÃO ELIMINADA)*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-130

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 33081

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes nascimentoi S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DB CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DB QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus

dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* VITORIA DO XINGU E SENADOR JOSE PORFIRIO; ÁREA QUE SOFREU EXPLORAÇÃO MADEIREIRA; EXISTÊNCIA DE ÁREAS DEGRADADASEXPLORAÇÃO MADEIREIRA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-131

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 353717

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Potamobatrachus trispinosus / Rio Guamá;*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Trichechus inunguis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D PALEOZOICO TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DA CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DA QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; DA TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Paleozoico Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Paleozoico Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta South; Rio Guamá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÃO ÁREAS COM VEGETAÇÃO DIFERENCIADA NA REGIÃO, QUE ESTA SENDO SUBMETIDA A EXTRAÇÃO DE AREIA (ÁREA DE CAMPINARANA)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações: Entorno de território quilombola titulado (sobreposição eliminada)/Sobreposição com território quilombola em estudo (sobreposição mantida)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-132

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 51765

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Loxopholis snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB PALEOZOICO JAPURÁ-NEGRO; AB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; D PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA; D QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DB PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA; DB PALEOZOICO JAPURÁ-NEGRO; LD BRANCO-TROMBETA; LG JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Lower Negro floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jaú; Alvo 2 - Macrófitas / Lower Negro floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jaú; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Curiuaú;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Paleozoico Japurá-Negro; Ab Quaternario Japurá-Negro; D Paleozoico Branco-Trombeta; D Quaternario Branco-Trombeta; D Quaternario Japurá-Negro; Da Paleozoico Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Proterozoico B
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ab Paleozoico Japurá-Negro; Ab Quaternario Japurá-Negro; D Paleozoico Branco-Trombeta; D Quaternario Branco-Trombeta; D Quaternario Japurá-Negro; Da Paleozoico Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Proterozoico Branco-Trombeta; Db Paleozoico Branco-Trombeta; Db Paleozoico Japurá-Negro; Ld Branco-Trombeta; Lg Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Lower Negro floodplain; Rio Curiuaú; Rio Jaú;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CALHA DO RIO NEGRO E ENCONTRO COM O RIO BRANCO. ÁREA POUCO CONHECIDA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-133

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 94516

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	3 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	4 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO JAPURÁ-NEGRO; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DA PROTEROZOICO JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB PROTEROZOICO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Lower Negro floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Lower Negro floodplain; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Branco; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Lower Negro floodplain;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Negro / Floodplain Branco; Rios Ordem 7 a 11 - Rio Negro / Floodplain Negro; Rios Ordem 7 a 11 - Rio Negro / Lower Negro floodplain;
- *Ambientes Reofílicos:* Lower Negro floodplain; D Proterozoico Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Proterozoico Branco-Trombeta; Da Proterozoico Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Proterozoico Branco-Trombeta; Da Proterozoico Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Proterozoico Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Branco; Floodplain Negro; Lower Negro floodplain; Rio Unini;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CALHA DO RIO NEGRO E ENCONTRO COM O RIO BRANCO. ÁREA POUCO CONHECIDA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-134

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 65606

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	1 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis transversalis; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; L JAPURÁ-NEGRO; LA JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO; LG JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Negro / Floodplain Negro;
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; L Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro; Lg Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; L Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro; Lg Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Negro;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CALHA DO RIO NEGRO E ENCONTRO COM O RIO BRANCO. ÁREA POUCO CONHECIDA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-135

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 110137

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; coleodactylus septentrionalis; kentropyx striata RR; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS CENOZOICO TERC2 BRANCO-TROMBETA; DS QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; LD BRANCO-TROMBETA; LG BRANCO-TROMBETA; LO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera publifora Benth.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Anauá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ds Quaternario Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta; Lg Branco-Trombeta; LO Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ds Quaternario Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta; Lg Branco-Trombeta; LO Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Anauá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS INTEGRAS, POUCO CONHECIDA, COM ESTRADA RECENTE.; GESTÃO DO CONHECIMENTO;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-136

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 56443

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	13 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus septemcinctus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: CS MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FA MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Cs Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Cs Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS DE SOLOS ARENOSOS E DE RELEVO MOVIMENTADO, INDICADA PARA A COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL E DE FORTALECIMENTO DA CADEIA DA SOCIOBIODIVERSIDADE.; ÁREA INDICADA PARA A COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL E DE FORTALECIMENTO DA CADEIA DA SOCIOBIODIVERSIDADE.;

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; PCH/CGH

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-137

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 100399

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	9 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	12 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: SA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Juruena;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Juruena; Sa Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Sa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS DE SOLOS ARENOSOS E DE RELEVO MOVIMENTADO, INDICADA PARA A COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL E DE FORTALECIMENTO DA CADEIA DA SOCIOBIODIVERSIDADE.; ÁREA INDICADA

PARA A COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL E DE FORTALECIMENTO DA CADEIA DA SOCIOBIODIVERSIDADE.;

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-138

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 342849

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	9 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	0 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	0 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:*
- *Ambientes Terrestres:*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Juruena;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Juruena;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:*
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruena;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS DE SOLOS ARENOSOS E DE RELEVO MOVIMENTADO, INDICADA PARA A COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL E DE FORTALECIMENTO DA CADEIA DA SOCIOBIODIVERSIDADE.; ÁREA INDICADA PARA A COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL E DE FORTALECIMENTO DA CADEIA DA SOCIOBIODIVERSIDADE.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA

- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação; PCH/CGH UHE; Fragmentação de rios (montante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-139

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 520280

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	18 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Psophia_interjecta; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; DA PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DA CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; FA XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SG XINGÚ-ARAGUAIA; SO XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pau-d`arco;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; Sg Xingú-Aragua
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; Sg Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE EXPANSÃO DE SOJA; ASSENTAMENTOS; PRODUÇÃO DE ABACAXI; PARA FORTALECER O USO SUSTENTÁVEL DAS ÁREAS COM OS PRODUTORES. INCLUSIVE A PROGRESSÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA CULTURA DO ABACAXI; EXPANSÃO DE SOJA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-140

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 354025

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; PAH JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tefé; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; Pah Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; Pah Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* IG DA FARINHA DE UARINI; AGRICULTORES TRADICIONAIS BASTANTE ENVOLVIDOS; ATIVIDADE AGRÍCOLA PODE EXPANDIR; CUIDADO PARA O INSTRUMENTO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NÃO FOMENTAR A ESPECIALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE AGRICULTURA (PERDA DA AGROBIODIVERSIDADE); EXPANSÃO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* AGRICULTURA TRADICIONAL
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* AGRICULTURA TRADICIONAL
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-141

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 673469

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes nascimentoi S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DA QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DB PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DB CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DB QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Pacajá; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Xingú-Araguaia; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Db Proterozoico Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Xingú-Araguaia; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Db Proterozoico Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Pacajá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE ASSENTAMENTOS; ÁREA DE EXPLORAÇÃO MADEIREIRA; REGIÃO DE CONFLITO; MEADOS DA BR-163 (TRANSAMAZÔNICA); FORTALECER O USO ONDE TEM ASSENTAMENTO PARA QUE HAJA O DESENVOLVIMENTO DE UMA ATIVIDADE SUSTENTÁVEL; EXPLORAÇÃO MADEIREIRA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-142

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 32063

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Pithecia cazuzai; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao calvus calvus; Cebus albifrons albifrons; Saimiri vanzolinii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* IG DA FARINHA DE UARINI; AGRICULTORES TRADICIONAIS BASTANTE ENVOLVIDOS; ATIVIDADE AGRÍCOLA PODE EXPANDIR; CUIDADO PARA O INSTRUMENTO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NÃO FOMENTAR A ESPECIALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE AGRICULTURA (PERDA DA AGROBIODIVERSIDADE); EXPANSÃO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* AGRICULTURA TRADICIONAL
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* AGRICULTURA TRADICIONAL
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-143

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 156231

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: MADEIRA EMPRESARIAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	1 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Arinos;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Arinos;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM GRANDE NÚMERO DE PLANOS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL AUTORIZADOS PELA SEMA/MT E INDICADO PARA ATIVIDADE FLORESTAL PELO ZSEE/MT.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-144

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 31746

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	1 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Saguinus mystax pluto; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 5 a 11 - Margem Sul do Rio Amazonas / West Central Amazon floodplain;
- *Ambientes Reofílicos:* Da Quaternario Japurá-Purús;

- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* CASTANHA
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BLOCO CODAJÁS, AMORÍ E BERURI*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-145

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 32459

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Saguinus mystax pluto; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* D Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* AÇAÍ
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BLOCO ENTRE COARÍ E CODAJÁS*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-146

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 68398

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PAH JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira; Pah Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira; Pah Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* CASTANHA
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BLOCO CODAJÁS, AMORÍ E BERURI*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-147

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 164609

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Saguinus mystax pluto; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; D QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; PAH JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Qu
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Purús; Pah Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* AÇAÍ
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BLOCO ENTRE COARÍ E CODAJÁS*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-148

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 32706

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: ESPÉCIES ENVOLVIDAS DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE; BIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	13 ESPÉCIES
AVES	37 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	2 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	2 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus E; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; gonatodes nascimentoi S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_retentus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Ossubtus xinguense / Floodplain Iriri; Scobinancistrus aureatus / Floodplain Iriri;*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus;

Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;

- *Ambientes Terrestres: As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Quaternario Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Iriri; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Xingu / Floodplain Iriri; Rios Ordem 7 a 11 - Rio Xingu / Floodplain Xingu;
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Iriri; Floodplain Xingu; As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Quaternario Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Quaternario Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia;

- *Interface Terra*-Água: Floodplain Iriri; Floodplain Xingu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE CONFLUÊNCIA DOS RIOS XINGU E IRIRI, POR ISSO A IMPORTÂNCIA DO MONITORAMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-149

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 103759

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Abacaxis; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maués-açu; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Maués-açu;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Abacaxis; Rio Maués-açu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* GUARANÁ
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BLOCO MAUÉS / BOA VISTA DO RAMOS*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-150

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 23703

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus baptista; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Abacaxis; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Abacaxis;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Floodplain Abacaxis;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* GUARANÁ
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO COM TERRITÓRIO QUILOMBOLA EM ESTUDO (SOBREPOSIÇÃO MANTIDA); BLOCO MAUÉS / BOA VISTA DO RAMOS*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-151

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 54568

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	18 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Cebus albifrons albifrons; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus apella; Sotalia fluviatilis; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Abacaxis; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Abacaxis;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Floodplain Abacaxis;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* GUARANÁ
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BLOCO MAUÉS / BOA VISTA DO RAMOS*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-152

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 37262

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea pygmaea; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; LD SOLIMÕES-JAPURÁ; PAH JAPURÁ-NEGRO; PAH SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Japurá - Caquetá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Ld Solimões-Japurá; Pah Japurá-Negro; Pah Solimões-Japurá;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Ld Solimões-Japurá; Pah Japurá-Negro; Pah Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Japurá - Caquetá; Western Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CONFLITOS DE PESCA, PRESENÇA DE PIRATAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-153

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 57620

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Psophia_interjecta; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; FA XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SUGERE UMA RPPN, POIS E UMA ÁREA DE FLORESTA PRIMARIA, ASSOCIADO QUE O PROPRIETÁRIO JÁ AJUDA BASTANTE NA PRESERVAÇÃO DA ÁREA E O PODER PUBLICO; CRIAÇÃO DE RPPN;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-154

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 30604

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	4 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Chiasmocleis_avilapireae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Lophornis_gouldii; Pyrrhura_amazonum; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: S ARAGUAIA-TOCANT; SA ARAGUAIA-TOCANT; SO ARAGUAIA-TOCANT;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tocantins;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* S Araguaia-Tocant; Sa Araguaia-Tocant; SO Araguaia-Tocant;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* S Araguaia-Tocant; Sa Araguaia-Tocant; SO Araguaia-Tocant;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REMANESCENTE DE FLORESTA AMAZÔNICA E ESTA ÁREA ESTA DEFINIDA COMO PRIORITÁRIA PARA CONSERVAÇÃO DE ACORDO COM O ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DO ESTADO DO TOCANTINS

- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Gasoduto; Ferrovias ; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-155

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 359735

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	18 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Penelope_pileata; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Crenicichla cyclostoma / Floodplain Araguaia;*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO ARAGUAIA-TOCANT; A CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; A CRETACEO ARAGUAIA-TOCANT; A PALEOZOICO ARAGUAIA-TOCANT; AS CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; AS CRETACEO ARAGUAIA-TOCANT; AS PALEOZOICO ARAGUAIA-TOCANT; D CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; D PALEOZOICO ARAGUAIA-TOCANT; S ARAGUAIA-TOCANT; SA ARAGUAIA-TOCANT; SO ARAGUAIA-TOCANT;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Araguaia-Tocant; A Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; A Cretaceo Araguaia-Tocant; A Paleozoico Araguaia-Tocant; As Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; As Cretaceo Araguaia-Tocant; As Paleozoico Araguaia-Tocant; D Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Araguaia-Tocant; A Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; A Cretaceo Araguaia-Tocant; A Paleozoico Araguaia-Tocant; As Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; As Cretaceo Araguaia-Tocant; As Paleozoico Araguaia-Tocant; D Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; D Paleozoico Araguaia-Tocant; S Araguaia-Tocant; Sa Araguaia-Tocant; SO Araguaia-Tocant;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* O ESTADO AVALIOU COMO ÁREA PRIORITÁRIA PARA CONSERVAÇÃO, SENDO QUE ESTA EM PROCESSO DE CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO; PROCESSO DE CRIAÇÃO DE UC;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; PCH/CGH

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: PECUÁRIA; ASSENTAMENTOS*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-156

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 28320

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	26 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Piculus_paraensis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tocantins;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Cretaceo Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Cretaceo Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA PRÓXIMA DA UC COM EXISTÊNCIA DE VEGETAÇÃO PRIMARIA, DE MODO QUE A ÁREA DEVE SER INTEGRADA A UC JÁ EXISTENTE;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-157

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 101865

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	12 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	4 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	22 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	23 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus PA; Dendropsophus_sarayacuensis; gonatodes tapajonicus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Harttia dissidens / Floodplain Tapajós; Leporacanthicus joselimai / Floodplain Tapajós; Peckoltia snethlageae / Floodplain Tapajós; Teleocichla prionogenys / Floodplain Tapajós;*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Mico leucippe; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;

- *Ambientes Terrestres: As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Tapajós-Xingú; As Quaternario Madeira-Tapajós; As Quaternario Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Tapajós-Xingú; D Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Tapajós; As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Tapajós-Xingú; As Quaternario Madeira-Tapajós; As Quaternario Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Tapajós-X
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Tapajós-Xingú; As Quaternario Madeira-Tapajós; As Quaternario Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Tapajós-Xingú; D

Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú;

- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tapajós;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* DEVE SER CRIADA UMA UC SEM DEFINIÇÃO (DE CATEGORIA) POIS TEM LAGARTO (GONATODES TAPAJONICUS) QUE SÓ OCORRE NO AÇAIZAL NO LADO DIREITO DO RIO TAPAJÓS. SÓ FOI ENCONTRADO NESTE LOCAL E ESTÁ EM PERIGO DE EXTINÇÃO; CRIAÇÃO DE UC POIS HÁ ESPÉCIE ENDÊMICA EM PERIGO DE EXTINÇÃO;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO DE BORDAS DA UP (<5%) COM ÁREA MILITAR*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-158

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 117364

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Psophia_obscura; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA BEM PRESERVADA E RELATIVAMENTE CONTÍNUA À UPS SELECIONADAS NUMA REGIÃO COM ALTA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-159

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 32087

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Psophia_obscura; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* UMA ÁREA COM BASTANTE REMANESCENTE FLORESTAL ASSOCIADO AO FATO QUE NA REGIÃO POSSUI POUCAS ÁREAS DE REMANESCENTES FLORESTAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-160

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 308303

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; Chiasmocleis_avilapireae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Saguinus bicolor; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DA CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; PAA BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Lower Negro floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Branco-Trombeta; Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Paa Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Branco-Trombeta; Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Paa Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* JÁ EXISTE UMA PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARA PROTEGER O SAUIM-DE-COLEIRA, PROPOSTAS DO MUNICÍPIO E DO ESTADO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-161

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 138413

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DB CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DB QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus

dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE REGIÃO DE ESPÉCIE PESQUEIRA; REGIÃO DE RIOS; EXPLORAÇÃO MADEIREIRA; EXISTÊNCIA DE MUITA VEGETAÇÃO PRESERVADA NA ÁREAEXPLORAÇÃO MADEIREIRA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-162

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 211805

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	25 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii N; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DB QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta South;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North; Amazon Delta South;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PRÓXIMO DE RESEX; ÁREA COM FLORESTA NATIVA; POPULAÇÃO TRADICIONAL; PESCA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* POPULAÇÃO TRADICIONAL
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-163

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 26671

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; coleodactylus septentrionalis; kentropyx striata RR; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; DS CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; DS QUATERNARIO NEGRO-BRANCO; LD NEGRO-BRANCO; LG NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera publifora Benth.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Branco; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Catrimani;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ds Proterozoico Negro-Branco; Ds Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Ds Quaternario Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* Ds Proterozoico Negro-Branco; Ds Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Ds Quaternario Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA PRÓXIMA AO PARNA DA MOCIDADE E ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE NIQUIÁ
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO DE BORDAS DA UP (<5%) COM ÁREA MILITAR*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-164

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 109163

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; cnemidophorus lemniscatus RR; gymnophthalmus vanzoi; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; FA BRANCO-TROMBETA; FS BRANCO-TROMBETA; SA BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera publifora Benth.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Branco; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Tacutu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Fa Branco-Trombeta; Fs Branco-Trombeta; Sa Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Fa Branco-Trombeta; Fs Branco-Trombeta; Sa Branco-Trombeta;

- *Interface Terra*-Água: Rio Tacutu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA ÚNICA. O LAVRADO É POUCO PROTEGIDO NO ESTADO DE RORAIMA; FRONTEIRA COM GUIANA INGLESA. ÁREA COM FAZENDA DE MAIS DE 1 ANOS. SERRA DA LUA, ONDE FOI PROPOSTA UMA UC, QUE NÃO FOI ADIANTE. RIO CAHORRO.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-165

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 214571

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	14 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus RR; anolis planiceps; Anomaloglossus_tepequem; Atelopus_hoogmoedi; Boana_xerophylla; cnemidophorus lemniscatus RR; coleodactylus septentrionalis; Dendrobates_leucomelas; gymnophthalmus leucomystax; gymnophthalmus vanzoi; kentropyx striata RR; neusticurus racenisi; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DM PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; DS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; FM NEGRO-BRANCO; FS NEGRO-BRANCO; ON NEGRO-BRANCO; SA NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uraricoera;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Uraricoera; Dm Proterozoico Negro-Branco; Ds Proterozoico Negro-Branco; Fm Negro-Branco; Fs Negro-Branco; ON Negro-Branco; Sa Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Dm Proterozoico Negro-Branco; Ds Proterozoico Negro-Branco; Fm Negro-Branco; Fs Negro-Branco; ON Negro-Branco; Sa Negro-Branco;

- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PARTE INCLUI A RESERVA FLORESTAL DO PARIMA EM PROCESSO DE RECATEGORIZAÇÃO E ÁREA ENGLOBA A TRANSIÇÃO DE LAVRADO E FLORESTA AMAZÔNICA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-166

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 7850

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	24 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes eladioi; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Itacaiúnas;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA INCLUI AMBIENTE DE CANGA (CAMPOS FERRUGINOSOS), QUE ESTÃO EM QUASE EM SUA TOTALIDADE RESTRITOS À FLONA DE CANGAS, ONDE HÁ EXPLORAÇÃO MINERAL QUE ELIMINA ESTE AMBIENTE.; AMBIENTE ÚNICO (CANGA) EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. PRESENÇA DE ESPÉCIES ENDÊMICAS DE CANGAS. PRESENÇA DE CAVERNAS. ESPÉCIES NOVAS RECÉM DESCOBERTAS QUE SÃO CONHECIDAS APENAS PARA A ÁREA. CONTÍGUA À ÁREA XIKIN CATETE.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BUFFER DE 1 KM: ÁREA DE CANGA (SERRA ARQUEADA)*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-167

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 6202

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	23 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_retentus; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA INCLUI AMBIENTE DE CANGA (CAMPOS FERRUGINOSOS), QUE ESTÃO EM QUASE EM SUA TOTALIDADE RESTRITOS À FLONA DE CANGAS, ONDE HÁ EXPLORAÇÃO MINERAL QUE ELIMINA ESTE AMBIENTE.; AMBIENTE ÚNICO (CANGA) EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. PRESENÇA DE ESPÉCIES ENDÊMICAS DE CANGA. PRESENÇA DE CAVERNAS. UMA ESPÉCIE RESTRITA À ÁREA (MIMOSA DASILVAE);
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BUFFER DE 1 KM: ÁREA DE CANGA (SERRA DE CAMPOS)*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-168

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 102024

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guamá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TENDO EM VISTA QUE POSSUI UM REMANESCENTE FLORESTAL EM TODO O POLÍGONO. AINDA POSSUI UMA ÁREA AO LADO QUE NÃO ESTA CADASTRADA E POSSUI FLORESTA EM GRANDE PARTE
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-187

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 329102

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Loxopholis snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CRETACEO JAPURÁ-NEGRO; AA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; AB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CRETACEO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB CRETACEO JAPURÁ-NEGRO; DB PALEOZOICO JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; LG JAPURÁ-NEGRO; LO JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Lower Negro floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jaú; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Manacapuru; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jaú;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cretaceo Japurá-Negro; Aa Quaternario Japurá-Negro; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Ab Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cretaceo Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cretaceo Japur
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cretaceo Japurá-Negro; Aa Quaternario Japurá-Negro; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Ab Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cretaceo Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cretaceo Japurá-Negro; Db Paleozoico Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Lg Japurá-Negro; LO Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA VIZINHA DO PARNA JAÚ, NECESSIDADE DE PROTEGER AS MICROBACIAS DO CARABINANI, QUE DRENAM PARA O PARQUE
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: INCLUIR O POLÍGONO EM BRANCO ENTRE A ÁREA E O PARNA JAÚ*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-188

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 64046

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): LIMITAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis chrysolepis; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; cnemidophorus lemniscatus AM; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Saguinus martinsi ochraceus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Nhamundá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Nhamundá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Nhamundá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PRÓXIMO A ÁREA DE MINERAÇÃO; MORRO DO ESPELHO, REGIÃO DE NHAMUNGÁ. EXISTE UMA ÁREA PRIORITÁRIA AO LADO QUE PRECISA TER AÇÃO DE MITIGAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-189

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 146840

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): LIMITAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Saguinus martinsi ochraceus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; LD BRANCO-TROMBETA; LG BRANCO-TROMBETA; PAA BRANCO-TROMBETA; SP BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Uatumã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta; Lg Branco-Trombeta; Paa Branco-Trombeta; Sp Branco-Trombeta;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta; Lg Branco-Trombeta; Paa Branco-Trombeta; Sp Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Uatumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MINAS DE CALCÁRIO PARA FÁBRICA DE CIMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-190

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 93355

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): LIMITAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis chrysolepis; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Saguinus martinsi ochraceus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA; DA PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DS PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA; DS QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Uatumã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Uatumã; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Rio Uatumã; D Paleozoico Branco-Trombeta; Da Paleozoico Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Paleozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Cretaceo Branco-Trombeta; Ds Paleozoico Branco-Trombet
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Paleozoico Branco-Trombeta; Da Paleozoico Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Paleozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Cretaceo Branco-Trombeta; Ds Paleozoico Branco-Trombeta; Ds Quaternario Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Uatumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MINAS DE CALCÁRIO PARA FÁBRICA DE CIMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-191

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 45430

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): LIMITAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis chrysolepis; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Uatumã; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Paleozoico Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Paleozoico Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MINAS DE CALCÁRIO PARA FÁBRICA DE CIMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-192

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 68022

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): AMPLIAÇÃO DE UC

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	0 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:*
- *Aves:* Hylexetastes_uniformis; Pyrrhura_perlata;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FB PARAGUAY; SA PARAGUAY; SN PARAGUAY; SP PARAGUAY;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fb Paraguay; Sa Paraguay; SN Paraguay; Sp Paraguay;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Fb Paraguay; Sa Paraguay; SN Paraguay; Sp Paraguay;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* INDICAÇÃO DO ZSEE 218.; AMPLIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DE SANTA BÁRBARA EM ÁREA DEVOLUTA.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-193

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 89203

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): AMPLIAÇÃO DE UC

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	5 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Hylexetastes_uniformis; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus septemcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: C MADEIRA-TAPAJÓS; C PARAGUAY; F MADEIRA-TAPAJÓS; FA MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SA PARAGUAY; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* C Madeira-Tapajós; C Paraguay; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; Sa Paraguay; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* C Madeira-Tapajós; C Paraguay; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; Sa Paraguay; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* INDICAÇÃO DO ZSEE 218.; AMPLIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DE SANTA BÁRBARA EM ÁREA DEVOLUTA.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-194

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 91269

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): AMPLIAÇÃO DE UC

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Phaethornis_bourcieri_major; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta caraya; Alouatta discolor; Ateles marginatus; Chiropotes utahickae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus libidinosus; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DA CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; F XINGÚ-ARAGUAIA; FS XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia; F Xingú-Araguaia; Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia; F Xingú-Araguaia; Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Comandante Fontoura; Floodplain Xingu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA CONTÍNUA AO PARQUE ESTADUAL DO XINGU; AMPLIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DO XINGU;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-195

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 3422

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): AMPLIAÇÃO DE UC

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes eladioi; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Procnias_albus_wallacei; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Itacaiúnas;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Itacaiúnas;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* LIMITE COM DUAS UCS, ENTÃO SUGERE-SE A AMPLIAÇÃO PARA INCORPORAÇÃO NA UC E TI
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO DE BORDAS DA UP (<5%) COM ÁREA MILITAR*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-196

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 8070

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	8 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F MADEIRA-TAPAJÓS; FB MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TERRA INDÍGENA EM ESTUDO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*

- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Terra indígena em estudo
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-197

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 287

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jarina; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TERRA INDÍGENA EM ESTUDO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* TERRA INDÍGENA EM ESTUDO
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-198

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 242418

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Roosevelt;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Roosevelt;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TERRA INDÍGENA EM ESTUDO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* TERRA INDÍGENA EM ESTUDO
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-199

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 606621

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	6 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta puruensis; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Cebus albifrons albifrons; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Plecturocebus stephennashi; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus macrocephalus; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari; Trichechus inunguis;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AS CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; S PURÚS-MADEIRA; SA PURÚS-MADEIRA; SG PURÚS-MADEIRA; SO PURÚS-MADEIRA; SP PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Purus; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Ituxi; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Mucuim; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Ituxi; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Mucuim;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; As Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; S Purús-Madeira; Sa Purús-Madeira; Sg Purús-Madeira; SO Purús-Madeira; Sp Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; As Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; S Purús-Madeira; Sa Purús-Madeira; Sg Purús-Madeira; SO Purús-Madeira; Sp Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TERRA INDÍGENA EM ESTUDO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* TERRA INDÍGENA EM ESTUDO
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-200

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 27900

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Ituxi; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Ituxi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Ituxi;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AMPLIAÇÃO DE TI (CAITITU APURINÃ);
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI (CAITITU APURINÃ)
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-202

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 136927

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	28 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes nascimentoi S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DA PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TERRA INDÍGENA EM ESTUDO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* TERRA INDÍGENA EM ESTUDO
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-203

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 116811

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jutaí; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jutaí;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jutaí;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* POVO KANAMARI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-204

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 110797

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	27 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	15 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	15 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus rubicundus; Cebuella pygmaea niveiventris; Cebuella pygmaea pygmaea; Cebus albifrons albifrons; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix lagotricha; Lagothrix poeppigii; Leontocebus nigricollis; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Pithecia hirsuta; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus macrocephalus; Sotalia fluviatilis; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari; Trichechus inunguis;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; D CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPURÁ; D QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; D QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DB QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; PAA JAVARÍ-JURUÁ; PAA SOLIMÕES-JAPURÁ; PAH JAVARÍ-JURUÁ; PAH SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis

erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Western Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Western Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Cenozoico Terc2 Solimões-Japurá; D Quaternario Javarí-Juruá; D Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Cenozoico Terc2 Solimões-Japurá; D Quaternario Javarí-Juruá; D Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Solimões-Japurá; Paa Javarí-Juruá; Paa Solimões-Japurá; Pah Javarí-Juruá; Pah Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: Western Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* RECONHECIMENTO DE TI KOKAMA, KAMBEBA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* RECONHECIMENTO DE TI KOKAMA, KAMBEBA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-205

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 292733

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	27 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus rubicundus; Cebuella pygmaea pygmaea; Coendou bicolor; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia hirsuta; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Leontocebus nigricollis; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DA CENOZOICO TERC1 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC1 SOLIMÕES-JAPUR; DB CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DB QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Western Amazon floodplain; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Iça - Putumayo;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* D Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Solimões-Japurá;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Iça - Putumayo;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PEDIDO DE RECONHECIMENTO TI POVO KOKAMA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* RECONHECIMENTO DE TI KOKAMA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-206

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 24805

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus rubicundus; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao calvus calvus; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; D QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; PAA JAVARÍ-JURUÁ; PAA SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jutaí; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Western Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jutaí; Alvo 2 - Macrófitas / Western Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Quaternario Javarí-Juruá; D Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Quaternario Javarí-Juruá; Paa Javarí-Juruá; Paa Solimões-Japurá;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Quaternario Javarí-Juruá; D Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Quaternario Javarí-Juruá; Paa Javarí-Juruá; Paa Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jutaí; Western Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* TI KOKMA, KAMBEBA, FEIJOAL (CERCADA POR ESSAS TIS)
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-207

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 40046

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; AS CENOZOICO TERC2 BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS CENOZOICO TERC2 BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jauaperi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Branco-Trombeta; As Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Branco-Trombeta; As Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TERRA INDÍGENA EM ESTUDO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* TERRA INDÍGENA EM ESTUDO
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-208

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 72480

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus RR; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; cnemidophorus lemniscatus RR; coleodactylus septentrionalis; Dendrobates_leucomelas; gymnophthalmus leucomystax; gymnophthalmus vanzoi; kentropyx striata RR; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uraricoera;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Fs Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Rio Uraricoera;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TERRA DE LAVRADO, ANTERIORMENTE PROPOSTA COMO UC, PRESENÇA DE INDÍGENAS NA ÁREA. MUITO AFLORAMENTO ROCHOSO; ÁREA PRESERVADA, NÃO IDEAL PARA AGRICULTURA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* ÁREA UTILIZADA POR INDÍGENAS
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-209

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 232440

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Psophia_interjecta; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; FA XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SG XINGÚ-ARAGUAIA; SO XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sg Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sg Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PRÓXIMO DE TI, COM A CRIAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA A PROTEÇÃO DA ÁREA. ASSIM COMO COM ASSENTAMENTOS PRÓXIMOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-210

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 359445

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Penelope_pileata; Psophia_interjecta; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SO XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pau-d`arco;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Pau-d`arco;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PRÓXIMO DE TI, COM A CRIAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA A PROTEÇÃO DA ÁREA. ASSIM COMO COM ASSENTAMENTOS PRÓXIMOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-212

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 22748

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes eladioi; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Procnias_albus_wallacei; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Itacaiúnas;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PRÓXIMO A TI E UC
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-213

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 583078

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	28 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	4 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	28 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	6 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Alouatta puruensis; Ateles chamek; Cacajao calvus novaesi; Callimico goeldii; Cebuella pygmaea niveiventris; Cebus albifrons albifrons; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Lagothrix poeppigii; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus macrocephalus; Sotalia fluviatilis; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari; Trichechus inunguis;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; A CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; A CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tarauca; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tarauca;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa C
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Japurá-Purús; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Javarí-

Juruá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Javarí-Juruá;

- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá; Rio Juruá; Rio Jutaí; Rio Tarauca;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PROPOSTA DE GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA NO FÓRUM DO TERRITÓRIO DO MÉDIO JURUÁ
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-214

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 274472

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	15 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	15 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá; Rio Jutaí;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PROPOSTA DE GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA NO FÓRUM DO TERRITÓRIO DO MÉDIO JURUÁ
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-215

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 97428

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PROPOSTA DE GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA NO FÓRUM DO TERRITÓRIO DO MÉDIO JURUÁ
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-216

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 44524

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	6 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Piculus_paraensis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI; S TOCANTINS-MEARI; SA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; S Tocantins-Meari; Sa Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; S Tocantins-Meari; Sa Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Mearim;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* O REMANESCENTE AMAZÔNICO EM ESTAGIO DE REGENERAÇÃO (VEGETAÇÃO SECUNDARIA); PRÓXIMO A TI E ASSENTAMENTOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-217

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 283755

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	6 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Piculus_paraensis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI; F TOCANTINS-MEARI; P TOCANTINS-MEARI; S TOCANTINS-MEARI; SN TOCANTINS-MEARI; SP TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; F Tocantins-Meari; P Tocantins-Meari; S Tocantins-Meari; SN Tocantins-Meari; Sp Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; F Tocantins-Meari; P Tocantins-Meari; S Tocantins-Meari; SN Tocantins-Meari; Sp Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Mearim;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* O REMANESCENTE AMAZÔNICO EM ESTAGIO DE REGENERAÇÃO (VEGETAÇÃO SECUNDARIA); PRÓXIMO A TI E ASSENTAMENTOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-218

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 21647

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Crax_fasciolata_pinima; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Psophia_obscura; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Gurupi;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* LIMITE COM A RESERVA BIOLÓGICA DO GURUPI; INTEGRAÇÃO DAS UPS COM A RESERVA DO GURUPI QUE ESTA SENDO CRIADA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-219

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 40580

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA; DB QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; LG BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Uatumã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Paleozoico Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Lg Branco-Trombeta;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Paleozoico Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Lg Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Uatumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ASSENTAMENTO DO INCRA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-220

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 11396

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA; DA PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DS PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Uatumã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Paleozoico Branco-Trombeta; Da Paleozoico Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Ds Paleozoico Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* D Paleozoico Branco-Trombeta; Da Paleozoico Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Ds Paleozoico Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Uatumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ASSENTAMENTO DO INCRA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: RIO UATUMÃ (ID 110)*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-221

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 81768

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	25 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	1 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Trichechus inunguis; Trichechus manatus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:* Manguezais;
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta South;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta South;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* EXISTÊNCIA DE PEIXE-BOI; PRÓXIMA A UMA RESEX; ÁREA SOBRE O MAR; PROTEÇÃO DE ESPÉCIES EXISTENTES NO LOCAL;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO COM TERRITÓRIO QUILOMBOLA EM ESTUDO (SOBREPOSIÇÃO MANTIDA)*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-223

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 49940

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): RESERVA DA BIOSFERA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	13 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Chiasmocleis_avilapireae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PALEOZOICO ARAGUAIA-TOCANT; SA ARAGUAIA-TOCANT;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tocantins;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Paleozoico Araguaia-Tocant; Sa Araguaia-Tocant;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Paleozoico Araguaia-Tocant; Sa Araguaia-Tocant;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE PECUÁRIA E AGRICULTURA; FICA NA FRONTEIRA DO CERRADO COM AMAZÔNIA; EM SUA MAIORIA É CERRADO; CRIAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA; AGRICULTURA E PECUÁRIA

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-224

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 860375

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): RESERVA DA BIOSFERA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	18 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	25 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	25 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO ARAGUAIA-TOCANT; A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; A CRETACEO ARAGUAIA-TOCANT; A PALEOZOICO ARAGUAIA-TOCANT; AS PROTEROZOICO ARAGUAIA-TOCANT; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; AS CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; AS CRETACEO ARAGUAIA-TOCANT; AS PALEOZOICO ARAGUAIA-TOCANT; D CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; D CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; FA XINGÚ-ARAGUAIA; S ARAGUAIA-TOCANT; S XINGÚ-ARAGUAIA; SA ARAGUAIA-TOCANT; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SG ARAGUAIA-TOCANT; SG XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA; SO ARAGUAIA-TOCANT; SO XINGÚ-ARAGUAIA; SP ARAGUAIA-TOCANT;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tocantins;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Araguaia-Tocant; A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; A Cretaceo Araguaia-Tocant; A Paleozoico Araguaia-Tocant; As Proterozoico Araguaia-Tocant; As Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Araguaia-Tocant; A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; A Cretaceo Araguaia-Tocant; A Paleozoico Araguaia-Tocant; As Proterozoico Araguaia-Tocant; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Cretaceo Araguaia-Tocant; As Paleozoico Araguaia-Tocant; D Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; S Araguaia-Tocant; S Xingú-Araguaia; Sa Araguaia-Tocant; Sa Xingú-Araguaia; Sg Araguaia-Tocant; Sg Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; SO Araguaia-Tocant; SO Xingú-Araguaia; Sp Araguaia-Tocant;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia; Rio Pau-d`arco;

CARACTERIZAÇÃO

- *Características Gerais:* Área de pecuária e agricultura; Fica na fronteira do cerrado com Amazônia; Em sua maioria é cerrado; Criação da reserva da biosfera; Agricultura e pecuária

- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Gasoduto; Ferrovias; Mineração com até 50ha de área; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-225

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 155629

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DB PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 2 - Macrófitas / Rio Uatumã; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Db Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Db Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Uatumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* LAGO DE BALBINA - ENTORNO JÁ EXISTE ACORDO DE PESCA. ILHAS / ÁREA BASTANTE FRAGMENTADA (CRIADAS ARTIFICIALMENTE POR BALBINA); MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNANÇA JÁ EXISTENTES;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; UHE; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-226

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 131012

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	12 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Psophia_interjecta; Pyrrhura_anerythra; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; FA XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Javaés;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia; Rio Javaés;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PRÓXIMO DE APA; PRÓXIMO DE RPPN (2); ÁREAS CONSERVADAS; DIREITA COM TI; ENTORNO DO PE CANTÃO E PN ARAGUAIAÁREAS DE CERRADO CONSERVADOS PRÓXIMOS A TI; NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO POIS JÁ POSSUI UMA APA NAS PROXIMIDADES DE MODO QUE SE FAZ MELHOR FISCALIZAR PARA MANTER A GESTÃO DA ÁREA; NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO NA ZONA TAMPÃO DO PE CANTÃO E PN ARAGUAIA;

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-227

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 89303

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	0 ESPÉCIES
AVES	5 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	2 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	0 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	0 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:*
- *Aves:* Aburria_cujubi; Dendrocolaptes_retentus; Lophornis_gouldii; Pyrrhura_amazonum; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Inia araguaiaensis;
- *Ambientes Terrestres:*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:*
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:*
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PRÓXIMO DE APA; PRÓXIMO DE RPPN (2); ÁREAS CONSERVADAS; DIREITA COM TI; NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO POIS JÁ POSSUI UMA APA NAS PROXIMIDADES DE MODO QUE SE FAZ MELHOR FISCALIZAR PARA MANTER A GESTÃO DA ÁREA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-228

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 177919

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	2 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Dendrocolaptes_retentus; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO ARAGUAIA-TOCANT; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO ARAGUAIA-TOCANT; D QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tocantins;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Araguaia / Floodplain Araguaia; Rios Ordem 7 a 11 - Rio Araguaia / Floodplain Tocantins;
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Araguaia-Tocant; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Quaternario Araguaia-Tocant; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Araguaia-Tocant; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Quaternario Araguaia-Tocant; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia; Floodplain Tocantins;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AREIA; TURISMO; EXPLORAÇÃO FLORESTAL; RESERVA EXTRATIVISTA; TARTARUGA DA AMAZÔNIA; ASSENTAMENTOS; PECUÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Gasoduto; Ferrovias; Mineração com até 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-229

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 28237

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jutaí; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jutaí;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jutaí;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GARIMPO ILEGAL NO RIO BOIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-230

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 47464

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jutaí; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jutaí;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;

- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GARIMPO ILEGAL NO RIO BOIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-231

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 218834

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; LO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jutaí; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jutaí;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá; LO Javarí-Juruá;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá; LO Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GARIMPO ILEGAL NO RIO BOIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-232

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 164038

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao calvus calvus; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jutaí; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Western Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jutaí;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jutaí; Western Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GARIMPO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-233

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 114953

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus rubicundus; Cebuella pygmaea pygmaea; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia hirsuta; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Leontocebus nigricollis; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPURÁ; D QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DA CENOZOICO TERC1 SOLIMÕES-JAPUR; DA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC1 SOLIMÕES-JAPUR; DB CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DB QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Western Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Western Amazon floodplain; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Iça - Putumayo;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Solimões-Japurá; D Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario So
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Solimões-Japurá; D Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Iça - Putumayo; Western Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PRESSÃO DE CAÇA, EXPLORAÇÃO MADEIREIRA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-234

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 74345

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	20 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Cebus albifrons albifrons; Saguinus martinsi martinsi; Saguinus martinsi ochraceus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO BRANCO-TROMBETA; D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA BRANCO-TROMBETA; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; PAH BRANCO-TROMBETA; PAH MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis

erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Branco-Trombeta; D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Branco-Trombeta; Paa Madeira-Tapajós; Pah Branco-Trombeta; Pah Madeira-Tap
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Branco-Trombeta; D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Branco-Trombeta; Paa Madeira-Tapajós; Pah Branco-Trombeta; Pah Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA BASTANTE ANTROPIZADA C/ MUITAS ATIVIDADES PECUÁRIAS E MUITO PRÓXIMA A UM NÚCLEO URBANO (PARINTINS)PECUÁRIA E NÚCLEO URBANO (PARINTINS)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-235

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 549463

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Dendrocolaptes_retentus; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes satanas; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;

- *Ambientes Terrestres: D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Db Terciario Litora Tocantins-Meari; La Tocantins-Meari; Lg Tocantins-Meari;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta South; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Lower Tocantins floodplain; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Db Terciario Litora Tocantins-Meari; La Tocantins-Meari; Lg Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Db Terciario Litora Tocantins-Meari; La Tocantins-Meari; Lg Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta South; Lower Tocantins floodplain; Rio Guamá;

Caracterização

- *Características Gerais:* Área de capoeira; Plantação de pimenta; Plantação de dendêAgricultura extensiva de pimenta e dendê, com a utilização de agrotóxicos

- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Próximo a comunidade quilombola
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Gasoduto; Ferrovias; Mineração com até 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (jusante de UHE);

- *Referências:*

- *Outras Observações: Entorno de território quilombola titulado (sobreposição eliminada)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-236

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 32711

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii N; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Guaruba_guarouba; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: PAH JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus

dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Pah Jarí-Foz Amazon;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Pah Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* E UMA ÁREA DE VÁRZEA QUE NECESSITA SER ACOMPANHADA PARA MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES QUE ESTÃO SENDO EXERCIDA ALI, VISANDO A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE ALI EXISTENTE
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-237

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 16937

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	8 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii N; Atelopus_hoogmoedi; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Guaruba_guarouba; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_anerythra;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Quaternario Jarí-Foz Amazon;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Quaternario Jarí-Foz Amazon;

- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* E UMA ÁREA DE VÁRZEA QUE NECESSITA SER ACOMPANHADA PARA MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES QUE ESTÃO SENDO EXERCIDA ALI, VISANDO A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE ALI EXISTENTE

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-238

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 105197

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii N; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_anerythra;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Quaternario Jarí-Foz Amazon;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* Da Quaternario Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* E UMA ÁREA DE VÁRZEA QUE NECESSITA SER ACOMPANHADA PARA MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES QUE ESTÃO SENDO EXERCIDA ALI, VISANDO A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE ALI EXISTENTE

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-239

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 195378

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; AS CENOZOICO TERC2 BRANCO-TROMBETA; D PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; D CENOZOICO TERC2 BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS CENOZOICO TERC2 BRANCO-TROMBETA; LD BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jauaperi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Jauaperi; As Proterozoico Branco-Trombeta; As Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; D Proterozoico Branco-Trombeta; D Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Branco-Trombeta; As Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; D Proterozoico Branco-Trombeta; D Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* EXPLORAÇÃO MADEIREIRA SEGUIDA DE IMPLANTAÇÃO DE PASTO PARA CRIAÇÃO DE GADO DE CORTE. ALÉM DISSO, PRESENÇA DE ESPINHA-DE-PEIXE.EXPLORAÇÃO MADEIREIRA SEGUIDA DE IMPLANTAÇÃO DE PASTO PARA CRIAÇÃO DE GADO DE CORTE
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-240

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 571545

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	12 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	3 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	16 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	16 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus RR; anolis chrysolepis; anolis planiceps; Anomaloglossus_apiau; Atelopus_hoogmoedi; cnemidophorus lemniscatus RR; coleodactylus septentrionalis; gymnophthalmus leucomystax; gymnophthalmus vanzoi; kentropyx striata RR; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados: Melanocharacidium nigrum / Floodplain Branco; Sternarchorhynchus caboclo / Rio Mucajaí; Sternarchorhynchus severii / Floodplain Branco;*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Ateles paniscus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; D PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; DS QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DS QUATERNARIO NEGRO-BRANCO; F BRANCO-TROMBETA; F NEGRO-BRANCO; FS BRANCO-TROMBETA; FS NEGRO-BRANCO; LA NEGRO-BRANCO; ON NEGRO-BRANCO; SG BRANCO-TROMBETA; SG NEGRO-BRANCO; SP BRANCO-TROMBETA; SP NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera publifora Benth.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Branco; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Mucajaí;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Negro-Branco; D Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Negro-Branco; Ds Quaternario Branco-Trombeta; Ds Quaternario Negro-Branco; F Branco-Trombeta; F Negro-Branco; Fs Branco-Trombeta; Fs Negro-Branc
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Negro-Branco; D Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Negro-Branco; Ds Quaternario Branco-Trombeta; Ds Quaternario Negro-Branco; F Branco-Trombeta; F Negro-Branco; Fs Branco-Trombeta; Fs Negro-Branco; La Negro-Branco; ON Negro-Branco; Sg Branco-Trombeta; Sg Negro-Branco; Sp Branco-Trombeta; Sp Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Branco; Rio Mucajaí;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CRIAÇÃO DE GADO; MACAJAÍ - MUITO DEGRADADO, 25% DESMATADO; PRESENÇA DE ESTRADAS FACILITANDO A OCUPAÇÃO DA TERRA COM CONSEQUENTE DESMATAMENTO OCORRENDO AGORA. OCUPAÇÃO RECENTE; PROJETO DE ASSENTAMENTO NA ÁREA.DESMATAMENTO; OCUPAÇÃO IRREGULAR; PECUÁRIA

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-241

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 162224

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	12 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; A PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cretaceo Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cretaceo Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PROVÍNCIA DE CERRADO DIFERENCIADO FLORISTICAMENTE POR SOLOS MESOTRÓFICOS DO OESTE DISTANTE, NA REGIÃO DE PIMENTA BUENO E PEQUENAS MANCHAS NO MT E MS (RATTER ET AL 23). O POLÍGONO ABRANGE TAMBÉM A ÁREA CONTÍGUA AOS POLÍGONOS14271, 14276; OCORRÊNCIA DE NOVA ESPÉCIE DE PRIMATA ZOGUE-ZOGUE, PLECTUROCEBUS PALLESCE, CUJA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA AINDA NÃO ESTÁ TOTALMENTE DEFINIDA, MAS PROVAVELMENTE É RESTRITA À SERRA DOS PARECIS.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; UHE; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS: RATTER ET AL. 23*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: PIMENTA BUENO (ID 99)*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-242

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 24660

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Purus;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Made
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Purus;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PECUÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-243

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 100132

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; SP PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Purus;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Sp Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Sp Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Purus;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PECUÁRIA, MADEIRA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-244

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 41022

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; D QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; LA JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; La Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; La Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AGRICULTURA E PECUÁRIA DE PEQUENO PORTE
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-245

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 497916

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	15 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	15 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Saguinus bicolor; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; D CRETACEO BRANCO-TROMBETA; D PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA; D QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DA CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DB PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA; DB QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DS PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA; DS QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; LD BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Lower Negro floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Urubu; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Urubu; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Curiuaú;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Branco-Trombeta; D Cretaceo Branco-Trombeta; D Paleozoico Branco-Trombeta; D Quaternario Branco-Trombeta; Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Proterozoico Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Paleozoi
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Branco-Trombeta; D Cretaceo Branco-Trombeta; D Paleozoico Branco-Trombeta; D Quaternario Branco-Trombeta; Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Proterozoico Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Paleozoico Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Cretaceo Branco-Trombeta; Ds Paleozoico Branco-Trombeta; Ds Quaternario Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ASSENTAMENTO DO INCRA, PRESENÇA DE ESTRADA FACILITANDO A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL, ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIAPRESENÇA DE ESTRADA FACILITANDO A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL, ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-246

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 417141

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	1 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO NEGRO-BRANCO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; L JAPURÁ-NEGRO; LA JAPURÁ-NEGRO; LB JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO; LD NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Unini; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Cuiuni; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Unini;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Negro / Floodplain Negro;

- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Negro-Branco; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; L Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Lb Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro; Ld
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Negro-Branco; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; L Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Lb Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro; Ld Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Negro; Rio Cuiuni;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* INFLUÊNCIA DA ÁREA URBANA DE BARCELOS, ASSENTAMENTO AO LONGO DA ESTRADA BARCELOS - CAMIS; ÁREA URBANA DE NOVO AIRÃO, TURISMO DE BAIXO IMPACTO, DEGRADAÇÃO EM ANDAMENTO, DESMATAMENTODESMATAMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* TURISMO DE BAIXO IMPACTO
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-247

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 87517

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados: Harttia depressa / Rio Uatumã;*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jauaperi; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA POUCO CONHECIDA, ENTRE TERRA INDÍGENA E ÁREA DE PROTEÇÃO JÁ ESTABELECIDA. ÁREA DA HIDRELÉTRICA PITINGA - ÁREA DE MINERAÇÃOÁREA DA HIDRELÉTRICA PITINGA - ÁREA DE MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS ; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; UHE; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-248

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 32015

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	2 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis bombiceps; anolis planiceps; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO NEGRO-BRANCO; L JAPURÁ-NEGRO; LA JAPURÁ-NEGRO; LA NEGRO-BRANCO; LD NEGRO-BRANCO; LO JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Piaçava; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uneiuxi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Negro / Floodplain Negro; Rios Ordem 7 a 11 - Rio Negro / Rio Uneiuxi;

- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Db Proterozoico Negro-Branco; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Db Quaternario Japurá-Negro; Db Quaternario Negro-Branco; L Japurá-Negro; La Japu
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Db Proterozoico Negro-Branco; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Db Quaternario Japurá-Negro; Db Quaternario Negro-Branco; L Japurá-Negro; La Japurá-Negro; La Negro-Branco; Ld Negro-Branco; LO Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Negro; Rio Uneiuxi;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE EXPANSÃO URBANA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-249

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 394976

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): ;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; coleodactylus septentrionalis; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS CENOZOICO TERC2 BRANCO-TROMBETA; D PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; D CENOZOICO TERC2 BRANCO-TROMBETA; D QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS CENOZOICO TERC2 BRANCO-TROMBETA; DS QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; LA BRANCO-TROMBETA; LB BRANCO-TROMBETA; LD BRANCO-TROMBETA; LG BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera publifora Benth.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Anauá; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jauaperi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Rio Anauá; As Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; D Proterozoico Branco-Trombeta; D Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; D Quaternario Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ds Quaternario Branco-Trombeta; La Branco
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; D Proterozoico Branco-Trombeta; D Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; D Quaternario Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ds Quaternario Branco-Trombeta; La Branco-Trombeta; Lb Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta; Lg Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Anauá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* DESMATAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PASTO PARA CRIAÇÃO DE GADO DE CORTE
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-250

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 65387

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): AMPLIAÇÃO DE UC

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Bolitoglossa_caldwellae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; A CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; D CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; D QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; LD JAVARÍ-JURUÁ; LG JAVARÍ-JURUÁ; LO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; D Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; D Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá; Ld Javarí-Juruá; Lg Javarí-Juruá; LO Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CRIAÇÃO DE UCUS 13884 NO AMAZONAS . CAMPINARANAS SEM PROTEÇÃO E COM RISCO DE CONVERSÃO PRO ATIVIDADES MINERADORAS (PETRÓLEO, GÁS, AREIA)GESTÃO EM MOSAICO POIS HÁ TIS E UCS QUE FICARÃO CONTÍGUAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-251

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 26775

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): AMPLIAÇÃO DE UC

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Bolitoglossa_caldwellae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; A QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO EM MOSAICO POIS HÁ TIS E UCS QUE FICARÃO CONTÍGUAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-252

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 52367

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	11 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	18 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	19 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Hydrolaetare_capuru; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA; SO MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Upper Madeira floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Upper Madeira floodplain;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Upper Madeira floodplain; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; A Quaternario Purús-Madeira; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Purús-Madeira; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; A Quaternario Purús-Madeira; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Purús-Madeira; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Purús-Madeira; SO Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jaci Paraná; Upper Madeira floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*

- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-253

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 71955

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Acre; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Acre;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Ma
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Acre;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-254

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 39655

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	14 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	14 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Acre; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Acre;

- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Mad
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Acre;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-255

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 257943

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	13 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	38 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	5 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	39 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Hydrolaetare_capuru; Phyllomedusa_atelopoides; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus stephennashi; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Proterozoico Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Madeira-Tapajós; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Purús-Madeira; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Purús-Madeira; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D*

Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Proterozoico Madeira-Tapajós; Db Proterozoico Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós; Pa Purús-Madeira; Paa Madeira-Tapajós; Paa Purús-Madeira; S Purús-Madeira; SO Madeira-Tapajós; SO Purús-Madeira;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jamari; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Upper Madeira floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Upper Madeira floodplain;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Upper Madeira floodplain; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Proterozoico Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Madeira-Tapajós; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quat
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Proterozoico Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Madeira-Tapajós; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Aa

Quaternario Purús-Madeira; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Purús-Madeira; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Purús-Madeira; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Proterozoico Madeira-Tapajós; Db Proterozoico Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós; Pa Purús-Madeira; Paa Madeira-Tapajós; Paa Purús-Madeira; S Purús-Madeira; SO Madeira-Tapajós; SO Purús-Madeira;

- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira; Rio Jaci Paraná; Rio Jamari; Rio Mucuim; Upper Madeira floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMEN

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: AS FICHAS 48 E 49 FORAM UNIFICADAS, POIS SÃO IDÊNTICAS (48 FOI A IDENTIFICAÇÃO ATRIBUÍDA DA ÁREA).*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-256

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 85982

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	14 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	14 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Bolitoglossa_caldwellae; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Pithecia inusta; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab C
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-257

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 85431

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas

Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jiparaná ou Machado;
- *Encontro de águas:* clear black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-T
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jiparaná ou Machado; Floodplain Madeira;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (jusante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-258

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 59524

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus novaesi; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tarauca; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tarauca;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tarauca;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: AS FICHAS 48 E 49 FORAM UNIFICADAS, POIS SÃO IDÊNTICAS (48 FOI A IDENTIFICAÇÃO ATRIBUÍDA DA ÁREA).*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-259

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 57574

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	20 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	20 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Bolitoglossa_caldwellae; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Callimico goeldii; Cebuella pygmaea niveiventris; Cebus albifrons albifrons; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Lagothrix poeppigii; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus macrocephalus; Sotalia fluviatilis; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari; Trichechus inunguis;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; A QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; D CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; D QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; D QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios

(Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; A Quaternario Japurá-Purús; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Cenozoico
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; A Quaternario Japurá-Purús; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Quaternario Japurá-Purús; D Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: As fichas 48 e 49 foram unificadas, pois são idênticas (48 foi a identificação atribuída da área).*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-260

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 65899

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Purus;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Purus;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-261

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 106407

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus novaesi; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tarauca; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tarauca;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tarauca;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-262

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 80710

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA PURÚS-MADEIRA; SO PURÚS-MADEIRA; SP PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon

scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Purús-Madeira; SO Purús-Madeira; Sp Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações: As fichas 48 e 49 foram unificadas, pois são idênticas (48 foi a identificação atribuída da área);Sobreposição de bordas da UP (<5%) com área militar*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-263

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 44379

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	17 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	17 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus novaesi; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;

- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Japurá-Purús; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: AS FICHAS 48 E 49 FORAM UNIFICADAS, POIS SÃO IDÊNTICAS (48 FOI A IDENTIFICAÇÃO ATRIBUÍDA DA ÁREA).*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-264

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 37106

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus novaesi; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-265

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 46871

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	11 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta puruensis; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Cebus albifrons albifrons; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Sotalia fluviatilis; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari; Trichechus inunguis;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PAA PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira;

- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Paa Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Paa Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-266

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 50830

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus novaesi; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; A CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; A QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;

- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Cen
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá; Rio Juruá; Rio Jutaí;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-267

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 19023

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	11 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PAA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira;

- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Db Quaternario Purús-Madeira; Paa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: AS FICHAS 48 E 49 FORAM UNIFICADAS, POIS SÃO IDÊNTICAS (48 FOI A IDENTIFICAÇÃO ATRIBUÍDA DA ÁREA).*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-268

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 10266

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	11 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PA PURÚS-MADEIRA; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; PAA PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Marmelos; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Marmelos;

- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pa Purús-Madeira; Paa Madeira-Tapajós; Paa Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pa Purús-Madeira; Paa Madeira-Tapajós; Paa Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira; Rio Marmelos;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-269

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 121257

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	11 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Mico manicorensis; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Manicoré; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Manicoré;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Pu
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira; Rio Maderinha; Rio Manicoré;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações: As fichas 48 e 49 foram unificadas, pois são idênticas (48 foi a identificação atribuída da área).*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-270

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 60556

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus stephennashi; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Purus; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Ipixuna; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Ipixuna;

- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Purus; Rio Ipixuna;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: AS FICHAS 48 E 49 FORAM UNIFICADAS, POIS SÃO IDÊNTICAS (48 FOI A IDENTIFICAÇÃO ATRIBUÍDA DA ÁREA).*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-271

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 105047

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	12 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Callibella humilis; Cebus albifrons albifrons; Mico manicorensis; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Aripuanã; Floodplain Madeira;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: JUNTAR COM A ÁREA CONTÍGUA DO EXERCÍCIO ANTERIOR*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-272

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 24405

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	6 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia monachus; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Javari; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Quixitó; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Subandean Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Javari; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Quixitó; Alvo 2 - Macrófitas / Subandean Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Javari; Rio Quixitó; Subandean Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: AS FICHAS 48 E 49 FORAM UNIFICADAS, POIS SÃO IDÊNTICAS (48 FOI A IDENTIFICAÇÃO ATRIBUÍDA DA ÁREA).*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-273

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 98578

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	2 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Saguinus mystax pluto; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; D QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; PAH JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Coari Grande; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Coari Grande; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 6 - Margem Sul do Rio Amzonas / Rio Coari Grande; Rios Ordem 6 - Margem Sul do Rio Amzonas / West Central Amazon floodplain;
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Ceno
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; Pah Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Coari Grande; West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-274

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 53243

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Saguinus mystax pluto; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-275

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 108119

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; anolis tandai; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Mico chrysoleucus; Plecturocebus baptista; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Abacaxis; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Abacaxis;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cretaceo Madeira-Tapajós; D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cretaceo Madeira-Tapajós; D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Floodplain Abacaxis;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-276

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 87808

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* D Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-277

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 29055

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus rubicundus; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Lagothrix poeppigii; Leontocebus nigricollis; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; D QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; PAH JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Western Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Western Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Pah Javarí-Juruá;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Pah Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jandiatuba; Western Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-278

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 67936

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; D QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Quaternario Japurá-Negro; Aa Quaternario Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternari
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Quaternario Japurá-Negro; Aa Quaternario Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tefé; West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-279

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 30656

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO JAPURÁ-NEGRO; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CRETACEO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PAH JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:* white black;

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Japurá-Negro; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cretaceo Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Purús-Madeira; Pah Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Japurá-Negro; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cretaceo Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Purús-Madeira; Pah Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-280

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 74130

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus rubicundus; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia hirsuta; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Lagothrix poeppigii; Leontocebus nigricollis; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; D CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPURÁ; D QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; PAA JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Western Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Western Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Cenozoico Terc2 Solimões-Japurá; D Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Cenozoico Terc2 Solimões-Japurá; D Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Javarí-Juruá; Paa Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jutaí; Western Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-281

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 53324

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB CRETACEO PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Lower Negro floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central

Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Quaternario Purús-Madeira; Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Cretaceo Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* A Quaternario Purús-Madeira; Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Cretaceo Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Lower Negro floodplain; West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-282

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 74963

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao calvus calvus; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; D QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá;

- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternari
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-283

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 48277

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; anolis tandai; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Mico chrysoleucus; Plecturocebus baptista; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Abacaxis; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maués-açu; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Abacaxis;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Floodplain Abacaxis; Rio Maués-açu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-284

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 50096

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus rubicundus; Cebuella pygmaea pygmaea; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia hirsuta; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Leontocebus nigricollis; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC1 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC1 SOLIMÕES-JAPUR; DB QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Iça - Putumayo;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Db Quaternario Solimões-Japurá;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Db Quaternario Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Iça - Putumayo; Western Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-285

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 108545

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Cebus albifrons albifrons; Mico chrysoleucus; Plecturocebus baptista; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; PAH BRANCO-TROMBETA; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; PAH PURÚS-MADEIRA; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis

erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Pah Branco-Trombeta; Pah Madeira-Tapajós; Pah Purús-Madeira; Sp Madeira-Tap
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Pah Branco-Trombeta; Pah Madeira-Tapajós; Pah Purús-Madeira; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-286

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 34075

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus rubicundus; Coendou bicolor; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia hirsuta; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Leontocebus nigricollis; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC1 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC1 SOLIMÕES-JAPUR; DB QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Iça - Putumayo;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Db Quaternario Solimões-Japurá;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Db Quaternario Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Iça - Putumayo;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-287

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 72100

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	27 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Pithecia cazuzai; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao calvus calvus; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Saimiri vanzolinii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; D QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; PAH JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Western Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Quaternario Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quatern
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Ab Quaternario Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; Pah Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain; Western Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-288

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 114119

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	18 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus baptista; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Abacaxis; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cretaceo Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cretaceo Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Floodplain Abacaxis; Rio Mamuru;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO COM TERRITÓRIO QUILOMBOLA EM ESTUDO (SOBREPOSIÇÃO MANTIDA)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-289

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 54281

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus baptista; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAH BRANCO-TROMBETA; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Branco-Trombeta; Sp Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Branco-Trombeta; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-290

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 22741

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	27 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Pithecia cazuzai; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao calvus calvus; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; D QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; PAH JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Western Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; D Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; Pah Javarí-Ju
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; D Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; Pah Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá; West Central Amazon floodplain; Western Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-291

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 35096

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	20 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus PA; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus baptista; Saguinus martinsi ochraceus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA BRANCO-TROMBETA; PAH BRANCO-TROMBETA; PAH MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis

erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Mamuru; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Branco-Trombeta; Pah Branco-Trombeta; Pah Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Branco-Trombeta; Pah Branco-Trombeta; Pah Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Rio Mamuru;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-292

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 60825

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus rubicundus; Cebuella pygmaea niveiventris; Cebuella pygmaea pygmaea; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia hirsuta; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; AA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; D CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPURÁ; D QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DB QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; PAA SOLIMÕES-JAPURÁ; PAH JAVARÍ-JURUÁ; PAH SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Western Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Western Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Aa Quaternario Solimões-Japurá; D Cenozoico Terc2 Solimões-Japurá; D Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-J
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Aa Quaternario Solimões-Japurá; D Cenozoico Terc2 Solimões-Japurá; D Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Solimões-Japurá; Paa Solimões-Japurá; Pah Javarí-Juruá; Pah Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: Western Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-293

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 78879

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; kentropyx striata AP PA; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus rubicundus; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia cazuzai; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao calvus calvus; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; PAA JAVARÍ-JURUÁ; PAA SOLIMÕES-JAPURÁ; PAH JAVARÍ-JURUÁ; PAH SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Western Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Western Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá; Paa Javarí-Juruá; Paa Solimões-Japurá; Pah Javarí-Juruá; Pah Solimões-Japurá;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá; Paa Javarí-Juruá; Paa Solimões-Japurá; Pah Javarí-Juruá; Pah Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: Western Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-294

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 134923

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	16 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	4 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	2 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	7 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus PA; Dendropsophus_sarayacuensis; kentropyx striata AP PA; Pipa_snethlageae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Leporacanthicus joselimai / Floodplain Tapajós;*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Ateles paniscus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; D CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DB CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; PAA TROMBETAS-JARÍ; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; PAH TAPAJÓS-XINGÚ; PAH TROMBETAS-JARÍ; SP MADEIRA-TAPAJÓS; SP TAPAJÓS-XINGÚ;*

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Arapiuns; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá-una; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Arapiuns;
- *Encontro de águas:* clear black; white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Paa Madeira-Tapajós; Paa Trombetas-Jarí; Pah Madeira-Tapajós; Pah Tapajós-Xingú; Pah Trombetas-Jarí; Sp Madeira-Tapajós; Sp Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Paa Madeira-Tapajós; Paa Trombetas-Jarí; Pah Madeira-Tapajós; Pah Tapajós-Xingú; Pah Trombetas-Jarí; Sp Madeira-Tapajós; Sp Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Floodplain Tapajós; Rio Arapiuns; Rio Curuá-una;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*

- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Comunidade quilombola
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (jusante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações: Sobreposição com território quilombola em estudo (sobreposição mantida)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-295

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 19772

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	2 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia cazuzai; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao calvus calvus; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; AA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; AA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Aa Quaternario Japurá-Negro; Aa Quaternario Solimões-Japurá; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Ceno
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Aa Quaternario Japurá-Negro; Aa Quaternario Solimões-Japurá; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-296

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 41659

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; AA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; AA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DB QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; LD SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Japurá - Caquetá;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Aa Quaternario Japurá-Negro; Aa Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Solimões-Japurá
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Aa Quaternario Japurá-Negro; Aa Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Solimões-Japurá; Ld Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Japurá - Caquetá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-297

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 22060

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; cnemidophorus lemniscatus AM; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Penelope_pileata;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Cebus olivaceus castaneus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Saguinus martinsi martinsi; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; PAH BRANCO-TROMBETA; PAH TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Trombetas; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Trombetas;
- *Encontro de águas:* clear black;
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Pah Branco-Trombeta; Pah Trombetas-Jarí;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Pah Branco-Trombeta; Pah Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Floodplain Trombetas;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) FERROVIAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-298

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 42553

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis bombiceps; anolis tandai; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; AA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; LD SOLIMÕES-JAPURÁ; PAH SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Japurá - Caquetá;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Quaternario Japurá-Negro; Aa Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Japurá-Negro; D
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Quaternario Japurá-Negro; Aa Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Japurá-Negro; Db Quaternario Solimões-Japurá; Ld Solimões-Japurá; Pah Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Japurá - Caquetá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-299

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 48311

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis bombiceps; anolis tandai; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; LD JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Japurá - Caquetá;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2

Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Japurá-Negro; Db Quaternario Solimões-Japur

- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Japurá-Negro; Db Quaternario Solimões-Japurá; Ld Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Japurá - Caquetá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-300

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 61544

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus calvus; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix lagotricha; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus macrocephalus; Sotalia fluviatilis; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari; Trichechus inunguis;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; AA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; AA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; AA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO; PAH JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Western Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Western Amazon floodplain; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Japurá - Caquetá;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Aa Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Aa Quaternario Japurá-Negro; Aa Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japur
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Aa Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Aa Quaternario Japurá-Negro; Aa Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro; Pah Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Japurá - Caquetá; West Central Amazon floodplain; Western Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-301

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 26048

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis bombiceps; anolis trachyderma W; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DS CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Japurá - Caquetá;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Ds Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Ds Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Japurá - Caquetá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* INCLUI UP NO MEIO (AO LADO DO UARINI)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-302

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 60411

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MADEIRA EMPRESARIAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Arinos;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Arinos; As Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* As Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Arinos;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM GRANDE NÚMERO DE PMFS AUTORIZADOS PELA SEMA/MT. RECURSOS PESQUEIROS.ÁREA PARA MELHORIA DA PECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15624 TEM ASSENTAMENTO RURAL DENTRO*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-303

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 56471

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MADEIRA EMPRESARIAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Juruena;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Juruena; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruena;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM GRANDE NÚMERO DE PMFS AUTORIZADOS PELA SEMA/MT. RECURSOS PESQUEIROS.ÁREA PARA MELHORIA DA PECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15624 TEM ASSENTAMENTO RURAL DENTRO*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-304

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 499709

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MADEIRA EMPRESARIAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	15 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	16 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Arinos;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Rio Arinos; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madei
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Arinos;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM GRANDE NÚMERO DE PMFS AUTORIZADOS PELA SEMA/MT. RECURSOS PESQUEIROS.ÁREA PARA MELHORIA DA PECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15624 TEM ASSENTAMENTO RURAL DENTRO*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-305

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 27016

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MADEIRA EMPRESARIAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Apiacás;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM GRANDE NÚMERO DE PMFS AUTORIZADOS PELA SEMA/MT. RECURSOS PESQUEIROS.ÁREA PARA MELHORIA DA PECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15624 TEM ASSENTAMENTO RURAL DENTRO*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-306

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 61019

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MADEIRA EMPRESARIAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	18 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Juruena;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruena;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM GRANDE NÚMERO DE PMFS AUTORIZADOS PELA SEMA/MT. RECURSOS PESQUEIROS.ÁREA PARA MELHORIA DA PECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15624 TEM ASSENTAMENTO RURAL DENTRO*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-307

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 88431

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MADEIRA EMPRESARIAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	23 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São Manuel ou Teles Pires;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Rio São Manuel ou Teles Pires; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Proterozoico Tapajós-Xingú; A Quaternario Madeira-Tapajós; A Quaternario Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Qua
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Proterozoico Tapajós-Xingú; A Quaternario Madeira-Tapajós; A Quaternario Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain São Manoel; Rio São Manuel ou Teles Pires;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM GRANDE NÚMERO DE PMFS AUTORIZADOS PELA SEMA/MT. RECURSOS PESQUEIROS.ÁREA PARA MELHORIA DA PECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15624 TEM ASSENTAMENTO RURAL DENTRO*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-308

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 148113

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MADEIRA EMPRESARIAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São João da Barra;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM GRANDE NÚMERO DE PMFS AUTORIZADOS PELA SEMA/MT. RECURSOS PESQUEIROS.ÁREA PARA MELHORIA DA PECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15624 TEM ASSENTAMENTO RURAL DENTRO*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-309

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 100101

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MADEIRA EMPRESARIAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	23 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Apiacás;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain São Manoel; Rio Apiacás;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM GRANDE NÚMERO DE PMFS AUTORIZADOS PELA SEMA/MT. RECURSOS PESQUEIROS.ÁREA PARA MELHORIA DA PECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15624 TEM ASSENTAMENTO RURAL DENTRO*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-310

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 666340

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MADEIRA EMPRESARIAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	24 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain São Manoel; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Apiacás;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Apiacás; A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain São Manoel; Rio Apiacás;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM GRANDE NÚMERO DE PMFS AUTORIZADOS PELA SEMA/MT. RECURSOS PESQUEIROS.ÁREA PARA MELHORIA DA PECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; PCH/CGH; UHE; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UH

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15624 TEM ASSENTAMENTO RURAL DENTRO*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-311

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 103818

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MADEIRA EMPRESARIAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São João da Barra;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM GRANDE NÚMERO DE PMFS AUTORIZADOS PELA SEMA/MT. RECURSOS PESQUEIROS.ÁREA PARA MELHORIA DA PECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15624 TEM ASSENTAMENTO RURAL DENTRO*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-312

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 45754

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	23 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	2 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Piculus_paraensis; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Baryancistrus longipinnis / Floodplain Araguaia; Baryancistrus niveatus / Floodplain Araguaia;*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; D PALEOZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; SA ARAGUAIA-TOCANT;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Paleozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Cretaceo Xingú-Araguaia; Sa Araguaia-Tocant;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Paleozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Cretaceo Xingú-Araguaia; Sa Araguaia-Tocant;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NÃO EXISTE FRAGMENTO DE VEGETAÇÃO PRIMARIA, MAS IRA APROVEITAR OS PEQUENOS TRECHOS PARA JUNTAR E FAZER UM CORREDOR ECOLÓGICO; RECUPERAÇÃO PARA FORMAR CORREDOR ECOLÓGICO;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-313

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 69456

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	27 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Psophia_obscura; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; P TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; P Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; P Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Pindaré;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* INTEGRAÇÃO DAS UPS AO MOSAICO GURUPI, EM PROCESSO DE CRIAÇÃO (E GRANDE DEMANDA); INTEGRAÇÃO DAS UPS AO MOSAICO GURUPI,;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; FERROVIAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-314

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 322475

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Crax_fasciolata_pinima; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Psophia_obscura; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; A CRETACEO TOCANTINS-MEARI; A TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; AB CRETACEO TOCANTINS-MEARI; AB TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; AS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; AS CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; A Cretaceo Tocantins-Meari; A Terciario Litora Tocantins-Meari; Ab Cretaceo Tocantins-Meari; Ab Terciario Litora Tocantins-Meari; As Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; As Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocanti
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; A Cretaceo Tocantins-Meari; A Terciario Litora Tocantins-Meari; Ab Cretaceo Tocantins-Meari; Ab Terciario Litora Tocantins-Meari; As Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; As Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Gurupi;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* INTEGRAÇÃO DAS UPS AO MOSAICO GURUPI, EM PROCESSO DE CRIAÇÃO (E GRANDE DEMANDA); INTEGRAÇÃO DAS UPS AO MOSAICO GURUPI,;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-315

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 195991

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Crax_fasciolata_pinima; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Psophia_obscura; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Gurupi;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* INTEGRAÇÃO DAS UPS AO MOSAICO GURUPI, EM PROCESSO DE CRIAÇÃO (E GRANDE DEMANDA); INTEGRAÇÃO DAS UPS AO MOSAICO GURUPI,;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-316

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 29293

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Crax_fasciolata_pinima; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DA CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DB CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Cretaceo Tocantins-Meari; Db Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Cretaceo Tocantins-Meari; Db Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Gurupi;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* INTEGRAÇÃO DAS UPS AO MOSAICO GURUPI, EM PROCESSO DE CRIAÇÃO (E GRANDE DEMANDA); INTEGRAÇÃO DAS UPS AO MOSAICO GURUPI,;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-317

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 41818

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Crax_fasciolata_pinima; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* INTEGRAÇÃO DAS UPS AO MOSAICO GURUPI, EM PROCESSO DE CRIAÇÃO (E GRANDE DEMANDA); INTEGRAÇÃO DAS UPS AO MOSAICO GURUPI,;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-318

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 146307

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	18 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Aripuanã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruena;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-319

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 50347

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Apiacás;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Apiacás;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-320

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 281316

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	18 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados: Prochilodus britskii / Rio Arinos;*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Juruena; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Arinos; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São João da Barra;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Juruena; Rio Arinos; A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapaj
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruena; Rio Arinos;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: RIO ARINOS (ID 119)*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-321

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 74140

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Aripuanã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Aripuanã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-322

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 84696

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	12 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jaci Paraná; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jaci Paraná;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS DE ALTO ÍNDICE DE DESMATAMENTO EM VIRTUDE DE OCUPAÇÕES ILEGAIS.OCUPAÇÕES ILEGAIS LEVANDO A DESMATAMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-323

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 109468

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	18 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Aripuanã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Aripuanã; A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Aripuanã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-324

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 35899

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	18 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Juruena;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;

- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-325

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 358836

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Juruena; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São João da Barra;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Juruena; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Protero
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruena;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-326

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 43863

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Psophia_interjecta; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; FA XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS COM ASSENTAMENTOS QUE NECESSITAM FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA VEGETAÇÃO; RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS QUE ESTÃO DEGRADADAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-327

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 469951

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Psophia_interjecta; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DA PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; FA XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS COM ASSENTAMENTOS QUE NECESSITAM FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA VEGETAÇÃO; RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS QUE ESTÃO DEGRADADAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-328

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 61326

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jamari; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Upper Madeira floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jamari;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Made
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jamari; Upper Madeira floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE ALTA CONSOLIDADA, MINERAÇÃO E POUCA VEGETAÇÃO REMANESCENTE.MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-329

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 152389

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	11 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus septemcinctus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: C PARAGUAY; FA PARAGUAY; FS PARAGUAY; S PARAGUAY; SA PARAGUAY; SN PARAGUAY; SP PARAGUAY;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Arinos;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* C Paraguay; Fa Paraguay; Fs Paraguay; S Paraguay; Sa Paraguay; SN Paraguay; Sp Paraguay;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* C Paraguay; Fa Paraguay; Fs Paraguay; S Paraguay; Sa Paraguay; SN Paraguay; Sp Paraguay;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE PLANALTO COM AGRICULTURA TECNIFICADA EM GRANDES ÁREAS; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA NO MANEJO DE SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* TI RIO FORMOSO
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; PCH/CGH

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15636 - TEM ASSENTAMENTOS RURAIS DENTRO ; 14821 - SOBREPÕE A TI RIO FORMOSO.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-330

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 192841

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	10 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus septemcinctus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: C PARAGUAY; F PARAGUAY; S PARAGUAY; SA PARAGUAY; SP PARAGUAY;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio do Sangue;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* C Paraguay; F Paraguay; S Paraguay; Sa Paraguay; Sp Paraguay;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* C Paraguay; F Paraguay; S Paraguay; Sa Paraguay; Sp Paraguay;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *Características Gerais:* Área de planalto com agricultura tecnificada em grandes áreas; Regularização ambiental; Melhoria no manejo de solo e água
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Ti Rio Formoso
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação; PCH/CGH; Fragmentação de rios (montante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações: 15636 - Tem assentamentos rurais dentro ; 14821 - Sobrepõe a TI Rio Formoso.*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-331

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 100950

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	0 ESPÉCIES
AVES	5 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:*
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Suiá-miçu ou Suiazão; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA

- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-332

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 262412

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F TAPAJÓS-XINGÚ; F XINGÚ-ARAGUAIA; FA XINGÚ-ARAGUAIA; FS TAPAJÓS-XINGÚ; FS XINGÚ-ARAGUAIA; ON TAPAJÓS-XINGÚ; ON XINGÚ-ARAGUAIA; S TAPAJÓS-XINGÚ; SA TAPAJÓS-XINGÚ; SN TAPAJÓS-XINGÚ; SP TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Tapajós-Xingú; F Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; Fs Tapajós-Xingú; Fs Xingú-Araguaia; ON Tapajós-Xingú; ON Xingú-Araguaia; S Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú; Sp Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* F Tapajós-Xingú; F Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; Fs Tapajós-Xingú; Fs Xingú-Araguaia; ON Tapajós-Xingú; ON Xingú-Araguaia; S Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú; Sp Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Xingu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-333

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 200552

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	12 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	0 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:*
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Arinos; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio do Sangue;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio do Sangue; As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE PLANALTO COM AGRICULTURA TECNIFICADA EM GRANDES ÁREAS; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA; AGRICULTURA TECNIFICADA EM GRANDES ÁREAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* TI RIO FORMOSO
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; PCH/CGH; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15636 - TEM ASSENTAMENTOS RURAIS DENTRO ; 14821 - SOBREPÕE A TI RIO FORMOSO.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-334

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 44210

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	0 ESPÉCIES
AVES	5 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:*
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FA XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA; PAH XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Suiá-miçu ou Suiazão;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fa Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Pah Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fa Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Pah Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-335

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 112285

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	12 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Arinos;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Arinos;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE PLANALTO COM AGRICULTURA TECNIFICADA EM GRANDES ÁREAS; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA; AGRICULTURA TECNIFICADA EM GRANDES ÁREAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* TI RIO FORMOSO
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15636 - TEM ASSENTAMENTOS RURAIS DENTRO ; 14821 - SOBREPÕE A TI RIO FORMOSO.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-336

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 66942

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	11 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	0 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FA MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:*
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio do Sangue;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fa Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fa Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*

- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: 151 - Sobreposto ao assentamento PA União de Todos, PA Renascer, PA Alto Paraíso PA ETA; 152 - Sobreposto ao assentamento PA Braco Sul; 26829 - - Sobreposto ao assentamento PA Iririzinho; 154 - - Sobreposto ao assentamento PA Cachimbo, Cachimbo II e Pad*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-337

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 51769

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	0 ESPÉCIES
AVES	6 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:*
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Pyrrhura_anerythra; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F XINGÚ-ARAGUAIA; FA XINGÚ-ARAGUAIA; FS XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Suiá-miçu ou Suiazão;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-338

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 176585

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ; SN TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Manissauá-miçu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *Características Gerais:* Regularização das atividades de agricultura tecnificada em área de planalto para a regularização ambiental.; Recuperação de APPs degradadas e reserva legal.; Agricultura tecnificada em grandes áreas
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-339

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 155960

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	18 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; FS MADEIRA-TAPAJÓS; FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON MADEIRA-TAPAJÓS; ON TAPAJÓS-XINGÚ; S MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SN TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São Manuel ou Teles Pires;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Fs Madeira-Tapajós; Fs Tapajós-Xingú; ON Madeira-Tapajós; ON Tapajós-Xingú; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; SN

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Fs Madeira-Tapajós; Fs Tapajós-Xingú; ON Madeira-Tapajós; ON Tapajós-Xingú; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; SN Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio São Manuel ou Teles Pires;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA TECNIFICADA EM ÁREA DE PLANALTO PARA A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL.; RECUPERAÇÃO DE APPS DEGRADADAS E RESERVA LEGAL.; AGRICULTURA TECNIFICADA EM GRANDES ÁREAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-340

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 369910

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Arinos;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Arinos;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA TECNIFICADA EM ÁREA DE PLANALTO PARA A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL.; RECUPERAÇÃO DE APPS DEGRADADAS E RESERVA LEGAL.; AGRICULTURA TECNIFICADA EM GRANDES ÁREAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-341

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 37130

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	0 ESPÉCIES
AVES	6 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:*
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Pyrrhura_anerythra; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F XINGÚ-ARAGUAIA; FA XINGÚ-ARAGUAIA; FS XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Suiá-miçu ou Suiazão;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; Fs Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; Fs Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-342

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 32797

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_anerythra; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA; PAA XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Suiá-miçu ou Suiazão;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

Caracterização

- *Características Gerais:* Regularização ambiental; Melhoria do manejo de solo e água
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: 1584 - Sobrepõe o assentamento PA São Manoel e PA Pingos D'água; 15566 - Sobrepõe ao assentamento PA Pingos d'água; 15567 - Sobrepõe ao assentamento PA Canaã I.*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-343

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 36689

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	1 ESPÉCIES
AVES	6 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Pyrrhura_anerythra; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FA XINGÚ-ARAGUAIA; FS XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA; PAA XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Suiá-miçu ou Suiazão;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fa Xingú-Araguaia; Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fa Xingú-Araguaia; Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Suiá-miçu ou Suiazão;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-344

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 68622

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Manissauá-miçu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA TECNIFICADA EM ÁREA DE PLANALTO PARA A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL.; RECUPERAÇÃO DE APPS DEGRADADAS E RESERVA LEGAL.; AGRICULTURA TECNIFICADA EM GRANDES ÁREAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-345

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 55941

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	1 ESPÉCIES
AVES	8 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_anerythra; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA; PAA XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Suiá-miçu ou Suiazão;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Suiá-miçu ou Suiazão;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15389 - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA SANTO ANTÔNIO DO FRONTEIRA; 15758 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA SANTO ANTÔNIO DO FRONTEIRA I E II; 15386 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA BRASIPAIVA; 154 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA JACARÉ VALENTE, SÃO V*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-346

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 95353

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	12 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jiparaná ou Machado;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS COM SOLICITAÇÃO DE EXTRAÇÃO MINERAL, ALTAMENTE CONSOLIDADA PARA GADO E SOJA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-347

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 323178

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Arinos; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São Manuel ou Teles Pires;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio São Manuel ou Teles Pires;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA TECNIFICADA EM ÁREA DE PLANALTO PARA A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL.; RECUPERAÇÃO DE APPS DEGRADADAS E RESERVA LEGAL.; AGRICULTURA TECNIFICADA EM GRANDES ÁREAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; PCH/CGH

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-348

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 26545

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	8 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_anerythra; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA; PAA XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Comandante Fontoura; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Suiá-miçu ou Suiazão;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia;

- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15389 - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA SANTO ANTÔNIO DO FRONTEIRA; 15758 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA SANTO ANTÔNIO DO FRONTEIRA I E II; 15386 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA BRASIPAIVA; 154 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA JACARÉ VALENTE, SÃO V*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-349

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 28140

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta puruensis; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Mico rondoni; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus apella; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Jiparaná ou Machado; A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jiparaná ou Machado;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS COM SOLICITAÇÃO DE EXTRAÇÃO MINERAL, ALTAMENTE CONSOLIDADA PARA GADO E SOJA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-350

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 110720

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	9 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_anerythra; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA; PAA XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA; SO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Comandante Fontoura; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15389 - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA SANTO ANTÔNIO DO FRONTEIRA; 15758 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA SANTO ANTÔNIO DO FRONTEIRA I E II; 15386 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA BRASIPAIVA; 154 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA JACARÉ VALENTE, SÃO V*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-351

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 30069

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	9 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_anerythra; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SO XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Tapirapé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;

- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15389 - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA SANTO ANTÔNIO DO FRONTEIRA; 15758 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA SANTO ANTÔNIO DO FRONTEIRA I E II; 15386 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA BRASIPAIVA; 154 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA JACARÉ VALENTE, SÃO V*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-352

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 201099

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	10 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_anerythra; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SO XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Tapirapé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;

- *Interface Terra*-Água: Rio Tapirapé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15389 - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA SANTO ANTÔNIO DO FRONTEIRA; 15758 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA SANTO ANTÔNIO DO FRONTEIRA I E II; 15386 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA BRASIPAIVA; 154 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA JACARÉ VALENTE, SÃO V*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-353

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 47441

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	11 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hylexetastes_brigidai; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Pyrrhura_anerythra; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15389 - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA SANTO ANTÔNIO DO FRONTEIRA; 15758 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA SANTO ANTÔNIO DO FRONTEIRA I E II; 15386 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA BRASIPAIVA; 154 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA JACARÉ VALENTE, SÃO V*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-354

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 100533

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	22 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Ateles marginatus; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; A QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Peixoto de Azevedo;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; A Quaternario Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; A Quaternario Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Peixoto de Azevedo;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 151 - SOBREPOSTO AO ASSENTAMENTO PA UNIÃO DE TODOS, PA RENASCER, PA ALTO PARAÍSO PA ETA; 152 - SOBREPOSTO AO ASSENTAMENTO PA BRACO SUL; 26829 - - SOBREPOSTO AO ASSENTAMENTO PA IRIRIZINHO; 154 - - SOBREPOSTO AO ASSENTAMENTO PA CACHIMBO, CACHIMBO II E PAD*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-355

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 257765

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	9 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_anerythra; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DA PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; F XINGÚ-ARAGUAIA; FS XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA; PAA XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SO XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Comandante Fontoura; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Tapirapé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; F Xingú-Araguaia; Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; F Xingú-Araguaia; Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Comandante Fontoura;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 15389 - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA SANTO ANTÔNIO DO FRONTEIRA; 15758 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA SANTO ANTÔNIO DO FRONTEIRA I E II; 15386 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA BRASIPAIVA; 154 - - SOBREPOSTA AO ASSENTAMENTO PA JACARÉ VALENTE, SÃO V*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-356

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 40522

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	25 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Phaethornis_aethopygus; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; SA TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain São Manoel;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; As Quaternario Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; As Quaternario Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain São Manoel;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 151 - SOBREPOSTO AO ASSENTAMENTO PA UNIÃO DE TODOS, PA RENASCER, PA ALTO PARAÍSO PA ETA; 152 - SOBREPOSTO AO ASSENTAMENTO PA BRACO SUL; 26829 - - SOBREPOSTO AO ASSENTAMENTO PA IRIRIZINHO; 154 - - SOBREPOSTO AO ASSENTAMENTO PA CACHIMBO, CACHIMBO II E PAD*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-357

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 228083

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	23 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; F TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; RM TAPAJÓS-XINGÚ; SN TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Peixoto de Azevedo;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; rm Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; rm Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Peixoto de Azevedo;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL; MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: 151 - SOBREPOSTO AO ASSENTAMENTO PA UNIÃO DE TODOS, PA RENASCER, PA ALTO PARAÍSO PA ETA; 152 - SOBREPOSTO AO ASSENTAMENTO PA BRACO SUL; 26829 - - SOBREPOSTO AO ASSENTAMENTO PA IRIRIZINHO; 154 - - SOBREPOSTO AO ASSENTAMENTO PA CACHIMBO, CACHIMBO II E PAD*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-358

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 37586

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Aripuanã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Aripuanã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* A ÁREA ESTÁ SOBRE ASSENTAMENTO E APRESENTA MUITOS DESMATAMENTOS; RECUPERAÇÃO DE RL E APP; RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS PRODUTIVAS (PASTAGENS E AGRICULTURA FAMILIAR)

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-359

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 234071

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Mico acariensis; Mico chrysoleucus; Mico saterei; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus);

Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Canumã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Canumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Proterozoico Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapa
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Proterozoico Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Cretaceo Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Canumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAÇÃO ATIVIDADE DE PECUÁRIA; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DESMATADAS PARA PECUÁRIA; PECUÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-360

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 601584

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	2 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	22 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	22 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_retentus; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Crenicichla cyclostoma / Floodplain Araguaia;*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; A CRETACEO ARAGUAIA-TOCANT; A CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; A PALEOZOICO ARAGUAIA-TOCANT; A PALEOZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CENOZOICO TERC2 XINGÚ-*

Araguaia; D Cretaceo Araguaia-Tocant; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Paleozoico Araguaia-Tocant; D Paleozoico Xingú-Araguaia; D Quaternario Araguaia-Tocant; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; F Araguaia-Tocant; F Tocantins-Meari; Sa Tocantins-Meari; SO Araguaia-Tocant;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tocantins;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Araguaia / Floodplain Araguaia; Rios Ordem 7 a 11 - Rio Araguaia / Floodplain Tocantins;
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; A Cretaceo Araguaia-Tocant; A Cretaceo Xingú-Araguaia; A Paleozoico Araguaia-Tocant; A Paleozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Creta
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; A Cretaceo Araguaia-Tocant; A Cretaceo Xingú-Araguaia; A Paleozoico Araguaia-Tocant; A Paleozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Cretaceo Araguaia-Tocant; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Paleozoico Araguaia-Tocant; D Paleozoico Xingú-Araguaia; D Quaternario

Araguaia-Tocant; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; F Araguaia-Tocant; F Tocantins-Meari; Sa Tocantins-Meari; SO Araguaia-Tocant;

- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia; Floodplain Tocantins;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS DEGRADADAS E COM OCORRÊNCIA DE QUEBRADEIRAS DE COCO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* QUEBRADEIRAS DE COCO
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* QUEBRADEIRAS DE COCO; COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; FERROVIAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO COM TERRITÓRIO QUILOMBOLA EM ESTUDO (SOBREPOSIÇÃO MANTIDA)*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-361

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 125452

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); PESQUISA: LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Hydrolaetare_capuru; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F MADEIRA-TAPAJÓS; FA MADEIRA-TAPAJÓS; FB MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;

- *Interface Terra*-Água: Rio Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* POUCOS FRAGMENTOS PRIMÁRIOS AO LONGO DO RIO; ÁREA MUITO DESMATADA; PROVAVELMENTE ALTO; ÁREAS ALAGADAS, MOSAICO DE BIOMAS E ECOSSISTEMAS DIFERENTES (PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO).
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-362

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 114116

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES); PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	14 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	14 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; A CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Acre; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Acre;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Mad
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Acre;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NO MAPEAMENTO DAS INVASÕES QUE OCORREM NA FLORESTA ESTADUAL DO ANTIMARY FOI DETECTADO AMPLAS OCUPAÇÕES DE FLORESTA A PARTIR DA FRONTEIRA COM O AMAZONAS; LIMITAÇÃO DE ATIVIDADES DEGRADANTES. PROIBIÇÃO DE INVASÕES E ARRENDAMENTO DE TERRAS DENTRO DA FLORESTA ESTADUAL ANTIMARY; JÁ HÁ ESTUDOS PRÉVIOS E É FRONTEIRIÇO COM UMA FLOTAINVASÃO E ARRENDAMENTO DE ÁREAS DENTRO DE UC
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-363

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 133034

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES); PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	18 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	18 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; A CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios

(Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Purus;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Pur
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Purus;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NO MAPEAMENTO DAS INVASÕES QUE OCORREM NA FLORESTA ESTADUAL DO ANTIMARY FOI DETECTADO AMPLAS OCUPAÇÕES DE FLORESTA A PARTIR DA FRONTEIRA COM O AMAZONAS; LIMITAÇÃO DE ATIVIDADES DEGRADANTES. PROIBIÇÃO DE INVASÕES E ARRENDAMENTO DE TERRAS DENTRO DA FLORESTA ESTADUAL ANTIMARY; JÁ HÁ ESTUDOS PRÉVIOS E É FRONTEIRIÇO COM UMA FLOTAINVASÃO E ARRENDAMENTO DE ÁREAS DENTRO DE UC
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*

- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-364

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 48075

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Abunã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira;

- *Interface Terra*-Água: Rio Abunã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-365

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 94810

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Abunã; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Ituxi; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Ituxi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC); ALTA DEMANDA POR SAF - FORTALECIMENTO O QUE JÁ EXISTE
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* SAF E AGRICULTURA FAMILIAR
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-366

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 12190

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allophryne_ruthveni; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DB CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DS CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DS CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus

dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jarauçu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jarauçu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIO, ASSENTAMENTOS COM NECESSIDADE DE APOIO, EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA, ALTERNATIVAS ECONÔMICAS.EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA; CONFLITOS FUNDIÁRIOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-367

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 96437

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	33 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DB CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DB CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DS CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DS CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jarauçu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIO, ASSENTAMENTOS COM NECESSIDADE DE APOIO, EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA, ALTERNATIVAS ECONÔMICAS.EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA; CONFLITOS FUNDIÁRIOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: COMENTÁRIOS SOBRE ATIVIDADES DE CAMPO DA FUNAI NA ÁREA - POSSÍVEIS ISOLADOS (?); SOBREPOSIÇÃO COM PAE COM/INCRA (?)*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-368

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 44457

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	33 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DB CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DS CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DS CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jarauçu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jarauçu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIO, ASSENTAMENTOS COM NECESSIDADE DE APOIO, EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA, ALTERNATIVAS ECONÔMICAS.EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA; CONFLITOS FUNDIÁRIOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: IDEM FICHA 47*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-369

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 26189

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DS CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DS CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIO, ASSENTAMENTOS COM NECESSIDADE DE APOIO, EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA, ALTERNATIVAS ECONÔMICAS.EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA; CONFLITOS FUNDIÁRIOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-370

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 19049

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	0 ESPÉCIES
AVES	5 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:*
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FA XINGÚ-ARAGUAIA; PAH XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Suiá-miçu ou Suiazão;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fa Xingú-Araguaia; Pah Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fa Xingú-Araguaia; Pah Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-371

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 326446

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_anerythra; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F XINGÚ-ARAGUAIA; FA XINGÚ-ARAGUAIA; FS XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA; PAA XINGÚ-ARAGUAIA; PAH XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Suiá-miçu ou Suiazão;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; Pah Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; Pah Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Suiá-miçu ou Suiazão;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-372

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 39760

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	1 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Pyrrhura_anerythra; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: ON XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Tapirapé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* ON Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* ON Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-373

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 193918

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	1 ESPÉCIES
AVES	9 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_anerythra; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA; PAA XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA; SO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Comandante Fontoura; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Suiá-miçu ou Suiazão; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Tapirapé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-374

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 252498

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	9 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_anerythra; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA; PAA XINGÚ-ARAGUAIA; SO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Comandante Fontoura; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Xingu; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Suiá-miçu ou Suiazão;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Suiá-miçu ou Suiazão;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-375

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 80490

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	9 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_anerythra; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SO XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Tapirapé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-376

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 28482

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	9 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_anerythra; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Ateles marginatus; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; FS XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SO XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Comandante Fontoura;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;

- *Interface Terra*-Água: Rio Comandante Fontoura;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-377

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 747113

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	14 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	14 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Psophia_interjecta; Pyrrhura_anerythra; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; DA PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DA CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; FA XINGÚ-ARAGUAIA; FS XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA; SO XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Comandante Fontoura; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Javaés; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Tapirapé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; Fs Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; SO Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia; Rio Javaés;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-378

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 426504

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	1 ESPÉCIES
AVES	5 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Hylexetastes_uniformis; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FA PARAGUAY; S PARAGUAY; SA PARAGUAY; SN PARAGUAY; SP PARAGUAY;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fa Paraguay; S Paraguay; Sa Paraguay; SN Paraguay; Sp Paraguay;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Fa Paraguay; S Paraguay; Sa Paraguay; SN Paraguay; Sp Paraguay;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS, CAVERNAS, SÍTIOS QUILOMBOLAS, CACHOEIRAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA

- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Reconhecimento / titulação de quilombolas em Vila Bela; Bela Cor; Manga; Boqueirão; Barra do Rio Alegre; Vale do Rio Guaporé; Capão Negro; Vale do Alegre.
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Gasoduto; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-379

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 31480

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	0 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:*
- *Aves:* Hylexetastes_uniformis; Pyrrhura_perlata;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus septemcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: CB MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; TN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Cb Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; TN Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Cb Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; TN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS, CAVERNAS, SÍTIOS QUILOMBOLAS, CACHOEIRAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* RECONHECIMENTO / TITULAÇÃO DE QUILOMBOLAS EM VILA BELA; BELA COR; MANGA; BOQUEIRÃO; BARRA DO RIO ALEGRE; VALE DO RIO GUAPORÉ; CAPÃO NEGRO; VALE DO ALEGRE.

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-380

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 67065

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	1 ESPÉCIES
AVES	4 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni;
- *Aves:* Hylexetastes_uniformis; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus septemcinctus; Alouatta caraya; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: CB MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FA MADEIRA-TAPAJÓS; FB MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS; ST MADEIRA-TAPAJÓS; TN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Cb Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós; ST Madeira-Tapajós; TN Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Cb Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós; ST Madeira-Tapajós; TN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS, CAVERNAS, SÍTIOS QUILOMBOLAS, CACHOEIRAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* RECONHECIMENTO / TITULAÇÃO DE QUILOMBOLAS EM VILA BELA; BELA COR; MANGA; BOQUEIRÃO; BARRA DO RIO ALEGRE; VALE DO RIO GUAPORÉ; CAPÃO NEGRO; VALE DO ALEGRE.
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-381

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 68744

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	0 ESPÉCIES
AVES	4 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:*
- *Aves:* Aburria_cujubi; Hylexetastes_uniformis; Pyrrhura_perlata; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus septemcinctus; Alouatta caraya; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F MADEIRA-TAPAJÓS; FB MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; ST MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Paragua;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; ST Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* F Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; ST Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS, CAVERNAS, SÍTIOS QUILOMBOLAS, CACHOEIRAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* RECONHECIMENTO / TITULAÇÃO DE QUILOMBOLAS EM VILA BELA; BELA COR; MANGA; BOQUEIRÃO; BARRA DO RIO ALEGRE; VALE DO RIO GUAPORÉ; CAPÃO NEGRO; VALE DO ALEGRE.
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-382

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 59675

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus septemcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: C MADEIRA-TAPAJÓS; CS MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* C Madeira-Tapajós; Cs Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* C Madeira-Tapajós; Cs Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS, CAVERNAS, SÍTIOS QUILOMBOLAS, CACHOEIRAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* RECONHECIMENTO / TITULAÇÃO DE QUILOMBOLAS EM VILA BELA; BELA COR; MANGA; BOQUEIRÃO; BARRA DO RIO ALEGRE; VALE DO RIO GUAPORÉ; CAPÃO NEGRO; VALE DO ALEGRE.
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-383

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 212311

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	6 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus septemcinctus; Alouatta caraya; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: C MADEIRA-TAPAJÓS; CS MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FA MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* C Madeira-Tapajós; Cs Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* C Madeira-Tapajós; Cs Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS, CAVERNAS, SÍTIOS QUILOMBOLAS, CACHOEIRAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* RECONHECIMENTO / TITULAÇÃO DE QUILOMBOLAS EM VILA BELA; BELA COR; MANGA; BOQUEIRÃO; BARRA DO RIO ALEGRE; VALE DO RIO GUAPORÉ; CAPÃO NEGRO; VALE DO ALEGRE.; COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO COM TERRITÓRIO QUILOMBOLA EM ESTUDO (SOBREPOSIÇÃO MANTIDA)*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-384

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 110382

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus septemcinctus; Alouatta caraya; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: CS MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FA MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Cs Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Cs Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS, CAVERNAS, SÍTIOS QUILOMBOLAS, CACHOEIRAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* RECONHECIMENTO / TITULAÇÃO DE QUILOMBOLAS EM VILA BELA; BELA COR; MANGA; BOQUEIRÃO; BARRA DO RIO ALEGRE; VALE DO RIO GUAPORÉ; CAPÃO NEGRO; VALE DO ALEGRE.
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-385

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 74817

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	9 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	12 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F MADEIRA-TAPAJÓS; FA MADEIRA-TAPAJÓS; FB MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS, CAVERNAS, SÍTIOS QUILOMBOLAS, CACHOEIRAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* RECONHECIMENTO / TITULAÇÃO DE QUILOMBOLAS EM VILA BELA; BELA COR; MANGA; BOQUEIRÃO; BARRA DO RIO ALEGRE; VALE DO RIO GUAPORÉ; CAPÃO NEGRO; VALE DO ALEGRE.
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-386

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 14841

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	5 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Hydrolaetare_capuru; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_perlata; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F MADEIRA-TAPAJÓS; FA MADEIRA-TAPAJÓS; FB MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Guaporé; Rio Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-387

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 123943

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	9 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; enyalioides laticeps; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; A PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cretaceo Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cretaceo Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* ; DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: PIMENTA BUENO (ID 99)*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-388

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 36903

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	11 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Paleozoico Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* As Paleozoico Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: PIMENTA BUENO (ID 99)*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-389

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 86443

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	12 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-390

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 50663

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	13 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jiparaná ou Machado;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-391

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 13143

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	12 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta puruensis; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus apella; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: PIMENTA BUENO (ID 99)*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-392

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 27593

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	12 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jiparaná ou Machado;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-393

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 14295

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	12 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jiparaná ou Machado;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-394

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 81740

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jiparaná ou Machado;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-395

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 24229

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-396

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 20478

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	8 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Parkerthraustes_humeralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Mamoré;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO PARA ESTABELECIMENTO DE MOSAICO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-397

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 25058

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	8 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Hydrolaetare_capuru;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Parkerthraustes_humeralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Upper Madeira floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Upper Madeira floodplain; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Mamoré; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Upper Madeira floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Upper Madeira floodplain; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Mamoré; Upper Madeira floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO PARA ESTABELECIMENTO DE MOSAICO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-398

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 101947

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-399

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 27162

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Jiparaná ou Machado; A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jiparaná ou Machado;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-400

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 24804

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jamari; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jamari;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jamari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO INTEGRADA/PARTICIPATIVA PARA ESTABELECIMENTO DE MOSAICO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-401

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 5153

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA; AB PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA; AS PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Abunã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Abunã; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Abunã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Purús-Madeira; Ab Proterozoico Purús-Madeira; As Proterozoico Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Purús-Madeira; Ab Proterozoico Purús-Madeira; As Proterozoico Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Abunã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO PARA ESTABELECIMENTO DE MOSAICO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS ; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-402

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 115923

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	8 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	15 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	16 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Hydrolaetare_capuru;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Parkerthraustes_humeralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Upper Madeira floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Upper Madeira floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Upper Madeira floodplain; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; A
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Upper Madeira floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO PARA ESTABELECIMENTO DE MOSAICO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-403

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 118451

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; A PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA; AS CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AS PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Abunã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Abunã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Proterozoico Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Proterozoico Purús-Madeira; As Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; As Proterozoico Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Proterozoico Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Proterozoico Purús-Madeira; As Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; As Proterozoico Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Abunã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO PARA ESTABELECIMENTO DE MOSAICO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-404

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 29347

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta puruensis; Ateles chamek; Cebus albifrons albifrons; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus macrocephalus; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA; AS PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA; DS PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Purús-Madeira; As Proterozoico Purús-Madeira; Ds Proterozoico Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Purús-Madeira; As Proterozoico Purús-Madeira; Ds Proterozoico Purús-Madeira;

- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO PARA ESTABELECIMENTO DE MOSAICO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-406

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 189041

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	13 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	21 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	22 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Hydrolaetare_capuru; Phyllomedusa_atelopoides; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA; SO MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jaci Paraná; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Upper Madeira floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jaci Paraná; Alvo 2 - Macrófitas / Upper Madeira floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Upper Madeira floodplain; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; As Proterozoico Madeira-Tapa
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Purús-Madeira; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Purús-Madeira; SO Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jaci Paraná; Upper Madeira floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO PARA ESTABELECIMENTO DE MOSAICO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE R

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-407

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 38346

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	13 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Hydrolaetare_capuru; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jaci Paraná; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Upper Madeira floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jaci Paraná;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jaci Paraná; Upper Madeira floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO PARA ESTABELECIMENTO DE MOSAICO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-408

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 175289

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno

(Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jiparaná ou Machado;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jiparaná ou Machado;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-409

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 234941

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	14 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	15 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu -

Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jiparaná ou Machado; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Roosevelt;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Jiparaná ou Machado; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jiparaná ou Machado; Rio Roosevelt;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (jusante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-410

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 75651

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	13 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu -

Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jamari; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jamari;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Proterozoico Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jamari; Upper Madeira floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO PARA ESTABELECIMENTO DE MOSAICO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-411

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 921410

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu -

Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jaci Paraná; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jamari; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jaci Paraná; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jamari;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Made
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jiparaná ou Machado; Rio Jamari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO INTEGRADA/PARTICIPATIVA PARA ESTABELECIMENTO DE MOSAICO; INCLUIR UP ADJACENTE AO SUL DA UP 17755 (GEOLOGIA DE ALTA RELEVÂNCIA, PINTURAS RUPESTRES).
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE

ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; PCH/CGH; UHE; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRA

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-412

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 119666

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES); CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): COMITÊS DE BACIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	6 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Psophia_dextralis; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ; SN TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NASCENTES; COMITÊ DE BACIA; CORREDOR (UP 1589)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: VERIFICAR SE A MESMA DINÂMICA QUE OCORRE NA PORÇÃO PARAENSE DA TI XINGU.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-413

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 57306

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES); CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): COMITÊS DE BACIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Psophia_dextralis; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ; PAA TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NASCENTES; COMITÊ DE BACIA; CORREDOR (UP 1589)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: VERIFICAR SE A MESMA DINÂMICA QUE OCORRE NA PORÇÃO PARAENSE DA TI XINGU.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-414

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 119534

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES); CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): COMITÊS DE BACIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Psophia_dextralis; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ; PAA TAPAJÓS-XINGÚ; SA TAPAJÓS-XINGÚ; SN TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NASCENTES; COMITÊ DE BACIA; CORREDOR (UP 1589)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: VERIFICAR SE A MESMA DINÂMICA QUE OCORRE NA PORÇÃO PARAENSE DA TI XINGU.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-415

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 780734

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	13 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	14 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FA MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Arinos; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio do Sangue;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio do Sangue; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da

Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fs Madeira

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Arinos; Rio do Sangue;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; PCH/CGH; UHE; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-416

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 96610

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Psophia_obscura; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guamá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ALGUMAS ÁREAS NECESSITAM DE RECUPERAÇÃO; PARA PRESERVAR AS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E PARA NÃO OCORRER A SUPRESSÃO DAS MESMAS; ÁREA COM REMANESCENTES FLORESTAIS;

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-417

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 133730

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Psophia_obscura; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guamá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ALGUMAS ÁREAS NECESSITAM DE RECUPERAÇÃO; PARA PRESERVAR AS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E PARA NÃO OCORRER A SUPRESSÃO DAS MESMAS; ÁREA COM REMANESCENTES FLORESTAIS;

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; FERROVIAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-418

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 28724

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES); FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	33 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Mico leucippe; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jamaxim;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* RESTABELECIMENTO DE ÁREAS DESMATADAS POR OCUPAÇÃO HUMANA, LIMITAR ATIVIDADE DEGRADANTE, COMO DESMATAMENTO, LIGADA A IMPLANTAÇÃO DA BR-163; DEVE SER FISCALIZADA A ÁREA POIS A ESTRADA FAVORECE OCUPAÇÃO HUMANA E CONSEQUENTEMENTE ATIVIDADES ILEGAIS POR AUSÊNCIA DO PODER PÚBLICOMUITAS ATIVIDADES ILEGAIS E IRREGULARES LIGADAS AO DESMATAMENTO COM A FACILIDADE DE OCUPAÇÃO HUMANA PROPORCIONADA PELA BR-163
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-419

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 61090

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES); FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lepidothrix_vilasboasi; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Mico leucippe; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS TERCIARIO LITORA TAPAJÓS-XINGÚ;*

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jamaxim;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Jamaxim; A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Terciario Litora Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Terciario Litora Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jamaxim;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FORTE OCUPAÇÃO; ALTAS TAXAS DE DESMATAMENTO; ÁREAS TITULADAS (TERRA LEGAL - SIGEF); GARIMPO; ÁREA DE OCUPAÇÃO ILEGAL EM FUNÇÃO DA ESTRADA BR-163 (CUIABÁ-SANTARÉM) QUE FACILITA O ACESSO A ESSAS ÁREAS POR MADEIREIROS, GARIMPEIROS, ETC.; ÁREA COM NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO POR ESTAR MUITO DEGRADADA (ÁREA LIMITADA POR ATIVIDADE DEGRADANTE)MUITAS ATIVIDADES ILEGAIS E IRREGULARES LIGADAS AO DESMATAMENTO COM A FACILIDADE DE OCUPAÇÃO HUMANA PROPORCIONADA PELA BR-163
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-420

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 353755

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES); FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	12 ESPÉCIES
AVES	37 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; gonatodes tapajonicus; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lepidothrix_vilasboasi; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Ateles marginatus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Mico leucippe; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus apella; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;

- *Ambientes Terrestres: A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jamaxim;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Jamaxim; A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jamaxim;

Caracterização

- *Características Gerais:* Forte ocupação; Altas taxas de desmatamento; Áreas tituladas (Terra Legal - SIGEF); Garimpo; Área de ocupação ilegal em função da estrada BR-163 (Cuiabá-Santarém) que facilita o acesso a essas áreas por madeireiros, garimpeiros, etc.; Área com necessidade de restauração por estar muito degradada (área limitada por atividade degradante)Muitas atividades ilegais e irregulares ligadas ao desmatamento com a facilidade de ocupação humana proporcionada pela BR-163

- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia; Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: Sobreposição de bordas da UP (<5%) com área militar*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-421

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 16132

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; gonatodes tapajonicus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Mico leucippe; Sotalia fluviatilis; Ateles marginatus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ;*

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jamaxim;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Tapajós; As Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tapajós; Rio Jamaxim;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* A ÁREA JÁ APRESENTA ALTOS NÍVEIS DE DEGRADAÇÃO POR OCUPAÇÃO HUMANA POR SER CIDADE HÁ MUITO TEMPO O QUE FAVORECE O DESMATAMENTO. ESSE TRECHO ESTÁ ENTRE AS CIDADES DE ITAITUBA E TRAIRÃO; DEVE SER FISCALIZADO E CONTROLADO AÇÕES DE ATIVIDADES ILEGAIS LIGADAS AO DESFLORESTAMENTO, AGRICULTURA QUE GERA QUEIMADAS, OCUPAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL. ESSA ÁREA APRESENTA UMA OCUPAÇÃO TERRITORIAL ANTIGA COM O ESTABELECIMENTO DE CIDADES COMO ITAITUBA E TRAIRÃOMINERAÇÃO; PECUÁRIA E AGRICULTURA; OCUPAÇÃO IRREGULAR (BR-163); EXPLORAÇÃO MADEIREIRA

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação Fragmentação de rios (montante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações: Sobreposição de bordas da UP (<5%) com área militar*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-422

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 230832

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	33 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	6 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	14 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	15 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; gonatodes tapajonicus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Crenicichla urosema / Floodplain Tapajós; Hopliancistrus tricornis / Floodplain Tapajós; Leporacanthicus joselimai / Floodplain Tapajós; Megadontognathus kaitukaensis / Floodplain Tapajós; Peckoltia compta / Floodplain Tapajós; Peckoltia snethlageae / Flo*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Mico leucippe; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;

- *Ambientes Terrestres: As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Tapajós-Xingú; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Tapajós; As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Tapajós-Xingú; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xing
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Tapajós-Xingú; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-

Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú;

- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tapajós;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* A ÁREA JÁ APRESENTA ALTOS NÍVEIS DE DEGRADAÇÃO POR OCUPAÇÃO HUMANA POR SER CIDADE HÁ MUITO TEMPO O QUE FAVORECE O DESMATAMENTO. ESSE TRECHO ESTÁ ENTRE AS CIDADES DE ITAITUBA E TRAIRÃO; DEVE SER FISCALIZADO E CONTROLADO AÇÕES DE ATIVIDADES ILEGAIS LIGADAS AO DESFLORESTAMENTO, AGRICULTURA QUE GERA QUEIMADAS, OCUPAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL. ESSA ÁREA APRESENTA UMA OCUPAÇÃO TERRITORIAL ANTIGA COM O ESTABELECIMENTO DE CIDADES COMO ITAITUBA E TRAIRÃOMINERAÇÃO; PECUÁRIA E AGRICULTURA; OCUPAÇÃO IRREGULAR (BR-163); EXPLORAÇÃO MADEIREIRA

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO DE BORDAS DA UP (<5%) COM ÁREA MILITAR*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-423

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 31032

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	21 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; D PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tapajós;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* A ÁREA JÁ APRESENTA ALTOS NÍVEIS DE DEGRADAÇÃO POR OCUPAÇÃO HUMANA POR SER CIDADE HÁ MUITO TEMPO O QUE FAVORECE O DESMATAMENTO. ESSE TRECHO ESTÁ ENTRE AS CIDADES DE ITAITUBA E TRAIRÃO; DEVE SER FISCALIZADO E CONTROLADO AÇÕES DE ATIVIDADES ILEGAIS LIGADAS AO DESFLORESTAMENTO, AGRICULTURA QUE GERA QUEIMADAS, OCUPAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL. ESSA ÁREA APRESENTA UMA OCUPAÇÃO TERRITORIAL ANTIGA COM O ESTABELECIMENTO DE CIDADES COMO ITAITUBA E TRAIRÃOMINERAÇÃO; PECUÁRIA E AGRICULTURA; OCUPAÇÃO IRREGULAR (BR-163); EXPLORAÇÃO MADEIREIRA

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-424

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 177841

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	25 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	26 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Mico leucippe; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; A PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; A QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D CRETACEO*

Madeira-Tapajós; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; D Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; Ds Quaternario Tapajós-Xingú; Pah Madeira-Tapajós; Pah Tapajós-Xingú;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Tapajós; A Cretaceo Tapajós-Xingú; A Paleozoico Tapajós-Xingú; A Quaternario Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Cretaceo Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; As Quaternario Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Cre
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cretaceo Tapajós-Xingú; A Paleozoico Tapajós-Xingú; A Quaternario Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Cretaceo Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; As Quaternario Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; D Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da

Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; Ds Quaternario Tapajós-Xingú; Pah Madeira-Tapajós; Pah Tapajós-Xingú;

- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tapajós;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* A ÁREA JÁ APRESENTA ALTOS NÍVEIS DE DEGRADAÇÃO POR OCUPAÇÃO HUMANA POR SER CIDADE HÁ MUITO TEMPO O QUE FAVORECE O DESMATAMENTO. ESSE TRECHO ESTÁ ENTRE AS CIDADES DE ITAITUBA E TRAIRÃO; DEVE SER FISCALIZADO E CONTROLADO AÇÕES DE ATIVIDADES ILEGAIS LIGADAS AO DESFLORESTAMENTO, AGRICULTURA QUE GERA QUEIMADAS, OCUPAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL. ESSA ÁREA APRESENTA UMA OCUPAÇÃO TERRITORIAL ANTIGA COM O ESTABELECIMENTO DE CIDADES COMO ITAITUBA E TRAIRÃOMINERAÇÃO; PECUÁRIA E AGRICULTURA; OCUPAÇÃO IRREGULAR (BR-163); EXPLORAÇÃO MADEIREIRA

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-425

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 20745

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	33 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Mico leucippe; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DA CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DB CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DB QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Cretaceo Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Quaternario Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Cretaceo Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Quaternario Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tapajós;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* A ÁREA JÁ APRESENTA ALTOS NÍVEIS DE DEGRADAÇÃO POR OCUPAÇÃO HUMANA POR SER CIDADE HÁ MUITO TEMPO O QUE FAVORECE O DESMATAMENTO. ESSE TRECHO ESTÁ ENTRE AS CIDADES DE ITAITUBA E TRAIRÃO; DEVE SER FISCALIZADO E CONTROLADO AÇÕES DE ATIVIDADES ILEGAIS LIGADAS AO DESFLORESTAMENTO, AGRICULTURA QUE GERA QUEIMADAS, OCUPAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL. ESSA ÁREA APRESENTA UMA OCUPAÇÃO TERRITORIAL ANTIGA COM O ESTABELECIMENTO DE CIDADES COMO ITAITUBA E TRAIRÃOMINERAÇÃO; PECUÁRIA E AGRICULTURA; OCUPAÇÃO IRREGULAR (BR-163); EXPLORAÇÃO MADEIREIRA

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (jusante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-426

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 524872

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO/ PROTEÇÃO DE FORMAÇÃO GEOLÓGICAS RELEVANTES

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes eladioi; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Procnias_albus_wallacei; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chiropotes utahickae; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Saguinus niger; Sapajus apella; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; RM XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Itacaiúnas;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Itacaiúnas; A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Cretaceo Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Cretaceo Xingú-
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Cretaceo Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Cretaceo Xingú-Araguaia; rm Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* COLONIZAÇÃO ANTIGA, MUITOS ASSENTAMENTOS, ÁREA ALTAMENTE DESMATADA COM MUITAS NASCENTES, OCORRÊNCIAS DE CAVERNAS COM BIODIVERSIDADE ESPECIFICA E RECURSOS MINERAIS (FERRO, COBRE E MANGANÊS); MUITAS NASCENTES, OCORRÊNCIAS DE CAVERNAS COM BIODIVERSIDADE ESPECIFICA E RECURSOS MINERAIS (FERRO, COBRE E MANGANÊS);
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações: UPS FALTANDO, NÃO ENCONTRADAS NO SHP: 13876, 13687*
- *Presença de sítio Baze: Serra Pelada (Id 150)*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-427

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 127714

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jamari; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jamari;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE MUITA VIOLÊNCIA NO CAMPO, MUITOS ASSENTAMENTOS E GRILAGEM E RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-428

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 25800

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE MUITA VIOLÊNCIA NO CAMPO, MUITOS ASSENTAMENTOS E GRILAGEM E RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-429

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 63792

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	13 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	27 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	27 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Hydrolaetare_capuru; Phyllomedusa_atelopoides; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA*

Quaternario Purús-Madeira; Pa Madeira-Tapajós; Pa Purús-Madeira; Pah Madeira-Tapajós; Pah Purús-Madeira; S Purús-Madeira; Sp Purús-Madeira;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Ituxi; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jaci Paraná; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Upper Madeira floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jaci Paraná; Alvo 2 - Macrófitas / Upper Madeira floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Madeira-Tapajós; A Quaternario Purús-Madeira; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapa
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Madeira-Tapajós; A Quaternario Purús-Madeira; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da

Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Pa Madeira-Tapajós; Pa Purús-Madeira; Pah Madeira-Tapajós; Pah Purús-Madeira; S Purús-Madeira; Sp Purús-Madeira;

- *Interface Terra*-Água: Rio Jaci Paraná; Upper Madeira floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DA UHE E DA BR, USO CONSOLIDADO, MAS EXISTÊNCIA DE FRAGMENTO.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE R

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-430

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 89473

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Acre;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Acre;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-431

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 70697

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Acre; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Acre;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Db
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Acre; Rio Ituxi;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CONTROLE DE DESMATAMENTO E REFLORESTAMENTO;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-432

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 18885

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	24 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_vilasboasi; Micrastur_mintoni; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Ateles chamek; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Mico leucippe; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: CS MADEIRA-TAPAJÓS; CS TAPAJÓS-XINGÚ; DS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; PAA TAPAJÓS-XINGÚ; S TAPAJÓS-XINGÚ; SA TAPAJÓS-XINGÚ; SN TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain São Manoel; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Apiacás; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São Benedito;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Cs Madeira-Tapajós; Cs Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú; S Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Cs Madeira-Tapajós; Cs Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú; S Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain São Manoel; Rio Apiacás; Rio São Benedito;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* UP BORDEJANDO TI E PRESERVADA, MAS SOB PRESSÃO; INCLUI UP NO MEIO (AO LADO DO UARINI)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-433

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 25942

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	21 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Mamuru;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* UP BEM PRESERVADA CIRCUNDANDO A UC E PRÓXIMA A TI
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-434

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 33946

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	22 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Arapiuns;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Ds Cretaceo Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Ds Cretaceo Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Arapiuns;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* UP BEM PRESERVADA CIRCUNDANDO A UC E PRÓXIMA A TI
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-435

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 62251

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tapauá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tapauá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-

Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tapauá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSITA REFINAR E AVALIAR POSSIBILIDADE DE NOVAS AÇÕESÁREA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-436

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 52965

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tapauá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tapauá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-

Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tapauá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSITA REFINAR E AVALIAR POSSIBILIDADE DE NOVAS AÇÕESÁREA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-437

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 34242

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tapauá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tapauá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tapauá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSITA REFINAR E AVALIAR POSSIBILIDADE DE NOVAS AÇÕESÁREA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-438

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 224767

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta puruensis; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Cebus albifrons albifrons; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus macrocephalus; Sotalia fluviatilis; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tapauá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tapauá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSITA REFINAR E AVALIAR POSSIBILIDADE DE NOVAS AÇÕESÁREA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-439

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 39836

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tapauá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tapauá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSITA REFINAR E AVALIAR POSSIBILIDADE DE NOVAS AÇÕESÁREA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-440

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 27372

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tapauá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tapauá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tapauá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSITA REFINAR E AVALIAR POSSIBILIDADE DE NOVAS AÇÕESÁREA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-441

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 240849

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tapauá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tapauá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tapauá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSITA REFINAR E AVALIAR POSSIBILIDADE DE NOVAS AÇÕESÁREA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-442

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 27398

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Coari Grande;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Purus; Rio Coari Grande;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSITA REFINAR E AVALIAR POSSIBILIDADE DE NOVAS AÇÕESÁREA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL GASODUTO ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-443

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 48074

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus stephennashi; Saguinus mystax pluto; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Purus;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Purus; Rio Coari Grande;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSITA REFINAR E AVALIAR POSSIBILIDADE DE NOVAS AÇÕESÁREA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-444

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 39691

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tapauá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tapauá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tapauá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSITA REFINAR E AVALIAR POSSIBILIDADE DE NOVAS AÇÕESÁREA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-445

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 105346

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Coari Grande;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSITA REFINAR E AVALIAR POSSIBILIDADE DE NOVAS AÇÕESÁREA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-446

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 70132

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tefé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSITA REFINAR E AVALIAR POSSIBILIDADE DE NOVAS AÇÕESÁREA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-447

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 57104

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tefé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tapauá; Rio Tefé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSITA REFINAR E AVALIAR POSSIBILIDADE DE NOVAS AÇÕESÁREA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-448

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 90819

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tefé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSITA REFINAR E AVALIAR POSSIBILIDADE DE NOVAS AÇÕESÁREA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-449

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 184509

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Coari Grande; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Coari Grande;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Coari Grande;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSITA REFINAR E AVALIAR POSSIBILIDADE DE NOVAS AÇÕESÁREA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-450

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 214780

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta puruensis; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Cebus albifrons albifrons; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus macrocephalus; Sotalia fluviatilis; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Coari Grande;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSITA REFINAR E AVALIAR POSSIBILIDADE DE NOVAS AÇÕESÁREA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS); EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (CAMPOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-451

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 133707

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tefé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tefé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSITA REFINAR E AVALIAR POSSIBILIDADE DE NOVAS AÇÕESÁREA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS); EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (CAMPOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-452

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 25913

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Dendrocolaptes_retentus; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes satanas; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; D QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; D TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA; DA QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; DA QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DA TERCIARIO*

Litora Tocantins-Meari; Da Terciario Litora Xingú-Araguaia; Db Proterozoico Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Pah Tocantins-Meari; Pah Xingú-Araguaia;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Lower Tocantins floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Da Terciario Litora Tocantins-Meari; D
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Da Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Terciario Litora Xingú-Araguaia; Db Proterozoico Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Pah Tocantins-Meari; Pah Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Lower Tocantins floodplain;

Caracterização

- *Características Gerais:* Região povoada por ribeirinhos que necessitam do fortalecimento das atividades por eles desempenhadas; Necessidade de avaliação dos estoques em virtude da usina (Tucuruí)
- *Usos Sustentáveis:*

- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Comunidades ribeirinhas
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (jusante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-453

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 227580

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes satanas; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DB CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DB QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; DB TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; LA TOCANTINS-MEARI; LG TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Lower Tocantins floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Db Cretaceo Tocantins-Meari; Db Quaternario Tocantins-Meari; Db Terciario Litora Tocantins-Meari; La Tocantins-Meari; Lg Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Db Cretaceo Tocantins-Meari; Db Quaternario Tocantins-Meari; Db Terciario Litora Tocantins-Meari; La Tocantins-Meari; Lg Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Lower Tocantins floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO POVOADA POR RIBEIRINHOS QUE NECESSITAM DO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES POR ELES DESEMPENHADAS; NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES EM VIRTUDE DA USINA (TUCURUÍ)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADES RIBEIRINHAS
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-454

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 22669

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Dendrocolaptes_retentus; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes satanas; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; D TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA; DA QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; DA QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DA TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA;*

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta South;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Da Terciario Litora Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Da Terciario Litora Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta South;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE PESCA QUE NECESSITA O MONITORAMENTO DAS ESPÉCIES ALI EXISTENTES. PARA QUE NÃO HAJA A EXTINÇÃO DAS MESMAS; AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES PESQUEIROS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-455

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 200979

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	33 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Brycon gouldingi / Amazon Delta South;*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes satanas; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA XINGÚ-*

Araguaia; Da Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Quaternario Xingú-Araguaia;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta South;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Tocantins-Meari; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Da Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Tocan
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Tocantins-Meari; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Da Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Quaternario Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta South;

Caracterização

- *Características Gerais:* Área de pesca que necessita o monitoramento das espécies ali existentes. Para que não haja a extinção das mesmas; Avaliação dos estoques pesqueiros;

- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Próximo a comunidade quilombola
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: Entorno de território quilombola titulado (sobreposição eliminada)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-456

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 29165

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MONITORAMENTO DE ESPÉCIES

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii N; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta South;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Quaternario Jarí-Foz Amazon;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Quaternario Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TENDO EM VISTA QUE E UMA REGIÃO DE ILHAS E QUE O POVOADO SOBREVIVE DA PESCA. NECESSITA SER ESTUDADA PARA APOIO DO POVOADO LOCALCOMUNIDADES RIBEIRINHAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* FORTALECER O POVOADO LOCAL QUE SOBREVIVEM DOS RECURSOS NATURAIS EXISTENTES; AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES PESQUEIROS
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-458

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 17020

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MONITORAMENTO DE ESPÉCIES

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	3 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	1 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Pyrilia_vulturina; Xiphocolaptes_carajaensis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Trichechus manatus; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; PF JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:* Manguezais;
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Pf Jarí-Foz Amazon;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Pf Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TENDO EM VISTA QUE E UMA REGIÃO DE ILHAS E QUE O POVOADO SOBREVIVE DA PESCA. NECESSITA SER ESTUDADA PARA APOIO DO POVOADO LOCAL; FORTALECER O POVOADO LOCAL QUE SOBREVIVEM DOS RECURSOS NATURAIS EXISTENTES; AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES PESQUEIROS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADES RIBEIRINHAS
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-459

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1350

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MONITORAMENTO DE ESPÉCIES

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	1 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Pyrilia_vulturina;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Chironectes minimus; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Trichechus manatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:* Manguezais;
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Quaternario Jarí-Foz Amazon;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Quaternario Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North;

CARACTERIZAÇÃO

- *Características Gerais:* Tendo em vista que e uma região de ilhas e que o povoado sobrevive da pesca. Necessita ser estudada para apoio do povoado local; Fortalecer o povoado local que sobrevivem dos recursos naturais existentes; Avaliação dos estoques pesqueiros;
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Comunidades ribeirinhas
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-461

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 10063

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MONITORAMENTO DE ESPÉCIES

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	0 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	0 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; arthrosaura kockii N; Atelopus_hoogmoedi; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Chironectes minimus; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Trichechus manatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres:*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:*
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:*
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North;

CARACTERIZAÇÃO

- *Características Gerais:* Tendo em vista que e uma região de ilhas e que o povoado sobrevive da pesca. Necessita ser estudada para apoio do povoado local; Fortalecer o povoado local que sobrevivem dos recursos naturais existentes; Avaliação dos estoques pesqueiros;
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Comunidades ribeirinhas
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-462

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 25759

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	26 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DB TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus

dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Terciario Litora Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Terciario Litora Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Pacajá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE FLORESTA PRIMARIA; ÁREA COM ASSENTAMENTO; ÁREA COM POTENCIAL MADEIREIRO, QUE NECESSITAM SER PRESERVADAS E QUE NÃO ESTÃO OCUPADAS; TENDO EM VISTA A DIVERSIDADE DE ESPÉCIES, AS MESMAS DEVEM SER ESTUDADAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-463

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 124328

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	25 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; D TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA; DA TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA; DB CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DB TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA; LA XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios

(Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta South; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Lower Tocantins floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Da Terciario Litora Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Terciario Litora Xingú-Araguaia; La Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Da Terciario Litora Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Terciario Litora Xingú-Araguaia; La Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE FLORESTA PRIMARIA; ÁREA COM ASSENTAMENTO; ÁREA COM POTENCIAL MADEIREIRO, QUE NECESSITAM SER PRESERVADAS E QUE NÃO ESTÃO OCUPADAS; TENDO EM VISTA A DIVERSIDADE DE ESPÉCIES, AS MESMAS DEVEM SER ESTUDADAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ENTORNO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA TITULADO (SOBREPOSIÇÃO ELIMINADA)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-464

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 161440

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	28 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DA QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DB CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DB QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus

dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Xingú-Araguaia; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Xingú-Araguaia; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Pacajá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE FLORESTA PRIMARIA; ÁREA COM ASSENTAMENTO; ÁREA COM POTENCIAL MADEIREIRO, QUE NECESSITAM SER PRESERVADAS E QUE NÃO ESTÃO OCUPADAS; TENDO EM VISTA A DIVERSIDADE DE ESPÉCIES, AS MESMAS DEVEM SER ESTUDADAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-465

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 156440

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; DB QUATERNARIO NEGRO-BRANCO; LA NEGRO-BRANCO; LB NEGRO-BRANCO; LD NEGRO-BRANCO; LG NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jufari;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Db Quaternario Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Db Quaternario Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Negro; Rio Jufari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AS CALHAS DOS RIOS DE TODA A BACIA DESSA ÁREA É POUCO CONHECIDA.; RIO DEMINI - TERRITÓRIO INDÍGENA - PESCA ORNAMENTAL, CASTANHA, CIPÓ; RIO ARAÇÁ - PIAÇABA - CASTANHA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* EXTRATIVISMO: PIAÇAVA, CASTANHA, PEIXE ORNAMENTAL, CIPÓ (RIO DEMINI).
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* ÁREA OCUPADA POR INDÍGENAS; TRATA-SE DE UMA ÁREA QUILOMBOLA CRIADA RECENTEMENTE (EREPECURU) QUE JÁ EXISTE UM NÍVEL DE PROTEÇÃO GERADO PELAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-466

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1859462

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	1 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	29 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	4 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	30 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis bombiceps; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; cnemidophorus lemniscatus Rio Negro; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cacajao ayresi; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus macrocephalus; Sotalia fluviatilis; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari; Trichechus inunguis;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; AS CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; D PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO NEGRO-BRANCO; DB PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO NEGRO-BRANCO; DS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; DS CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; DS QUATERNARIO NEGRO-BRANCO; L JAPURÁ-NEGRO; L NEGRO-BRANCO; LA JAPURÁ-NEGRO; LA NEGRO-BRANCO; LB JAPURÁ-NEGRO; LB NEGRO-BRANCO; LD JAPURÁ-NEGRO; LD NEGRO-BRANCO; LG JAPURÁ-NEGRO; LG NEGRO-BRANCO; LO JAPURÁ-NEGRO; LO NEGRO-BRANCO; RM NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Piaçava; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis

erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Demini; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jufari; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Padauari;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Negro / Floodplain Negro;
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Negro; As Proterozoico Negro-Branco; As Cenozoico Terc2 Negro-Branco; D Proterozoico Negro-Branco; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Negro-B
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Negro-Branco; As Cenozoico Terc2 Negro-Branco; D Proterozoico Negro-Branco; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Negro-Branco; Db Proterozoico Negro-Branco; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Db Quaternario Japurá-Negro; Db Quaternario Negro-Branco; Ds Proterozoico Negro-Branco; Ds Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Ds Quaternario Negro-Branco; L Japurá-Negro; L Negro-Branco; La Japurá-Negro; La Negro-Branco; Lb Japurá-Negro; Lb Negro-Branco; Ld Japurá-Negro; Ld Negro-Branco; Lg Japurá-Negro; Lg Negro-Branco; LO Japurá-Negro; LO Negro-Branco; rm Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Negro; Rio Demini; Rio Jufari; Rio Padauari;

- *Características Gerais:* As calhas dos rios de toda a bacia dessa área é pouco conhecida.; Rio Demini - Território indígena - Pesca ornamental, castanha, cipó; Rio Araçá - Piaçaba - Castanha
- *Usos Sustentáveis:* Extrativismo: Piaçava, castanha, peixe ornamental, cipó (Rio Demini).
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Área ocupada por indígenas; Trata-se de uma área quilombola criada recentemente (Erepecuru) que já existe um nível de proteção gerado pelas comunidades quilombolas
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: UPs entre UCs geradas por problemas nas bases (FE do Paru e RDS do Rio Iratapuru)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-467

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 40207

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DM PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; DS CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; LA NEGRO-BRANCO; LB NEGRO-BRANCO; LD NEGRO-BRANCO; LG NEGRO-BRANCO; RM NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Piaçava; Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Demini;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Dm Proterozoico Negro-Branco; Ds Cenozoico Terc2 Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco; rm Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Dm Proterozoico Negro-Branco; Ds Cenozoico Terc2 Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco; rm Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AS CALHAS DOS RIOS DE TODA A BACIA DESSA ÁREA É POUCO CONHECIDA.; RIO DEMINI - TERRITÓRIO INDÍGENA - PESCA ORNAMENTAL, CASTANHA, CIPÓ; RIO ARAÇÁ - PIAÇABA - CASTANHA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* EXTRATIVISMO: PIAÇAVA, CASTANHA, PEIXE ORNAMENTAL, CIPÓ (RIO DEMINI).
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* ÁREA OCUPADA POR INDÍGENAS;
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-468

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 52076

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis bombiceps; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DM PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; DS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; LA NEGRO-BRANCO; LB NEGRO-BRANCO; LD NEGRO-BRANCO; LG NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Piaçava; Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Demini;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Dm Proterozoico Negro-Branco; Ds Proterozoico Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Dm Proterozoico Negro-Branco; Ds Proterozoico Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AS CALHAS DOS RIOS DE TODA A BACIA DESSA ÁREA É POUCO CONHECIDA.; RIO DEMINI - TERRITÓRIO INDÍGENA - PESCA ORNAMENTAL, CASTANHA, CIPÓ; RIO ARAÇÁ - PIAÇABA - CASTANHA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* EXTRATIVISMO: PIAÇAVA, CASTANHA, PEIXE ORNAMENTAL, CIPÓ (RIO DEMINI).
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* ÁREA OCUPADA POR INDÍGENAS;
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-469

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 11861

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; D CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; D Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; D Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Inauini; Rio Purus;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-470

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 29174

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maderinha;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Maderinha;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO INTEGRADA COM UCS A RECÉM CRIADAS NA REGIÃO, MONITORAMENTO IMPACTOS BR-319; PESQUISA E MONITORAMENTO BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-471

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 227975

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; PA PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maderinha; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Maderinha;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Pa Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Pa Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO INTEGRADA COM UCS A RECÉM CRIADAS NA REGIÃO, MONITORAMENTO IMPACTOS BR-319; PESQUISA E MONITORAMENTO BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-472

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 48677

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PAH PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira; P
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira; Pah Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO INTEGRADA COM UCS A RECÉM CRIADAS NA REGIÃO, MONITORAMENTO IMPACTOS BR-319; PESQUISA E MONITORAMENTO BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-473

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 77048

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis chrysolepis; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Saguinus martinsi ochraceus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; PAH BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Uatumã; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Pah Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Pah Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Rio Uatumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO COMPARTILHADA COM ÁREAS ADJACENTES
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (CAMPOS); FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-474

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 40159

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Saguinus martinsi ochraceus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; LG BRANCO-TROMBETA; PAA BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Uatumã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Lg Branco-Trombeta; Paa Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Lg Branco-Trombeta; Paa Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Uatumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO COMPARTILHADA COM ÁREAS ADJACENTES
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-475

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 50890

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis chrysolepis; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA; DB PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PALEOZOICO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Uatumã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Uatumã; D Paleozoico Branco-Trombeta; Db Paleozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Paleozoico Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* D Paleozoico Branco-Trombeta; Db Paleozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Paleozoico Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Uatumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO COMPARTILHADA COM ÁREAS ADJACENTES
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-476

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 43198

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis chrysolepis; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO COMPARTILHADA COM ÁREAS ADJACENTES
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-477

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 29433

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis bombiceps; anolis planiceps; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB PROTEROZOICO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; LA JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uneiuxi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Uneiuxi; Db Proterozoico Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Proterozoico Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;

- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA POUCO CONHECIDA, ALTA DIVERSIDADE ESPERADA, REGIÃO DE INTERESSE BIOGEOGRÁFICO; CONECTIVIDADE ÉTNICA E ECOSSISTÊMICA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-478

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 68836

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis chrysolepis; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Uatumã; Da Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;

- *Interface Terra*-Água: Rio Uatumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* GESTÃO COMPARTILHADA COM ÁREAS ADJACENTES
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-479

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 72349

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis bombiceps; anolis tandai; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; LA JAPURÁ-NEGRO; LB JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Marié;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Lb Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Lb Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;

- *Interface Terra*-Água: Rio Marié;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA POUCO CONHECIDA, ALTA DIVERSIDADE ESPERADA, REGIÃO DE INTERESSE BIOGEOGRÁFICO; CONECTIVIDADE ÉTNICA E ECOSSISTÊMICA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO DE BORDAS DA UP (<5%) COM ÁREA MILITAR*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-480

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 56278

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tapauá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tapauá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tapauá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ESTA REGIÃO TEM SIDO INDICADA PARA CRIAÇÃO DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO E NUNCA FOI REALIZADO PROVAVELMENTE POR SOBREPOSIÇÃO COM RESERVAS DE GÁS/PETRÓLEO; REGIÃO DE ALTA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, APESAR DE UMA LACUNA AMOSTRAL PARA VÁRIOS GRUPOS. ALTA EXPECTATIVA DE NOVOS REGISTROS, ENDEMISMOS E NOVAS ESPÉCIES.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-481

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 10877

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tefé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ESTA REGIÃO TEM SIDO INDICADA PARA CRIAÇÃO DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO E NUNCA FOI REALIZADO PROVAVELMENTE POR SOBREPOSIÇÃO COM RESERVAS DE GÁS/PETRÓLEO; REGIÃO DE ALTA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, APESAR DE UMA LACUNA AMOSTRAL PARA VÁRIOS GRUPOS. ALTA EXPECTATIVA DE NOVOS REGISTROS, ENDEMISMOS E NOVAS ESPÉCIES.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-482

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 127162

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Coari Grande; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tefé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ESTA REGIÃO TEM SIDO INDICADA PARA CRIAÇÃO DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO E NUNCA FOI REALIZADO PROVAVELMENTE POR SOBREPOSIÇÃO COM RESERVAS DE GÁS/PETRÓLEO; REGIÃO DE ALTA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, APESAR DE UMA LACUNA AMOSTRAL PARA VÁRIOS GRUPOS. ALTA EXPECTATIVA DE NOVOS REGISTROS, ENDEMISMOS E NOVAS ESPÉCIES.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-483

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 75728

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Saguinus mystax pluto; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ESTA REGIÃO TEM SIDO INDICADA PARA CRIAÇÃO DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO E NUNCA FOI REALIZADO PROVAVELMENTE POR SOBREPOSIÇÃO COM RESERVAS DE GÁS/PETRÓLEO; REGIÃO DE ALTA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, APESAR DE UMA LACUNA AMOSTRAL PARA VÁRIOS GRUPOS. ALTA EXPECTATIVA DE NOVOS REGISTROS, ENDEMISMOS E NOVAS ESPÉCIES.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-484

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 67833

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tefé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ESTA REGIÃO TEM SIDO INDICADA PARA CRIAÇÃO DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO E NUNCA FOI REALIZADO PROVAVELMENTE POR SOBREPOSIÇÃO COM RESERVAS DE GÁS/PETRÓLEO; REGIÃO DE ALTA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, APESAR DE UMA LACUNA AMOSTRAL PARA VÁRIOS GRUPOS. ALTA EXPECTATIVA DE NOVOS REGISTROS, ENDEMISMOS E NOVAS ESPÉCIES.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS); EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (CAMPOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-485

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 531148

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados: Melanocharacidium nigrum / Rio Coari Grande;*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Coari Grande; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Coari Grande;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ESTA REGIÃO TEM SIDO INDICADA PARA CRIAÇÃO DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO E NUNCA FOI REALIZADO PROVAVELMENTE POR SOBREPOSIÇÃO COM RESERVAS DE GÁS/PETRÓLEO; REGIÃO DE ALTA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, APESAR DE UMA LACUNA AMOSTRAL PARA VÁRIOS GRUPOS. ALTA EXPECTATIVA DE NOVOS REGISTROS, ENDEMISMOS E NOVAS ESPÉCIES.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS); EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (CAMPOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-486

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 357348

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Saguinus mystax pluto; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Coari Grande; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Coari Grande;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Purus; Rio Coari Grande; West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ESTA REGIÃO TEM SIDO INDICADA PARA CRIAÇÃO DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO E NUNCA FOI REALIZADO PROVAVELMENTE POR SOBREPOSIÇÃO COM RESERVAS DE GÁS/PETRÓLEO; REGIÃO DE ALTA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, APESAR DE UMA LACUNA AMOSTRAL PARA VÁRIOS GRUPOS. ALTA EXPECTATIVA DE NOVOS REGISTROS, ENDEMISMOS E NOVAS ESPÉCIES.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-487

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 190485

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Coari Grande; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ESTA REGIÃO TEM SIDO INDICADA PARA CRIAÇÃO DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO E NUNCA FOI REALIZADO PROVAVELMENTE POR SOBREPOSIÇÃO COM RESERVAS DE GÁS/PETRÓLEO; REGIÃO DE ALTA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, APESAR DE UMA LACUNA AMOSTRAL PARA VÁRIOS GRUPOS. ALTA EXPECTATIVA DE NOVOS REGISTROS, ENDEMISMOS E NOVAS ESPÉCIES.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-488

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 61600

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Loxopholis snethlageae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Badajós; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Rio Badajós;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS IMPORTANTES PARA PESCA; PESQUISA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-489

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 207437

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO; MONITORAMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus ucayalli; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Javari; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Javari; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Javari;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Javari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE POUCO CONHECIMENTO E DE IMPORTANTE BIODIVERSIDADE; PRESSÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, EXPLORAÇÃO MADEIREIRA, USO POR PESSOAS DOS PAÍSES VIZINHOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-490

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 505003

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO; MONITORAMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	8 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus ucayalli; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia monachus; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Javari; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Quixitó; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Subandean Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas /

Rio Javari; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Quixitó; Alvo 2 - Macrófitas / Subandean Amazon floodplain; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Javari; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Subandean Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Quixitó; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Javari; Rio Quixitó; Subandean Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE POUCO CONHECIMENTO E DE IMPORTANTE BIODIVERSIDADE; PRESSÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, EXPLORAÇÃO MADEIREIRA, USO POR PESSOAS DOS PAÍSES VIZINHOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-491

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 33763

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	13 ESPÉCIES
AVES	41 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	3 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	1 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus E; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; gonatodes nascimentoi S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Campylorhamphus_multostriatus; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_retentus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_paraensis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Hypancistrus zebra / Floodplain Xingu; Parancistrus nudiventris / Floodplain Xingu; Scobinancistrus pariolispos / Floodplain Xingu;*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus;

Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;

- *Ambientes Terrestres: As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Xingu / Floodplain Xingu;
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Xingu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PRÓXIMO DE HIDRELÉTRICAS; ÁREA ONDE SE ENCONTRA O PEIXE "CASCUDO-ZEBRA"; UMA ÁREA MUITO DEGRADADA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE HIDRELÉTRICA, DE MODO QUE NECESSITA SER FISCALIZADA PARA A PRESERVAÇÃO DAS VEGETAÇÕES EXISTENTES; UMA ÁREA QUE POSSUI ESPÉCIES DE PEIXES RARAS QUE NECESSITAM SER ESTUDADAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-492

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 49947

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; coleodactylus septentrionalis; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera publifora Benth.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Anauá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA POUCO CONHECIDA, COM AUMENTO RÁPIDO DE DESMATAMENTO; ESTRADA E ASSENTAMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-493

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 75475

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO; PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Saguinus mystax pluto; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Coari Grande; West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-494

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 317924

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO; PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Coari Grande; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Coari Grande;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Coari Grande;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-495

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 207052

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO; PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; D QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Coari Grande; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Coari Grande; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Negro; Aa Quaternario Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Negro; Aa Quaternario Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Coari Grande; West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-496

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 107287

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO; PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	4 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; anolis tandai; anolis transversalis; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Mico chrysoleucus; Plecturocebus baptista; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis

erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Abacaxis; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Canumã; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pa
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Floodplain Abacaxis; Floodplain Madeira; Rio Canumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-497

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 81412

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO; PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro;

- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Rio Badajós; West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-498

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 90951

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO; PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	15 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	15 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; D CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PAA PURÚS-MADEIRA; PAH PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maderinha; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Maderinha;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajó
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Db Quaternario Purús-Madeira; Paa Purús-Madeira; Pah Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Rio Maderinha;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-499

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 77958

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO; PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Quaternario Japurá-Negro; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Quaternario Japurá-Negro; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-500

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 113944

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; PESQUISA: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Loxopholis snethlageae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; PAH JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Manacapuru; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Pah Japurá-Negro;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Pah Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-501

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 25626

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; PESQUISA: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Loxopholis snethlageae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Quaternario Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Quaternario Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-502

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 33790

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; PESQUISA: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Manacapuru;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-503

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 18507

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; PESQUISA: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Manacapuru;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro;

- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-504

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 50542

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; PESQUISA: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Manacapuru; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Manacapuru;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Rio Manacapuru;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-505

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 169167

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; MONITORAMENTO E MANEJO: USO E OCUPAÇÃO POR COMUNIDADES RESIDENTES

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	15 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	15 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Bolitoglossa_caldwellae; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Pithecia inusta; Sotalia fluviatilis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Ce
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MUITOS MORADORES HABITAM ESSA REGIÃO; DIAGNÓSTICO DE RECURSOSCONEXÃO DE APS (PNSD E TIS);
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-506

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 57931

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE; MONITORAMENTO E MANEJO: MONITORAMENTO DE ESPÉCIES

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus novaesi; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Ceno
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM POUCO CONHECIMENTO PELO ACRE; MONITORAMENTO , DEFINIDO PELOS ESTUDOS.LIGAÇÃO DE 2 APS (VALE JAVARI E RESEX MÉDIO JURUÁ);
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-507

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 13286

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA; MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	35 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	1 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus E; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; gonatodes nascimentoi S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_bourcieri_major; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;

- *Ambientes Terrestres: As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Quaternario Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Xingu / Floodplain Xingu;
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Xingu; As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Quaternario Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Quaternario Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Xingu;

Caracterização

- *Características Gerais:* Área integrada as UCs e TIs na região da terra do meio;
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas;Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Próximo a TI

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Área de desmatamento (até 2016); Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (montante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-508

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 54138

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO; MONITORAMENTO E MANEJO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus stephennashi; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Purus;
- *Encontro de águas:* white black;

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Purus;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* A FOZ DO RIO TAPAUÁ É HISTORICAMENTE IMPORTANTE PARA A INDÚSTRIA PESQUEIRA DO AMAZONAS. CONFLITOS ENTRE GRUPOS SOCIAIS SÃO RECORRENTES, ENTRE ELES COMUNIDADES LOCAIS E "FROTA" PESQUEIRA. UM ACORDO DE PESCA NA REGIÃO PODERIA MINIMIZAR OS CONFLITOS EM MÉDIO PRAZO E CONTRIBUIR PARA A RECUPERAÇÃO DOS ESTOQUES PESQUEIROS LOCAIS. ALÉM DISSO, A FOZ DO RIO TAPAUÁ É UMA IMPORTANTE REGIÃO DE CONFLUÊNCIA. RECURSOS PESQUEIROS. QUELÔNIOS.RECURSOS PESQUEIROS; CONFLITOS ENTRE GRUPOS SOCIAIS SÃO RECORRENTES, ENTRE ELES COMUNIDADES LOCAIS E "FROTA" PESQUEIRA

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-509

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 58954

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA; MONITORAMENTO E MANEJO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis chrysolepis; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; cnemidophorus lemniscatus AM; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Penelope_pileata;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Saguinus martinsi martinsi; Saguinus martinsi ochraceus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO BRANCO-TROMBETA; D QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DA CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; SP BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Nhamundá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Nhamundá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Branco-Trombeta; D Quaternario Branco-Trombeta; Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Sp Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Branco-Trombeta; D Quaternario Branco-Trombeta; Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Sp Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Rio Nhamundá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* UPS DE PRESSÃO AGROPECUÁRIA (PREDOMINANTEMENTE AGRICULTURA FAMILIAR), NECESSITANDO DE FISCALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EVITAR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO PARA ATIVIDADE MADEIREIRA, ESPECIALMENTE NA UP 17394AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA E ATIVIDADE MADEIREIRA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-510

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 47262

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA; MONITORAMENTO E MANEJO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; Atelopus_hoogmoedi; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Neusticomys oyapocki; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; A PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; AS CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; AS PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; DA CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; DS PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; S TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Curuá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cretaceo Trombetas-Jarí; A Paleozoico Trombetas-Jarí; As Cretaceo Trombetas-Jarí; As Paleozoico Trombetas-Jarí; Da Cretaceo Trombetas-Jarí; Ds Paleozoico Trombetas-Jarí; S Trombetas-Jarí;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cretaceo Trombetas-Jarí; A Paleozoico Trombetas-Jarí; As Cretaceo Trombetas-Jarí; As Paleozoico Trombetas-Jarí; Da Cretaceo Trombetas-Jarí; Ds Paleozoico Trombetas-Jarí; S Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Rio Curuá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* UPS DE PRESSÃO AGROPECUÁRIA (PREDOMINANTEMENTE AGRICULTURA FAMILIAR), NECESSITANDO DE FISCALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EVITAR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO PARA ATIVIDADE MADEIREIRA, ESPECIALMENTE NA UP 17394AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA E ATIVIDADE MADEIREIRA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ENTORNO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA TITULADO (SOBREPOSIÇÃO ELIMINADA)*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-511

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 51392

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA; MONITORAMENTO E MANEJO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Loxopholis guianense N;
- *Aves:* Aburria_cujubi;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus castaneus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Saguinus martinsi martinsi; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; A PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; AS CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; AS PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; DB CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; DB PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; PAH TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cretaceo Trombetas-Jarí; A Paleozoico Trombetas-Jarí; As Cretaceo Trombetas-Jarí; As Paleozoico Trombetas-Jarí; Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Paleozoico Trombetas-Jarí; Pah Trombetas-Jarí;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cretaceo Trombetas-Jarí; A Paleozoico Trombetas-Jarí; As Cretaceo Trombetas-Jarí; As Paleozoico Trombetas-Jarí; Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Paleozoico Trombetas-Jarí; Pah Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* UPS DE PRESSÃO AGROPECUÁRIA (PREDOMINANTEMENTE AGRICULTURA FAMILIAR), NECESSITANDO DE FISCALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EVITAR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO PARA ATIVIDADE MADEIREIRA, ESPECIALMENTE NA UP 17394AGRICULTURA FAMILIAR, PECUÁRIA E ATIVIDADE MADEIREIRA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-512

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 224743

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA; MONITORAMENTO E MANEJO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; Atelopus_hoogmoedi; gonatodes nascimentoi N; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Neusticomys oyapocki; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; D CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; D PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; D QUATERNARIO TROMBETAS-JARÍ; S TROMBETAS-JARÍ; SA TROMBETAS-JARÍ; SO TROMBETAS-JARÍ; SP TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maicuru; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Maicuru;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Rio Maicuru; As Paleozoico Trombetas-Jarí; D Cretaceo Trombetas-Jarí; D Paleozoico Trombetas-Jarí; D Quaternario Trombetas-Jarí; S Trombetas-Jarí; Sa Trombetas-Jarí; SO Trombetas-Jarí; Sp Trombetas-Jarí;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Paleozoico Trombetas-Jarí; D Cretaceo Trombetas-Jarí; D Paleozoico Trombetas-Jarí; D Quaternario Trombetas-Jarí; S Trombetas-Jarí; Sa Trombetas-Jarí; SO Trombetas-Jarí; Sp Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* UPS DE PRESSÃO AGROPECUÁRIA (PREDOMINANTEMENTE AGRICULTURA FAMILIAR), NECESSITANDO DE FISCALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EVITAR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO PARA ATIVIDADE MADEIREIRA, ESPECIALMENTE NA UP 17394AGRICULTURA E PECUÁRIA EM CAMPOS NATURAIS; CAÇA; APOIO AO GARIMPO; DEGRADAÇÃO EM APP.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-513

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 35702

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO/ PROTEÇÃO DE FORMAÇÃO GEOLÓGICAS RELEVANTES: GEOPARQUES

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; GEODIVERSIDADE;; DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	3 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; Atelopus_hoogmoedi; kentropyx striata AP PA; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles marginatus; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: PAA TROMBETAS-JARÍ; PAH TROMBETAS-JARÍ; S TROMBETAS-JARÍ; SP TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Paa Trombetas-Jarí; Pah Trombetas-Jarí; S Trombetas-Jarí; Sp Trombetas-Jarí;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Paa Trombetas-Jarí; Pah Trombetas-Jarí; S Trombetas-Jarí; Sp Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* INCLUIR UP ADJACENTE AO SUL DA UP 17755 DEVIDO AO ALTO VALOR E RELEVÂNCIA DO PATRIMÔNIO GEOCULTURAL ALI PRESENTE (GEOLOGIA DE ALTA RELEVÂNCIA, PINTURAS RUPESTRES). EM ESTUDO PRELIMINAR REALIZADO PELO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, A ÁREA FOI INDICADA COM POTENCIAL PARA CRIAÇÃO DE GEOPARQUE CONFORME METODOLOGIA DA UNESCO.; INCLUIR UP ADJACENTE AO SUL DA UP 17755 DEVIDO AO ALTO VALOR E RELEVÂNCIA DO PATRIMÔNIO GEOCULTURAL ALI PRESENTE (GEOLOGIA DE ALTA RELEVÂNCIA, PINTURAS RUPESTRES);
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS: SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: FICHAS 32 E 33 FORAM UNIFICADAS, ATRIBUINDO-SE A MESMA IDENTIDADE DA ÁREA (32).*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-514

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 21889

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO/ PROTEÇÃO DE FORMAÇÃO GEOLÓGICAS RELEVANTES: GEOPARQUES

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; GEODIVERSIDADE;; DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; Atelopus_hoogmoedi; kentropyx striata AP PA; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; S TROMBETAS-JARÍ; SP TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maicuru; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Maicuru;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Trombetas-Jarí; S Trombetas-Jarí; Sp Trombetas-Jarí;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Trombetas-Jarí; S Trombetas-Jarí; Sp Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* INCLUIR UP ADJACENTE AO SUL DA UP 17755 DEVIDO AO ALTO VALOR E RELEVÂNCIA DO PATRIMÔNIO GEOCULTURAL ALI PRESENTE (GEOLOGIA DE ALTA RELEVÂNCIA, PINTURAS RUPESTRES). EM ESTUDO PRELIMINAR REALIZADO PELO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, A ÁREA FOI INDICADA COM POTENCIAL PARA CRIAÇÃO DE GEOPARQUE CONFORME METODOLOGIA DA UNESCO.; INCLUIR UP ADJACENTE AO SUL DA UP 17755 DEVIDO AO ALTO VALOR E RELEVÂNCIA DO PATRIMÔNIO GEOCULTURAL ALI PRESENTE (GEOLOGIA DE ALTA RELEVÂNCIA, PINTURAS RUPESTRES);
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS: SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: FICHAS 32 E 33 FORAM UNIFICADAS, ATRIBUINDO-SE A MESMA IDENTIDADE DA ÁREA (32).*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-515

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 127667

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: LEVANTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO POR COMUNIDADES RESIDENTES; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	3 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Pithecia irrorata; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Purus;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MICROBACIA DO IGARAPÉ RIOZINHO QUE É AFLUENTE DO IACO; COMO A ÁREA É RECONHECIDA E NÃO FOI IDENTIFICADA É IMPORTANTE A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO DOS JAMUMAURA DO GUAJARÁ E MAUCHUNERI DO GUANABARA; JÁ HÁ DEMANDAS PARA RECONHECIMENTO DE TI; ESSA ÁREA FAZ CONECTIVIDADE DAS OUTRAS APS - RESEX CHICO MENDES, FLONAS MACAUÃ E SÃO FRANCISCO, TIS MAMOADATE E CABECEIRA DO RIO ACRE; AMPLIAÇÃO DA UP DE FORMA A FICAR CONTÍGUA A MARGEM DO RIO IACO (AC);
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-516

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 237260

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Pauini; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Pauini;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-

Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-517

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 112201

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; PAA JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Pauini; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Pauini;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-

Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; Paa Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Pauini; Rio Tapauá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-518

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 74063

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; PAA JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tapauá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tapauá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Paa Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Paa Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-519

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 131273

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus novaesi; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Japurá-Purús; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Ceno
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Japurá-Purús; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-520

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 66393

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus novaesi; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-521

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 35936

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus novaesi; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-522

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 16702

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): PESQUISA: DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECURSOS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus novaesi; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-523

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 135476

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Aripuanã;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Aripuanã; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Aripuanã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO DOS RIOS ARIPUANÃ E ROOSEVELT, CERCADA POR UMA PAE ONDE JÁ EXISTE DEMANDA FORMALIZADA PARA CRIAÇÃO DE RESEX; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE PRODUTOS (COPAÍBA, CASTANHA);
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-524

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 40487

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Aripuanã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Aripuanã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO DOS RIOS ARIPUANÃ E ROOSEVELT, CERCADA POR UMA PAE ONDE JÁ EXISTE DEMANDA FORMALIZADA PARA CRIAÇÃO DE RESEX; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE PRODUTOS (COPAÍBA, CASTANHA);
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-525

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 60864

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	13 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	13 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus kappleri; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio do Sangue;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio do Sangue;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL AUTORIZADO PELA SEMA/MT.; FORTALECER A CADEIA DA SOCIOBIODIVERSIDADE NOS MANEJOS AUTORIZADOS.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-526

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 152781

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Arinos; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio do Sangue;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Arinos; Rio do Sangue;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL AUTORIZADO PELA SEMA/MT.; FORTALECER A CADEIA DA SOCIOBIODIVERSIDADE NOS MANEJOS AUTORIZADOS.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-527

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 71321

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Manissauá-miçu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM GRANDE NÚMERO DE PLANOS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL AUTORIZADOS PELA SEMA/MT.; FORTALECER A CADEIA DE PRODUTOS NÃO MADEIREIROS DENTRO DOS MANEJOS JÁ APROVADOS.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: VERIFICAR SE A 15793 TEM PRESENÇA DE INDÍGENAS ISOLADOS.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-528

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 235901

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	16 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	17 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Arinos; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio do Sangue;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Rio Arinos; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-T
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Arinos; Rio do Sangue; Rio Juruena;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL AUTORIZADO PELA SEMA/MT.; FORTALECER A CADEIA DA SOCIOBIODIVERSIDADE NOS MANEJOS AUTORIZADOS.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-529

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 44550

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	20 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	15 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	15 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; gonatodes eladioi; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; A CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; FS TAPAJÓS-XINGÚ; S MADEIRA-TAPAJÓS; S TAPAJÓS-XINGÚ; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SA TAPAJÓS-XINGÚ; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SN TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São Manuel ou Teles Pires;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; A Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Fs
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; A Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Fs Tapajós-Xingú; S Madeira-Tapajós; S Tapajós-Xingú; Sa Madeira-Tapajós; Sa Tapajós-Xingú; SN Madeira-Tapajós; SN Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio São Manuel ou Teles Pires;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM GRANDE NÚMERO DE PLANOS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL AUTORIZADOS PELA SEMA/MT.; FORTALECER A CADEIA DE PRODUTOS NÃO MADEIREIROS DENTRO DOS MANEJOS JÁ APROVADOS.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: VERIFICAR SE A 15793 TEM PRESENÇA DE INDÍGENAS ISOLADOS.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-530

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 37545

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	20 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ; SN TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Peixoto de Azevedo;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Peixoto de Azevedo;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM GRANDE NÚMERO DE PLANOS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL AUTORIZADOS PELA SEMA/MT.; FORTALECER A CADEIA DE PRODUTOS NÃO MADEIREIROS DENTRO DOS MANEJOS JÁ APROVADOS.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: VERIFICAR SE A 15793 TEM PRESENÇA DE INDÍGENAS ISOLADOS.*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-531

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 725783

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; D CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; D QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DA CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; F TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ; SO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Manissauá-miçu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; D Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; SO Tapajós-
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; D Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; SO Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Manissauá-miçu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM GRANDE NÚMERO DE PLANOS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL AUTORIZADOS PELA SEMA/MT.; FORTALECER A CADEIA DE PRODUTOS NÃO MADEIREIROS DENTRO DOS MANEJOS JÁ APROVADOS.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: VERIFICAR SE A 15793 TEM PRESENÇA DE INDÍGENAS ISOLADOS.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-532

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 272417

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: ESPÉCIES ENVOLVIDAS DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE; RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	12 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus PA; Dendropsophus_sarayacuensis; kentropyx striata AP PA; Pipa_snethlageae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; D CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; D QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DA CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DB CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DB CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DB QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DS CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DS CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; PAH TAPAJÓS-XINGÚ;*

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá-una; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Cretaceo Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Cenozoico Terc2
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Cretaceo Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú; Pah Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Rio Curuá-una;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MONITORAMENTO E MANEJO DOS ESTOQUES PESQUEIRO E QUELÔNIOS, ASSIM COMO PRODUTOS FLORESTAIS; FORTALECER AS CADEIAS DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA

- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (jusante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-533

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 57115

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: ESPÉCIES ENVOLVIDAS DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE; RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; kentropyx striata AP PA; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles marginatus; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; D QUATERNARIO TROMBETAS-JARÍ; PAH TAPAJÓS-XINGÚ; PAH TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Trombetas-Jarí; D Quaternario Trombetas-Jarí; Pah Tapajós-Xingú; Pah Trombetas-Jarí;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Trombetas-Jarí; D Quaternario Trombetas-Jarí; Pah Tapajós-Xingú; Pah Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MONITORAMENTO E MANEJO DOS ESTOQUES PESQUEIRO E QUELÔNIOS, ASSIM COMO PRODUTOS FLORESTAIS; FORTALECER AS CADEIAS DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-534

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 150171

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	27 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	18 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	18 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	6 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Pithecia cazuzai; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao calvus calvus; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; D CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; D QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; D QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; PAA JAVARÍ-JURUÁ; PAA SOLIMÕES-JAPURÁ; PAH JAVARÍ-JURUÁ; PAH SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis

erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Western Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Western Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; D Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Quaternario Javarí-Juruá; D Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Qu
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; D Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Quaternario Javarí-Juruá; D Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Javarí-Juruá; Paa Javarí-Juruá; Paa Solimões-Japurá; Pah Javarí-Juruá; Pah Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá; West Central Amazon floodplain; Western Amazon floodplain;

- *Características Gerais:* Ações voltadas para o fortalecimento do acordo de pesca; Fortalecimento da cadeia de valor do Pirarucu;
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-535

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 547670

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis bombiceps; anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus rubicundus; Cebuella pygmaea niveiventris; Cebuella pygmaea pygmaea; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia hirsuta; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; AA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; D CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPURÁ; D QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DB QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; LA SOLIMÕES-JAPURÁ; LD SOLIMÕES-JAPURÁ; PAH JAPURÁ-NEGRO; PAH SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Japurá - Caquetá;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Quaternario Japurá-Negro; Aa Quaternario Solimões-Japurá; D Cenozoico Terc2 Solimões-Japurá; D Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japu
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Quaternario Japurá-Negro; Aa Quaternario Solimões-Japurá; D Cenozoico Terc2 Solimões-Japurá; D Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Solimões-Japurá; La Solimões-Japurá; Ld Solimões-Japurá; Pah Japurá-Negro; Pah Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Japurá - Caquetá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AÇÕES VOLTADAS PARA O FORTALECIMENTO DO ACORDO DE PESCA; FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DO PIRARUCU;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-536

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 281905

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	16 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	16 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	6 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; kentropyx striata AP PA; Loxopholis snethlageae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea pygmaea; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia cazuzai; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao calvus calvus; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; AA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; AA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO; LD SOLIMÕES-JAPURÁ; PAH JAPURÁ-NEGRO; PAH SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Western Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Western Amazon floodplain; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Japurá - Caquetá; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Aa Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Aa Quaternario Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Negro; D
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Aa Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Aa Quaternario Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro; Ld Solimões-Japurá; Pah Japurá-Negro; Pah Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Japurá - Caquetá; West Central Amazon floodplain; Western Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AÇÕES VOLTADAS PARA O FORTALECIMENTO DO ACORDO DE PESCA; FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DO PIRARUCU;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-537

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 260947

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	6 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; LA JAPURÁ-NEGRO; LB JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO; LG JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Unini; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Cuiuni; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Unini; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Lb Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro; Lg Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Lb Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro; Lg Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Negro; Rio Cuiuni; West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AÇÕES VOLTADAS PARA O FORTALECIMENTO DO ACORDO DE PESCA; FORTALECIMENTO DA CADEIA DE VALOR DO PIRARUCU;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-538

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 11549

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	11 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO COM COMUNIDADES QUILOMBOLAS NÃO TITULADAS: SANTA FÉ E SANTO ANTÔNIO. 7 E 9% DAS UPS RESPECTIVAMENTE TOMADAS POR ASSENTAMENTOS. POUCA VEGETAÇÃO REMANESCENTE.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADES QUILOMBOLAS NÃO TITULADAS: SANTA FÉ E SANTO ANTÔNIO
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-539

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 28930

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	10 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Parkerthraustes_humeralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico

Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO COM COMUNIDADES QUILOMBOLAS NÃO TITULADAS: SANTA FÉ E SANTO ANTÔNIO. 7 E 9% DAS UPS RESPECTIVAMENTE TOMADAS POR ASSENTAMENTOS. POUCA VEGETAÇÃO REMANESCENTE.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADES QUILOMBOLAS NÃO TITULADAS: SANTA FÉ E SANTO ANTÔNIO
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-540

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 208233

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ANÁLISE DE MERCADO PARA PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; FA MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Arinos; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio do Sangue;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-

Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Arinos; Rio do Sangue;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ANÁLISE DE MERCADO; ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO SÃO UMA DEMANDA LOCAL RECORRENTE;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-541

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 200826

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ANÁLISE DE MERCADO PARA PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados: Rhinopetitia potamorhachia / Rio Arinos;*
- *Mamíferos:* Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Arinos; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio do Sangue;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario

Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Arinos; Rio do Sangue;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ANÁLISE DE MERCADO; ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO SÃO UMA DEMANDA LOCAL RECORRENTE;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-542

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 37162

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ANÁLISE DE MERCADO PARA PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Aripuanã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *Características Gerais:* Análise de mercado; alternativas de produção são uma demanda local recorrente;
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (montante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-543

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 26406

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ANÁLISE DE MERCADO PARA PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	13 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus kappleri; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Arinos;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Arinos;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ANÁLISE DE MERCADO; ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO SÃO UMA DEMANDA LOCAL RECORRENTE;

- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-544

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 46009

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ANÁLISE DE MERCADO PARA PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; D PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio do Sangue;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio do Sangue; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As

Quaternario Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madei

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio do Sangue;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ANÁLISE DE MERCADO; ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO SÃO UMA DEMANDA LOCAL RECORRENTE;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-545

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 31158

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ANÁLISE DE MERCADO PARA PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; Atelopus_hoogmoedi; kentropyx striata AP PA; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Penelope_pileata;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; DB QUATERNARIO TROMBETAS-JARÍ; PAH TROMBETAS-JARÍ; S TROMBETAS-JARÍ; SP TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maicuru; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Quaternario Trombetas-Jarí; Pah Trombetas-Jarí; S Trombetas-Jarí; Sp Trombetas-Jarí;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Quaternario Trombetas-Jarí; Pah Trombetas-Jarí; S Trombetas-Jarí; Sp Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FORTALECER OS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE COMO FORMA DE MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES LOCAIS QUE MANTÉM ATIVIDADES DE BAIXO IMPACTO. ISSO EVITA A ENTRADA DOS AGRICULTORES DA SOJA; FISCALIZAÇÃO PARA CONTER ATIVIDADES ILEGAISATIVIDADES ILEGAIS LIGADAS AO DESMATAMENTO E OUTRAS ORIUNDAS DA ESTRADA ESTADUAL LIGANDO ALENQUER A MONTE ALEGRE PA-255
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-546

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 205383

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus PA; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; A PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; D PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DB CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DB CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DB PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ;*

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá-uná;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cretaceo Tapajós-Xingú; A Paleozoico Tapajós-Xingú; As Cretaceo Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Cretaceo Tapajós-Xingú; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; D
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cretaceo Tapajós-Xingú; A Paleozoico Tapajós-Xingú; As Cretaceo Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Cretaceo Tapajós-Xingú; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Paleozoico Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Curuá-uná;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FORTALECER OS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES/EXTRATIVISTAS EXISTENTES NESTE LOCAL, PRINCIPALMENTE CACAU EXISTENTE NESTAS ÁREAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* EXTRAÇÃO MADEIREIRA; AGRICULTURA DE PEQUENO PORTE
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação Fragmentação de rios (montante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-547

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 209215

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	33 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; D PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DB CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DB CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DB PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ;*

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá-una; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Curuá-una;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Paleozoico Tapajós-Xingú; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Paleozoico Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Paleozoico Tapajós-Xingú; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Paleozoico Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FORTALECER OS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES/EXTRATIVISTAS EXISTENTES NESTE LOCAL, PRINCIPALMENTE CACAU EXISTENTE NESTAS ÁREAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* EXTRAÇÃO MADEIREIRA; AGRICULTURA DE PEQUENO PORTE
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-548

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 22796

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus PA; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; PAH TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides);

Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá-uná; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Curuá-uná;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Pah Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Pah Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Curuá-uná;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FORTALECER OS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES/EXTRATIVISTAS EXISTENTES NESTE LOCAL, PRINCIPALMENTE CACAU EXISTENTE NESTAS ÁREAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* EXTRAÇÃO MADEIREIRA; AGRICULTURA DE PEQUENO PORTE
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-549

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 368715

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	13 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus PA; Dendropsophus_sarayacuensis; kentropyx striata AP PA; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;

- *Ambientes Terrestres: As Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; As Cretaceo Tapajós-Xingú; D Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá-uná; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Curuá-uná;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; As Cretaceo Tapajós-Xingú; D Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; As Cretaceo Tapajós-Xingú; D Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú;

- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Rio Curuá-uná; Rio Jarauçu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FORTALECER OS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES/EXTRATIVISTAS EXISTENTES NESTE LOCAL, PRINCIPALMENTE CACAU EXISTENTE NESTAS ÁREAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* EXTRAÇÃO MADEIREIRA; AGRICULTURA DE PEQUENO PORTE
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-550

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 49408

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; D CENOZOICO TERC2 BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS CENOZOICO TERC2 BRANCO-TROMBETA; LD BRANCO-TROMBETA; LG BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jauaperi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Branco-Trombeta; D Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta; Lg Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Branco-Trombeta; D Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta; Lg Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); ; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-551

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 30111

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: LD BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jauaperi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ld Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Ld Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jauaperi;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*

- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-552

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 20638

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jauaperi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*

- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-553

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 183707

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; LD BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Anauá; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jauaperi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Quaternario Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Quaternario Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta;

- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-554

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 30411

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus RR; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; cnemidophorus lemniscatus RR; coleodactylus septentrionalis; gymnophthalmus leucomystax; kentropyx striata RR; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; F NEGRO-BRANCO; FS NEGRO-BRANCO; ON NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera publifora Benth.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Branco;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ds Proterozoico Negro-Branco; F Negro-Branco; Fs Negro-Branco; ON Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ds Proterozoico Negro-Branco; F Negro-Branco; Fs Negro-Branco; ON Negro-Branco;

- *Interface Terra*-Água: Floodplain Branco;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CRIAÇÃO DE GADO; MACAJAÍ - MUITO DEGRADADO, 25% DESMATADO; PRESENÇA DE ESTRADAS FACILITANDO A OCUPAÇÃO DA TERRA COM CONSEQUENTE DESMATAMENTO OCORRENDO A TODO MOMENTO. OCUPAÇÃO RECENTE; PROJETO DE ASSENTAMENTO NA ÁREA.DESMATAMENTO, OCUPAÇÃO IRREGULAR, PECUÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-555

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 13137

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lepidothrix_vilasboasi; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Teleocichla prionogenys / Rio Jamaxim;*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Mico leucippe; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jamaxim;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* EXTRAÇÃO DE MADEIRA E MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-556

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 149248

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lepidothrix_vilasboasi; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Mico leucippe; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jamaxim;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Jamaxim; A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jamaxim;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* EXTRAÇÃO DE MADEIRA E MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-557

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 126392

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lepidothrix_vilasboasi; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Ateles marginatus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Mico leucippe; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus apella; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS TERCIARIO LITORA TAPAJÓS-XINGÚ;*

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jamaxim;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Terciario Litora Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Terciario Litora Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jamaxim;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO COM FORTE PRESSÃO DE GARIMPO E DESMATAMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-558

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 254357

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	1 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Trichechus inunguis; Trichechus manatus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DA CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DA QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; DA TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; PF TOCANTINS-MEARI; SA TOCANTINS-MEARI;*

- *Manguezais:* Manguezais;
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta South; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Terciario Litora Tocantins-Meari; Pf Tocantins-Meari; Sa Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Terciario Litora Tocantins-Meari; Pf Tocantins-Meari; Sa Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta South; Rio Guamá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PRESENÇA DE ASSENTAMENTOS; FOMENTAR O TURISMO PARA QUE OS MORADORES CONTINUEM TENDO SUA RENDA E PARA. PRESERVAÇÃO DAS ESPÉCIES ALI CULTIVADAS; FORTALECIMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA BIODIVERSIDADE; AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES PESQUEIROS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*

- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Comunidade quilombola
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Gasoduto; Ferrovias; Mineração com até 50ha de área; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: Entorno de território quilombola titulado (sobreposição eliminada)/Sobreposição com território quilombola em estudo (sobreposição mantida)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-559

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 97483

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; PESQUISA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; D QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DB CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; DB CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DB QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; LA JARÍ-FOZ AMAZON; LA XINGÚ-ARAGUAIA; PAH JARÍ-FOZ AMAZON;*

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta North;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Jarí-Foz Amazon; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Xingú-Araguaia; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon; La Jarí-Foz Amazon
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Jarí-Foz Amazon; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Xingú-Araguaia; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon; La Jarí-Foz Amazon; La Xingú-Araguaia; Pah Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* JÁ FORAM REALIZADOS DIVERSOS ESTUDOS NO LOCAL (OCUPAÇÃO HUMANA EM GERAL E PROJETOS DE MANEJO); POPULAÇÃO TRADICIONAL (QUILOMBO); PRÓXIMO A UC; RESEX; CONSERVAR AS ÁREAS DE FLORESTA E TAMBÉM FRONTEIRIÇAS COM ÁREAS PROTEGIDAS (QUILOMBO E UC)EXISTÊNCIA DE UMA GAMA DE BIODIVERSIDADE NA ÁREA, QUE NECESSITA SER ESTUDADA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* EXPLORAÇÃO MADEIREIRA; PESCA (CAMARÃO)
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA

- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Comunidade quilombola
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Área de desmatamento (até 2016); Gasoduto; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: Entorno de território quilombola titulado (sobreposição eliminada)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-560

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 48980

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; PESQUISA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	25 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii N; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; D QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DA CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; DA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DB CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; DB CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DB QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus

dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* JÁ FORAM REALIZADOS DIVERSOS ESTUDOS NO LOCAL (OCUPAÇÃO HUMANA EM GERAL E PROJETOS DE MANEJO); POPULAÇÃO TRADICIONAL (QUILOMBO); PRÓXIMO A UC; RESEX; CONSERVAR AS ÁREAS DE FLORESTA E TAMBÉM FRONTEIRIÇAS COM ÁREAS PROTEGIDAS (QUILOMBO E UC)EXISTÊNCIA DE UMA GAMA DE BIODIVERSIDADE NA ÁREA, QUE NECESSITA SER ESTUDADA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* EXPLORAÇÃO MADEIREIRA; PESCA (CAMARÃO)
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ENTORNO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA TITULADO (SOBREPOSIÇÃO ELIMINADA)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-561

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 22566

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ANÁLI; MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; ESPÉCIES ENVOLVIDAS DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE; PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Trichechus inunguis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta South;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta South;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CRIAÇÃO DA APA: PROMOVER A GESTÃO COMPARTILHADA DO TERRITÓRIO CONSIDERANDO A DIVERSIDADE SOCIAL E A MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS, FRENTE A IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE PRODUÇÃO (FABRICAS) E LOGÍSTICOS (PORTO);
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ENTORNO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA TITULADO (SOBREPOSIÇÃO ELIMINADA)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-562

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 18736

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ANÁLI; MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; ESPÉCIES ENVOLVIDAS DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE; PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Trichechus inunguis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: SP TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta South;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Sp Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Sp Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta South;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CRIAÇÃO DA APA: PROMOVER A GESTÃO COMPARTILHADA DO TERRITÓRIO CONSIDERANDO A DIVERSIDADE SOCIAL E A MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS, FRENTE A IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE PRODUÇÃO (FABRICAS) E LOGÍSTICOS (PORTO);
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ENTORNO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA TITULADO (SOBREPOSIÇÃO ELIMINADA)*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-563

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 90174

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ANÁLI; MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; ESPÉCIES ENVOLVIDAS DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE; PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Trichechus inunguis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DA CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DA TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta South; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Da Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Da Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta South; Rio Guamá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CRIAÇÃO DA APA: PROMOVER A GESTÃO COMPARTILHADA DO TERRITÓRIO CONSIDERANDO A DIVERSIDADE SOCIAL E A MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS, FRENTE A IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE PRODUÇÃO (FABRICAS) E LOGÍSTICOS (PORTO);
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A COMUNIDADE QUILOMBOLA

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Gasoduto; Ferrovias; Mineração com até 50ha de área; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: Entorno de território quilombola titulado (sobreposição eliminada)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-566

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 379955

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI; MONITORAMENTO E MANEJO: ESPÉCIES ENVOLVIDAS DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE; MADEIRA COMUNITÁRIA; PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	16 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	17 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; amapasaurus tetradactylus; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; arthrosaura kockii N; Atelopus_hoogmoedi; gonatodes nascimentoi N; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N;
- *Aves:* Aburria_cujubi;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus olivaceus castaneus; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Neusticomys oyapocki; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PALEOZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; D PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; D CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; D QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DA PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DA CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; DA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DB CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; DB PALEOZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DS PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DS CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; DS PALEOZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DS QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; PAH JARÍ-FOZ AMAZON; SA JARÍ-FOZ AMAZON; SP JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jari;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Amazon Delta North; As Paleozoico Jarí-Foz Amazon; D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Cretaceo Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Da Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Jarí-Fo
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Paleozoico Jarí-Foz Amazon; D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Cretaceo Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Da Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Db Paleozoico Jarí-Foz Amazon; Ds Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Ds Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Ds Paleozoico Jarí-Foz Amazon; Ds Quaternario Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz Amazon; Sa Jarí-Foz Amazon; Sp Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* INTEGRANDO TODO ASSENTAMENTO PAE MARACA (IDENTIFICADO NO MAPA) COM O AGRUPAMENTO DE MAIS 7 UPS.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-567

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 32858

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI; DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL: ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS QUE ENVOLVAM COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA; TURISMO DE BAIXO IMPACTO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	14 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus PA; Dendropsophus_sarayacuensis; kentropyx striata AP PA; Pipa_snethlageae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Teleocichla prionogenys / East Central Amazon floodplain;*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; PAA TROMBETAS-JARÍ; PAH TAPAJÓS-XINGÚ; PAH TROMBETAS-JARÍ; SP TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá-uná; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Paa Trombetas-Jarí; Pah Tapajós-Xingú; Pah Trombetas-Jarí; Sp Trombetas-Jarí;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Paa Trombetas-Jarí; Pah Tapajós-Xingú; Pah Trombetas-Jarí; Sp Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Floodplain Tapajós; Rio Curuá-uná;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FORTALECER AS ATIVIDADES COM PESCA COMERCIAL DE BAIXO IMPACTO E REGULAMENTADA; FORTALECER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA FAMILIAR; REGULAMENTAR O TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA E DE BAIXO IMPACTO, POR SE TRATAR DE UMA ÁREA COM MUITOS ATRATIVOS TURÍSTICOS E COM BASTANTE PROCURA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *Referências:*
- *Outras Observações: Sobreposição com território quilombola em estudo (sobreposição mantida)*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-568

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 52001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI; DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL: ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS QUE ENVOLVAM COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA; TURISMO DE BAIXO IMPACTO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	21 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	6 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus PA; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Arapiuns; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Arapiuns;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Floodplain Tapajós; Rio Arapiuns;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FORTALECER AS ATIVIDADES COM PESCA COMERCIAL DE BAIXO IMPACTO E REGULAMENTADA; FORTALECER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA FAMILIAR; REGULAMENTAR O TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA E DE BAIXO IMPACTO, POR SE TRATAR DE UMA ÁREA COM MUITOS ATRATIVOS TURÍSTICOS E COM BASTANTE PROCURA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-569

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 76900

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI; DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL: ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS QUE ENVOLVAM COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA; TURISMO DE BAIXO IMPACTO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	3 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Pipa_snethlageae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Hylexetastes_uniformis; Penelope_pileata;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles marginatus; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: PAA TROMBETAS-JARÍ; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; PAH TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Paa Trombetas-Jarí; Pah Madeira-Tapajós; Pah Trombetas-Jarí;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Paa Trombetas-Jarí; Pah Madeira-Tapajós; Pah Trombetas-Jarí;

- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FORTALECER AS ATIVIDADES COM PESCA COMERCIAL DE BAIXO IMPACTO E REGULAMENTADA; FORTALECER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA FAMILIAR; REGULAMENTAR O TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA E DE BAIXO IMPACTO, POR SE TRATAR DE UMA ÁREA COM MUITOS ATRATIVOS TURÍSTICOS E COM BASTANTE PROCURA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-570

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 102030

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL: ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS QUE ENVOLVAM COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; D CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tarauca; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tarauca;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; D Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Qua
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; D Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tarauca;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* COMO TEM ÁREAS URBANAS EXISTEM VÁRIAS ATIVIDADES ECONÔMICAS CONSOLIDADAS;; FESTIVAL DO ABACAXI NATIVO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-571

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 164334

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL: TURISMO DE BAIXO IMPACTO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus novaesi; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; A CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tarauca; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tarauca;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tarauca;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* COMO ESSAS ÁREAS ESTÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ E NA ZONA RURAL TEM FAZENDAS, SENDO NECESSÁRIO REGULARIZAR AS ATIVIDADES ECONÔMICAS CONSOLIDADAS; FESTIVAL DE PRAIA EM AGOSTO NO MUNICÍPIO COM MOVIMENTOS DE PESSOAS E MERCADORIAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* EM FEIJÓ O AÇAÍ
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-572

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 34109

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO; ESPÉCIES ENVOLVIDAS DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	12 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	1 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Dendrocolaptes_medius; Guaruba_guarouba; Lophornis_gouldii; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Trichechus manatus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; D PROTEROZOICO TOCANTINS-MEARI; D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; PAH TOCANTINS-MEARI; PF TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:* Manguezais;
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Terciario Litora Tocantins-Meari; D Proterozoico Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Pah Tocantins-Meari; Pf Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Terciario Litora Tocantins-Meari; D Proterozoico Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Pah Tocantins-Meari; Pf Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AS ÁREAS CITADAS ESTÃO NO ENTORNO DIRETO DAS UCS. PORTANTO, ÁREAS DE MORADIA E RESIDÊNCIAS DOS COMUNITÁRIOS.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ESTAS ESSAS ÁREAS DEVEM SER DISCUTIDAS NO OFICINA DE BELÉM*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-573

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 20374

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO; ESPÉCIES ENVOLVIDAS DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	1 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_coerulescens; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Trichechus inunguis; Trichechus manatus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; PF TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:* Manguezais;
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Pf Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Pf Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AS ÁREAS CITADAS ESTÃO NO ENTORNO DIRETO DAS UCS. PORTANTO, ÁREAS DE MORADIA E RESIDÊNCIAS DOS COMUNITÁRIOS.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; ATIVIDADES MINERADORAS NÃO OFICIAIS (CLANDESTINAS); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ESTAS ESSAS ÁREAS DEVEM SER DISCUTIDAS NO OFICINA DE BELÉM*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-575

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 42231

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guamá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS ATRELADA AO CONHECIMENTO E NECESSIDADES DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS LOCAIS. IMPORTANTE RESSALTAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS PRESTADOS PELO SISTEMA HIDROGRÁFICO.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* POPULAÇÕES TRADICIONAIS LOCAIS
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-576

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 337971

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios

(Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta South; Rio Guamá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS ATRELADA AO CONHECIMENTO E NECESSIDADES DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS LOCAIS. IMPORTANTE RESSALTAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS PRESTADOS PELO SISTEMA HIDROGRÁFICO.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* POPULAÇÕES TRADICIONAIS LOCAIS; PRÓXIMO A COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; FERROVIAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ENTORNO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA TITULADO (SOBREPOSIÇÃO ELIMINADA)*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-577

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 42841

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MADEIRA EMPRESARIAL; MADEIRA COMUNITÁRIA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	24 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; D TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA; LG XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios

(Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta South;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Lg Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Lg Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta South;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REVISÃO DE ACORDO DE PESCA E CRIAÇÃO DE NOVOS ACORDOS DE PESCA. ATUALIZAR E IMPLEMENTAR O ZEE E OUTROS INSTRUMENTOS DE GESTÃO EXISTENTES.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ENTORNO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA TITULADO (SOBREPOSIÇÃO ELIMINADA)*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-578

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 329204

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MADEIRA EMPRESARIAL; MADEIRA COMUNITÁRIA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	17 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	17 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Dendrocolaptes_retentus; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Brycon gouldingi / Lower Tocantins floodplain;*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Chiropotes satanas; Chiropotes utahickae; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Saguinus niger; Sapajus apella; Sotalia fluviatilis; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari; Trichechus inunguis;
- *Ambientes Terrestres: D QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA; DA QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; DA QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DA TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DA*

Terciario Litora Xingú-Araguaia; Db Quaternario Tocantins-Meari; Db Terciario Litora Tocantins-Meari; Db Terciario Litora Xingú-Araguaia; La Tocantins-Meari; Lg Tocantins-Meari; Lg Xingú-Araguaia; Pah Tocantins-Meari; Sa Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta South; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Lower Tocantins floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Tocantins-Meari; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Da Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Terciario Litora Xin
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Tocantins-Meari; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Da Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Terciario Litora Xingú-Araguaia; Db Quaternario Tocantins-Meari; Db Terciario Litora Tocantins-Meari; Db Terciario Litora Xingú-Araguaia; La Tocantins-Meari; Lg Tocantins-Meari; Lg Xingú-Araguaia; Pah Tocantins-Meari; Sa Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta South; Lower Tocantins floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REVISÃO DE ACORDO DE PESCA E CRIAÇÃO DE NOVOS ACORDOS DE PESCA. ATUALIZAR E IMPLEMENTAR O ZEE E OUTROS INSTRUMENTOS DE GESTÃO EXISTENTES.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ENTORNO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA TITULADO (SOBREPOSIÇÃO ELIMINADA)*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-580

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 42723

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO; MADEIRA COMUNITÁRIA; PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS;;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; arthrosaura kockii N; Atelopus_hoogmoedi; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus castaneus; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Neusticomys oyapocki; Trichechus manatus; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; D TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZON; DA PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DB PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; PAH JARÍ-FOZ AMAZON; S JARÍ-FOZ AMAZON; SG JARÍ-FOZ AMAZON; SP JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Da Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz Amazon; S Jarí-Foz Amazon; Sg Jarí-Foz Amazon; Sp Jarí-Foz Amazon;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Da Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz Amazon; S Jarí-Foz Amazon; Sg Jarí-Foz Amazon; Sp Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ASSENTAMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; PCH/CGH

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-581

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 27587

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO; MADEIRA COMUNITÁRIA; PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS;;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; arthrosaura kockii N; Atelopus_hoogmoedi; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus castaneus; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Neusticomys oyapocki; Trichechus manatus; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; D QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; D TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZON; DA PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DA TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZO; DB PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DB TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZO; DS PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; PAH JARÍ-FOZ AMAZON; SP JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Da Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Jarí-Foz

Amazon; Da Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Db Terciario Litora Ja

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Da Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Db Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Ds Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz Amazon; Sp Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ASSENTAMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-582

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 71456

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Coari Grande;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PEIXE ORNAMENTAL; SISTEMAS AGRÍCOLAS
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-583

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 20292

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tefé; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tefé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tefé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PEIXE ORNAMENTAL; SISTEMAS AGRÍCOLAS
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-584

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 141750

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; D QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tefé; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tefé; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tefé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PEIXE ORNAMENTAL; SISTEMAS AGRÍCOLAS
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-585

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 114781

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ; RAMSARS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA; MONITORAMENTO DAS ESPÉCIES DESENVOLVIDAS.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-586

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 25918

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: MADEIRA EMPRESARIAL;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	3 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Purus;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* EXISTE PMF APROVADO E DEMANDA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADA DE ACESSO PELA RESEX CHICO MENDES
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-587

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 144100

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: MADEIRA EMPRESARIAL;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Aripuanã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Aripuanã; Rio Roosevelt;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA ENTRE OS RIOS GUARIBA E ROOSEVELT; MANEJO FLORESTAL PRIVADOÁREA DE CONCENTRAÇÃO DE DESMATAMENTO E QUEIMADAS ILEGAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: OS LIMITES DA RESEX GUARIBA ESTÃO EQUIVOCADOS, E ISSO FAZ COM QUE PARTE DA ÁREA 19777. ESTÁ SOBREPOSTA A ÁREA JÁ CRIADAS E OUTRA PARTE NÃO.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-588

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 156666

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	12 ESPÉCIES
AVES	41 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	2 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	1 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus E; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Campylorhamphus_multostriatus; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_retentus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_paraensis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Ossubtus xinguense / Lower Xingu floodplain; Scobinancistrus aureatus / Lower Xingu floodplain;*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera

onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;

- *Ambientes Terrestres: D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Tapajós-Xingú; D Quaternario Xingú-Araguaia; Da Cretaceo Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Quaternario Tapajós-Xingú; Paa Xingú-Araguaia; Pah Xingú-Araguaia;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Lower Xingu floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Xingu / Lower Xingu floodplain;
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Tapajós-Xingú; D Quaternario Xingú-Araguaia; Da Cretaceo Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Xingú-Aragua
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Tapajós-Xingú; D Quaternario Xingú-Araguaia; Da Cretaceo Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Quaternario Tapajós-Xingú; Paa Xingú-Araguaia; Pah Xingú-Araguaia;

- *Interface Terra*-Água: Lower Xingu floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS DE DESOVA DE QUELÔNIOS; PESCA DE PEIXES ORNAMENTAIS; AGROPECUÁRIA; LOCALIZADA ABAIXO DA VOLTA GRANDE DO XINGU
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-589

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 181182

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO; PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus stephennashi; Saguinus mystax pluto; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; PA JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Purus;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; Pa Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; Pa Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Purus;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PESQUISA; MONITORAMENTO PESQUEIRO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-590

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 82138

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO; PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	1 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PAA PURÚS-MADEIRA; PAH PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Purus; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maderinha; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Purus;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 5 a 11 - Margem Sul do Rio Amazonas / Floodplain Purus;
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira; Paa Purús-Madeira; Pah Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira; Paa Purús-Madeira; Pah Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Purus; Rio Maderinha;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PESQUISA; MONITORAMENTO PESQUEIRO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-591

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 60862

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO; PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	1 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maderinha; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 5 a 11 - Margem Sul do Rio Amazonas / West Central Amazon floodplain;
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PESQUISA; MONITORAMENTO PESQUEIRO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-592

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 24233

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: MADEIRA COMUNITÁRIA; PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: BIODIVERSIDADE; USO E OCUPAÇÃO POR COMUNIDADES RESIDENTES; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	27 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DA QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DB CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DB QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Quaternario Xingú-Araguaia; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Quaternario Xingú-Araguaia; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Pacajá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* E UMA ÁREA DE POPULAÇÃO DE BAIXA-RENDA (RIBEIRINHOS) SENDO A REGIÃO COM O MENOR IDH DO PAIS, DE MODO QUE NECESSITAM DE UM APOIO PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES DE SOBREVIVÊNCIA; NECESSITA ESTUDAR ESPÉCIES PESQUEIRAS; PESCA (MAPARA); EXPLORAÇÃO MADEIREIRA; POTENCIAL TURÍSTICO; MUITA FLORESTA PRIMARIA; ESPÉCIES PROTEGIDAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE RIBEIRINHA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-593

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 84744

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: MADEIRA COMUNITÁRIA; PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: BIODIVERSIDADE; USO E OCUPAÇÃO POR COMUNIDADES RESIDENTES; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	24 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; D TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA; DA QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DA TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA; DB TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides);

Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta South;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Da Terciario Litora Xingú-Araguaia; Db Terciario Litora Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Da Terciario Litora Xingú-Araguaia; Db Terciario Litora Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta South;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* E UMA ÁREA DE POPULAÇÃO DE BAIXA-RENDA (RIBEIRINHOS) SENDO A REGIÃO COM O MENOR IDH DO PAIS, DE MODO QUE NECESSITAM DE UM APOIO PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES DE SOBREVIVÊNCIA; NECESSITA ESTUDAR ESPÉCIES PESQUEIRAS; POTENCIAL TURÍSTICO; MUITA FLORESTA PRIMARIA; ESPÉCIES PROTEGIDAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA (MAPARA); EXPLORAÇÃO MADEIREIRA;
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE RIBEIRINHA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-594

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1086872

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: MADEIRA COMUNITÁRIA; PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: BIODIVERSIDADE; USO E OCUPAÇÃO POR COMUNIDADES RESIDENTES; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	27 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	18 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	18 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; Pipa_snethlageae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; D QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; D TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA; DA CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; DA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DA QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DA TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA; DB CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; DB CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DB QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DB QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DB TERCIARIO LITORA XINGÚ-*

Araguaia; La Jarí-Foz Amazon; La Xingú-Araguaia; Lg Xingú-Araguaia; Pah Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta South; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Da Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Da Terciario Litora Xingú-Araguaia; Db C
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Da Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Da Terciario Litora Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Quaternario Xingú-Araguaia; Db Terciario Litora Xingú-Araguaia; La Jarí-Foz Amazon; La Xingú-Araguaia; Lg Xingú-Araguaia; Pah Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta South; Rio Pacajá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* E UMA ÁREA DE POPULAÇÃO DE BAIXA-RENDA (RIBEIRINHOS) SENDO A REGIÃO COM O MENOR IDH DO PAIS, DE MODO QUE NECESSITAM DE UM APOIO PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES DE SOBREVIVÊNCIA; NECESSITA ESTUDAR ESPÉCIES PESQUEIRAS; POTENCIAL TURÍSTICO; MUITA FLORESTA PRIMARIA; ESPÉCIES PROTEGIDAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA (MAPARA); EXPLORAÇÃO MADEIREIRA;
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE RIBEIRINHA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-595

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 79045

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: AQUICULTURA; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	12 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta puruensis; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus apella; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS CONSOLIDADAS, EUTROFIZAÇÃO E POLO DE PISCICULTURA DE TANQUE ESCAVADO.POLO DE PISCICULTURA DE TANQUE ESCAVADO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-596

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 274363

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: AQUICULTURA; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Rio Jiparaná ou Machado; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; S
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS CONSOLIDADAS, EUTROFIZAÇÃO E POLO DE PISCICULTURA DE TANQUE ESCAVADO.POLO DE PISCICULTURA DE TANQUE ESCAVADO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-597

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 129872

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Mico chrysoleucus; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; PAA PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios

(Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Aripuanã; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Canumã; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Aripuanã; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Mad
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Db Quaternario Purús-Madeira; Paa Madeira-Tapajós; Paa Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Aripuanã; Floodplain Madeira; Rio Canumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FONTE DE RECURSOS PESQUEIROS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (jusante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-598

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 71998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis phyllorhinus; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Mico chrysoleucus; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; PAH PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios

(Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Canumã; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Cretaceo Madeir
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Db Quaternario Purús-Madeira; Pah Madeira-Tapajós; Pah Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira; Rio Canumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FONTE DE RECURSOS PESQUEIROS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Ilhas do Madeira (Id 51)*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-599

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 448843

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	13 ESPÉCIES
AVES	4 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	29 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	17 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	17 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; anolis tandai; anolis transversalis; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis guianense N; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hylexetastes_uniformis; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Alouatta puruensis; Ateles paniscus; Cebus albifrons albifrons; Mico chrysoleucus; Saguinus bicolor; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO BRANCO-TROMBETA; D CRETACEO PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; LG BRANCO-TROMBETA; PAA BRANCO-TROMBETA; PAH BRANCO-TROMBETA; PAH PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios

(Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maderinha; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Urubu; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Branco-Trombeta; D Cretaceo Purús-Madeira; D Quaternario Branco-Trombeta; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Branco-Trombeta; D Cretaceo Purús-Madeira; D Quaternario Branco-Trombeta; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Cretaceo Purús-Madeira; Db Quaternario Branco-Trombeta; Db Quaternario Purús-Madeira; Lg Branco-Trombeta; Paa Branco-Trombeta; Pah Branco-Trombeta; Pah Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Rio Maderinha;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FONTE DE RECURSOS PESQUEIROS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*

- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Gasoduto; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-600

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 141813

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Melanocharacidium nigrum / East Central Amazon floodplain;*
- *Mamíferos:* Alouatta macconnelli; Alouatta nigerrima; Ateles paniscus; Cebus albifrons albifrons; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Plecturocebus baptista; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus apella; Sotalia fluviatilis; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari; Trichechus inunguis;
- *Ambientes Terrestres: DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; LD BRANCO-TROMBETA; PAH BRANCO-TROMBETA; SP BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios

(Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Uatumã; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta; Pah Branco-Trombeta; Sp Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta; Pah Branco-Trombeta; Sp Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Rio Uatumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FONTE DE RECURSOS PESQUEIROS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-601

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 741138

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	12 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	27 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	20 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	6 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	20 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	11 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; anolis planiceps; anolis tandai; anolis transversalis; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Ateles paniscus; Cebus albifrons albifrons; Mico chrysoleucus; Plecturocebus baptista; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; D CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO*

Purús-Madeira; Paa Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; Pah Purús-Madeira; Sp Madeira-Tapajós;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Abacaxis; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maderinha; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Mamuru; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maués-açu; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Abacaxis; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Maderinha; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Mamuru; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Maués-açu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cretaceo Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Cre
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cretaceo Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico

Terc2 Purús-Madeira; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Db Quaternario Purús-Madeira; Paa Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; Pah Purús-Madeira; Sp Madeira-Tapajós;

- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Floodplain Abacaxis; Floodplain Madeira; Rio Maderinha; Rio Mamuru; Rio Maués-açu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FONTE DE RECURSOS PESQUEIROS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-602

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 71921

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; MONITORAMENTO DE ESPÉCIES; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis chrysolepis; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus AM; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Plecturocebus baptista; Saguinus martinsi ochraceus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; PAH BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Uatumã; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Pah Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Pah Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Rio Nhamundá; Rio Uatumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FONTE DE RECURSOS PESQUEIROS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-603

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 27377

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus rubicundus; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia monachus; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Lagothrix poeppigii; Leontocebus nigricollis; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; PAA JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Subandean Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Subandean Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Paa Javarí-Juruá;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Da Quaternario Solimões-Japurá; Paa Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jandiatuba; Subandean Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AGROBIODIVERSIDADE (FARINHA)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-604

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 88069

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis planiceps; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; LA JAPURÁ-NEGRO; LB JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Cuiuni;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Lb Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Lb Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Rio Cuiuni;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-605

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 139224

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	1 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis planiceps; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO NEGRO-BRANCO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; LA JAPURÁ-NEGRO; LA NEGRO-BRANCO; LB JAPURÁ-NEGRO; LG JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Negro / Floodplain Negro;
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Negro-Branco; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; La Japurá-Negro; La Negro-Branco; Lb Japurá-Negro; Lg Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Negro-Branco; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; La Japurá-Negro; La Negro-Branco; Lb Japurá-Negro; Lg Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Negro;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-606

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 25771

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao calvus calvus; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* QUELÔNIOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* ANDIROBA; MURUMURU
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS); EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (CAMPOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-607

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 25362

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Alouatta puruensis; Ateles chamek; Cacajao calvus calvus; Cebuella pygmaea niveiventris; Cebus albifrons albifrons; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Lagothrix poeppigii; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Sapajus macrocephalus; Sotalia fluviatilis; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari; Trichechus inunguis;
- *Ambientes Terrestres: AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá;

- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* QUELÔNIOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* ANDIROBA; MURUMURU
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-608

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 326102

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao calvus calvus; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jutaí; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jutaí;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá; Rio Jutaí;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* QUELÔNIOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* ANDIROBA; MURUMURU
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-609

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 40570

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: MADEIRA EMPRESARIAL; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	6 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus septemcinctus; Alouatta caraya; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: CS MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FA MADEIRA-TAPAJÓS; FB MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Cs Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Cs Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* DIVISA COM RONDÔNIA - AO NORTE DO PE DA SERRA RICARDO FRANCO; CONECTIVIDADE DAS ÁREAS PROTEGIDAS; CORREDOR ECOLÓGICO PARA LIGAR AS TIS E UCS; AMPLIAR OS MANEJOS FLORESTAIS; CADEIAS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-610

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 38177

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: MADEIRA EMPRESARIAL; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	6 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	13 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta caraya; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F MADEIRA-TAPAJÓS; FA MADEIRA-TAPAJÓS; FB MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* DIVISA COM RONDÔNIA - AO NORTE DO PE DA SERRA RICARDO FRANCO; CONECTIVIDADE DAS ÁREAS PROTEGIDAS; CORREDOR ECOLÓGICO PARA LIGAR AS TIS E UCS; AMPLIAR OS MANEJOS FLORESTAIS; CADEIAS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-611

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 76283

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: MADEIRA EMPRESARIAL; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	9 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	13 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Hydrolaetare_capuru; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FA MADEIRA-TAPAJÓS; FB MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* DIVISA COM RONDÔNIA - AO NORTE DO PE DA SERRA RICARDO FRANCO; CONECTIVIDADE DAS ÁREAS PROTEGIDAS; CORREDOR ECOLÓGICO PARA LIGAR AS TIS E UCS; AMPLIAR OS MANEJOS FLORESTAIS; CADEIAS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-612

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 82642

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: MADEIRA EMPRESARIAL; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Hydrolaetare_capuru; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F MADEIRA-TAPAJÓS; FA MADEIRA-TAPAJÓS; FB MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Madeira-Tapajós; Fa Madeira-Tapajós; Fb Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;

- *Interface Terra*-Água: Rio Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* DIVISA COM RONDÔNIA - AO NORTE DO PE DA SERRA RICARDO FRANCO; CONECTIVIDADE DAS ÁREAS PROTEGIDAS; CORREDOR ECOLÓGICO PARA LIGAR AS TIS E UCS; AMPLIAR OS MANEJOS FLORESTAIS; CADEIAS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-613

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 63119

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AGREGA POLÍGONOS DAS ÁREAS ADJACENTES PARA GESTÃO COMPARTILHADA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-614

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 87463

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá; Rio Jutaí;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AGREGA POLÍGONOS DAS ÁREAS ADJACENTES PARA GESTÃO COMPARTILHADA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-615

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 66566

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: AQUICULTURA; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus stephennashi; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Purus; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Ipixuna; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Ipixuna;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Purus; Rio Ipixuna;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-616

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 44372

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO: AQUICULTURA; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Purus;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Purus;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-617

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 74885

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	1 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes nascimentoi S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DA PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus

dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Bacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Xingu / Rio Bacajá;
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Xingu; Rio Bacajá; Rio Pacajá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* IMPORTANTE GARANTIR O FORTALECIMENTO DAS CADEIAS, VISTO AS ÁREAS SEREM OCUPADAS POR ASSENTAMENTOS QUE PRODUZAM A AGRICULTURA FAMILIAR E GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS ECONÔMICAS A ESSES PRODUTORES.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: FICHAS 32 E 33 FORAM UNIFICADAS, ATRIBUINDO-SE A MESMA IDENTIDADE DA ÁREA (32).*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-618

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 84310

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes nascimentoi S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* IMPORTANTE GARANTIR O FORTALECIMENTO DAS CADEIAS, VISTO AS ÁREAS SEREM OCUPADAS POR ASSENTAMENTOS QUE PRODUZAM A AGRICULTURA FAMILIAR E GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS ECONÔMICAS A ESSES PRODUTORES.; AGRICULTURA E PECUÁRIA EM CAMPOS NATURAIS; CAÇA; APOIO AO GARIMPO; DEGRADAÇÃO EM APP.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-619

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 23671

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	24 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; D TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA; DB PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DB CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DB TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides);

Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Lower Tocantins floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Db Proterozoico Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Terciario Litora Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Db Proterozoico Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Terciario Litora Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* IMPORTANTE GARANTIR O FORTALECIMENTO DAS CADEIAS, VISTO AS ÁREAS SEREM OCUPADAS POR ASSENTAMENTOS QUE PRODUZAM A AGRICULTURA FAMILIAR E GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS ECONÔMICAS A ESSES PRODUTORES.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: FICHAS 32 E 33 FORAM UNIFICADAS, ATRIBUINDO-SE A MESMA IDENTIDADE DA ÁREA (32).*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-620

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 41763

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus

dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* IMPORTANTE GARANTIR O FORTALECIMENTO DAS CADEIAS, VISTO AS ÁREAS SEREM OCUPADAS POR ASSENTAMENTOS QUE PRODUZAM A AGRICULTURA FAMILIAR E GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS ECONÔMICAS A ESSES PRODUTORES.; AGRICULTURA E PECUÁRIA EM CAMPOS NATURAIS; CAÇA; APOIO AO GARIMPO; DEGRADAÇÃO EM APP.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-621

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 155301

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): MONITORAMENTO E MANEJO; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	27 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DA QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DB CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; DB TERCIARIO LITORA XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides);

Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Xingú-Araguaia; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Terciario Litora Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Xingú-Araguaia; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Terciario Litora Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta South; Rio Pacajá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* IMPORTANTE GARANTIR O FORTALECIMENTO DAS CADEIAS, VISTO AS ÁREAS SEREM OCUPADAS POR ASSENTAMENTOS QUE PRODUZAM A AGRICULTURA FAMILIAR E GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS ECONÔMICAS A ESSES PRODUTORES.; AGRICULTURA E PECUÁRIA EM CAMPOS NATURAIS; CAÇA; APOIO AO GARIMPO; DEGRADAÇÃO EM APP.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: FICHAS 32 E 33 FORAM UNIFICADAS, ATRIBUINDO-SE A MESMA IDENTIDADE DA ÁREA (32).*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-622

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 98599

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	0 ESPÉCIES
AVES	5 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:*
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio das Mortes;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* TURISMO NO PANTANAL DO RIO ARAGUAIA; RECURSOS PESQUEIROS - PESCA ARTESANAL

- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Ribeirão Cascalheira (Id 114)*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-623

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 82419

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	1 ESPÉCIES
AVES	5 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio das Mortes;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

Caracterização

- *Características Gerais:*
- *Usos Sustentáveis:* Turismo no Pantanal do rio Araguaia; Recursos pesqueiros - Pesca artesanal
- *Oportunidades:* Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Ribeirão Cascalheira (Id 114)*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-624

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 128324

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	0 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:*
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Pyrrhura_anerythra; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: S XINGÚ-ARAGUAIA; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Tapirapé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* S Xingú-Araguaia; Sa Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* TURISMO NO PANTANAL DO RIO ARAGUAIA; RECURSOS PESQUEIROS - PESCA ARTESANAL

- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-626

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 12860

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	5 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Hydrolaetare_capuru; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_perlata; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Inia geoffrensis boliviensis; Alouatta caraya; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ALTO POTENCIAL DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA E FORTALECIMENTO DE CADEIAS SOCIOBIOLÓGICAS.; PONTO CRÍTICO DE ATUAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS, FAUNA E FLORA E AUSÊNCIA DE ESTADO. INTENSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ILEGAIS.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-627

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 35797

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	4 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; enyalioides laticeps; Hydrolaetare_capuru;
- *Aves:* Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_perlata; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ALTO POTENCIAL DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA E FORTALECIMENTO DE CADEIAS SOCIOBIOLÓGICAS.; PONTO CRÍTICO DE ATUAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS, FAUNA E FLORA E AUSÊNCIA DE ESTADO. INTENSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ILEGAIS.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO COM TERRITÓRIO QUILOMBOLA EM ESTUDO (SOBREPOSIÇÃO MANTIDA)*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-628

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 94062

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	5 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; enyalioides laticeps; Hydrolaetare_capuru;
- *Aves:* Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_perlata; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Alouatta caraya; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Made

- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ALTO POTENCIAL DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA E FORTALECIMENTO DE CADEIAS SOCIOBIOLÓGICAS.; PONTO CRÍTICO DE ATUAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS, FAUNA E FLORA E AUSÊNCIA DE ESTADO. INTENSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ILEGAIS.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO COM TERRITÓRIO QUILOMBOLA EM ESTUDO (SOBREPOSIÇÃO MANTIDA)*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-629

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 49710

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; enyalioides laticeps;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_perlata; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ALTO POTENCIAL DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA E FORTALECIMENTO DE CADEIAS SOCIOBIOLÓGICAS.; PONTO CRÍTICO DE ATUAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS, FAUNA E FLORA E AUSÊNCIA DE ESTADO. INTENSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ILEGAIS.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-630

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 41121

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL: ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS QUE ENVOLVAM COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	17 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	17 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Bolitoglossa_caldwellae; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Pithecia inusta; Sotalia fluviatilis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; A QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Ce
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Japurá-Purús; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MUNICÍPIO MARECHAL THAUMATURGOFESTIVAL INDÍGENA PYARENTSI - ASHANINKA DA AMAZÔNIA. ROMARIAS NA RESEX ALTO JURUÁ; CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS PARA PRODUÇÃO DE POLPA, PLANTIOS DE FRUTÍFERAS NA RESEX ALTO JURUÁ E TI ASHANINKA AMONEA; SERRARIAS CLANDESTINAS QUE USAM MADEIRA DAS APPS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* TI ASHANINKA AMONEA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-631

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 57605

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	3 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Malacoptila_striata; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrrhura_coerulescens;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Conepatus semistriatus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Trichechus manatus; Alouatta ululata; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO TOCANTINS-MEARI; A CRETACEO TOCANTINS-MEARI; A QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; A TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; PAH TOCANTINS-MEARI; SN TOCANTINS-MEARI; SPP TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Tocantins-Meari; A Cretaceo Tocantins-Meari; A Quaternario Tocantins-Meari; A Terciario Litora Tocantins-Meari; Pah Tocantins-Meari; SN Tocantins-Meari; SPP Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Tocantins-Meari; A Cretaceo Tocantins-Meari; A Quaternario Tocantins-Meari; A Terciario Litora Tocantins-Meari; Pah Tocantins-Meari; SN Tocantins-Meari; SPP Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Munim;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA ENTRE DUAS APAS; REGIÃO DE LAGOS; BAIXADA MARANHENSE; PESCA; QUEBRADEIRAS DE COCO; COMUNIDADES PESQUEIRAS; CULTIVO DE ARROZ; ÁREA MUITO DEGRADADA, PRÓXIMA DE ESTRADAS E LAGOS. ASSIM COMO EXISTEM ASSENTAMENTOS PRÓXIMOS DAS ÁREAS.; AMPLIAÇÃO DA APA EXISTENTE (BAIXADA MARANHENSE);
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA; QUEBRADEIRAS DE COCO
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* QUEBRADEIRAS DE COCO; COMUNIDADE PESQUEIRA; PRÓXIMO A COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ENTORNO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA TITULADO (SOBREPOSIÇÃO ELIMINADA); REFERE-SE AS UPS 18878, 33581 E 33351, SUGERINDO A AMPLIAÇÃO DA APA EXISTENTE (BAIXADA MARANHENSE)*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-633

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 10977

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC SEM CATEGORIA DEFINIDA;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	5 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	1 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	0 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	0 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis;
- *Aves:* Lophornis_gouldii; Malacoptila_striata; Piculus_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrrhura_coerulescens;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta prymnolopha; Euphractus sexcinctus; Trichechus manatus; Alouatta ululata; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres:*
- *Manguezais:* Manguezais;
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:*
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:*
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA ENTRE DUAS APAS; REGIÃO DE LAGOS; BAIXADA MARANHENSE; PESCA; QUEBRADEIRAS DE COCO; COMUNIDADES PESQUEIRAS; CULTIVO DE ARROZ; ÁREA MUITO DEGRADADA, PRÓXIMA

de estradas e lagos. Assim como existem assentamentos próximos das áreas.; Ampliação da APA existente (Baixada Maranhense);

- *Usos Sustentáveis:* Pesca; Quebradeiras de coco
- *Oportunidades:* Terras não destinadas;;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Quebradeiras de coco; Comunidade pesqueira
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: Refere-se as UPs 18878, 33581 e 33351, sugerindo a ampliação da APA existente (Baixada Maranhense)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-634

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 27134

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)]

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA; AS PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA; DS PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Ituxi; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Upper Madeira floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Ituxi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Purús-Madeira; As Proterozoico Purús-Madeira; Ds Proterozoico Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Purús-Madeira; As Proterozoico Purús-Madeira; Ds Proterozoico Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Upper Madeira floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* OCORRÊNCIA DE ECOSSISTEMA FRÁGIL E ENDÊMICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, OS CAMPOS DE UMIRIZAL. ESTA ÁREA SOFRERÁ IMPACTO DO RESERVATÓRIO DA UHE RIBEIRÃO POTENCIALMENTE DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAL (AUMENTO DE COTA), DA BR 364 (SENTIDO ACRE) E DA FERROVIA INTERNACIONAL BIOCEÂNICA TRANSAMAZÔNICA, E ESTÁ NO TRAJETO DA NOVA RODOVIA SAÍDA PARA TRANSPACÍFICA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-635

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 386884

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)]

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	8 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	29 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	30 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	7 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Hydrolaetare_capuru; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Proterozoico Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Madeira-Tapajós; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Proterozoico Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Purús-Madeira; As Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Purús-Madeira; As Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Db Quaternario Purús-Madeira; Ds Proterozoico*

Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Purús-Madeira; Ds Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; SO Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós; Sp Purús-Madeira;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Abunã; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Ituxi; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Upper Madeira floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Abunã; Alvo 2 - Macrófitas / Upper Madeira floodplain; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Abunã; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Upper Madeira floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Upper Madeira floodplain; A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Proterozoico Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Madeira-Tapajós; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Ceno
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Proterozoico Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Madeira-Tapajós; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Proterozoico Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Purús-Madeira; As Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Purús-Madeira; As

Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Db Quaternario Purús-Madeira; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Purús-Madeira; Ds Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; SO Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós; Sp Purús-Madeira;

- *Interface Terra*-Água: Rio Abunã; Upper Madeira floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* OCORRÊNCIA DE ECOSSISTEMA FRÁGIL E ENDÊMICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, OS CAMPOS DE UMIRIZAL. ESTA ÁREA SOFRERÁ IMPACTO DO RESERVATÓRIO DA UHE RIBEIRÃO POTENCIALMENTE DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAL (AUMENTO DE COTA), DA BR 364 (SENTIDO ACRE) E DA FERROVIA INTERNACIONAL BIOCEÂNICA TRANSAMAZÔNICA, E ESTÁ NO TRAJETO DA NOVA RODOVIA SAÍDA PARA TRANSPACÍFICA.; CRIAÇÃO DE UC DE CATEGORIA DE PRESERVAÇÃO INTEGRAL PARA PRESERVAR PARTE DO ECOSSISTEMA FRÁGIL E ENDÊMICO DOS UMIRIZAIS.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-638

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 58491

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): AMPLIAÇÃO DE UC; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	6 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Psophia_dextralis; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ; PAA TAPAJÓS-XINGÚ; SN TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *Características Gerais:* Melhoria do manejo de solo e água para proteção de recursos hídricos: Área de planalto com presença das nascentes do Xingu e área de recarga de aquíferos.; Área indicada para a criação de UC pelo macroZEE da Amazônia Legal e do ZSEE/MT 218; Ampliação da ESEC Rio Ronuro; Criação da APA do Rio Negro
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências: macroZEE da Amazônia Legal e ZSEE/MT 218*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-639

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 118019

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): AMPLIAÇÃO DE UC; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Psophia_dextralis; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ; PAH TAPAJÓS-XINGÚ; SA TAPAJÓS-XINGÚ; SN TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Pah Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Pah Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA PARA PROTEÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: ÁREA DE PLANALTO COM PRESENÇA DAS NASCENTES DO XINGU E ÁREA DE RECARGA DE AQUÍFEROS.; ÁREA INDICADA PARA A CRIAÇÃO DE UC PELO MACROZEE DA AMAZÔNIA LEGAL E DO ZSEE/MT 218; AMPLIAÇÃO DA ESEC RIO RONURO; CRIAÇÃO DA APA DO RIO NEGRO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS: MACROZEE DA AMAZÔNIA LEGAL E ZSEE/MT 218*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-640

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 129942

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): AMPLIAÇÃO DE UC; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	8 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Psophia_dextralis; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ; S TAPAJÓS-XINGÚ; SA TAPAJÓS-XINGÚ; SN TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; S Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; S Tapajós-Xingú; Sa Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *Características Gerais:* Melhoria do manejo de solo e água para proteção de recursos hídricos: Área de planalto com presença das nascentes do Xingu e área de recarga de aquíferos.; Área indicada para a criação de UC pelo macroZEE da Amazônia Legal e do ZSEE/MT 218; Ampliação da ESEC Rio Ronuro; Criação da APA do Rio Negro
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências: macroZEE da Amazônia Legal e ZSEE/MT 218*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-641

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 32760

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): AMPLIAÇÃO DE UC; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: MELHORIA DO MANEJO DO SOLO, ÁGUA, PASTAGEM

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	10 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS TAPAJÓS-XINGÚ; PAA TAPAJÓS-XINGÚ; PAH TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú; Pah Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Fs Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú; Pah Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Xingu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MELHORIA DO MANEJO DE SOLO E ÁGUA PARA PROTEÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: ÁREA DE PLANALTO COM PRESENÇA DAS NASCENTES DO XINGU E ÁREA DE RECARGA DE AQUÍFEROS.; ÁREA

INDICADA PARA A CRIAÇÃO DE UC PELO MACROZEE DA AMAZÔNIA LEGAL E DO ZSEE/MT 218; AMPLIAÇÃO DA ESEC RIO RONURO; CRIAÇÃO DA APA DO RIO NEGRO

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS: MACROZEE DA AMAZÔNIA LEGAL E ZSEE/MT 218*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-642

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 51120

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)]

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECONHECIMENTO DE TI;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Roosevelt;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Roosevelt; A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Roosevelt;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CONSOLIDADA DE UM CORREDOR ECOLÓGICO, CONFORME DEFINIDO NO ZSEE 218;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRESENÇA DE ÍNDIOS ISOLADOS NA 146, CONFORME MAPEAMENTO SOCIAL, 28 - UFMI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS: MAPEAMENTO SOCIAL, 28 - UFMI; ZSEE 218*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-643

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 55718

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)]

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECONHECIMENTO DE TI;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; anolis tandai; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Aripuanã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Aripuanã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CONSOLIDADA DE UM CORREDOR ECOLÓGICO, CONFORME DEFINIDO NO ZSEE 218;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRESENÇA DE ÍNDIOS ISOLADOS NA 146, CONFORME MAPEAMENTO SOCIAL, 28 - UFMI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS: MAPEAMENTO SOCIAL, 28 - UFMI; ZSEE 218*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-644

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 22537

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA); GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; enyalioides laticeps;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Pyrrhura_perlata; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* HA DEMANDA PARA RECONHECIMENTO DE QUILOMBOLAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: VERIFICAR CORREDOR GUAPORÉ*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-645

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 307127

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA); GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	11 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	17 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	17 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Guaporé;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Made
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Guaporé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA; HA DEMANDA PARA RECONHECIMENTO DE QUILOMBOLAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações: Verificar corredor Guaporé; Sobreposição com território quilombola em estudo (sobreposição mantida)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-646

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 77043

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA); GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	12 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* HA DEMANDA PARA RECONHECIMENTO DE QUILOMBOLAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: VERIFICAR CORREDOR GUAPORÉ*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-647

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 26583

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis bombiceps; anolis tandai; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia hirsuta; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC1 SOLIMÕES-JAPUR; DA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC1 SOLIMÕES-JAPUR; DB CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DB QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Puruí;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Solimões-Japurá;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* HÁ UMA CONECTIVIDADE ÉTNICA E ECOSSISTÊMICA ÁREAS QUE DEVEM TER GESTÃO INTEGRADA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-648

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 123023

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis bombiceps; anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia hirsuta; Sotalia fluviatilis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC1 SOLIMÕES-JAPUR; DA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC1 SOLIMÕES-JAPUR; DB CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DB QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; LD SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Iça - Putumayo; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Puruí;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Solimões-Japurá; Ld Solimões-Japurá;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Solimões-Japurá; Ld Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* HÁ UMA CONECTIVIDADE ÉTNICA E ECOSSISTÊMICA ÁREAS QUE DEVEM TER GESTÃO INTEGRADA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-649

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 195460

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis bombiceps; anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC1 SOLIMÕES-JAPUR; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC1 SOLIMÕES-JAPUR; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; LD JAPURÁ-NEGRO; LD SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Japurá - Caquetá; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Marié;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Db Quaternario Solimões-Japur
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Db Quaternario Solimões-Japurá; Ld Japurá-Negro; Ld Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Japurá - Caquetá; Rio Puruí;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* HÁ UMA CONECTIVIDADE ÉTNICA E ECOSSISTÊMICA ÁREAS QUE DEVEM TER GESTÃO INTEGRADA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-650

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 87198

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis bombiceps; anolis tandai; anolis trachyderma W; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DS CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Marié;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Ds Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Ds Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;

- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* HÁ UMA CONECTIVIDADE ÉTNICA E ECOSSISTÊMICA ÁREAS QUE DEVEM TER GESTÃO INTEGRADA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-651

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 177253

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis bombiceps; anolis tandai; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; LA JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Marié; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uneiuxi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Japurá - Caquetá; Rio Marié;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* HÁ UMA CONECTIVIDADE ÉTNICA E ECOSSISTÊMICA ÁREAS QUE DEVEM TER GESTÃO INTEGRADA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO DE BORDAS DA UP (<5%) COM ÁREA MILITAR*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-652

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 27312

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis bombiceps; anolis tandai; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Marié; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uneiuxi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* HÁ UMA CONECTIVIDADE ÉTNICA E ECOSSISTÊMICA ÁREAS QUE DEVEM TER GESTÃO INTEGRADA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-653

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 29023

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis bombiceps; anolis tandai; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; LB JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Marié;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Lb Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Lb Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Rio Marié;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* HÁ UMA CONECTIVIDADE ÉTNICA E ECOSSISTÊMICA ÁREAS QUE DEVEM TER GESTÃO INTEGRADA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-654

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 93896

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis bombiceps; anolis planiceps; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uneiuxi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* HÁ UMA CONECTIVIDADE ÉTNICA E ECOSSISTÊMICA ÁREAS QUE DEVEM TER GESTÃO INTEGRADA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-655

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 130442

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL: CRIAÇÃO DE RESEX

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Coari Grande; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tefé; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tefé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tefé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AMPLIAÇÃO DA FLONA TEFÉ; FORTALECER GESTÃO INTEGRADA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS); EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (CAMPOS)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: INSERIR ÁREA EM BRANCO ENTRE AS UPS (16197 E 19177). APESAR DE NÃO MORAREM NA UC, AS COMUNIDADES DA REGIÃO SE RECONHECEM COMO MORADORES DA UC.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-656

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 442774

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL: CRIAÇÃO DE RESEX

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; D QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; L JAPURÁ-PURÚS; LA JAPURÁ-PURÚS; PAH JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tefé; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tefé; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoi
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; L Japurá-Purús; La Japurá-Purús; Pah Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tefé; West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AMPLIAÇÃO DA FLONA TEFÉ; FORTALECER GESTÃO INTEGRADA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações: Inserir área em branco entre as UPs (16197 e 19177). Apesar de não morarem na UC, as comunidades da região se reconhecem como moradores da UC.*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-657

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 47128

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis chrysolepis; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; cnemidophorus lemniscatus AM; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Penelope_pileata;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Saguinus martinsi ochraceus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; PAA BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Nhamundá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Nhamundá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Paa Branco-Trombeta;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Paa Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Nhamundá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-658

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 105798

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Mico saterei; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Canumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Cretaceo Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Cretaceo Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Canumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-659

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 85078

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Mico saterei; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Abacaxi; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Abacaxi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Rio Abacaxi; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Abacaxi;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-660

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 30274

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Mico saterei; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Abacaxi; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Abacaxi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Abacaxi;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-661

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 109697

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; anolis tandai; anolis transversalis; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Abacaxis; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Abacaxi; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Abacaxis;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Abacaxis; Rio Abacaxi;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-662

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 29966

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Cebuella pygmaea pygmaea; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Pithecia cazuzai; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao calvus calvus; Cebus albifrons albifrons; Saimiri vanzolinii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; PAH SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Solimões-Japurá; Pah Solimões-Japurá;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Solimões-Japurá; Pah Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR ECOLÓGICO;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PIRARUCU
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-663

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 56237

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia cazuzai; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; AA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Cuiuni;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Aa Quaternario Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Qua
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Aa Quaternario Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Negro; Rio Cuiuni; West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR ECOLÓGICO;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PIRARUCU
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-664

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 456812

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tapauá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tapauá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AMPLIAÇÃO DE TI (DENI...ZURUANÃ); GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: INSERIR BLOCOS BRANCOS.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-665

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1052125

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Purus; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Tapauá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Tapauá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Purus; Rio Tapauá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AMPLIAÇÃO DE TI (DENI...ZURUANÃ); GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016) ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: INSERIR BLOCOS BRANCOS.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-666

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 24713

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus baptista; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Mamuru; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Mamuru;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AO LADO HÁ UMA DEMANDA DE RECONHECIMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-667

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 29449

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Mamuru; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Mamuru;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Rio Mamuru;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AO LADO HÁ UMA DEMANDA DE RECONHECIMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-668

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 34843

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Mico acariensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Canumã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Canumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Cretaceo Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Cretaceo Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Canumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-669

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 169543

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Mico acariensis; Mico chrysoleucus; Mico saterei; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Canumã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Canumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Cretaceo Madeira-Tapaj
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Cretaceo Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira; Rio Canumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-670

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 35639

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis phyllorhinus; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Mico chrysoleucus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Canumã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Canumã;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-671

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 179255

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis phyllorhinus; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Mico chrysoleucus; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PAH MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis

erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maderinha; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Maderinha;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Db Quaternario Purús-M
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Db Quaternario Purús-Madeira; Pah Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira; Rio Maderinha;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Ilhas do Madeira (Id 51)*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-672

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 124703

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; PESQUISA: LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis bombiceps; anolis tandai; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; AA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; AA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO; PAH JAPURÁ-NEGRO; PAH SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Japurá - Caquetá; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Marié;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Aa Quaternario Japurá-Negro; Aa Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Ld Ja
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Aa Quaternario Japurá-Negro; Aa Quaternario Solimões-Japurá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro; Pah Japurá-Negro; Pah Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Japurá - Caquetá; Rio Marié; Rio Uneiuxi;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA POUCO CONHECIDA, REGIÃO DE ALTA DIVERSIDADE, FRONTEIRA E REGIÃO DE INTERESSE BIOGEOGRÁFICO.CONECTIVIDADE ÉTNICA E ECOSSISTÊMICA; ÁREA DE MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: A MARCAÇÃO FOI FEITA NO MAPA DA AM-RR*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-673

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 772715

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; PESQUISA: LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis bombiceps; anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Pithecia hirsuta; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix lagotricha; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC1 SOLIMÕES-JAPUR; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; DB CENOZOICO TERC1 SOLIMÕES-JAPUR; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 SOLIMÕES-JAPUR; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO SOLIMÕES-JAPURÁ; LB SOLIMÕES-JAPURÁ; LD JAPURÁ-NEGRO; LD SOLIMÕES-JAPURÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Iça - Putumayo; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Japurá - Caquetá; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Puruí;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Soli
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Solimões-Japurá; Db Cenozoico Terc1 Solimões-Japur; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Solimões-Japur; Db Quaternario Japurá-Negro; Db Quaternario Solimões-Japurá; Lb Solimões-Japurá; Ld Japurá-Negro; Ld Solimões-Japurá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Japurá - Caquetá; Rio Puruí;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA POUCO CONHECIDA, REGIÃO DE ALTA DIVERSIDADE, FRONTEIRA E REGIÃO DE INTERESSE BIOGEOGRÁFICO.CONECTIVIDADE ÉTNICA E ECOSSISTÊMICA; ÁREA DE MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: A MARCAÇÃO FOI FEITA NO MAPA DA AM-RR*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-674

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 161267

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao calvus calvus; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jutaí; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Ceno
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá; Rio Jutaí; Rio Tefé;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO DE INTERESSE BIOLÓGICO E CARENTE DE LEVANTAMENTOS E CARACTERIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE; REGIÃO JÁ TRADICIONALMENTE PRESERVADA E MANEJADA PELAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, CARENTES DE RECONHECIMENTO FORMAL.; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA.; COMUNIDADES TRADICIONAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* REGIÃO DE EXPLORAÇÃO E MANEJO DE PRODUTOS FLORESTAIS (E.G.. ÓLEO DE ANDIROBA, MURUMURU, COPAÍBA, AÇAÍ) E PESCA E MANEJO DE QUELÔNIOS.
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-675

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 213830

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	18 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	18 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao calvus calvus; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; D CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; D QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; D QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; PAA JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Quaternario Japurá-Purús; D Quat
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Quaternario Japurá-Purús; D Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Javarí-Juruá; Paa Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO DE INTERESSE BIOLÓGICO E CARENTE DE LEVANTAMENTOS E CARACTERIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE; REGIÃO JÁ TRADICIONALMENTE PRESERVADA E MANEJADA PELAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, CARENTES DE RECONHECIMENTO FORMAL.; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA.; COMUNIDADES TRADICIONAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* REGIÃO DE EXPLORAÇÃO E MANEJO DE PRODUTOS FLORESTAIS (E.G.. ÓLEO DE ANDIROBA, MURUMURU, COPAÍBA, AÇAÍ) E PESCA E MANEJO DE QUELÔNIOS.
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-676

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 190838

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao calvus calvus; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; PAH JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Ceno
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Javarí-Juruá; Pah Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO DE INTERESSE BIOLÓGICO E CARENTE DE LEVANTAMENTOS E CARACTERIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE; REGIÃO JÁ TRADICIONALMENTE PRESERVADA E MANEJADA PELAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, CARENTES DE RECONHECIMENTO FORMAL.; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA.; COMUNIDADES TRADICIONAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* REGIÃO DE EXPLORAÇÃO E MANEJO DE PRODUTOS FLORESTAIS (E.G.. ÓLEO DE ANDIROBA, MURUMURU, COPAÍBA, AÇAÍ) E PESCA E MANEJO DE QUELÔNIOS.
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-677

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 67258

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): SÍTIO RAMSAR

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	1 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis transversalis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; L JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Unini; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Negro / Floodplain Negro;
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; L Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; L Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Negro;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ARTICULAÇÃO EM TORNO DO ESTABELECIMENTO DO SÍTIO RAMSAR;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-678

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 71867

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE ÁREAS CONSERVADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): SÍTIO RAMSAR

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; DA QUATERNARIO NEGRO-BRANCO; LA NEGRO-BRANCO; LB NEGRO-BRANCO; LD NEGRO-BRANCO; LG NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Da Quaternario Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Da Quaternario Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco;

- *Interface Terra*-Água: Floodplain Negro;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ARTICULAÇÃO EM TORNO DO ESTABELECIMENTO DO SÍTIO RAMSAR;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-679

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 37605

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	1 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; LA JAPURÁ-NEGRO; LB JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Cuiuni;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Lb Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; La Japurá-Negro; Lb Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* HÁ TI EM PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO PELA FUNAI NAS BACIAS DOS RIOS ARACÁ E DEMENI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-680

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 26349

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; LD NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jufari;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Ld Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Ld Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* HÁ TI EM PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO PELA FUNAI NAS BACIAS DOS RIOS ARACÁ E DEMENI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-681

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 43367

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; LA NEGRO-BRANCO; LB NEGRO-BRANCO; LO NEGRO-BRANCO; RM NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jufari;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; LO Negro-Branco; rm Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; LO Negro-Branco; rm Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jufari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* HÁ TI EM PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO PELA FUNAI NAS BACIAS DOS RIOS ARACÁ E DEMENI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-682

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 47841

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cacajao ayresi; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; DS QUATERNARIO NEGRO-BRANCO; LA NEGRO-BRANCO; LB NEGRO-BRANCO; LD NEGRO-BRANCO; LG NEGRO-BRANCO; LO NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Piaçava; Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Demini;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ds Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Ds Quaternario Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco; LO Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Ds Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Ds Quaternario Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco; LO Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Rio Demini;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* HÁ TI EM PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO PELA FUNAI NAS BACIAS DOS RIOS ARACÁ E DEMENI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-683

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 137059

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis bombiceps; anolis planiceps; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; DB CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; DS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; DS CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; LA NEGRO-BRANCO; LD NEGRO-BRANCO; LO NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Piaçava; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Padauari;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Proterozoico Negro-Branco; Db Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Ds Proterozoico Negro-Branco; Ds Cenozoico Terc2 Negro-Branco; La Negro-Branco; Ld Negro-Branco; LO Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Db Proterozoico Negro-Branco; Db Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Ds Proterozoico Negro-Branco; Ds Cenozoico Terc2 Negro-Branco; La Negro-Branco; Ld Negro-Branco; LO Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Rio Padauari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* HÁ TI EM PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA PELA FUNAI NAS BACIAS DOS RIOS PADAUARI E PRETO
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-684

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 43473

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; LA NEGRO-BRANCO; LB NEGRO-BRANCO; LD NEGRO-BRANCO; LG NEGRO-BRANCO; LO NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Piaçava; Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Demini;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco; LO Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco; LO Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Rio Demini;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* HÁ TI EM PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO PELA FUNAI NAS BACIAS DOS RIOS ARACÁ E DEMENI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-685

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 40304

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis bombiceps; anolis planiceps; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: LA NEGRO-BRANCO; LB NEGRO-BRANCO; LD NEGRO-BRANCO; LO NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Piaçava; Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Padauari;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; LO Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; LO Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Rio Padauari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* HÁ TI EM PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA PELA FUNAI NAS BACIAS DOS RIOS PADAUARI E PRETO
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-686

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 55332

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis bombiceps; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cacajao ayresi; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; LA NEGRO-BRANCO; LB NEGRO-BRANCO; LD NEGRO-BRANCO; LG NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Piaçava; Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Demini;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ds Proterozoico Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Ds Proterozoico Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* HÁ TI EM PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO PELA FUNAI NAS BACIAS DOS RIOS ARACÁ E DEMENI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-687

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 37299

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: LA NEGRO-BRANCO; LD NEGRO-BRANCO; LO NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Piaçava; Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Demini;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* La Negro-Branco; Ld Negro-Branco; LO Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* La Negro-Branco; Ld Negro-Branco; LO Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Rio Demini;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*

- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Há TI em processo de identificação pela FUNAI nas bacias dos rios Aracá e Demeni
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-688

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 35184

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; AS CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; LB NEGRO-BRANCO; LD NEGRO-BRANCO; LG NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Piaçava; Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Demini;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Negro-Branco; As Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Negro-Branco; As Cenozoico Terc2 Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Rio Demini;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* HÁ TI EM PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO PELA FUNAI NAS BACIAS DOS RIOS ARACÁ E DEMENI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-689

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 57146

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis bombiceps; anolis planiceps; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS CENOZOICO TERC2 NEGRO-BRANCO; LA NEGRO-BRANCO; LD NEGRO-BRANCO; LO NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Piaçava; Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Padauari;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ds Cenozoico Terc2 Negro-Branco; La Negro-Branco; Ld Negro-Branco; LO Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ds Cenozoico Terc2 Negro-Branco; La Negro-Branco; Ld Negro-Branco; LO Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Rio Padauari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* HÁ TI EM PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA PELA FUNAI NAS BACIAS DOS RIOS PADAUARI E PRETO
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-690

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 57004

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DM PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; LA NEGRO-BRANCO; LB NEGRO-BRANCO; LD NEGRO-BRANCO; LG NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Piaçava; Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Demini;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Dm Proterozoico Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Dm Proterozoico Negro-Branco; La Negro-Branco; Lb Negro-Branco; Ld Negro-Branco; Lg Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* HÁ TI EM PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO PELA FUNAI NAS BACIAS DOS RIOS ARACÁ E DEMENI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-691

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 181464

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jaú; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Manacapuru; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Manacapuru;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Rio Manacapuru;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE VÁRZEA POUCO CONHECIDA, OU ÁREA DE INFLUÊNCIA DE VÁRZEA; ÁREA MUITO OCUPADA, NECESSITA DE MOBILIZAÇÃO LOCAL
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-692

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 542710

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA: LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	15 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	15 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Loxopholis snethlageae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; AA CRETACEO JAPURÁ-NEGRO; AA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; D CRETACEO JAPURÁ-NEGRO; D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CRETACEO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB CRETACEO JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; LO JAPURÁ-NEGRO; PAH JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Lower Negro floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Manacapuru; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain;

Alvo 2 - Macrófitas / Rio Manacapuru; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Aa Cretaceo Japurá-Negro; Aa Quaternario Japurá-Negro; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Cretaceo Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cretaceo Japu
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Aa Cretaceo Japurá-Negro; Aa Quaternario Japurá-Negro; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Cretaceo Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cretaceo Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cretaceo Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; LO Japurá-Negro; Pah Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Lower Negro floodplain; Rio Manacapuru; West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE VÁRZEA POUCO CONHECIDA, OU ÁREA DE INFLUÊNCIA DE VÁRZEA; ÁREA MUITO OCUPADA, NECESSITA DE MOBILIZAÇÃO LOCAL
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-693

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 15439

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): PESQUISA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	2 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis bombiceps; anolis planiceps; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Cacajao melanocephalus; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB PROTEROZOICO JAPURÁ-NEGRO; DB PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO NEGRO-BRANCO; DS PROTEROZOICO JAPURÁ-NEGRO; LB JAPURÁ-NEGRO; LD JAPURÁ-NEGRO; LD NEGRO-BRANCO; LO JAPURÁ-NEGRO; LO NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Piaçava; Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Negro; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Marié;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Negro / Floodplain Negro; Rios Ordem 7 a 11 - Rio Negro / Rio Marié;

- *Ambientes Reofílicos:* Db Proterozoico Japurá-Negro; Db Proterozoico Negro-Branco; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Db Quaternario Negro-Branco; Ds Proterozoico Japurá-Negro; Lb Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro; Ld Negro-Branco; LO Japurá-Negro; LO Neg
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Proterozoico Japurá-Negro; Db Proterozoico Negro-Branco; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Db Quaternario Negro-Branco; Ds Proterozoico Japurá-Negro; Lb Japurá-Negro; Ld Japurá-Negro; Ld Negro-Branco; LO Japurá-Negro; LO Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Negro; Rio Marié;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FOZ DO RIO CURICURIAÚ, INICIO DE CORREDEIRA (REGIÃO DE PEDRA) E ILHAS DE AFLORAMENTO ROCHOSO (16318). PEQUENO ARQUIPÉLAGO (28432) NO MEIO DE TERRAS INDÍGENAS (TI MÉDIO RIO NEGRO II E TI MÉDIO REIO NEGRO I); ÁREA POUCO CONHECIDA; EXISTE MOBILIZAÇÃO PARA ACORDO DE PESCA NA ÁREA.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* TERRAS INDÍGENAS (TI MÉDIO RIO NEGRO II E TI MÉDIO REIO NEGRO I)
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO DE BORDAS DA UP (<5%) COM ÁREA MILITAR*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-695

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 41877

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	20 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Rio Arapiuns;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FORTALECER O ASSENTAMENTO; PROPOSTA DE ACORDO DE PESCA; MITIGAÇÃO POR PRESSÃO DA SOJA E EXPLORAÇÃO MADEIREIRA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-696

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 29713

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	20 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Arapiuns; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FORTALECER O ASSENTAMENTO; PROPOSTA DE ACORDO DE PESCA; MITIGAÇÃO POR PRESSÃO DA SOJA E EXPLORAÇÃO MADEIREIRA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-697

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 379561

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	21 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	21 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	1 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus novaesi; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; A CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; A QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; D CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; D QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; LD JAVARÍ-JURUÁ; LG JAVARÍ-JURUÁ; PA JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios

(Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Quixitó; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Quixitó;
- *Encontro de águas:* white black;
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cen
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Japurá-Purús; Ab Quaternario Javarí-Juruá; D Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá; Ld Javarí-Juruá; Lg Javarí-Juruá; Pa Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá; Rio Quixitó;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* EXPLORAÇÃO MADEIREIRA, DESMATAMENTO, CAÇA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas Mudança do Clima - Precipitação; Exploração e produção de gás e óleo (Blocos)

- *Referências:*

- *Outras Observações: Ordenamento territorial*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-698

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 131555

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.);

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	20 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	20 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus novaesi; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; A QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Ce
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* EXPLORAÇÃO MADEIREIRA, DESMATAMENTO, CAÇA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações: Ordenamento territorial*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-699

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 16027

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): COMITÊS DE BACIA; ACORDO DE PESCA; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis chrysolepis; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; cnemidophorus lemniscatus AM; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Saguinus martinsi martinsi; Saguinus martinsi ochraceus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; PAA BRANCO-TROMBETA; SP BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Nhamundá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Nhamundá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Paa Branco-Trombeta; Sp Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Quaternario Branco-Trombeta; Paa Branco-Trombeta; Sp Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Nhamundá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAR AS ATIVIDADES DE PESCA COMERCIAL E AGROPECUÁRIA; REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL (ACORDOS DE PESCA); VALORIZAÇÃO E VALORAÇÃO DA CADEIA DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ESSA ÁREA É IMPORTANTE PARA A MIGRAÇÃO E PARA A DESOVA DOS QUELÔNIOS AQUÁTICOS (RIO TROMBETAS)*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-700

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 310546

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): COMITÊS DE BACIA; ACORDO DE PESCA; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	2 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	18 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	5 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	18 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	8 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus AM; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Penelope_pileata;
- *Peixes Ameaçados: Crenicichla heckeli / Floodplain Trombetas; Lithoxus lithoides / Floodplain Trombetas;*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Cebus olivaceus castaneus; Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Saguinus martinsi martinsi; Saguinus martinsi ochraceus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO BRANCO-TROMBETA; D PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; D QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; D QUATERNARIO TROMBETAS-JARÍ; DA CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; DB PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; DB QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DB QUATERNARIO TROMBETAS-JARÍ; DS CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; DS PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; DS QUATERNARIO TROMBETAS-JARÍ; PAA BRANCO-TROMBETA; PAA TROMBETAS-JARÍ; PAH BRANCO-TROMBETA; SP BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis

erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Paru do Oeste ou Erepecuru ou Cumin; Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Trombetas; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Nhamundá; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Trombetas; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Paru do Oeste ou Erepecuru ou Cumin; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Trombetas;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Branco-Trombeta; D Paleozoico Trombetas-Jarí; D Quaternario Branco-Trombeta; D Quaternario Trombetas-Jarí; Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Paleozoico Tromb
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Branco-Trombeta; D Paleozoico Trombetas-Jarí; D Quaternario Branco-Trombeta; D Quaternario Trombetas-Jarí; Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Paleozoico Trombetas-Jarí; Db Quaternario Branco-Trombeta; Db Quaternario Trombetas-Jarí; Ds Cretaceo Trombetas-Jarí; Ds Paleozoico Trombetas-Jarí; Ds Quaternario Trombetas-Jarí; Paa Branco-Trombeta; Paa Trombetas-Jarí; Pah Branco-Trombeta; Sp Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Paru do Oeste ou Erepecuru ou Cumin; East Central Amazon floodplain; Floodplain Trombetas; Rio Nhamundá; Rio Trombetas;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAR AS ATIVIDADES DE PESCA COMERCIAL E AGROPECUÁRIA; REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL (ACORDOS DE PESCA); VALORIZAÇÃO E VALORAÇÃO DA CADEIA DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; ; FERROVIAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO ; ; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE);

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ESSA ÁREA É IMPORTANTE PARA A MIGRAÇÃO E PARA A DESOVA DOS QUELÔNIOS AQUÁTICOS (RIO TROMBETAS); ENTORNO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA TITULADO (SOBREPOSIÇÃO ELIMINADA)*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-701

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 348212

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): COMITÊS DE BACIA; ACORDO DE PESCA; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	20 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	15 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	16 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Cebus olivaceus castaneus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Neusticomys oyapocki; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles marginatus; Ateles paniscus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; A PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; AS CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; AS PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; D CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; D PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; DA CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; DB CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; DB QUATERNARIO TROMBETAS-JARÍ; DS CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; DS PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; PAA TROMBETAS-JARÍ; PAH TROMBETAS-JARÍ; S TROMBETAS-JARÍ; SP TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides);

Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Curuá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Curuá; A Cretaceo Trombetas-Jarí; A Paleozoico Trombetas-Jarí; As Cretaceo Trombetas-Jarí; As Paleozoico Trombetas-Jarí; D Cretaceo Trombetas-Jarí; D Paleozoico Trombetas-Jarí; Da Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Quaternario Tro
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cretaceo Trombetas-Jarí; A Paleozoico Trombetas-Jarí; As Cretaceo Trombetas-Jarí; As Paleozoico Trombetas-Jarí; D Cretaceo Trombetas-Jarí; D Paleozoico Trombetas-Jarí; Da Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Quaternario Trombetas-Jarí; Ds Cretaceo Trombetas-Jarí; Ds Paleozoico Trombetas-Jarí; Paa Trombetas-Jarí; Pah Trombetas-Jarí; S Trombetas-Jarí; Sp Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Rio Curuá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAR AS ATIVIDADES DE PESCA COMERCIAL E AGROPECUÁRIA; REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL (ACORDOS DE PESCA); VALORIZAÇÃO E VALORAÇÃO DA CADEIA DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ATENÇÃO NA REPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO FLORESTAL NAS ÁREAS JÁ DEGRADADAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA

- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Comunidade quilombola
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: Entorno de território quilombola titulado (sobreposição eliminada)/Sobreposição com território quilombola em estudo (sobreposição mantida)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-702

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1228882

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): COMITÊS DE BACIA; ACORDO DE PESCA; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	15 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	28 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	34 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	4 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	34 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	7 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; arthrosaura kockii N; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; gonatodes nascimentoi N; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Alouatta discolor; Cebus olivaceus castaneus; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Neusticomys oyapocki; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles marginatus; Ateles paniscus; Chiropotes utahickae; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;

- *Ambientes Terrestres: As Cretaceo Trombetas-Jarí; As Paleozoico Trombetas-Jarí; D Cenozoico Terc2 Trombetas-Jarí; D Cretaceo Jarí-Foz Amazon; D Cretaceo Trombetas-Jarí; D Paleozoico Trombetas-Jarí; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Trombetas-Jarí; Da Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Da Cretaceo Trombetas-Jarí; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Trombetas-Jarí; Db Cenozoico Terc2 Trombetas-Jarí; Db Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Paleozoico Trombetas-Jarí; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Quaternario Trombetas-Jarí; Ds Cenozoico Terc2 Jarí-Foz Amazon; Ds Cenozoico Terc2 Trombetas-Jarí; Ds Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Ds Cretaceo Trombetas-Jarí; Ds Paleozoico Trombetas-Jarí; Ds Quaternario Jarí-Foz Amazon; Ds Quaternario Trombetas-Jarí; P Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz Amazon; Pah Tapajós-Xingú; Pah Trombetas-Jarí; S Trombetas-Jarí; Sa Trombetas-Jarí; So Trombetas-Jarí; Sp Trombetas-Jarí;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jari; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Paru;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Cretaceo Trombetas-Jarí; As Paleozoico Trombetas-Jarí; D Cenozoico Terc2 Trombetas-Jarí; D Cretaceo Jarí-Foz Amazon; D Cretaceo Trombetas-Jarí; D

Paleozoico Trombetas-Jarí; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Trombetas-Jarí; Da Cretaceo Jarí-F

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Cretaceo Trombetas-Jarí; As Paleozoico Trombetas-Jarí; D Cenozoico Terc2 Trombetas-Jarí; D Cretaceo Jarí-Foz Amazon; D Cretaceo Trombetas-Jarí; D Paleozoico Trombetas-Jarí; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Trombetas-Jarí; Da Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Da Cretaceo Trombetas-Jarí; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Trombetas-Jarí; Db Cenozoico Terc2 Trombetas-Jarí; Db Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Paleozoico Trombetas-Jarí; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Quaternario Trombetas-Jarí; Ds Cenozoico Terc2 Jarí-Foz Amazon; Ds Cenozoico Terc2 Trombetas-Jarí; Ds Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Ds Cretaceo Trombetas-Jarí; Ds Paleozoico Trombetas-Jarí; Ds Quaternario Jarí-Foz Amazon; Ds Quaternario Trombetas-Jarí; P Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz Amazon; Pah Tapajós-Xingú; Pah Trombetas-Jarí; S Trombetas-Jarí; Sa Trombetas-Jarí; SO Trombetas-Jarí; Sp Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North; East Central Amazon floodplain; Rio Jari; Rio Paru;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAR AS ATIVIDADES DE PESCA COMERCIAL E AGROPECUÁRIA; REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL (ACORDOS DE PESCA); VALORIZAÇÃO E VALORAÇÃO DA CADEIA DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-703

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 64885

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA; MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	28 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Alouatta puruensis; Ateles paniscus; Cebus albifrons albifrons; Saguinus bicolor; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA; PAH BRANCO-TROMBETA; PAH PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Pah Branco-Trombeta; Pah Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cretaceo Branco-Trombeta; Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cretaceo Branco-Trombeta; Pah Branco-Trombeta; Pah Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PARTE DESSE POLÍGONO É UMA ÁREA MILITAR NA PORÇÃO BAIXA É IMPORTANTE PARA ACORDO DE PESCA; É IMPORTANTE PARA ACORDO DE PESCA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-704

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 73565

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA; MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; bachia panoplia; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Saguinus bicolor; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DA CRETACEO BRANCO-TROMBETA; DB CRETACEO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Branco-Trombeta; Da Cretaceo Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Branco-Trombeta; Da Cretaceo Branco-Trombeta; Db Cretaceo Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Lower Negro floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PARTE DESSE POLÍGONO É UMA ÁREA MILITAR NA PORÇÃO BAIXA É IMPORTANTE PARA ACORDO DE PESCA; É IMPORTANTE PARA ACORDO DE PESCA;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-705

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 390834

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): COMITÊS DE BACIA; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	26 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	26 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Bolitoglossa_caldwellae; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cacajao calvus ucayalli; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Pithecia inusta; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; A CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; D CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; D CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; D CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; D QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; D QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; A Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; A Quaternario Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Japurá-Purús; Ab Quaternario Javarí-Juruá; D Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; D Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; D Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Quaternario Japurá-Purús; D Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PLANO ESTADUAL DE BACIAS CONTEMPLA A ÁREA MAS ATUAÇÃO E FORMAÇÃO DE COMITÊ AINDA NÃO OCORREU; ESSAS UPS INTERLIGAM AS APS; ÁREA COM MUITA ENTRADA DE DROGAS DO LADO FRONTEIRIÇO COM PERU
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-706

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 43757

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Psophia_interjecta; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; S XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; S Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TODAS AS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS NESTE TERRITÓRIO DEPENDEM DA CONECTIVIDADE DOS CURSOS D'AGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA; QUEBRADEIRAS DE COCO
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-707

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 117806

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	15 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	15 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrocolaptes_retentus; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Psophia_interjecta; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO ARAGUAIA-TOCANT; A CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; A CRETACEO ARAGUAIA-TOCANT; A PALEOZOICO ARAGUAIA-TOCANT; AS PROTEROZOICO ARAGUAIA-TOCANT; AS CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; AS CRETACEO ARAGUAIA-TOCANT; AS PALEOZOICO ARAGUAIA-TOCANT; D CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; D CRETACEO ARAGUAIA-TOCANT; D PALEOZOICO ARAGUAIA-TOCANT; S ARAGUAIA-TOCANT; SA ARAGUAIA-TOCANT; SG ARAGUAIA-TOCANT; SO ARAGUAIA-TOCANT;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Araguaia-Tocant; A Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; A Cretaceo Araguaia-Tocant; A Paleozoico Araguaia-Tocant; As Proterozoico Araguaia-Tocant; As Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; As Cretaceo Araguaia-Tocant; As Paleozoico Araguaia-Tocant; D
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Araguaia-Tocant; A Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; A Cretaceo Araguaia-Tocant; A Paleozoico Araguaia-Tocant; As Proterozoico Araguaia-Tocant; As Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; As Cretaceo Araguaia-Tocant; As Paleozoico Araguaia-Tocant; D Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; D Cretaceo Araguaia-Tocant; D Paleozoico Araguaia-Tocant; S Araguaia-Tocant; Sa Araguaia-Tocant; Sg Araguaia-Tocant; SO Araguaia-Tocant;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TODAS AS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS NESTE TERRITÓRIO DEPENDEM DA CONECTIVIDADE DOS CURSOS D'AGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA; QUEBRADEIRAS DE COCO
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; FERROVIAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: RECOMENDAÇÃO PARA TODO O BLOCO MARCADO DE FORMA ADJACENTE.*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-708

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 525198

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	23 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	23 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO ARAGUAIA-TOCANT; A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; A CRETACEO ARAGUAIA-TOCANT; A PALEOZOICO ARAGUAIA-TOCANT; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; D CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; DA PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DA CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; FA XINGÚ-ARAGUAIA; S ARAGUAIA-TOCANT; S XINGÚ-ARAGUAIA; SA ARAGUAIA-TOCANT; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SG XINGÚ-ARAGUAIA; SN XINGÚ-ARAGUAIA; SO ARAGUAIA-TOCANT; SO XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pau-d`arco;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Araguaia-Tocant; A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; A Cretaceo Araguaia-Tocant; A Paleozoico Araguaia-Tocant; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Araguaia-Tocant; A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; A Cretaceo Araguaia-Tocant; A Paleozoico Araguaia-Tocant; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; S Araguaia-Tocant; S Xingú-Araguaia; Sa Araguaia-Tocant; Sa Xingú-Araguaia; Sg Xingú-Araguaia; SN Xingú-Araguaia; SO Araguaia-Tocant; SO Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia; Rio Pau-d`arco;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TODAS AS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS NESTE TERRITÓRIO DEPENDEM DA CONECTIVIDADE DOS CURSOS D'AGUA

- *Usos Sustentáveis:* Pesca; Quebradeiras de coco
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Comunidades Quilombolas certificadas na área (Boa Fé, Ituquara, São Pedro, Santa Teresa do Matupiri)
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: Área entre UPs: 16844 e 16847 (demanda para Território Quilombola - Criação de nova UP); Unificado com ficha 57 (mesmas UPs); Recomendação para todo o bloco marcado de forma adjacente.*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-709

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 72242

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	21 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Baryancistrus niveatus / Floodplain Araguaia;*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO ARAGUAIA-TOCANT; A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; D CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Araguaia-Tocant; A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Araguai
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Araguaia-Tocant; A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TODAS AS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS NESTE TERRITÓRIO DEPENDEM DA CONECTIVIDADE DOS CURSOS D'AGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA; QUEBRADEIRAS DE COCO
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-710

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 300368

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	21 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	3 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	20 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	20 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Baryancistrus longipinnis / Floodplain Araguaia; Baryancistrus niveatus / Floodplain Araguaia; Crenicichla jegui / Floodplain Araguaia;*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO ARAGUAIA-TOCANT; A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; A CRETACEO ARAGUAIA-TOCANT; A CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; A PALEOZOICO ARAGUAIA-TOCANT; AS PROTEROZOICO ARAGUAIA-TOCANT; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; AS CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; AS CRETACEO ARAGUAIA-TOCANT; AS PALEOZOICO ARAGUAIA-TOCANT; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; D CENOZOICO*

TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; S ARAGUAIA-TOCANT; SA ARAGUAIA-TOCANT; SO ARAGUAIA-TOCANT;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Araguaia-Tocant; A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; A Cretaceo Araguaia-Tocant; A Cretaceo Xingú-Araguaia; A Paleozoico Araguaia-Tocant; As Proterozoico Araguaia-Tocant; As Pr
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Araguaia-Tocant; A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; A Cretaceo Araguaia-Tocant; A Cretaceo Xingú-Araguaia; A Paleozoico Araguaia-Tocant; As Proterozoico Araguaia-Tocant; As Proterozoico Xingú-Araguaia; As Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; As Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Cretaceo Araguaia-Tocant; As Paleozoico Araguaia-Tocant; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Cretaceo Xingú-Araguaia; S Araguaia-Tocant; Sa Araguaia-Tocant; SO Araguaia-Tocant;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TODAS AS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS NESTE TERRITÓRIO DEPENDEM DA CONECTIVIDADE DOS CURSOS D'AGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA; QUEBRADEIRAS DE COCO
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: FICHAS 3 E 16 CONTINHAM AS MESMAS UPS, POR ISSO, FORAM UNIFICADAS; RECOMENDAÇÃO PARA TODO O BLOCO MARCADO DE FORMA ADJACENTE.; SOBREPOSIÇÃO COM TERRITÓRIO QUILOMBOLA EM ESTUDO (SOBREPOSIÇÃO MANTIDA)*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-711

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 19032

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Chiasmocleis_avilapireae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Penelope_pileata; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO ARAGUAIA-TOCANT; A CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; A PALEOZOICO ARAGUAIA-TOCANT; S ARAGUAIA-TOCANT; SA ARAGUAIA-TOCANT;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Araguaia-Tocant; A Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; A Paleozoico Araguaia-Tocant; S Araguaia-Tocant; Sa Araguaia-Tocant;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Araguaia-Tocant; A Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; A Paleozoico Araguaia-Tocant; S Araguaia-Tocant; Sa Araguaia-Tocant;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TODAS AS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS NESTE TERRITÓRIO DEPENDEM DA CONECTIVIDADE DOS CURSOS D'AGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA; QUEBRADEIRAS DE COCO
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; ATIVIDADES MINERADORAS NÃO OFICIAIS (CLANDESTINAS); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-712

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 74359

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	21 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Piculus_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Teleocichla cinderella / Floodplain Araguaia;*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A PALEOZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; D CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; D PALEOZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Paleozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Paleozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Paleozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Paleozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TODAS AS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS NESTE TERRITÓRIO DEPENDEM DA CONECTIVIDADE DOS CURSOS D'AGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA; QUEBRADEIRAS DE COCO
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: FICHAS 3 E 16 CONTINHAM AS MESMAS UPS, POR ISSO, FORAM UNIFICADAS.*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-713

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 112629

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	25 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	2 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Malacoptila_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Piculus_paraensis; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Crenicichla jegui / Floodplain Araguaia; Scobinancistrus pariolispos / Floodplain Araguaia;*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO ARAGUAIA-TOCANT; A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; A PALEOZOICO ARAGUAIA-TOCANT; A PALEOZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CENOZOICO TERC2 ARAGUAIA-TOCANT; D CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; D PALEOZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; SO ARAGUAIA-TOCANT; SO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Araguaia-Tocant; A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; A Paleozoico Araguaia-Tocant; A Paleozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Araguaia-Tocant; A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; A Paleozoico Araguaia-Tocant; A Paleozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Araguaia-Tocant; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Paleozoico Xingú-Araguaia; D Quaternario Xingú-Araguaia; SO Araguaia-Tocant; SO Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Araguaia;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TODAS AS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS NESTE TERRITÓRIO DEPENDEM DA CONECTIVIDADE DOS CURSOS D'AGUA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA; QUEBRADEIRAS DE COCO
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-714

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 72726

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_retentus; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Aguarunichthys tocantinsensis / Floodplain Tocantins;*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO TOCANTINS-MEARI; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO XINGÚ-ARAGUAIA; D QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO TOCANTINS-MEARI; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tocantins; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Itacaiúnas;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Tocantins-Meari; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Tocantins-Meari; Ds Proter
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Tocantins-Meari; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Tocantins-Meari; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tocantins; Rio Itacaiúnas;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; FERROVIAS;

Mineração com até 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (montante de UHE)

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-716

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 34789

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	28 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-717

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 40432

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-718

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 162168

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-719

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 35949

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-720

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 45534

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guamá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-721

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 233102

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Crax_fasciolata_pinima; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; A CRETACEO TOCANTINS-MEARI; A TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; AB CRETACEO TOCANTINS-MEARI; AB TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; AS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; AS CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Gurupi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; A Cretaceo Tocantins-Meari; A Terciario Litora Tocantins-Meari; Ab Cretaceo Tocantins-Meari; Ab Terciario Litora Tocantins-Meari; As Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; As Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocanti
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; A Cretaceo Tocantins-Meari; A Terciario Litora Tocantins-Meari; Ab Cretaceo Tocantins-Meari; Ab Terciario Litora Tocantins-Meari; As Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; As Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; FERROVIAS;

Mineração com até 50ha de área; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-722

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 144245

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_medius; Guaruba_guarouba; Lophornis_gouldii; Malacoptila_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Penelope_pileata; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Psophia_obscura; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; A CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; P TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; A Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; P Tocantins-Meari;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; A Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; P Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Mearim; Rio Pindaré;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS IMPORTANTES PARA AS QUEBRADEIRAS DO COCO, COMUNIDADES QUILOMBOLAS QUE NECESSITAM DE MAIOR CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* QUEBRADEIRAS DE COCO
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA; QUEBRADEIRAS DE COCO
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; FERROVIAS ; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-723

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 221191

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Psophia_obscura; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios

(Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guamá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS QUE ESTÃO DEGRADADAS FACE A ATIVIDADE AGROPECUÁRIA E TOPOS DE MORRO; NECESSITA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE RLAGROPECUÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-724

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 34734

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Psophia_obscura; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DS TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Ds Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Ds Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guamá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-725

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 159925

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Crax_fasciolata_pinima; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Psophia_obscura; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guamá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* VISA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAIS QUE SÃO OS ÚNICOS PONTOS PRESERVADOS NA REGIÃO PARA QUE NÃO OCORRA MAIS DESMATAMENTOS; RECUPERAÇÃO DA ÁREA EM VIRTUDE DE UMA PREDOMINÂNCIA DE ÁREAS FRAGMENTADAS COM RESQUÍCIOS DE ARL'S EM ALGUMAS PROPRIEDADES PRIVADAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; FERROVIAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-726

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 43544

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Crax_fasciolata_pinima; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Gurupi;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* VISA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAIS QUE SÃO OS ÚNICOS PONTOS PRESERVADOS NA REGIÃO PARA QUE NÃO OCORRA MAIS DESMATAMENTOS; RECUPERAÇÃO DA ÁREA EM VIRTUDE DE UMA PREDOMINÂNCIA DE ÁREAS FRAGMENTADAS COM RESQUÍCIOS DE ARL'S EM ALGUMAS PROPRIEDADES PRIVADAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-727

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 37218

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DB TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios

(Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Terciario Litora Tocantins-Meari; Db Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Terciario Litora Tocantins-Meari; Db Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-728

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 23667

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Crax_fasciolata_pinima; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DB CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DB TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Db Cretaceo Tocantins-Meari; Db Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Db Cretaceo Tocantins-Meari; Db Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* VISA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAIS QUE SÃO OS ÚNICOS PONTOS PRESERVADOS NA REGIÃO PARA QUE NÃO OCORRA MAIS DESMATAMENTOS; RECUPERAÇÃO DA ÁREA EM VIRTUDE DE UMA PREDOMINÂNCIA DE ÁREAS FRAGMENTADAS COM RESQUÍCIOS DE ARL'S EM ALGUMAS PROPRIEDADES PRIVADAS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-729

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1596218

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	33 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Crax_fasciolata_pinima; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Psophia_obscura; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D QUATERNARIO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DB TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Guamá; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Db Terciario Litora Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Db Terciario Litora Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Rio Guamá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* VISA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAIS QUE SÃO OS ÚNICOS PONTOS PRESERVADOS NA REGIÃO PARA QUE NÃO OCORRA MAIS DESMATAMENTOS; ÁREAS QUE ESTÃO DEGRADADAS FACE A ATIVIDADE AGROPECUÁRIA E TOPOS DE MORRO; NECESSITA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE RL; RECUPERAÇÃO DA ÁREA EM VIRTUDE DE UMA PREDOMINÂNCIA DE ÁREAS FRAGMENTADAS COM RESQUÍCIOS DE ARL'S EM ALGUMAS PROPRIEDADES PRIVADAS; AGROPECUÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; FERROVIAS;

Mineração com até 50ha de área; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-730

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 82668

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	22 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Coastal wetland S;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA COM BASTANTE USO PARA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA (CULTIVO DE FARINHA) E ASSIM MANTER O CULTIVO DAS ESPÉCIES; NECESSITA DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA, TENDO EM VISTA A EXPANSÃO DA CULTURA DO DENDÊ. PARA QUE NÃO OCORRA CULTIVO EM ÁREAS ILEGAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ENTORNO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA TITULADO (SOBREPOSIÇÃO ELIMINADA)*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-731

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 271514

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	17 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	18 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; arthrosaura kockii N; Atelopus_hoogmoedi; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus olivaceus castaneus; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Neusticomys oyapocki; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZON; AA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; D PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; D QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; D TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZON; DA PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DA TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZO; DB PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DB TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZO; PA JARÍ-FOZ AMAZON; PAA JARÍ-FOZ AMAZON; PAH JARÍ-FOZ AMAZON; S JARÍ-FOZ AMAZON; SA JARÍ-FOZ AMAZON; SO JARÍ-FOZ AMAZON; SP JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta North;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Rio Araguari; A Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Aa Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Da Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Tercia
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Aa Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Da Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Db Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Pa Jarí-Foz Amazon; Paa Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz Amazon; S Jarí-Foz Amazon; Sa Jarí-Foz Amazon; SO Jarí-Foz Amazon; Sp Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North; Rio Araguari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO MUITO DEGRADADA EM VIRTUDE DA CRIAÇÃO DE BÚFALOS E HIDRELÉTRICAS QUANDO DESVIARAM O CURSO DO RIO ARAGUARI
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE R

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-732

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 81808

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jauaperi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *Características Gerais:* Área de ocupação para criação de gado de corte com desmatamentoDesmatamento para implantação de pasto para criação de gado de corte
- *Usos Sustentáveis:* Extração de castanha associado com comunidade indígena, e plantação de banana
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-733

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 119722

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados: Lithoxus lithoides / Rio Uatumã;*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; AS QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; D PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; D QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uatumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Branco-Trombeta; As Quaternario Branco-Trombeta; D Proterozoico Branco-Trombeta; D Quaternario Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Quaternario Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Branco-Trombeta; As Quaternario Branco-Trombeta; D Proterozoico Branco-Trombeta; D Quaternario Branco-Trombeta; Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Quaternario Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Uatumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE OCUPAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE GADO DE CORTE COM DESMATAMENTODESMATAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PASTO PARA CRIAÇÃO DE GADO DE CORTE
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* EXTRAÇÃO DE CASTANHA ASSOCIADO COM COMUNIDADE INDÍGENA, E PLANTAÇÃO DE BANANA
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; PCH/CGH

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-734

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 20190

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; gonatodes eladioi; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; F TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; LO TAPAJÓS-XINGÚ; RM TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; LO Tapajós-Xingú; rm Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; LO Tapajós-Xingú; rm Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* PARA PROTEGER AS NASCENTES DA SERRA DO CACHIMBO; FAUNA ESPECIALIZADA DO CERRADO; GRILAGEM, EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA E AGRONEGÓCIOS SEM LICENCIAMENTOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-735

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 51668

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS CENOZOICO TERC2 BRANCO-TROMBETA; LD BRANCO-TROMBETA; LG BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Anauá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta; Lg Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta; Lg Branco-Trombeta;

- *Interface Terra*-Água: Rio Anauá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* LOTEAMENTO RECENTE POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO, O QUE VAI AFETAR O PARNA VIRUÁ; ENTORNO DO PARQUE NACIONAL DO VIRUÁ ONDE JÁ EXISTE PROCESSO DE AMPLIAÇÃO QUE SE APROXIMA DOS POLÍGONOS. ÁREA DE CAMPINARANA / CAMPINADESMATAMENTO PARA ASSENTAMENTO HUMANO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-736

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 15057

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; coleodactylus septentrionalis; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PROTEROZOICO BRANCO-TROMBETA; DS CENOZOICO TERC2 BRANCO-TROMBETA; DS QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; LD BRANCO-TROMBETA; LG BRANCO-TROMBETA; LO BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera publifora Benth.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Anauá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ds Quaternario Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta; Lg Branco-Trombeta; LO Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* Ds Proterozoico Branco-Trombeta; Ds Cenozoico Terc2 Branco-Trombeta; Ds Quaternario Branco-Trombeta; Ld Branco-Trombeta; Lg Branco-Trombeta; LO Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Anauá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* LOTEAMENTO RECENTE POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO, O QUE VAI AFETAR O PARNA VIRUÁ; ENTORNO DO PARQUE NACIONAL DO VIRUÁ ONDE JÁ EXISTE PROCESSO DE AMPLIAÇÃO QUE SE APROXIMA DOS POLÍGONOS. ÁREA DE CAMPINARANA / CAMPINADESMATAMENTO PARA ASSENTAMENTO HUMANO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-737

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 33530

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC1 JAVARÍ-JURUÁ; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; PAH JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jandiatuba; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jandiatuba;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Db
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Ab Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Da Quaternario Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc1 Javarí-Juruá; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Javarí-Juruá; Pah Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* KAMBEBAGARIMPO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-738

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 33418

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	18 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus baptista; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Mamuru; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Mamuru;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Rio Mamuru;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AMPLIAÇÃO DA TI ANDIRÁ-MARAU; ASSENTAMENTO ILEGAL, EXTRAÇÃO DE MADEIRA E DESMATAMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: E ÁREAS BRANCAS ADJACENTES*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-739

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 69078

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECONHECIMENTO DE TI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus RR; anolis planiceps; cnemidophorus lemniscatus RR; coleodactylus septentrionalis; gymnophthalmus leucomystax; gymnophthalmus vanzoi; kentropyx striata RR; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F NEGRO-BRANCO; FA NEGRO-BRANCO; FS NEGRO-BRANCO; SA NEGRO-BRANCO; SP NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Branco; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uraricoera;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Negro-Branco; Fa Negro-Branco; Fs Negro-Branco; Sa Negro-Branco; Sp Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* F Negro-Branco; Fa Negro-Branco; Fs Negro-Branco; Sa Negro-Branco; Sp Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Rio Uraricoera;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* TERRA INDÍGENA, PRESENÇA DE FAZENDEIROS, CRIAÇÃO DE AÇUDES PARA PISCICULTURA (TAMBAQUI) ÁREA CERCADA POR 3 TERRAS INDÍGENAS.ATIVIDADES ILEGAIS DE DESMATAMENTO, CONSTRUÇÃO DE AÇUDES PARA PISCICULTURA, CONTENÇÃO DE IGARAPÉS.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* ÁREA DE USO INDÍGENA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-740

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 394757

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: MOSAICO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	12 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	28 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	28 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; A PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Cretaceo Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Madeira-Tapajós
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Cretaceo Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Paleozoico Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cretaceo Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Guaporé;

- *Características Gerais:* Gestão para mosaico, devido à existência de TIs, UCs próximas/vizinhas, e devido também à possibilidade de estabelecimento de corredor para NW.
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Próximo a TI
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação; PCH/CGH

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-741

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 154794

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	18 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Roosevelt;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Rio Roosevelt; A Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; Aa Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Roosevelt;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR ECOLÓGICO ENTRE TIS E UCS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-742

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 215035

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Aripuanã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Aripuanã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR ECOLÓGICO ENTRE TIS E UCS;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-743

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 35323

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	10 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Guaporé;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AINDA COM GRANDES REMANESCENTES; DESMATAMENTO RECENTE
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-745

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 124103

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus stephennashi; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AS CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; S PURÚS-MADEIRA; SA PURÚS-MADEIRA; SO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Mucuim; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Mucuim;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; As Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; S Purús-Madeira; Sa Purús-Madeira; SO Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; As Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; S Purús-Madeira; Sa Purús-Madeira; SO Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Mucuim; Upper Madeira floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BR 3/9 - BLOCO*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-746

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 12579

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Marmelos; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Marmelos;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO DE BORDAS DA UP (<5%) COM ÁREA MILITAR*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-747

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 19829

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA PURÚS-MADEIRA; PAH MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Purús-Madeira; Pah Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Purús-Madeira; Pah Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BR 3/9 - BLOCO; SOBREPOSIÇÃO DE BORDAS DA UP (<5%) COM ÁREA MILITAR*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-748

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 90919

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus stephennashi; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; SO PURÚS-MADEIRA; SP PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Ipixuna; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Ipixuna;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; SO Purús-Madeira; Sp Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; SO Purús-Madeira; Sp Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Ipixuna;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BR 3/9 - BLOCO*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-749

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 56787

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus stephennashi; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Ipixuna; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Ipixuna;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Ipixuna;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BR 3/9 - BLOCO*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-750

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 18679

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu -

Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Purús-
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *Referências:*
- *Outras Observações: BR 3/9 - BLOCO*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-751

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 395216

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	16 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	4 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	18 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	10 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Mico marcai; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas

Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Aripuanã; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Manicoré; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Marmelos; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Aripuanã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Manicoré; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Marmelos; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Aripuanã; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Aripuanã; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Manicoré; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Roosevelt;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Aripuanã; Rio Roosevelt; As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Made
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Proterozoico Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Aripuanã; Rio Aripuanã; Rio Manicoré; Rio Roosevelt;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-752

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 74856

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Mico chrysoleucus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-753

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 119016

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Mico acariensis; Mico chrysoleucus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus);

Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Canumã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Canumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; D
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-754

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 30715

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Mico acariensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Canumã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Canumã;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós; D
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Canumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-755

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 188840

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus stephennashi; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PA PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Ipixuna; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Ipixuna;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Pa Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Pa Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira; Rio Ipixuna;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BR 3/9 - BLOCO*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-756

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 43477

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	11 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Quaternario Purús-Madeira; D Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Quaternario Purús-Madeira; D Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BR 3/9 - BLOCO*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-757

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 69033

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PA PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira; Pa Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BR 3/9 - BLOCO*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-758

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 31044

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	11 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PA MADEIRA-TAPAJÓS; PA PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Pa Madeira-Tapajós; Pa Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Pa Madeira-Tapajós; Pa Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BR 3/9 - BLOCO*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-759

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 48307

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	11 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Callibella humilis; Cebus albifrons albifrons; Mico manicorensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BR 3/9 - BLOCO*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-760

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 11145

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	13 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Callibella humilis; Cebus albifrons albifrons; Mico manicorensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BR 3/9 - BLOCO*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-761

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 38034

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	11 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Callibella humilis; Cebus albifrons albifrons; Mico manicorensis; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; SG PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maderinha; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Maderinha;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Db Quaternario Purús-
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Db Quaternario Purús-Madeira; Sg Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BR 3/9 - BLOCO*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-762

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 58200

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Callibella humilis; Cebus albifrons albifrons; Mico chrysoleucus; Mico manicorensis; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios

(Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Aripuanã; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Aripuanã; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Pu
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Aripuanã; Floodplain Madeira;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREAATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE SEIXO, MADEIRA, PECUÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (jusante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações: BR 3/9 - BLOCO*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-763

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 15157

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maderinha; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Maderinha;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Maderinha;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BR 3/9 - BLOCO*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-764

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 221191

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Purus; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maderinha;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Maderinha;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BR 3/9 - BLOCO*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-765

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 40617

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	2 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Purus; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maderinha; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Purus; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 5 a 11 - Margem Sul do Rio Amazonas / Floodplain Purus; Rios Ordem 5 a 11 - Margem Sul do Rio Amazonas / West Central Amazon floodplain;
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Purus; Rio Maderinha; West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BR 3/9 - BLOCO*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-766

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 35743

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maderinha; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Maderinha;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BR 3/9 - BLOCO*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-767

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 58122

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PAH PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira; Pah Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira; Pah Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: BR 3/9 - BLOCO*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-768

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 27518

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO; RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO; AQUICULTURA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO; RECURSO PESQUEIRO; RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	21 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Arapiuns; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Arapiuns;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Rio Arapiuns;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* A ÁREA QUE ABRANGE UPS QUE CONTEMPLAM ÁREAS DE BERÇÁRIO DE ESPÉCIES DO RECURSO PESQUEIRO. EXISTEM INSTRUMENTOS DE GESTÃO (ACORDO DE PESCA E PLANO DE UTILIZAÇÃO DOS PAES-INCRA) QUE PRECISAM SER FISCALIZADOS. COMO RECOMENDAÇÃO, CONSIDERAR ESTAS AÇÕES TAMBÉM AS UPS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO, VISTO QUE TODA A ÁREA É OCUPADA POR POPULAÇÕES HUMANAS; E GRANDE PARTE SE ENCONTRA NO INTERIOR DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTAS - PAE.;

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-769

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 40362

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO; RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO; AQUICULTURA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO; RECURSO PESQUEIRO; RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	31 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus PA; kentropyx striata AP PA; Pipa_snethlageae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: PAH TAPAJÓS-XINGÚ; PAH TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides);

Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Pah Tapajós-Xingú; Pah Trombetas-Jarí;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Pah Tapajós-Xingú; Pah Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* A ÁREA QUE ABRANGE UPS QUE CONTEMPLAM ÁREAS DE BERÇÁRIO DE ESPÉCIES DO RECURSO PESQUEIRO. EXISTEM INSTRUMENTOS DE GESTÃO (ACORDO DE PESCA E PLANO DE UTILIZAÇÃO DOS PAES-INCRA) QUE PRECISAM SER FISCALIZADOS. COMO RECOMENDAÇÃO, CONSIDERAR ESTAS AÇÕES TAMBÉM AS UPS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO, VISTO QUE TODA A ÁREA É OCUPADA POR POPULAÇÕES HUMANAS; E GRANDE PARTE SE ENCONTRA NO INTERIOR DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTAS - PAE.;

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO COM TERRITÓRIO QUILOMBOLA EM ESTUDO (SOBREPOSIÇÃO MANTIDA)*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-770

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 63048

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO; RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO; AQUICULTURA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO; RECURSO PESQUEIRO; RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	20 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* A ÁREA QUE ABRANGE UPS QUE CONTEMPLAM ÁREAS DE BERÇÁRIO DE ESPÉCIES DO RECURSO PESQUEIRO. EXISTEM INSTRUMENTOS DE GESTÃO (ACORDO DE PESCA E PLANO DE UTILIZAÇÃO DOS PAES-INCRA) QUE PRECISAM SER FISCALIZADOS. COMO RECOMENDAÇÃO, CONSIDERAR ESTAS AÇÕES TAMBÉM AS UPS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO, VISTO QUE TODA A ÁREA É OCUPADA POR POPULAÇÕES HUMANAS; E GRANDE PARTE SE ENCONTRA NO INTERIOR DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTAS - PAE.;

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-772

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 41469

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO; RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO; AQUICULTURA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO; RECURSO PESQUEIRO; RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; kentropyx striata AP PA; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Penelope_pileata;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles marginatus; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; PAA TROMBETAS-JARÍ; PAH TROMBETAS-JARÍ; S TROMBETAS-JARÍ; SP TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Paa Trombetas-Jarí; Pah Trombetas-Jarí; S Trombetas-Jarí; Sp Trombetas-Jarí;

- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Paa Trombetas-Jarí; Pah Trombetas-Jarí; S Trombetas-Jarí; Sp Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* A ÁREA QUE ABRANGE UPS QUE CONTEMPLAM ÁREAS DE BERÇÁRIO DE ESPÉCIES DO RECURSO PESQUEIRO. EXISTEM INSTRUMENTOS DE GESTÃO (ACORDO DE PESCA E PLANO DE UTILIZAÇÃO DOS PAES-INCRA) QUE PRECISAM SER FISCALIZADOS. COMO RECOMENDAÇÃO, CONSIDERAR ESTAS AÇÕES TAMBÉM AS UPS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO, VISTO QUE TODA A ÁREA É OCUPADA POR POPULAÇÕES HUMANAS; E GRANDE PARTE SE ENCONTRA NO INTERIOR DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTAS - PAE.;

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-773

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 27922

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO; RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO; AQUICULTURA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO; RECURSO PESQUEIRO; RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: PAH TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus

dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Pah Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Pah Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* A ÁREA QUE ABRANGE UPS QUE CONTEMPLAM ÁREAS DE BERÇÁRIO DE ESPÉCIES DO RECURSO PESQUEIRO. EXISTEM INSTRUMENTOS DE GESTÃO (ACORDO DE PESCA E PLANO DE UTILIZAÇÃO DOS PAES-INCRA) QUE PRECISAM SER FISCALIZADOS. COMO RECOMENDAÇÃO, CONSIDERAR ESTAS AÇÕES TAMBÉM AS UPS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO, VISTO QUE TODA A ÁREA É OCUPADA POR POPULAÇÕES HUMANAS; E GRANDE PARTE SE ENCONTRA NO INTERIOR DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTAS - PAE.;

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-774

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 152104

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO; RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO; AQUICULTURA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO; RECURSO PESQUEIRO; RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	20 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis chrysolepis; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus AM; Dendropsophus_sarayacuensis; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Cebus albifrons albifrons; Saguinus martinsi martinsi; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO TROMBETAS-JARÍ; PAA BRANCO-TROMBETA; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; PAH BRANCO-TROMBETA; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; PAH TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides);

Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Arapiuns; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Db Quaternario Trombetas-Jarí; Paa Branco-Trombeta; Paa Madeira-Tapajós; Pah Branco-Trombeta; Pah Madeira-Tapajós; Pah Trombetas-Jarí;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Db Quaternario Trombetas-Jarí; Paa Branco-Trombeta; Paa Madeira-Tapajós; Pah Branco-Trombeta; Pah Madeira-Tapajós; Pah Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* A ÁREA QUE ABRANGE UPS QUE CONTEMPLAM ÁREAS DE BERÇÁRIO DE ESPÉCIES DO RECURSO PESQUEIRO. EXISTEM INSTRUMENTOS DE GESTÃO (ACORDO DE PESCA E PLANO DE UTILIZAÇÃO DOS PAES-INCRA) QUE PRECISAM SER FISCALIZADOS. COMO RECOMENDAÇÃO, CONSIDERAR ESTAS AÇÕES TAMBÉM AS UPS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO, VISTO QUE TODA A ÁREA É OCUPADA POR POPULAÇÕES HUMANAS; E GRANDE PARTE SE ENCONTRA NO INTERIOR DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTAS - PAE.;

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (jusante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-775

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 15369

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO; RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO; AQUICULTURA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO; RECURSO PESQUEIRO; RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	27 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; kentropyx striata AP PA; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles marginatus; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; D QUATERNARIO TROMBETAS-JARÍ; PAH TAPAJÓS-XINGÚ; PAH TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus

dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Trombetas-Jarí; D Quaternario Trombetas-Jarí; Pah Tapajós-Xingú; Pah Trombetas-Jarí;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Trombetas-Jarí; D Quaternario Trombetas-Jarí; Pah Tapajós-Xingú; Pah Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* A ÁREA QUE ABRANGE UPS QUE CONTEMPLAM ÁREAS DE BERÇÁRIO DE ESPÉCIES DO RECURSO PESQUEIRO. EXISTEM INSTRUMENTOS DE GESTÃO (ACORDO DE PESCA E PLANO DE UTILIZAÇÃO DOS PAES-INCRA) QUE PRECISAM SER FISCALIZADOS. COMO RECOMENDAÇÃO, CONSIDERAR ESTAS AÇÕES TAMBÉM AS UPS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO, VISTO QUE TODA A ÁREA É OCUPADA POR POPULAÇÕES HUMANAS; E GRANDE PARTE SE ENCONTRA NO INTERIOR DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTAS - PAE.;

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-776

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 17034

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: RECURSO PESQUEIRO; HABITAT CRÍTICO; RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO; AQUICULTURA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; PESQUISA: HABITAT CRÍTICO; DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO; RECURSO PESQUEIRO; RECURSOS FAUNÍSTICOS PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	28 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis chrysolepis; arthrosaura kockii N; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; kentropyx striata AP PA; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles marginatus; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DB CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; DB CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; DB QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; PAA JARÍ-FOZ AMAZON; PAH JARÍ-FOZ AMAZON; PAH TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Paru;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon; Paa Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz Amazon; Pah Trombetas-Jarí;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon; Paa Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz Amazon; Pah Trombetas-Jarí;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North; Rio Paru;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* A ÁREA QUE ABRANGE UPS QUE CONTEMPLAM ÁREAS DE BERÇÁRIO DE ESPÉCIES DO RECURSO PESQUEIRO. EXISTEM INSTRUMENTOS DE GESTÃO (ACORDO DE PESCA E PLANO DE UTILIZAÇÃO DOS PAES-INCRA) QUE PRECISAM SER FISCALIZADOS. COMO RECOMENDAÇÃO, CONSIDERAR ESTAS AÇÕES TAMBÉM AS UPS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO, VISTO QUE TODA A ÁREA É OCUPADA POR POPULAÇÕES HUMANAS; E GRANDE PARTE SE ENCONTRA NO INTERIOR DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTAS - PAE.;

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação Fragmentação de rios (montante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-777

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 259775

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	13 ESPÉCIES
AVES	40 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	2 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	1 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	17 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	18 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus E; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; gonatodes nascimentoi S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Campylorhamphus_multostriatus; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_retentus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_paraensis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Hypancistrus zebra / Lower Xingu floodplain; Scobinancistrus pariolispos / Lower Xingu floodplain;*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera

onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;

- *Ambientes Terrestres: As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Paleozoico Tapajós-Xingú; D Paleozoico Xingú-Araguaia; D Quaternario Tapajós-Xingú; D Quaternario Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Paleozoico Tapajós-Xingú; Db Quaternario Tapajós-Xingú; Db Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia; Pah Xingú-Araguaia;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Lower Xingu floodplain; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 7 a 11 - Rio Xingu / Lower Xingu floodplain;
- *Ambientes Reofílicos:* Lower Xingu floodplain; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Paleozoico Tapajós-Xingú; D Paleozoico Xingú-Araguaia; D Quaternario Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Paleozoico Tapajós-Xingú; D Paleozoico Xingú-Araguaia; D Quaternario Tapajós-Xingú; D

Quaternario Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Paleozoico Tapajós-Xingú; Db Quaternario Tapajós-Xingú; Db Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia; Pah Xingú-Araguaia;

- *Interface Terra*-Água: Lower Xingu floodplain; Rio Pacajá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO DA TRANSAMAZONICA COM PRESENÇA DE ASSENTAMENTOS E IMPACTOS DE DESMATAMENTO, NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS, ALTERNATIVAS E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEISGRANDE PRESENÇA DE ASSENTAMENTOS E EXPANSÃO DA PECUÁRIA / DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA. EXPANSÃO DA PECUÁRIA EM GRANDES PROPRIEDADES.

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE R

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-778

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 36130

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; amapasaurus tetradactylus; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; arthrosaura kockii N; Atelopus_hoogmoedi; gonatodes nascimentoi N; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus castaneus; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Neusticomys oyapocki; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; D QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DB PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DB QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DS PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DS QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon; Ds Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Ds Quaternario Jarí-Foz Amazon;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon; Ds Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Ds Quaternario Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North; Rio Araguari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; FORTALECER OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO (PA PEDRA BRANCA E PA MUNGUBA); EXTRAÇÃO DE MADEIRA ILEGAL; CAÇA DE ANIMAIS SILVESTRES
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; FERROVIAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-779

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1275650

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	13 ESPÉCIES
AVES	3 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	1 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	29 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	30 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; amapasaurus tetradactylus; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; arthrosaura kockii N; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; gonatodes nascimentoi N; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Pyrilia_vulturina;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus olivaceus castaneus; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Neusticomys oyapocki; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Trichechus manatus; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZON; AA PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; AA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; D PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; D CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; D QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; D TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZON; DA PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DA CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; DA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DA TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZO; DB PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DB CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; DB PALEOZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DB QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DB TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZO; DS PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DS CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; DS QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DS TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZO; PA JARÍ-FOZ AMAZON; PAA JARÍ-FOZ AMAZON; PAH JARÍ-FOZ AMAZON; PF JARÍ-FOZ AMAZON; S JARÍ-FOZ AMAZON; SA JARÍ-FOZ AMAZON; SG JARÍ-FOZ AMAZON; SO JARÍ-FOZ AMAZON; SP JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:* Manguezais;

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta North;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Amazon Delta North; A Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Aa Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Aa Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Cretaceo Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Da Prot
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Aa Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Aa Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Cretaceo Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Da Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Da Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Db Paleozoico Jarí-Foz Amazon; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Ds Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Ds Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Ds Quaternario Jarí-Foz Amazon; Ds Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Pa Jarí-Foz Amazon; Paa Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz Amazon; Pf Jarí-Foz Amazon; S Jarí-Foz Amazon; Sa Jarí-Foz Amazon; Sg Jarí-Foz Amazon; SO Jarí-Foz Amazon; Sp Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North; Rio Araguari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* JÁ TRATA-SE DE UM PAE (PROJETO DE ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTA); FORTALECIMENTO DO INSTRUMENTO DE GESTÃO; VALORAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; FORTALECER OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO (PA NOVA COLINA); ÁREA COM ALTA INCIDÊNCIA DE EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA; CONFLITOS DE PESCA (PESCA COMERCIAL/INDUSTRIAL FORA DOS PARÂMETROS LEGAIS); CRIAÇÃO DE BÚFALO; CAÇA DE ANIMAIS SILVESTRES
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; FERROVIAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGME

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: NO POLÍGONO QUE FOI DESENHADO NO MAPA (EM AZUL) EXISTE UMA ÁREA JÁ "ANALISADA NA OFICINA ANTERIOR", COM INDICAÇÃO DE CRIAÇÃO DE UMA RESEX. MAS, ESSA ÁREA JÁ É UM PAE (PAE MARACÁ); ENTORNO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA TITULADO (SOBREPOSIÇÃO ELIMINADA); SOBREPO*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-780

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 33834

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; arthrosaura kockii N; Atelopus_hoogmoedi; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus olivaceus castaneus; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Neusticomys oyapocki; Trichechus manatus; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; D TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZON; PAA JARÍ-FOZ AMAZON; PAH JARÍ-FOZ AMAZON; SP JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta North;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Paa Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz Amazon; Sp Jarí-Foz Amazon;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* Aa Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Paa Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz Amazon; Sp Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North; Rio Araguari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS COM VÁRIOS ASSENTAMENTOS; VALORAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; CONFLITOS DE PESCA (PESCA ILEGAL); CRIAÇÃO EXTENSIVA DE BÚFALO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-781

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 36648

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	14 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; Atelopus_hoogmoedi; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus castaneus; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Neusticomys oyapocki; Sotalia fluviatilis; Trichechus manatus; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; D QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; D TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZON; DA PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DA TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZO; DB PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; PAA JARÍ-FOZ AMAZON; PAH JARÍ-FOZ AMAZON; S JARÍ-FOZ AMAZON; SA JARÍ-FOZ AMAZON; SG JARÍ-FOZ AMAZON; SO JARÍ-FOZ AMAZON; SP JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Coastal wetland N; D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Da Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Da Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Paa Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz A

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Da Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Da Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Paa Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz Amazon; S Jarí-Foz Amazon; Sa Jarí-Foz Amazon; Sg Jarí-Foz Amazon; SO Jarí-Foz Amazon; Sp Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* VALORAÇÃO/VALORIZAÇÃO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; CONFLITO DE PESCA (PESCA COMERCIAL/INDUSTRIAL FORA DOS PARÂMETROS LEGAIS); EXPLORAÇÃO MADEIREIRA ILEGAL
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO COM TERRITÓRIO QUILOMBOLA EM ESTUDO (SOBREPOSIÇÃO MANTIDA)*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-782

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 166738

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	25 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	25 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis trachyderma W; anolis transversalis; Bolitoglossa_caldwellae; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Lagothrix poeppigii; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; A CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; D CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; D CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; D QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; D QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; DA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAVARÍ-JURUÁ; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAVARÍ-JURUÁ; LD JAVARÍ-JURUÁ; LG JAVARÍ-JURUÁ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios

(Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Juruá; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Juruá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cen
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; A Quaternario Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Javarí-Juruá; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; D Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; D Quaternario Japurá-Purús; D Quaternario Javarí-Juruá; Da Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Javarí-Juruá; Db Quaternario Japurá-Purús; Db Quaternario Javarí-Juruá; Ld Javarí-Juruá; Lg Javarí-Juruá;
- *Interface Terra*-Água: Rio Juruá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE ENTRADA DE DROGAS E COMÉRCIO DE MADEIRA ILEGAL; A PRODUÇÃO DE FARINHA DE CRUZEIRO É BEM REPRESENTATIVO E ATUALMENTE FEITA DE FORMA PREDATÓRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA

- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: Cruzeiro do Sul é a 2° maior cidade do estado sendo um pólo populacional.*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-783

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 85684

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	20 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus baptista; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Mamuru; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Mamuru;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Rio Mamuru;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FAIXA PRÓXIMA DA UP MAIS AO NORTE, MARGEIAM A TI, VÃO ATÉ O LIMITE SUL DE MAUÉS.; ÚNICO BANCO GENÉTICO DE GUARANÁ NATIVO; USO DE AGROTÓXICO INFLUENCIANDO SAÚDE DA TI; ÚNICO BANCO GENÉTICO DE GUARANÁ NATIVO, SOFRENDO INFLUÊNCIA DE AGROTÓXICOS; POVO SATERA MAUÉ DOMESTICOU O GUARANÁ, TEM TIDO DIFICULDADE DEVIDO O LOBBY ECONÔMICO NA REGIÃO, INCENTIVADO PELO MUNICÍPIO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* EXTRAÇÃO DE GUARANÁ
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* ÁREA COM TI; COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO COM TERRITÓRIO QUILOMBOLA EM ESTUDO (SOBREPOSIÇÃO MANTIDA)*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-784

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 378337

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; anolis tandai; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Plecturocebus baptista; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; PAH MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Abacaxis; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maués-açu; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Abacaxis;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cretaceo Madeira-Tapajós; D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; Sa
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cretaceo Madeira-Tapajós; D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cretaceo Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós; Pah Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Floodplain Abacaxis; Rio Maués-açu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* FAIXA PRÓXIMA DA UP MAIS AO NORTE, MARGEIAM A TI, VÃO ATÉ O LIMITE SUL DE MAUÉS.; ÚNICO BANCO GENÉTICO DE GUARANÁ NATIVO; USO DE AGROTÓXICO INFLUENCIANDO SAÚDE DA TI; ÚNICO BANCO GENÉTICO DE GUARANÁ NATIVO, SOFRENDO INFLUÊNCIA DE AGROTÓXICOS; POVO SATERA MAUÉ DOMESTICOU O GUARANÁ, TEM TIDO DIFICULDADE DEVIDO O LOBBY ECONÔMICO NA REGIÃO, INCENTIVADO PELO MUNICÍPIO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* EXTRAÇÃO DE GUARANÁ
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* ÁREA COM TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-785

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 83743

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus RR; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; cnemidophorus lemniscatus RR; coleodactylus septentrionalis; gymnophthalmus leucomystax; gymnophthalmus vanzoi; kentropyx striata RR; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Ateles paniscus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS NEGRO-BRANCO; SA NEGRO-BRANCO; SP BRANCO-TROMBETA; SP NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera publifora Benth.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Branco; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Mucajaí; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uraricoera;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Negro-Branco; Sa Negro-Branco; Sp Branco-Trombeta; Sp Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* Fs Negro-Branco; Sa Negro-Branco; Sp Branco-Trombeta; Sp Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Branco;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* RECUPERAÇÃO DE APP EM ÁREA DE AGRICULTURA INTENSIVA EM ZONA DE CAMPOS NATURAIS (RIOS, LAGOS, VEREDAS); FORTALECIMENTO DA CADEIA NAS ÁREAS DA AGRICULTURA FAMILIAR; SUPORTE AO GARIMPO ILEGAL EM ÁREAS ADJACENTES
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: A UP 16673 É UMA CONFLUÊNCIA IMPORTANTE.*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-786

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 68901

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus RR; anolis planiceps; cnemidophorus lemniscatus RR; coleodactylus septentrionalis; gymnophthalmus leucomystax; gymnophthalmus vanzoi; kentropyx striata RR; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F BRANCO-TROMBETA; F NEGRO-BRANCO; FS BRANCO-TROMBETA; FS NEGRO-BRANCO; SG BRANCO-TROMBETA; SG NEGRO-BRANCO; SP BRANCO-TROMBETA; SP NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera publifora Benth.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Branco; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Tacutu; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uraricoera;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Branco-Trombeta; F Negro-Branco; Fs Branco-Trombeta; Fs Negro-Branco; Sg Branco-Trombeta; Sg Negro-Branco; Sp Branco-Trombeta; Sp Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* F Branco-Trombeta; F Negro-Branco; Fs Branco-Trombeta; Fs Negro-Branco; Sg Branco-Trombeta; Sg Negro-Branco; Sp Branco-Trombeta; Sp Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Branco; Rio Tacutu; Rio Uraricoera;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* RECUPERAÇÃO DE APP EM ÁREA DE AGRICULTURA INTENSIVA EM ZONA DE CAMPOS NATURAIS (RIOS, LAGOS, VEREDAS); FORTALECIMENTO DA CADEIA NAS ÁREAS DA AGRICULTURA FAMILIAR; SUPORTE AO GARIMPO ILEGAL EM ÁREAS ADJACENTES
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: A UP 16673 É UMA CONFLUÊNCIA IMPORTANTE.*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-787

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 42523

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cnemidophorus lemniscatus RR; gymnophthalmus vanzoi; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS BRANCO-TROMBETA; SG BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera publifora Benth.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Tacutu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Branco-Trombeta; Sg Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Fs Branco-Trombeta; Sg Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tacutu;

CARACTERIZAÇÃO

- *Características Gerais:* Recuperação de APP em área de agricultura intensiva em zona de campos naturais (rios, lagos, veredas); Fortalecimento da cadeia nas áreas da agricultura familiar; Suporte ao garimpo ilegal em áreas adjacentes
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas

- *Referências:*

- *Outras Observações: a UP 16673 é uma confluência importante.*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-788

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 954317

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; MONITORAMENTO E MANEJO: MADEIRA EMPRESARIAL

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	3 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Pithecia irrorata; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Acre; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Acre; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Purus;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Acre; Rio Purus;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÃO ÁREAS DE FAZENDAS COM CAR REALIZADOS E A SEREM VALIDADAS AO PASSO QUE O PRA FOI IMPLEMENTADO;; MONITORAR AS ATIVIDADES DO MANEJO FLORESTAL EMPRESARIAL NAS FAZENDAS QUE REALIZAM O MANEJO NAS RLS; HÁ QUE SE CONSIDERAR A CONECTIVIDADE DE RLS E APPS COM AS APS DO ENTORNO.DESMATAMENTOS ILEGAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-789

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 58133

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; MONITORAMENTO E MANEJO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lepidothrix_vilasboasi; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Mico leucippe; Sotalia fluviatilis; Ateles marginatus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Quaternario Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Quaternario Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tapajós;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MONITORAR AS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO (GARIMPO); ÁREA COM PRESSÃO AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO; GRANDE EMPREENDIMENTO (HIDRELÉTRICA); GARIMPO E AGROPECUÁRIA COMO ATIVIDADES ILEGAIS NESTAS ÁREAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-790

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 50790

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	0 ESPÉCIES
AVES	6 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:*
- *Aves:* Aburria_cujubi; Hylexetastes_uniformis; Lophornis_gouldii; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: C PARAGUAY; FA PARAGUAY; S PARAGUAY; SA PARAGUAY; SP PARAGUAY;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* C Paraguay; Fa Paraguay; S Paraguay; Sa Paraguay; Sp Paraguay;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* C Paraguay; Fa Paraguay; S Paraguay; Sa Paraguay; Sp Paraguay;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO DE CACHOEIRAS JÁ UTILIZADAS E ESPORTES RADICAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Gasoduto; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-791

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 35538

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	5 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; manciola guaporicola;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Hylexetastes_uniformis; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F PARAGUAY; FA PARAGUAY; S PARAGUAY; SP PARAGUAY;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Paraguay; Fa Paraguay; S Paraguay; Sp Paraguay;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* F Paraguay; Fa Paraguay; S Paraguay; Sp Paraguay;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO DE CACHOEIRAS JÁ UTILIZADAS E ESPORTES RADICAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-792

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 40485

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	1 ESPÉCIES
AVES	8 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Pyrrhura_perlata; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus septemcinctus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F PARAGUAY; FA PARAGUAY; FB PARAGUAY;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Paraguay; Fa Paraguay; Fb Paraguay;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* F Paraguay; Fa Paraguay; Fb Paraguay;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO DE CACHOEIRAS JÁ UTILIZADAS E ESPORTES RADICAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-793

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 520324

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	9 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: C PARAGUAY; F PARAGUAY; FA PARAGUAY; S PARAGUAY; SA PARAGUAY; SN PARAGUAY; SP PARAGUAY;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* C Paraguay; F Paraguay; Fa Paraguay; S Paraguay; Sa Paraguay; SN Paraguay; Sp Paraguay;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* C Paraguay; F Paraguay; Fa Paraguay; S Paraguay; Sa Paraguay; SN Paraguay; Sp Paraguay;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO DE CACHOEIRAS JÁ UTILIZADAS E ESPORTES RADICAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-794

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 571276

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	9 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; stenocercus albolineatus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Pyrrhura_perlata; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus septemcinctus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: C PARAGUAY; F PARAGUAY; FA PARAGUAY; FS PARAGUAY; S PARAGUAY; SA PARAGUAY; SN PARAGUAY; SP PARAGUAY;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* C Paraguay; F Paraguay; Fa Paraguay; Fs Paraguay; S Paraguay; Sa Paraguay; SN Paraguay; Sp Paraguay;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* C Paraguay; F Paraguay; Fa Paraguay; Fs Paraguay; S Paraguay; Sa Paraguay; SN Paraguay; Sp Paraguay;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO DE CACHOEIRAS JÁ UTILIZADAS E ESPORTES RADICAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; PCH/CGH

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO COM TERRITÓRIO QUILOMBOLA EM ESTUDO (SOBREPOSIÇÃO MANTIDA)*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-795

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 13977

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	8 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Psophia_dextralis; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ; PAA TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA

- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-796

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 120315

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	13 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ; SN TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São Manuel ou Teles Pires;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*

- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-797

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 33541

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	9 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Dendropsophus_cachimbo; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ; PAA TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Xingu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR

- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-798

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 37437

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	11 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ; PAA TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Xingu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*

- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-799

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 309755

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Dendropsophus_cachimbo; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Manissauá-miçu; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-800

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 254511

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; ON MADEIRA-TAPAJÓS; SN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Arinos; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São Manuel ou Teles Pires;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; ON Madeira-Tapajós; SN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Arinos;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-801

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 35921

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Manissauá-miçu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-802

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 660593

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	22 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	22 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; D CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; D PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; F MADEIRA-TAPAJÓS; F TAPAJÓS-XINGÚ; FS MADEIRA-TAPAJÓS; FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON MADEIRA-TAPAJÓS; ON TAPAJÓS-XINGÚ; PAA MADEIRA-TAPAJÓS; PAA TAPAJÓS-XINGÚ; SN MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Arinos; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Manissauá-miçu; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São Manuel ou Teles Pires;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Tapajós-Xingú; D Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Ce
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Tapajós-Xingú; D Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; F Madeira-Tapajós; F Tapajós-Xingú; Fs Madeira-Tapajós; Fs Tapajós-Xingú; ON Madeira-Tapajós; ON Tapajós-Xingú; Paa Madeira-Tapajós; Paa Tapajós-Xingú; SN Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio São Manuel ou Teles Pires;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE

ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-803

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 57714

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	3 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Manissauá-miçu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-804

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 46861

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* cercosaura eigenmanni; Dendropsophus_sarayacuensis; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Manissauá-miçu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Manissauá-miçu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-805

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 25568

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	20 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São Manuel ou Teles Pires;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-806

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 63588

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	20 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ; SN TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Manissauá-miçu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-807

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 66647

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	13 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Manissauá-miçu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Manissauá-miçu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-808

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 169502

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	20 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	14 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; F MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Apiacás; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São Manuel ou Teles Pires;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; F Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio São Manuel ou Teles Pires;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-809

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 30200

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	20 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FS TAPAJÓS-XINGÚ; SN TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Peixoto de Azevedo;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fs Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Fs Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Peixoto de Azevedo;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-810

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 166901

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	19 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; FS MADEIRA-TAPAJÓS; SA MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Apiacás;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Apiacás; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Fs Madeira-Tapajós; Sa Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Apiacás;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-811

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 220126

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Ateles marginatus; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ; PAA TAPAJÓS-XINGÚ; SN TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-812

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 113408

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	26 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; gonatodes eladioi; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_vilasboasi; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; F TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; LA TAPAJÓS-XINGÚ; LD TAPAJÓS-XINGÚ; LG TAPAJÓS-XINGÚ; LO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; La Tapajós-Xingú; Ld Tapajós-Xingú; Lg Tapajós-Xingú; LO Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; La Tapajós-Xingú; Ld Tapajós-Xingú; Lg Tapajós-Xingú; LO Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-815

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 103851

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	22 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	15 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados: Hassar shewellkeimi / Floodplain São Manoel;*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain São Manoel; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Apiacás;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-816

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 2040559

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	12 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	44 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	5 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	46 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; gonatodes eladioi; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_vilasboasi; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados: Rhinopetitia potamorhachia / Floodplain São Manoel;*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Ateles chamek; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; A CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; A PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; AS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; CS MADEIRA-TAPAJÓS; CS TAPAJÓS-XINGÚ; D*

Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; Ds Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Tapajós-Xingú; F Madeira-Tapajós; F Tapajós-Xingú; Fs Madeira-Tapajós; Fs Tapajós-Xingú; La Tapajós-Xingú; Ld Tapajós-Xingú; LO Tapajós-Xingú; ON Madeira-Tapajós; ON Tapajós-Xingú; S Madeira-Tapajós; S Tapajós-Xingú; Sa Madeira-Tapajós; Sa Tapajós-Xingú; SN Madeira-Tapajós; SN Tapajós-Xingú; SO Tapajós-Xingú;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain São Manoel; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Apiacás; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Peixoto de Azevedo; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São Benedito; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio São Manuel ou Teles Pires;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain São Manoel; Rio São Manuel ou Teles Pires; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Proterozoico Tapajós-Xingú; A Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; A Paleozoico Tapajós-Xingú; A Quaternario Madeira-Tapajós; A Quaternario Tapajós-Xingú; As Proterozoico Ma
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Proterozoico Tapajós-Xingú; A Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; A Paleozoico Tapajós-Xingú; A Quaternario Madeira-Tapajós; A Quaternario Tapajós-Xingú; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; As Quaternario Madeira-Tapajós; As Quaternario Tapajós-Xingú; Cs Madeira-Tapajós; Cs Tapajós-Xingú; D Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Quaternario Madeira-Tapajós; D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú; Ds Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Tapajós-Xingú; F Madeira-Tapajós; F Tapajós-Xingú; Fs Madeira-Tapajós; Fs Tapajós-Xingú; La Tapajós-Xingú; Ld Tapajós-Xingú; LO Tapajós-Xingú; ON Madeira-Tapajós; ON Tapajós-Xingú; S Madeira-Tapajós; S Tapajós-Xingú; Sa Madeira-Tapajós; Sa Tapajós-Xingú; SN Madeira-Tapajós; SN Tapajós-Xingú; SO Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain São Manoel; Rio Apiacás; Rio Peixoto de Azevedo; Rio São Benedito; Rio São Manuel ou Teles Pires;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* CORREDOR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; PCH/CGH; UHE; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRA

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações: Sobreposição de bordas da UP (<5%) com área militar*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-817

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 27807

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus RR; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; cnemidophorus lemniscatus RR; coleodactylus septentrionalis; Dendrobates_leucomelas; gymnophthalmus leucomystax; gymnophthalmus vanzoi; kentropyx striata RR; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FA NEGRO-BRANCO; FS NEGRO-BRANCO; SA NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uraricoera;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fa Negro-Branco; Fs Negro-Branco; Sa Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Fa Negro-Branco; Fs Negro-Branco; Sa Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Rio Uraricoera;

CARACTERIZAÇÃO

- *Características Gerais:* Agricultura e pecuária em campos naturais; Caça; Apoio ao garimpo; Degradação em APP.
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-818

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 24606

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	16 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus RR; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; cnemidophorus lemniscatus RR; coleodactylus septentrionalis; Dendrobates_leucomelas; gymnophthalmus leucomystax; gymnophthalmus vanzoi; kentropyx striata RR; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; FA NEGRO-BRANCO; FM NEGRO-BRANCO; FS NEGRO-BRANCO; SA NEGRO-BRANCO; SP NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uraricoera;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Uraricoera; Ds Proterozoico Negro-Branco; Fa Negro-Branco; Fm Negro-Branco; Fs Negro-Branco; Sa Negro-Branco; Sp Negro-Branco;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Ds Proterozoico Negro-Branco; Fa Negro-Branco; Fm Negro-Branco; Fs Negro-Branco; Sa Negro-Branco; Sp Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* AGRICULTURA E PECUÁRIA EM CAMPOS NATURAIS; CAÇA; APOIO AO GARIMPO; DEGRADAÇÃO EM APP.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-819

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 73506

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Mico marcai; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Marmelos; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Marmelos;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Db Proterozoico Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Db Proterozoico Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Marmelos;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO AO LONGO DA TRANSAMAZÔNICA. ZONA DE ALTO INTERESSE BIOLÓGICO E ECOLÓGICO, CONTATO ENTRE ECOSSISTEMAS DE SAVANA E FLORESTAS, ONDE O ARCO DO DESMATAMENTO E ATIVIDADES DEGRADANTES ILEGAIS ESTÃO AVANÇANDO.; REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ILEGAIS QUE OCORREM NA ÁREA; GESTÃO INTEGRADA ENTRE UCS, TIS, ASSENTAMENTOS; GARIMPO, EXTRAÇÃO DE MINÉRIO, DESMATAMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-820

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 57618

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Mico manicorensis; Mico marcai; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Manicoré; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Marmelos; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Manicoré; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Marmelos;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO AO LONGO DA TRANSAMAZÔNICA. ZONA DE ALTO INTERESSE BIOLÓGICO E ECOLÓGICO, CONTATO ENTRE ECOSSISTEMAS DE SAVANA E FLORESTAS, ONDE O ARCO DO DESMATAMENTO E ATIVIDADES DEGRADANTES ILEGAIS ESTÃO AVANÇANDO.; REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ILEGAIS QUE OCORREM NA ÁREA; GESTÃO INTEGRADA ENTRE UCS, TIS, ASSENTAMENTOS; GARIMPO, EXTRAÇÃO DE MINÉRIO, DESMATAMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-821

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 60873

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	5 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Mico marcai; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Aripuanã; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Manicoré; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Manicoré; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Manicoré; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Roosevelt;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Proterozoico Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Proterozoico Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Aripuanã; Rio Manicoré; Rio Roosevelt;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO AO LONGO DA TRANSAMAZÔNICA. ZONA DE ALTO INTERESSE BIOLÓGICO E ECOLÓGICO, CONTATO ENTRE ECOSSISTEMAS DE SAVANA E FLORESTAS, ONDE O ARCO DO DESMATAMENTO E ATIVIDADES DEGRADANTES ILEGAIS ESTÃO AVANÇANDO.; REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ILEGAIS QUE OCORREM NA ÁREA; GESTÃO INTEGRADA ENTRE UCS, TIS, ASSENTAMENTOS; GARIMPO, EXTRAÇÃO DE MINÉRIO, DESMATAMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-822

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 86556

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Mico chrysoleucus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; SP MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Aripuanã; A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapa
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Paleozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós; Sp Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO AO LONGO DA TRANSAMAZÔNICA. ZONA DE ALTO INTERESSE BIOLÓGICO E ECOLÓGICO, CONTATO ENTRE ECOSSISTEMAS DE SAVANA E FLORESTAS, ONDE O ARCO DO DESMATAMENTO E ATIVIDADES DEGRADANTES ILEGAIS ESTÃO AVANÇANDO.; REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ILEGAIS QUE OCORREM NA ÁREA; GESTÃO INTEGRADA ENTRE UCS, TIS, ASSENTAMENTOS; GARIMPO, EXTRAÇÃO DE MINÉRIO, DESMATAMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-823

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 234089

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	14 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	14 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; D CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PA MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos);

Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Marmelos; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Marmelos;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Pa Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO AO LONGO DA TRANSAMAZÔNICA. ZONA DE ALTO INTERESSE BIOLÓGICO E ECOLÓGICO, CONTATO ENTRE ECOSSISTEMAS DE SAVANA E FLORESTAS, ONDE O ARCO DO DESMATAMENTO E ATIVIDADES DEGRADANTES ILEGAIS ESTÃO AVANÇANDO.; REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ILEGAIS QUE OCORREM NA ÁREA; GESTÃO INTEGRADA ENTRE UCS, TIS, ASSENTAMENTOS; GARIMPO, EXTRAÇÃO DE MINÉRIO, DESMATAMENTO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*

- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Próximo a TI
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: Sobreposição de bordas da UP (<5%) com área militar*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-824

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 29295

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes eladioi; gonatodes nascimentoi S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Procnias_albus_wallacei; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Itacaiúnas;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Itacaiúnas;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA PELO LAGO DA UHE TUCURUÍ, LAGO CIRCUNDADO POR TIS, ASSENTAMENTOS DA DÉCADA DE 7, INCLUINDO MÉDIOS E GRANDES PRODUTORES RURAIS. EM CONSEQUÊNCIA, ALTA PRESSÃO DE DESMATAMENTO E DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS. APESAR DO CENÁRIO, HÁ POPULAÇÕES COM MODO DE VIDA TRADICIONAL, COMO PESCADORES ARTESANAIS, QUE DEMANDAM ORDENAMENTO PARA USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS.; ORDENAMENTO PARA USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS.; ALTA PRESSÃO DE DESMATAMENTO E DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA ARTESANAL
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI; COMUNIDADES TRADICIONAIS COMO PESCADORES ARTESANAIS
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-825

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 150863

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tocantins;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA PELO LAGO DA UHE TUCURUÍ, LAGO CIRCUNDADO POR TIS, ASSENTAMENTOS DA DÉCADA DE 7, INCLUINDO MÉDIOS E GRANDES PRODUTORES RURAIS. EM CONSEQUÊNCIA, ALTA PRESSÃO DE DESMATAMENTO E DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS. APESAR DO CENÁRIO, HÁ POPULAÇÕES COM MODO DE VIDA TRADICIONAL, COMO PESCADORES ARTESANAIS, QUE DEMANDAM ORDENAMENTO PARA USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS.; ORDENAMENTO PARA USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS.; ALTA PRESSÃO DE DESMATAMENTO E DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA ARTESANAL
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI; COMUNIDADES TRADICIONAIS COMO PESCADORES ARTESANAIS
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-826

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 649833

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	12 ESPÉCIES
AVES	38 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	3 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes eladioi; gonatodes nascimentoi S; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Dendrocolaptes_retentus; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Procnias_albus_wallacei; Psophia_interjecta; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Aguarunichthys tocantinsensis / Floodplain Tocantins; Mylesinus paucisquamatus / Floodplain Tocantins; Roestes itupiranga / Floodplain Tocantins;*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;

- *Ambientes Terrestres: A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tocantins-Meari; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Tocantins-Meari; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tocantins; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Itacaiúnas; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tocantins-Meari; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Tocantins-Meari; Ds Prot
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tocantins-Meari; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Tocantins-Meari; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tocantins; Rio Itacaiúnas;

Caracterização

- *Características Gerais:* Área de influência direta e indireta pelo Lago da UHE Tucuruí, lago circundado por TIs, Assentamentos da década de 7, incluindo médios e grandes produtores rurais. Em consequência, alta pressão de desmatamento e de exploração dos recursos naturais. Apesar do cenário, há populações com modo de vida tradicional, como pescadores artesanais, que demandam ordenamento para uso sustentável dos recursos.; ordenamento para uso sustentável dos recursos.; alta pressão de desmatamento e de exploração dos recursos naturais
- *Usos Sustentáveis:* Pesca artesanal
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia; Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Próximo a TI; Comunidades tradicionais como pescadores artesanais
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Gasoduto; Mineração com até 50ha de área; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (montante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-827

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 41683

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	28 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Pacajá; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA PELO LAGO DA UHE TUCURUÍ, LAGO CIRCUNDADO POR TIS, ASSENTAMENTOS DA DÉCADA DE 7, INCLUINDO MÉDIOS E GRANDES PRODUTORES RURAIS. EM CONSEQUÊNCIA, ALTA PRESSÃO DE DESMATAMENTO E DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS. APESAR DO CENÁRIO, HÁ POPULAÇÕES COM MODO DE VIDA TRADICIONAL, COMO PESCADORES ARTESANAIS, QUE DEMANDAM ORDENAMENTO PARA USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS.; ORDENAMENTO PARA USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS.; ALTA PRESSÃO DE DESMATAMENTO E DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA ARTESANAL
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI; COMUNIDADES TRADICIONAIS COMO PESCADORES ARTESANAIS
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-828

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 46541

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis guianense S; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; DS CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Tocantins-Meari; Ds Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA PELO LAGO DA UHE TUCURUÍ, LAGO CIRCUNDADO POR TIS, ASSENTAMENTOS DA DÉCADA DE 7, INCLUINDO MÉDIOS E GRANDES PRODUTORES RURAIS. EM CONSEQUÊNCIA, ALTA PRESSÃO DE DESMATAMENTO E DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS. APESAR DO CENÁRIO, HÁ POPULAÇÕES COM MODO DE VIDA TRADICIONAL, COMO PESCADORES ARTESANAIS, QUE DEMANDAM ORDENAMENTO PARA USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS.; ORDENAMENTO PARA USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS.; ALTA PRESSÃO DE DESMATAMENTO E DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA ARTESANAL
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI; COMUNIDADES TRADICIONAIS COMO PESCADORES ARTESANAIS
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-829

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 61232

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes nascimentoi S; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA PELO LAGO DA UHE TUCURUÍ, LAGO CIRCUNDADO POR TIS, ASSENTAMENTOS DA DÉCADA DE 7, INCLUINDO MÉDIOS E GRANDES PRODUTORES RURAIS. EM CONSEQUÊNCIA, ALTA PRESSÃO DE DESMATAMENTO E DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS. APESAR DO CENÁRIO, HÁ POPULAÇÕES COM MODO DE VIDA TRADICIONAL, COMO PESCADORES ARTESANAIS, QUE DEMANDAM ORDENAMENTO PARA USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS.; ORDENAMENTO PARA USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS.; ALTA PRESSÃO DE DESMATAMENTO E DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA ARTESANAL
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI; COMUNIDADES TRADICIONAIS COMO PESCADORES ARTESANAIS
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-830

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 564181

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.); MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (IDENTIFICAR PRIORIDADES)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	40 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	12 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	27 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	18 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	4 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	18 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes nascimentoi S; Loxopholis guianense S; Proceratophrys_concavitympanum; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Dendrocolaptes_retentus; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_brigidai; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Baryancistrus longipinnis / Lower Tocantins floodplain; Baryancistrus longipinnis / Rio Guamá; Baryancistrus niveatus / Lower Tocantins floodplain; Baryancistrus niveatus / Rio Guamá; Brycon gouldingi / Rio Guamá; Crenicichla cyclostoma / Lower Tocantins*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis;

Chiropotes satanas; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;

- *Ambientes Terrestres: D Proterozoico Tocantins-Meari; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Tocantins-Meari; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Da Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Terciario Litora Xingú-Araguaia; Db Proterozoico Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Tocantins-Meari; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Terciario Litora Tocantins-Meari; La Tocantins-Meari;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tocantins; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Lower Tocantins floodplain; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Guamá; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Tocantins-Meari; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Tocantins-Meari; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Da Pr

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Tocantins-Meari; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cretaceo Tocantins-Meari; D Cretaceo Xingú-Araguaia; D Quaternario Tocantins-Meari; D Quaternario Xingú-Araguaia; D Terciario Litora Tocantins-Meari; D Terciario Litora Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tocantins-Meari; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Da Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Terciario Litora Xingú-Araguaia; Db Proterozoico Xingú-Araguaia; Db Cretaceo Tocantins-Meari; Db Cretaceo Xingú-Araguaia; Db Terciario Litora Tocantins-Meari; La Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tocantins; Lower Tocantins floodplain; Rio Guamá; Rio Pacajá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA PELO LAGO DA UHE TUCURUÍ, LAGO CIRCUNDADO POR TIS, ASSENTAMENTOS DA DÉCADA DE 7, INCLUINDO MÉDIOS E GRANDES PRODUTORES RURAIS. EM CONSEQUÊNCIA, ALTA PRESSÃO DE DESMATAMENTO E DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS. APESAR DO CENÁRIO, HÁ POPULAÇÕES COM MODO DE VIDA TRADICIONAL, COMO PESCADORES ARTESANAIS, QUE DEMANDAM ORDENAMENTO PARA USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS.; ORDENAMENTO PARA USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS.; ALTA PRESSÃO DE DESMATAMENTO E DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA ARTESANAL
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI; COMUNIDADES TRADICIONAIS COMO PESCADORES ARTESANAIS
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE); FRAGMENTAÇÃO DE R

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-831

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 28636

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): COMITÊS DE BACIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	5 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F TAPAJÓS-XINGÚ; FS TAPAJÓS-XINGÚ; ON TAPAJÓS-XINGÚ; SN TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* F Tapajós-Xingú; Fs Tapajós-Xingú; ON Tapajós-Xingú; SN Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Xingu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: VERIFICAR A MESMA DINÂMICA QUE OCORRE NA PORÇÃO PARAENSE DA TI XINGU*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-832

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 124330

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORREDORES ECOLÓGICOS E TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: CORREDOR ECOLÓGICO (DE ACORDO COM O SNUC)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): COMITÊS DE BACIA

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	2 ESPÉCIES
AVES	7 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	14 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	14 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Psophia_dextralis; Pyrrhura_anerythra; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta azarae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Alouatta caraya; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F TAPAJÓS-XINGÚ; F XINGÚ-ARAGUAIA; FA XINGÚ-ARAGUAIA; FS TAPAJÓS-XINGÚ; FS XINGÚ-ARAGUAIA; ON TAPAJÓS-XINGÚ; ON XINGÚ-ARAGUAIA; PAA XINGÚ-ARAGUAIA; S TAPAJÓS-XINGÚ; S XINGÚ-ARAGUAIA; SA TAPAJÓS-XINGÚ; SA XINGÚ-ARAGUAIA; SN TAPAJÓS-XINGÚ; SN XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Tapajós-Xingú; F Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; Fs Tapajós-Xingú; Fs Xingú-Araguaia; ON Tapajós-Xingú; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; S Tapajós-Xingú; S Xingú-Araguaia; Sa Tapajós-Xingú; Sa Xingú-Araguaia; SN Tapajós-Xingú; SN Xingú-Araguaia
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* F Tapajós-Xingú; F Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia; Fs Tapajós-Xingú; Fs Xingú-Araguaia; ON Tapajós-Xingú; ON Xingú-Araguaia; Paa Xingú-Araguaia; S Tapajós-Xingú; S Xingú-Araguaia; Sa Tapajós-Xingú; Sa Xingú-Araguaia; SN Tapajós-Xingú; SN Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água: Rio Xingu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: VERIFICAR A MESMA DINÂMICA QUE OCORRE NA PORÇÃO PARAENSE DA TI XINGU*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-838

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 231176

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO: MADEIRA EMPRESARIAL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	18 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	18 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; A CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; A QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Inauini; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Purus; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Purus;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Japurá-Purús; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Japurá-Purús; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Japurá-Purús; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Japurá-Purús; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Japurá-Purús; Ab Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Inauini; Rio Purus;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* MONITORAMENTO DO MOGNO (MANEJO).
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-839

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 47134

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	12 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	12 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis transversalis; Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; A CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Acre; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Acre;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madei
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Abunã; Rio Acre;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-840

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 148470

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	13 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; manciola guaporicola; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Psophia_interjecta; Pyrrhura_anerythra; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Alouatta caraya; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; FA XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; Fa Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS DEGRADADAS E CONSOLIDADAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-841

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 90448

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	17 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allophryne_ruthveni; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hylexetastes_brigidai; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Fresco;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS DEGRADADAS E CONSOLIDADAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-842

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 29173

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Psophia_interjecta; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes utahickae; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: SA XINGÚ-ARAGUAIA; SG XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Sa Xingú-Araguaia; Sg Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Sa Xingú-Araguaia; Sg Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;

- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS DEGRADADAS E CONSOLIDADAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-843

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 247413

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Hylexetastes_brigidai; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; ON XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pau-d`arco;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; ON Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS DEGRADADAS E CONSOLIDADAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-844

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 84175

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	18 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Penelope_pileata; Psophia_interjecta; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Chiropotes utahickae; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Saguinus niger; Sapajus libidinosus; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; SP XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pau-d`arco;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; Sp Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS DEGRADADAS E CONSOLIDADAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-845

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 181326

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	22 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes eladioi; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Baryancistrus niveatus / Floodplain Araguaia;*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Sapajus libidinosus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; A CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D CENOZOICO TERC2 XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Araguaia;
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; A Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Cenozoico Terc2 Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS DEGRADADAS E CONSOLIDADAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-846

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 92278

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes eladioi; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Procnias_albus_wallacei; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Itacaiúnas;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS DEGRADADAS E CONSOLIDADAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-847

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 205616

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	20 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Guaruba_guarouba; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta leporina; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI; F TOCANTINS-MEARI; P TOCANTINS-MEARI; S TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tocantins;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; F Tocantins-Meari; P Tocantins-Meari; S Tocantins-Meari;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari; F Tocantins-Meari; P Tocantins-Meari; S Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS MUITO DEGRADADAS E COM GRANDES EMPRESAS DE CELULOSE
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; FERROVIAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-848

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 94002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	2 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Contopus_nigrescens; Crax_fasciolata_pinima; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; AS CRETACEO TOCANTINS-MEARI; D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D CRETACEO TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera marti Hayne); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*

- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; As Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; As Cretaceo Tocantins-Meari; D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Cretaceo Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS DEGRADADAS E COM OCORRÊNCIA DE CARVOARIAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; FERROVIAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-849

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 30317

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	33 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus PA; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus

dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá-uná;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cretaceo Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cretaceo Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE SOJA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: COMENTÁRIOS SOBRE ATIVIDADES DE CAMPO DA FUNAI NA ÁREA - POSSÍVEIS ISOLADOS (?); SOBREPOSIÇÃO COM PAE COM/INCRA (?)*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-850

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 59591

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	33 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus PA; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DB CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DB CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá-una; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Curuá-una;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Curuá-una;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE SOJA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: COMENTÁRIOS SOBRE ATIVIDADES DE CAMPO DA FUNAI NA ÁREA - POSSÍVEIS ISOLADOS (?); SOBREPOSIÇÃO COM PAE COM/INCRA (?)*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-851

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 191762

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	1 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; arthrosaura kockii S; Bolitoglossa_paraensis; Chiasmocleis_avilapireae; stenocercus dumerilii;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Dendrexetastes_rufigula_paraensis; Dendrocolaptes_medius; Dendrocolaptes_merula_badia; Granatellus_pelzelni; Guaruba_guarouba; Hylopezus_paraensis; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_paraensis; Piculus_paraensis; Piprites_chloris_grisescens; Polioptila_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_coerulescens; Sporophila_schistacea; Tangara_velia_signata; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus kaapori; Chironectes minimus; Dasyprocta prymnolopha; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia araguaiaensis; Trichechus inunguis; Chiropotes satanas; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; D TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; DA CENOZOICO TERC2 TOCANTINS-MEARI; DA TERCIARIO LITORA TOCANTINS-MEARI; PF TOCANTINS-MEARI;*
- *Manguezais:* Manguezais;

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera duckei Dwyer); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta South; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta South; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta South;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Da Terciario Litora Tocantins-Meari; Pf Tocantins-Meari;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; D Terciario Litora Tocantins-Meari; Da Cenozoico Terc2 Tocantins-Meari; Da Terciario Litora Tocantins-Meari; Pf Tocantins-Meari;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta South; Rio Guamá;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS PERIURBANAS COM FLORESTAS E NASCENTES, CONFLITOS FUNDIÁRIOS, ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA E RETIRADA DE RECURSOS MINERAIS DE FORMA IRREGULAR. TERRITÓRIO REIVINDICADO POR GRUPOS QUILOMBOLAS E REMANESCENTES DE QUILOMBOSCONFLITOS FUNDIÁRIOS, ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA E RETIRADA DE RECURSOS MINERAIS DE FORMA IRREGULAR
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE QUILOMBOLA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações: Entorno de território quilombola titulado (sobreposição eliminada)*
- *Presença de sítio Baze: RPPN Reserva Klagesi (Id 144)*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-854

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 2026

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE UC DE USO SUSTENTÁVEL

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	0 ESPÉCIES
AVES	5 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	2 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	1 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	1 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	0 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	0 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:*
- *Aves:* Lophornis_gouldii; Malacoptila_striata; Piculus_paraensis; Pteroglossus_bitorquatus_bitorquatus; Pyrrhura_coerulescens;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta prymnolopha;
- *Ambientes Terrestres:*
- *Manguezais:* Manguezais;
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:*
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:*
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGIÃO HABITADA ESSENCIALMENTE POR COMUNIDADES PESCADORAS, IMPACTADA POR EMPREENDIMENTOS PORTUÁRIOS E PELA PROXIMIDADE DE SÃO LUÍS, QUE NECESSITA MAIOR CONTROLE E FISCALIZAÇÃOEMPREENDIMENTOS PORTUÁRIOS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* PESCA ARTESANAL
- *OPORTUNIDADES:* ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA)
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADE PESCADORES
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* ; DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ; ESTRADAS MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-855

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 59966

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	33 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Mico leucippe; Sotalia fluviatilis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jamaxim;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS PRÓXIMAS A BR-163 E VIZINHA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: SOBREPOSIÇÃO DE BORDAS DA UP (<5%) COM ÁREA MILITAR*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-856

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 18629

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	33 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Mico leucippe; Sotalia fluviatilis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus

dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS PRÓXIMAS A BR-163 E VIZINHA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-857

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 66387

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados: Hopliancistrus tricornis / Floodplain Tapajós;*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; A PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DB CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DB PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Tapajós; A Proterozoico Tapajós-Xingú; A Paleozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Paleozoico Tapajós-Xingú; Ds
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; A Paleozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Paleozoico Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE AGRICULTURA FAMILIAR (ASSENTAMENTOS) AO LONGO DA BR-23 BASTANTE DEGRADADA (EFEITO ESPINHA DE PEIXE)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* AGRICULTURA FAMILIAR
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-858

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 94757

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; D PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá-uná;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE AGRICULTURA FAMILIAR (ASSENTAMENTOS) AO LONGO DA BR-23 BASTANTE DEGRADADA (EFEITO ESPINHA DE PEIXE)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* AGRICULTURA FAMILIAR
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-859

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 244455

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS; REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	33 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	15 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	15 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; A PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; D PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DB CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DB CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DB PALEOZOICO*

Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá-uná;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cretaceo Tapajós-Xingú; A Paleozoico Tapajós-Xingú; As Cretaceo Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Cretaceo Tapajós-Xingú; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Db Ce
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cretaceo Tapajós-Xingú; A Paleozoico Tapajós-Xingú; As Cretaceo Tapajós-Xingú; As Paleozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Cretaceo Tapajós-Xingú; D Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Cretaceo Tapajós-Xingú; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Paleozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Cretaceo Tapajós-Xingú; Ds Paleozoico Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Curuá-uná;

Caracterização

- *Características Gerais:* Área de agricultura familiar (Assentamentos) ao longo da BR-23 bastante degradada (efeito espinha de peixe)
- *Usos Sustentáveis:* Agricultura familiar
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (montante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-860

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 45897

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB PROTEROZOICO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Ituxi;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Proterozoico Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Proterozoico Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Ituxi;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* OCORRÊNCIA DE ECOSSISTEMA FRÁGIL E ENDÊMICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, OS CAMPOS DE UMIRIZAL. ESTA ÁREA SOFRERÁ IMPACTO DO RESERVATÓRIO DA UHE RIBEIRÃO POTENCIALMENTE DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (AUMENTO DE COTA), DA BR 364 (SENTIDO ACRE) E DA FERROVIA INTERNACIONAL BIOCEÂNICA TRANSAMAZÔNICA, E ESTÁ NO TRAJETO DA NOVA RODOVIA SAÍDA PARA TRANSPACÍFICA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-861

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 44685

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons albifrons; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; A CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Acre; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Acre;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Mad
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Acre;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-862

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 34522

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	10 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; LB PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Acre; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Sepatini; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Acre;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Made
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Lb Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Acre;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-863

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 29144

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; LB PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Sepatini; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Sepatini;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Lb Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Lb Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-864

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 263019

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	27 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes eladioi; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phlegopsis_nigromaculata_confinis; Polioptila_paraensis; Psophia_interjecta; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Itacaiúnas;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE MINERAÇÃO; PRÓXIMA DE TI E ÁREA COM ASSENTAMENTO; É UMA GRANDE ÁREA COM EXPANSÃO DE MINERAÇÃO QUE NECESSITA SER FISCALIZADA PARA QUE NÃO OCORRA ATIVIDADES ILEGAISMINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-865

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 62420

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	27 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes eladioi; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Procnias_albus_wallacei; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Xingu; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Itacaiúnas;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE MINERAÇÃO; PRÓXIMA DE TI E ÁREA COM ASSENTAMENTO; É UMA GRANDE ÁREA COM EXPANSÃO DE MINERAÇÃO QUE NECESSITA SER FISCALIZADA PARA QUE NÃO OCORRA ATIVIDADES ILEGAISMINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-866

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 70579

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	15 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Mico acariensis; Mico chrysoleucus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus);

Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Aripuanã; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Canumã; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Canumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; As Cretaceo Madeira-Tapajós; As Paleozoico Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Cretaceo Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações: Estrada de terra entre Apuí e Novo Aripuanã*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-867

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 62354

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	27 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes eladioi; gonatodes nascimentoi S; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Procnias_albus_wallacei; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Bacajá;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA DE MINERAÇÃO; PRÓXIMA DE TI E ÁREA COM ASSENTAMENTO; É UMA GRANDE ÁREA COM EXPANSÃO DE MINERAÇÃO QUE NECESSITA SER FISCALIZADA PARA QUE NÃO OCORRA ATIVIDADES ILEGAISMINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRÓXIMO A TI
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-868

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 62626

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE;

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	16 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis phyllorhinus; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Mico chrysoleucus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Aripuanã; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Canumã;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Aripuanã; Rio Canumã;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:*
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: ESTRADA DE TERRA ENTRE APUÍ E NOVO ARIPUANÃ*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-869

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 167234

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA); RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; enyalioides laticeps; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; D PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; SO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Rio Jiparaná ou Machado; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; D Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; SO Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jiparaná ou Machado;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA MUITO CONSOLIDADA E CORTADA PELA BR 364 E LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-870

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 73219

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	14 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_nidicola; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Hydrolaetare_capuru; Phyllomedusa_atelopoides; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PA MADEIRA-TAPAJÓS; PA PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos);

Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jiparaná ou Machado; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Jiparaná ou Machado; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Purús-
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Aa Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Purús-Madeira; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Purús-Madeira; Pa Madeira-Tapajós; Pa Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Jiparaná ou Machado; Floodplain Madeira; Rio Jamari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREA MUITO IMPACTADA E GRANDE INVASÃO DE TERRA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-871

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 13885

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_cachimbo; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lepidothrix_vilasboasi; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Mico leucippe; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; SP MADEIRA-TAPAJÓS; SP TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Sp Madeira-Tapajós; Sp Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Sp Madeira-Tapajós; Sp Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tapajós;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* EIXO AO LONGO DA TRANSAMAZONICA E ATIVIDADE MINERADORA INTENSA NO LEITO E PRÓXIMO AO LEITO DO RIO TAPAJÓS. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA EM EXPANSÃO AO LONGO DA TRANSAMAZONICA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações: Fichas 32 e 33 foram unificadas, atribuindo-se a mesma identidade da área (32).*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-872

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 14252

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lepidothrix_vilasboasi; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Mico leucippe; Sotalia fluviatilis; Ateles marginatus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DS QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Crepori;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Tapajós; Rio Crepori; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Quaternario Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Quaternario Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tapajós; Rio Crepori;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* EIXO AO LONGO DA TRANSAMAZONICA E ATIVIDADE MINERADORA INTENSA NO LEITO E PRÓXIMO AO LEITO DO RIO TAPAJÓS. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA EM EXPANSÃO AO LONGO DA TRANSAMAZONICA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA; VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações: Fichas 32 e 33 foram unificadas, atribuindo-se a mesma identidade da área (32).*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-873

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 83219

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lepidothrix_vilasboasi; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Mico leucippe; Sotalia fluviatilis; Ateles marginatus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO MADEIRA-*

Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Tapajós-Xingú;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera glycycarpa Ducke); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Quaternari
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Quaternario Madeira-Tapajós; Ds Quaternario Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tapajós;

Caracterização

- *Características Gerais:* Eixo ao longo da Transamazonica e atividade mineradora intensa no leito e próximo ao leito do Rio Tapajós. Atividade agropecuária em expansão ao longo da Transamazonica.
- *Usos Sustentáveis:*
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa);Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:*
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação; Fragmentação de rios (jusante de UHE)

- *Referências:*

- *Outras Observações: Fichas 32 e 33 foram unificadas, atribuindo-se a mesma identidade da área (32); Sobreposição de bodas da UP (<5%) com área militar*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-874

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 13367

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	29 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; gonatodes tapajonicus;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Mico leucippe; Sotalia fluviatilis; Ateles marginatus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tapajós;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* EIXO AO LONGO DA TRANSAMAZONICA E ATIVIDADE MINERADORA INTENSA NO LEITO E PRÓXIMO AO LEITO DO RIO TAPAJÓS. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA EM EXPANSÃO AO LONGO DA TRANSAMAZONICA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações: Fichas 32 e 33 foram unificadas, atribuindo-se a mesma identidade da área (32); Sobreposição de bodas da UP (<5%) com área militar*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-875

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 29235

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	21 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus PA; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; D PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PALEOZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DS CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DS PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus

dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Paleozoico M
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Madeira-Tapajós; Da Paleozoico Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Paleozoico Madeira-Tapajós; Ds Cretaceo Madeira-Tapajós; Ds Paleozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tapajós;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* EIXO AO LONGO DA TRANSAMAZONICA E ATIVIDADE MINERADORA INTENSA NO LEITO E PRÓXIMO AO LEITO DO RIO TAPAJÓS. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA EM EXPANSÃO AO LONGO DA TRANSAMAZONICA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*

- *Outras Observações: Fichas 32 e 33 foram unificadas, atribuindo-se a mesma identidade da área (32).*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-876

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 52469

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	22 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; D PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; D QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB PALEOZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Paleozoico Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Madeira-Tapajós; D Paleozoico Madeira-Tapajós; D Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Paleozoico Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tapajós;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* EIXO AO LONGO DA TRANSAMAZONICA E ATIVIDADE MINERADORA INTENSA NO LEITO E PRÓXIMO AO LEITO DO RIO TAPAJÓS. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA EM EXPANSÃO AO LONGO DA TRANSAMAZONICA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES: FICHAS 32 E 33 FORAM UNIFICADAS, ATRIBUINDO-SE A MESMA IDENTIDADE DA ÁREA (32).*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-877

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 24738

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	33 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Mico leucippe; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Ateles marginatus; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; PAA TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Tapajós; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Tapajós;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Db Quaternario Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Madeira-Tapajós; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Db Quaternario Tapajós-Xingú; Paa Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Tapajós;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* EIXO AO LONGO DA TRANSAMAZONICA E ATIVIDADE MINERADORA INTENSA NO LEITO E PRÓXIMO AO LEITO DO RIO TAPAJÓS. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA EM EXPANSÃO AO LONGO DA TRANSAMAZONICA.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações: Fichas 32 e 33 foram unificadas, atribuindo-se a mesma identidade da área (32).*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-878

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 142497

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA); RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	21 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis tandai; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; DB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Mamuru; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Mamuru;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Db Quaternario Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* COMO TEM MUITA ÁREA ANTROPIZADA É NECESSÁRIO REGULAMENTAR AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS; POSSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO MADEIREIRA E AGROPECUÁRIA NÃO LICENCIADA; ALGUMAS ÁREAS DESMATADAS POR QUEIMADAS E APPS DESMATADAS
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-879

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 18186

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA); RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; amapasaurus tetradactylus; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; arthrosaura kockii N; Atelopus_hoogmoedi; gonatodes nascimentoi N; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus castaneus; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Neusticomys oyapocki; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; D QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; D TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZON; DB PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DB QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DB TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZO; DS PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DS QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta North;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Ds Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Ds Quaternario Jarí-Fo
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Ds Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Ds Quaternario Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North; Rio Araguari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAR AS ATIVIDADES MADEIREIRAS/MINERAIS; RECUPERAR AS ÁREAS ANTROPIZADAS; EXTRAÇÃO MADEIREIRA E DE MINÉRIO (GARIMPO/MINERAÇÃO) ILEGAL; CAÇA DE ANIMAIS SILVESTRES
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; FERROVIAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-880

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 63738

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA); RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	3 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; arthrosaura kockii N; Atelopus_hoogmoedi; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Cebus olivaceus castaneus; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Neusticomys oyapocki; Trichechus manatus; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; D QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; D TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZON; PA JARÍ-FOZ AMAZON; PAA JARÍ-FOZ AMAZON; PAH JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta North;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Pa Jarí-Foz Amazon; Paa Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz Amazon;

- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Aa Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Pa Jarí-Foz Amazon; Paa Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North; Rio Araguari;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAR AS ATIVIDADES FLORESTAIS E AGROPECUÁRIAS; EXPLORAÇÃO MADEIREIRA; AGRONEGÓCIO NÃO LICENCIADO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-882

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 89011

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA); RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	0 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; arthrosaura kockii N; Atelopus_hoogmoedi; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus castaneus; Chironectes minimus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Neusticomys oyapocki; Trichechus manatus; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; D TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZON; DA PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DA TERCIARIO LITORA JARÍ-FOZ AMAZO; DB PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; PAA JARÍ-FOZ AMAZON; PAH JARÍ-FOZ AMAZON; S JARÍ-FOZ AMAZON; SP JARÍ-FOZ AMAZON;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:*
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Da Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Da Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Paa Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz Amazon; S Jarí-Foz Amazon; Sp Jarí-Foz Amazon;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Proterozoico Jarí-Foz Amazon; D Terciario Litora Jarí-Foz Amazon; Da Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Da Terciario Litora Jarí-Foz Amazo; Db Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Paa Jarí-Foz Amazon; Pah Jarí-Foz Amazon; S Jarí-Foz Amazon; Sp Jarí-Foz Amazon;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* REGULARIZAR AS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS, FLORESTAIS E PESQUEIROS; EXPLORAÇÃO MADEIREIRA E MINERAL; AGROPECUÁRIA NÃO LICENCIADA (BÚFALO E AGRONEGÓCIO)CAÇA E PESCA DE ANIMAIS SILVESTRES (JACARÉ, PIRARUCU E QUELÔNIOS)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-883

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 199361

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - ZEE, PLANOS DIRETORES, ETC.)

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; PESQUISA: POTENCIAL TURÍSTICO DE BAIXO IMPACTO OU COMUNITÁRIO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	2 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Dendropsophus_sarayacuensis; Dendropsophus_xapuriensis; enyalioides palpebralis; Phyllomedusa_atelopoides;
- *Aves:* Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Pithecia irrorata; Alouatta puruensis; Callimico goeldii; Cebus albifrons cuscinus; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; AA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; AB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC1 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera paupera (Herzog) Dwyer); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Jarina; Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Acre; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Acre; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Acre;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Aa Quaternario Purús-Madeira; Ab Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; D Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc1 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* SÃO ÁREAS DE PROPRIEDADES E ASSENTAMENTOS NO ENTORNO RESEX CHICO MENDES, PRÓXIMOS A CIDADE ASSIS BRASIL; ENTORNO DA RESEX NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA, ASSIS BRASIL E EPITACIOLANDIA EXISTEM INÚMERAS FAZENDAS E PROCESSOS DE TURISMO RELIGIOSO E DE AVENTURA CARECENDO DE PESQUISAS E DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE TURISMO.ANUALMENTE CERCA DE 3 PESSOAS ACESSAM A RESEX POR UPS DO ENTORNO CARECENDO O OLHAR SOBRE O TURISMO DE BAIXO CUSTO; ÁREAS DE EXPLORAÇÃO CONSOLIDADAS QUE CARECEM DE MONITORAMENTO DA REGULARIZAÇÃO.;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-884

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 43314

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	17 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	4 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	4 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis phyllorhinus; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Odontorchilus_cinereus; Parkerthraustes_humeralis; Polioptila_paraensis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cebus albifrons albifrons; Mico chrysoleucus; Sapajus apella; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DB CRETACEO MADEIRA-TAPAJÓS; PAA MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Floodplain Madeira; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Canumã; Alvo 2 - Macrófitas / Floodplain Madeira;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Db Cretaceo Madeira-Tapajós; Paa Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Madeira;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS IMPORTANTES PARA PESCA; FORTE PRESSÃO ANTRÓPICA NA VÁRZEA PARA USO PECUÁRIA E AGRICULTURA, PESCA ILEGAL, MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (JUSANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-885

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 571197

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	2 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Saguinus mystax pluto; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; D QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; PAH JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Coari Grande; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Coari Grande; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 6 - Margem Sul do Rio Amzonas / Rio Coari Grande; Rios Ordem 6 - Margem Sul do Rio Amzonas / West Central Amazon floodplain;
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; Pah Japur
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Aa Quaternario Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; D Quaternario Japurá-Purús; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Purús; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Purús; Pah Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: Rio Coari Grande; West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS IMPORTANTES PARA PESCA; FORTE PRESSÃO ANTRÓPICA NA VÁRZEA PARA USO PECUÁRIA E AGRICULTURA, PESCA ILEGAL, MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE GÁS E ÓLEO (BLOCOS)

- *REFERÊNCIAS:*

- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-886

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 233296

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	1 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	25 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	14 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	14 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Saguinus mystax pluto; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; AB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-PURÚS; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-PURÚS; PAA JAPURÁ-PURÚS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios

(Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:* Rios Ordem 5 a 11 - Margem Sul do Rio Amazonas / West Central Amazon floodplain;
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quater
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Ab Quaternario Japurá-Purús; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Purús; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Purús; Db Quaternario Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Purús; Paa Japurá-Purús;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS IMPORTANTES PARA PESCA; FORTE PRESSÃO ANTRÓPICA NA VÁRZEA PARA USO PECUÁRIA E AGRICULTURA, PESCA ILEGAL, MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*

- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Gasoduto; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-887

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 58333

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	7 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; PAH JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Pah Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Pah Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS IMPORTANTES PARA PESCA; FORTE PRESSÃO ANTRÓPICA NA VÁRZEA PARA USO PECUÁRIA E AGRICULTURA, PESCA ILEGAL, MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-888

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 27583

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; PAH JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Pah Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Pah Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS IMPORTANTES PARA PESCA; FORTE PRESSÃO ANTRÓPICA NA VÁRZEA PARA USO PECUÁRIA E AGRICULTURA, PESCA ILEGAL, MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-889

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 302348

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	24 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	8 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D CRETACEO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB CRETACEO PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PAH PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Maderinha; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Maderinha;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Cretaceo Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Cretaceo Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira; Pah Purús-Madeira;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Cretaceo Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Cretaceo Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira; Pah Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: Rio Maderinha;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS IMPORTANTES PARA PESCA; FORTE PRESSÃO ANTRÓPICA NA VÁRZEA PARA USO PECUÁRIA E AGRICULTURA, PESCA ILEGAL, MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-890

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 182710

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	26 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	13 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	6 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; Allobates_nidicola; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; Phyllomedusa_atelopoides; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Alouatta nigerrima; Ateles chamek; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; A QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; D CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; D CRETACEO JAPURÁ-NEGRO; D QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DA CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DA CRETACEO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO BRANCO-TROMBETA; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; DB CENOZOICO TERC2 PURÚS-MADEIRA; DB QUATERNARIO PURÚS-MADEIRA; PAH PURÚS-MADEIRA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / East Central Amazon floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Lower Negro floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / East Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Lower Negro floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Cretaceo Japurá-Negro; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Cretaceo Japurá-Negro; Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* A Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; A Quaternario Purús-Madeira; D Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; D Cretaceo Japurá-Negro; D Quaternario Purús-Madeira; Da Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Da Cretaceo Japurá-Negro; Da Quaternario Branco-Trombeta; Da Quaternario Japurá-Negro; Da Quaternario Purús-Madeira; Db Cenozoico Terc2 Purús-Madeira; Db Quaternario Purús-Madeira; Pah Purús-Madeira;
- *Interface Terra*-Água: East Central Amazon floodplain; Lower Negro floodplain; West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS IMPORTANTES PARA PESCA; FORTE PRESSÃO ANTRÓPICA NA VÁRZEA PARA USO PECUÁRIA E AGRICULTURA, PESCA ILEGAL, MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *Referências:*
- *Outras Observações:*
- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-891

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 57644

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Loxopholis snethlageae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Badajós; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Badajós;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Rio Badajós;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS IMPORTANTES PARA PESCA; FORTE PRESSÃO ANTRÓPICA NA VÁRZEA PARA USO PECUÁRIA E AGRICULTURA, PESCA ILEGAL, MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-892

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 560834

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	6 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Loxopholis snethlageae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; PAH JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Badajós; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Badajós; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Aa Quaternario Japurá-Negro; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Pah Japur
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Aa Quaternario Japurá-Negro; Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Pah Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Rio Badajós; Rio Manacapuru; West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS IMPORTANTES PARA PESCA; FORTE PRESSÃO ANTRÓPICA NA VÁRZEA PARA USO PECUÁRIA E AGRICULTURA, PESCA ILEGAL, MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); GASODUTO; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-893

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 84600

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	12 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	1 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	1 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Cebuella pygmaea niveiventris; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Da Quaternario Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:*

- *Ambientes Terrestres:* Da Quaternario Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS IMPORTANTES PARA PESCA; FORTE PRESSÃO ANTRÓPICA NA VÁRZEA PARA USO PECUÁRIA E AGRICULTURA, PESCA ILEGAL, MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-894

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 243141

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	23 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	9 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Chiasmocleis_avilapireae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Ateles chamek; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Lagothrix cana cana; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Alouatta puruensis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; D CRETACEO JAPURÁ-NEGRO; D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB CRETACEO JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; PAH JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Manacapuru; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Manacapuru; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;

- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Cretaceo Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cretaceo Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Pah Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Cretaceo Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cretaceo Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; Pah Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Rio Manacapuru; West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS IMPORTANTES PARA PESCA; FORTE PRESSÃO ANTRÓPICA NA VÁRZEA PARA USO PECUÁRIA E AGRICULTURA, PESCA ILEGAL, MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; GASODUTO; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-895

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 26594

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): MONITORAMENTO E MANEJO

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	5 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	11 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Loxopholis snethlageae; Pipa_snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; D CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; D QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Lagos); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; D Quaternario Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS IMPORTANTES PARA PESCA; FORTE PRESSÃO ANTRÓPICA NA VÁRZEA PARA USO PECUÁRIA E AGRICULTURA, PESCA ILEGAL, MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-897

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 69161

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; PESQUISA: RECURSO PESQUEIRO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Loxopholis snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Trichechus inunguis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Manacapuru; Alvo 1 - Florestas Alagadas / West Central Amazon floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;

- *Ambientes Terrestres:* Ab Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Rio Manacapuru; West Central Amazon floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS IMPORTANTES PARA PESCA; FORTE PRESSÃO ANTRÓPICA NA VÁRZEA PARA USO PECUÁRIA E AGRICULTURA, PESCA ILEGAL, MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL E REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-898

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 44345

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA (DE BACIAS, RESERVA DA BIOSFERA, SÍTIOS RAMSAR, ETC.): ACORDO DE PESCA

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; PESQUISA: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	10 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	6 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	6 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allobates_masniger; anolis tandai; anolis transversalis; Loxopholis snethlageae;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta juara; Dasyprocta fuliginosa; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Cacajao ouakary; Cebus albifrons albifrons; Sapajus macrocephalus; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DA CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DA QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; DB CENOZOICO TERC2 JAPURÁ-NEGRO; DB CRETACEO JAPURÁ-NEGRO; DB QUATERNARIO JAPURÁ-NEGRO; LO JAPURÁ-NEGRO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera guyanensis Desf.); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Lower Negro floodplain; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Jaú; Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Manacapuru;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cretaceo Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; LO Japurá-Negro;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Da Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Da Quaternario Japurá-Negro; Db Cenozoico Terc2 Japurá-Negro; Db Cretaceo Japurá-Negro; Db Quaternario Japurá-Negro; LO Japurá-Negro;
- *Interface Terra*-Água: Rio Manacapuru;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ÁREAS IMPORTANTES PARA PESCA; FORTE PRESSÃO ANTRÓPICA NA VÁRZEA PARA USO PECUÁRIA E AGRICULTURA, PESCA ILEGAL, MINERAÇÃO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-899

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 229539

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	8 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	15 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	5 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	16 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Hydrolaetare_capuru;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Parkerthraustes_humeralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; A QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AB PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AB CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AB QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; DA PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; DA CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DA QUATERNARIO MADEIRA-TAPAJÓS; S MADEIRA-TAPAJÓS; SG MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Copaiba (Copaifera piresii Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Beni; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Mamoré; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Pacaás Novos; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Yata;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Mamoré; A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; As Pr
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; A Quaternario Madeira-Tapajós; Aa Quaternario Madeira-Tapajós; Ab Proterozoico Madeira-Tapajós; Ab Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ab Quaternario Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Quaternario Madeira-Tapajós; Da Proterozoico Madeira-Tapajós; Da Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Da Quaternario Madeira-Tapajós; S Madeira-Tapajós; Sg Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Beni; Floodplain Mamoré; Rio Pacaás Novos; Rio Yata; Upper Madeira floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* UPS DE USO CONSOLIDADO COM PLANEJAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE FERROVIA, HIDROVIA, RODOVIA E HIDRELÉTRICA; A ÁREA CONTÍGUA ÀS UPS TAMBÉM DEVEM FORMAR A NOVA UC PORQUE ABRANGE O RIO PACÁAS NOVOS, O RIO MAIS PRÓXIMO DA COMUNIDADE DE PESCADORES DA COLÔNIA, QUE FAZ PESCAS RÁPIDAS (1 OU 2 DIAS) ARTESANAIS A REMO OU RABETA. ESTES PESCADORES UTILIZAM ESTA ÁREA HISTORICAMENTE, MUITOS SÃO NASCIDOS NESTA REGIÃO. NÃO SE RECOMENDA AMPLIAÇÃO DA RESEX PRÓXIMA.; CRIAÇÃO DE RESEX DE PESCA PARA VIABILIZAR A PESCA ARTESANAL DA COLÔNIA DE PESCADORES Z2RO, DE GUAJARÁ-MIRIM, VISTO QUE OS PESCADORES NÃO TÊM ÁREA PARA PESCA, E OS PROPRIETÁRIOS DESTA REGIÃO PROÍBEM OS MESMOS DE EXERCEREM A ATIVIDADE NESTA LOCALIDADE; JÁ INDICADO MAPEAMENTO DAS

cadeias de castanhas e pesca. Pesca como aliado importante, mas ainda insipiente, perto da sua potencialidade; Conflitos de pesca

- *Usos Sustentáveis:* Pesca artesanal
- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia; Vegetação secundária
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* Comunidade pescadores
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações: Área entre as UPs 14733 e 14386 mais área do entorno.*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-900

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 63028

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; PESQUISA: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS DE VALOR DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	8 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis transversalis; cercosaura eigenmanni; Chiasmocleis_avilapireae; Dendropsophus_sarayacuensis; enyalioides laticeps; Hydrolaetare_capuru;
- *Aves:* Automolus_paraensis; Capito_dayi; Hylexetastes_uniformis; Parkerthraustes_humeralis; Pyrrhura_perlata; Pyrrhura_snethlageae; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Ateles chamek; Dasyprocta variegata; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis boliviensis; Lagothrix cana cana; Mico rondoni; Alouatta puruensis; Cebus albifrons albifrons; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; A CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; AS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS; AS CENOZOICO TERC2 MADEIRA-TAPAJÓS; DS PROTEROZOICO MADEIRA-TAPAJÓS;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera multijuga Hayne); Jacarés (Jacaré-açu - Florestas Alagadas); Jacarés (Jacaré-açu - Macrófitas); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Upper Madeira floodplain; Alvo 2 - Macrófitas / Upper Madeira floodplain; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Upper Madeira floodplain;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*

- *Ambientes Reofílicos:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Madeira-Tapajós; A Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; As Proterozoico Madeira-Tapajós; As Cenozoico Terc2 Madeira-Tapajós; Ds Proterozoico Madeira-Tapajós;
- *Interface Terra*-Água: Upper Madeira floodplain;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* UPS DE USO CONSOLIDADO COM PLANEJAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE FERROVIA, HIDROVIA, RODOVIA E HIDRELÉTRICA.; JÁ INDICADO MAPEAMENTO DAS CADEIAS DE CASTANHAS E PESCA. PESCA COMO ALIADO IMPORTANTE, MAS AINDA INSIPIENTE, PERTO DA SUA POTENCIALIDADE;
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS;VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-901

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 173769

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	34 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	9 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	5 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	5 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus PA; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_perlata; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: D CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DA CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; DB CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DB CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ; PAH TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis erythrocephala); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá-una; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Curuá-una;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* D Cretaceo Tapajós-Xingú; Da Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Pah Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* D Cretaceo Tapajós-Xingú; Da Cretaceo Tapajós-Xingú; Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú; Pah Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Curuá-una;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ASSENTAMENTOSGRANDE PRESENÇA DE ASSENTAMENTOS E EXPANSÃO DA PECUÁRIA / DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA. EXPANSÃO DA PECUÁRIA EM GRANDES PROPRIEDADES.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-902

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 34924

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE; FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	32 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	8 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	2 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	2 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; anolis trachyderma E; Atelopus_hoogmoedi; Bolitoglossa_tapajonica; Chiasmocleis_avilapireae; cnemidophorus lemniscatus PA; Dendropsophus_sarayacuensis; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_cardosoi; Capito_dayi; Chamaeza_nobilis_fulvipectus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Guaruba_guarouba; Hylexetastes_uniformis; Hylopezus_whittakeri; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Odontorchilus_cinereus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_aethopygus; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Rhegmatorhina_gymnops; Sporophila_schistacea; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Sotalia fluviatilis; Ateles marginatus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: DB CENOZOICO TERC2 TAPAJÓS-XINGÚ; DB CRETACEO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides);

Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Rio Curuá-una; Alvo 2 - Macrófitas / Rio Curuá-una;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* Db Cenozoico Terc2 Tapajós-Xingú; Db Cretaceo Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Rio Curuá-una;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* ASSENTAMENTOSGRANDE PRESENÇA DE ASSENTAMENTOS E EXPANSÃO DA PECUÁRIA / DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA. EXPANSÃO DA PECUÁRIA EM GRANDES PROPRIEDADES.
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-903

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 535913

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FORTALECIMENTO DAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE: ADEQUAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS ENVOLVIDAS NAS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; ADEQUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS ÀS CADEIAS DE VALOR DOS PRODUTOS DA SOCI

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA); DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL: ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS QUE ENVOLVAM COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA; TURISMO DE BAIXO IMPACTO

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	11 ESPÉCIES
AVES	1 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	21 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	31 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	32 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	4 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_tinctorius; Allophryne_ruthveni; amapasaurus tetradactylus; anolis auratus AP PA; anolis chrysolepis; arthrosaura kockii N; Atelopus_hoogmoedi; gonatodes nascimentoi N; kentropyx striata AP PA; Loxopholis guianense N; Pipa_snethlageae;
- *Aves:* Aburria_cujubi;
- *Peixes Ameaçados: Teleocichla wajapi / Rio Jari;*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus castaneus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Neusticomys oyapocki; Sotalia fluviatilis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; AS PALEOZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; AS PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; D CENOZOICO TERC2 TROMBETAS-JARÍ; D CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; D CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; D PALEOZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; D PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; D QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; D QUATERNARIO TROMBETAS-JARÍ; DA CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; DA PALEOZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DA QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DA QUATERNARIO TROMBETAS-JARÍ; DB CENOZOICO TERC2 TROMBETAS-JARÍ; DB CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; DB CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; DB PALEOZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DB QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DB QUATERNARIO TROMBETAS-JARÍ; DS PROTEROZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DS CENOZOICO TERC2 TROMBETAS-JARÍ; DS CRETACEO JARÍ-FOZ AMAZON; DS CRETACEO TROMBETAS-JARÍ; DS PALEOZOICO JARÍ-FOZ AMAZON; DS PALEOZOICO TROMBETAS-JARÍ; DS QUATERNARIO JARÍ-FOZ AMAZON; DS QUATERNARIO TROMBETAS-JARÍ; PAH JARÍ-FOZ AMAZON; PAH TROMBETAS-JARÍ; SA TROMBETAS-JARÍ;*
- *Manguezais:*

- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis sextuberculata); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 1 - Florestas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 2 - Macrófitas / Amazon Delta North; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Amazon Delta North; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Jari;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Jari; As Cretaceo Jarí-Foz Amazon; As Paleozoico Jarí-Foz Amazon; As Paleozoico Trombetas-Jarí; D Cenozoico Terc2 Trombetas-Jarí; D Cretaceo Jarí-Foz Amazon; D Cretaceo Trombetas-Jarí; D Paleozoico Jarí-Foz Amazon; D Paleozoico Trombetas-Jarí; D Quate
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Cretaceo Jarí-Foz Amazon; As Paleozoico Jarí-Foz Amazon; As Paleozoico Trombetas-Jarí; D Cenozoico Terc2 Trombetas-Jarí; D Cretaceo Jarí-Foz Amazon; D Cretaceo Trombetas-Jarí; D Paleozoico Jarí-Foz Amazon; D Paleozoico Trombetas-Jarí; D Quaternario Jarí-Foz Amazon; D Quaternario Trombetas-Jarí; Da Cretaceo Trombetas-Jarí; Da Paleozoico Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Jarí-Foz Amazon; Da Quaternario Trombetas-Jarí; Db Cenozoico Terc2 Trombetas-Jarí; Db Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Db Cretaceo Trombetas-Jarí; Db Paleozoico Jarí-Foz Amazon; Db Quaternario Jarí-Foz Amazon; Db Quaternario Trombetas-Jarí; Ds Proterozoico Jarí-Foz Amazon; Ds Cenozoico Terc2 Trombetas-Jarí; Ds Cretaceo Jarí-Foz Amazon; Ds Cretaceo Trombetas-Jarí; Ds Paleozoico Jarí-Foz Amazon; Ds Paleozoico Trombetas-Jarí; Ds Quaternario Jarí-Foz Amazon; Ds Quaternario Trombetas-Jarí; Pah Jarí-Foz Amazon; Pah Trombetas-Jarí; Sa Trombetas-Jarí;

- *Interface Terra*-Água: Amazon Delta North; Rio Jari; Rio Paru;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* VALORIZAR E VALORAR OS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE; REGULARIZAR AS ATIVIDADES JÁ EXISTENTES (EXTRATIVISMO); REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/AMBIENTAL; ÁREA COM FORTE POTENCIAL TURÍSTICO (INCLUSIVE DE BASE COMUNITÁRIA)
- *USOS SUSTENTÁVEIS:* EXTRATIVISMO
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:*
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; FERROVIAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MINERAÇÃO COM MAIS DE 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO; UHE; FRAGMENTAÇÃO DE RIOS (MONTANTE DE UHE)

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-904

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 162604

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA); RECONHECIMENTO DE TI

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	10 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	18 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	7 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	3 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	8 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	3 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus RR; anolis planiceps; Atelopus_hoogmoedi; cnemidophorus lemniscatus RR; coleodactylus septentrionalis; gymnophthalmus leucomystax; gymnophthalmus vanzoi; kentropyx striata RR; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Cebus albifrons albifrons; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; DS PROTEROZOICO NEGRO-BRANCO; F NEGRO-BRANCO; FS NEGRO-BRANCO; ON NEGRO-BRANCO; SA NEGRO-BRANCO; SP NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Branco; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Mucajaí; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uraricoera;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Rio Mucajaí; As Proterozoico Negro-Branco; Ds Proterozoico Negro-Branco; F Negro-Branco; Fs Negro-Branco; ON Negro-Branco; Sa Negro-Branco; Sp Negro-Branco;

- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Negro-Branco; Ds Proterozoico Negro-Branco; F Negro-Branco; Fs Negro-Branco; ON Negro-Branco; Sa Negro-Branco; Sp Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Branco; Rio Mucajaí; Rio Uraricoera;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* DEGRADAÇÃO POR ESTRADAS, PLANTAÇÃO DE SOJA, SEM REGULAÇÃO FUNDIÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRESENÇA DE TERRA INDÍGENA NAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO 163, 1631 (ANZOL E LAGO DA PRAIA), 2791 (ARAPUÁ), 16237 (REGIÃO DE TABAIO); INDICAR QUE HÁ TERRA INDÍGENA ARAPUÁ NÃO DEMARCADA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; ATIVIDADES MINERADORAS NÃO OFICIAIS (CLANDESTINAS); MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-905

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 112080

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA); RECONHECIMENTO DE TI

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	4 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	5 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; cnemidophorus lemniscatus RR; gymnophthalmus vanzoi; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: FA BRANCO-TROMBETA; FS BRANCO-TROMBETA; SG BRANCO-TROMBETA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Copaiba (Copaifera publifora Benth.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Branco; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Tacutu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Fa Branco-Trombeta; Fs Branco-Trombeta; Sg Branco-Trombeta;
- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* Fa Branco-Trombeta; Fs Branco-Trombeta; Sg Branco-Trombeta;
- *Interface Terra*-Água: Rio Tacutu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* DEGRADAÇÃO POR ESTRADAS, PLANTAÇÃO DE SOJA, SEM REGULAÇÃO FUNDIÁRIA

- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRESENÇA DE TERRA INDÍGENA NAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO 163, 1631 (ANZOL E LAGO DA PRAIA), 2791 (ARAPUÁ), 16237 (REGIÃO DE TABAIO);
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ESTRADAS

- *REFERÊNCIAS:*

- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*

- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-906

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 271069

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR E PRA); RECONHECIMENTO DE TI

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	0 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	1 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	20 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	11 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	2 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	11 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	2 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Allophryne_ruthveni; anolis auratus RR; anolis planiceps; cnemidophorus lemniscatus RR; coleodactylus septentrionalis; gymnophthalmus leucomystax; gymnophthalmus vanzoi; kentropyx striata RR; panopa carvalhoi;
- *Aves:*
- *Peixes Ameaçados: Melanocharacidium nigrum / Rio Uraricoera;*
- *Mamíferos:* Cebus olivaceus olivaceus; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Inia geoffrensis geoffrensis; Trichechus inunguis; Alouatta macconnelli; Ateles belzebuth; Ateles paniscus; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: F BRANCO-TROMBETA; F NEGRO-BRANCO; FA NEGRO-BRANCO; FS BRANCO-TROMBETA; FS NEGRO-BRANCO; S BRANCO-TROMBETA; SA NEGRO-BRANCO; SG BRANCO-TROMBETA; SG NEGRO-BRANCO; SP BRANCO-TROMBETA; SP NEGRO-BRANCO;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera publifora Benth.); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Peltocephalus dumerilianus); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Branco; Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Rio Uraricoera;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* F Branco-Trombeta; F Negro-Branco; Fa Negro-Branco; Fs Branco-Trombeta; Fs Negro-Branco; S Branco-Trombeta; Sa Negro-Branco; Sg Branco-Trombeta; Sg Negro-Branco; Sp Branco-Trombeta; Sp Negro-Branco;

- *Igarapés de Terra Firme:*
- *Ambientes Terrestres:* F Branco-Trombeta; F Negro-Branco; Fa Negro-Branco; Fs Branco-Trombeta; Fs Negro-Branco; S Branco-Trombeta; Sa Negro-Branco; Sg Branco-Trombeta; Sg Negro-Branco; Sp Branco-Trombeta; Sp Negro-Branco;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Branco; Rio Uraricoera;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* DEGRADAÇÃO POR ESTRADAS, PLANTAÇÃO DE SOJA, SEM REGULAÇÃO FUNDIÁRIA
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA);VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* PRESENÇA DE TERRA INDÍGENA NAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO 163, 1631 (ANZOL E LAGO DA PRAIA), 2791 (ARAPUÁ), 16237 (REGIÃO DE TABAIO); INDICAR QUE HÁ TERRA INDÍGENA ARAPUÁ NÃO DEMARCADA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MINERAÇÃO COM ATÉ 50HA DE ÁREA; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-907

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 14751

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	7 ESPÉCIES
AVES	26 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	4 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	9 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	10 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus E; Adelphobates_galactonotus W; Allophryne_ruthveni; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Ateles marginatus; Chiropotes utahickae; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: A PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; A PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Xingu; A Proterozoico Tapajós-Xingú; A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Quaternario Tapajós-Xingú; D Quaternario Xingú-Ara
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* A Proterozoico Tapajós-Xingú; A Proterozoico Xingú-Araguaia; As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Quaternario Tapajós-Xingú; D Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Xingu;

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* IMPORTANTE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO - 5% NA REGIÃO DO XINGU. IMPORTANTE CONSIDERAR AS ATIVIDADES PRODUTIVAS E FORTALECIMENTO PARA ESCALA; REGIÃO COM ASSENTAMENTOS, ÁREAS DEGRADADAS, GARIMPO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADES NA APA DO TRIUNFO DO XINGU ISOLADA E AMEAÇADA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-908

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 48271

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	8 ESPÉCIES
AVES	27 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	19 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	7 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	3 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	0 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	3 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_galactonotus E; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; gonatodes eladioi; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_retentus; Hylexetastes_brigidai; Hypocnemis_striata; Lepidothrix_iris; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Polioptila_paraensis; Procnias_albus_wallacei; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; DS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA;*
- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera marti Hayne); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);

- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia;
- *Interface Terra*-Água:

CARACTERIZAÇÃO

- *CARACTERÍSTICAS GERAIS:* IMPORTANTE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO - 5% NA REGIÃO DO XINGU. IMPORTANTE CONSIDERAR AS ATIVIDADES PRODUTIVAS E FORTALECIMENTO PARA ESCALA; REGIÃO COM ASSENTAMENTOS, ÁREAS DEGRADADAS, GARIMPO
- *USOS SUSTENTÁVEIS:*
- *OPORTUNIDADES:* TERRAS NÃO DESTINADAS; ESTOQUE DE CARBONO (BIOMASSA); VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA NO ARCO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA;
- *POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PRESENTES NA ÁREA:* COMUNIDADES NA APA DO TRIUNFO DO XINGU ISOLADA E AMEAÇADA
- *ATIVIDADES CONFLITANTES EXISTENTES NA ÁREA PRIORITÁRIA:* PROJETO DE ASSENTAMENTO (INCRA); DEGRADAÇÃO FLORESTAL; ÁREA DE DESMATAMENTO (ATÉ 2016); ESTRADAS; MUDANÇA DO CLIMA - PRECIPITAÇÃO

- *REFERÊNCIAS:*
- *OUTRAS OBSERVAÇÕES:*
- *PRESENÇA DE SÍTIO BAZE: NÃO*

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMA AMAZÔNIA

CÓDIGO: AMZ-909

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 77381

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

AÇÕES RECOMENDADAS (SECUNDÁRIAS): REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADANTE: EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADAS, CAÇA E PESCA; FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES ILEGAIS

ALVOS

TOTAL DE ALVOS:

GRUPO/CATEGORIA	QUANTIDADE
ANFÍBIOS E RÉPTEIS	9 ESPÉCIES
AVES	30 ESPÉCIES
PEIXES AMEAÇADOS	0 ESPÉCIES
PEIXES ORNAMENTAIS	0 ESPÉCIES
MAMÍFEROS	22 ESPÉCIES
MANGUEZAIS	0 ESPÉCIES
USO SUSTENTÁVEL	6 ESPÉCIES
AMBIENTES TERRESTRES	13 AMBIENTES
INTERFACE TERRA-ÁGUA	1 AMBIENTES
IGARAPÉS DE TERRA FIRME	0 AMBIENTES
AMBIENTES REOFÍLICOS	14 AMBIENTES
ENCONTRO DE ÁGUAS	0 AMBIENTES
ÁREAS ALAGÁVEIS	1 AMBIENTES

NOME DOS ALVOS:

- *Anfíbios e Répteis:* Adelphobates_castaneoticus; Adelphobates_galactonotus E; Adelphobates_galactonotus W; Allobates_masniger; Allophryne_ruthveni; arthrosaura kockii S; Atelopus_hoogmoedi; Chiasmocleis_avilapireae; Proceratophrys_concavitympanum;
- *Aves:* Aburria_cujubi; Automolus_paraensis; Campylorhamphus_multostriatus; Capito_dayi; Conopophaga_melanogaster; Contopus_nigrescens; Dendrocolaptes_picumnus_transfasciatus; Dendrocolaptes_ridgwayi; Hylexetastes_uniformis; Hypocnemis_striata; Lophornis_gouldii; Micrastur_mintoni; Neomorphus_geoffroyi_amazonicus; Neomorphus_squamiger; Oxyruncus_cristatus_tocansi; Parkerthraustes_humeralis; Penelope_pileata; Phaethornis_bourcieri_major; Polioptila_paraensis; Psophia_dextralis; Pyrilia_vulturina; Pyrrhura_amazonum; Pyrrhura_anerythra; Sporophila_schistacea; Synallaxis_cherrieii; Syndactyla_ucayalae; Tinamus_tao; Tunchiornis_ochraceiceps_rubrifrons; Xiphocolaptes_carajaensis; Xipholena_lamellipennis;
- *Peixes Ameaçados:*
- *Mamíferos:* Alouatta belzebul; Alouatta discolor; Dasyprocta leporina; Dasypus kappleri; Dasypus septemcinctus; Euphractus sexcinctus; Inia geoffrensis geoffrensis; Ateles marginatus; Chiropotes utahickae; Saguinus niger; Sapajus apella; Leopardus tigrinus; Leopardus wiedii; Myrmecophaga tridactyla; Panthera onca; Priodontes maximus; Pteronura brasiliensis; Puma concolor; Puma yagouaroundi; Speotus venaticus; Tapirus terrerstris; Tayassu pecari;
- *Ambientes Terrestres: AS PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; AS PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; D PROTEROZOICO XINGÚ-ARAGUAIA; D QUATERNARIO TAPAJÓS-XINGÚ; D QUATERNARIO XINGÚ-ARAGUAIA; DA PROTEROZOICO TAPAJÓS-XINGÚ; DA PROTEROZOICO XINGÚ-*

Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Quaternario Tapajós-Xingú;

- *Manguezais:*
- *Espécies de Uso Sustentável:* Castanheira (Bertholletia excelsa); Copaiba (Copaifera reticulata Ducke); Mogno (Swietenia macrophylla); Quelonios (Kinosternon scorpioides); Quelonios (Podocnemis expansa); Quelonios (Podocnemis unifilis);
- *Áreas Alagáveis:* Alvo 3 - Demais Áreas Alagadas / Floodplain Xingu;
- *Encontro de águas:*
- *Peixes Ornamentais:*
- *Ambientes Reofílicos:* Floodplain Xingu; As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Quaternario Tapajós-Xingú; D Quaternario Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Xingú-A
- *Igarapés de Terra Firme:* Igarapé de terra firme - Rio de 1a ordem;
- *Ambientes Terrestres:* As Proterozoico Tapajós-Xingú; As Proterozoico Xingú-Araguaia; D Proterozoico Tapajós-Xingú; D Proterozoico Xingú-Araguaia; D Quaternario Tapajós-Xingú; D Quaternario Xingú-Araguaia; Da Proterozoico Tapajós-Xingú; Da Proterozoico Xingú-Araguaia; Da Quaternario Tapajós-Xingú; Da Quaternario Xingú-Araguaia; Ds Proterozoico Tapajós-Xingú; Ds Proterozoico Xingú-Araguaia; Ds Quaternario Tapajós-Xingú;
- *Interface Terra*-Água: Floodplain Xingu;

Caracterização

- *Características Gerais:* Importante ações de recuperação - 5% na região do Xingu. Importante considerar as atividades produtivas e fortalecimento para escala; Região com assentamentos, áreas degradadas, garimpo
- *Usos Sustentáveis:*

- *Oportunidades:* Terras não destinadas; Estoque de carbono (biomassa); Vegetação secundária no arco do desmatamento da Amazônia;
- *Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais presentes na área:* comunidades na APA do Triunfo do Xingu isolada e ameaçada
- *Atividades conflitantes existentes na área prioritária:* Projeto de assentamento (INCRA); Degradação florestal; Área de desmatamento (até 2016); Estradas; Mineração com até 50ha de área; Mineração com mais de 50ha de área; Mudança do Clima - Precipitação

- *Referências:*

- *Outras Observações:*

- *Presença de sítio Baze: Não*

**Para informações detalhadas sobre a caracterização, consultar o banco de dados espacial*