

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Julgue os itens a seguir, acerca da cadeia de custódia.

- 51** Apenas vestígios biológicos estão sujeitos à cadeia de custódia, já que são os únicos cuja contaminação pode comprometer a investigação.
- 52** A legislação brasileira determina que a central de custódia de vestígios esteja sob a gestão da direção dos institutos médico-legais.
- 53** A coleta de vestígios no local do crime deve ser realizada preferencialmente por perito oficial, que deverá dar o encaminhamento necessário para a central de custódia.
- 54** A cadeia de custódia é obrigatória desde o momento do reconhecimento da prova até seu descarte final, sendo a preservação da prova responsabilidade exclusiva dos agentes públicos do sistema de segurança.

A traumatologia forense é o ramo da medicina legal que estuda as lesões produzidas por agentes vulnerantes no corpo humano, consideradas sua dinâmica, consequências e implicações jurídico-penais. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 55** O Protocolo de Istambul é um documento jurídico vinculante adotado pelos Estados-membros das Nações Unidas que obriga os países signatários a instaurarem investigações criminais automáticas sempre que houver denúncia de maus-tratos, independentemente da vontade da vítima.
- 56** A definição penal de lesão corporal inclui qualquer ofensa à saúde física da vítima, de modo que, para haver tipificação, é necessário comprovar que a integridade corporal da vítima foi alterada.
- 57** Nos termos do Código Penal, a classificação das lesões em leve, grave ou gravíssima depende exclusivamente da extensão física da lesão observada no exame pericial.
- 58** Em crianças, a presença de equimoses em diferentes estágios evolutivos e localizadas em áreas do corpo como face, dorso, região glútea e face interna das coxas, constitui forte indicativo de maus-tratos físicos e deve ser diferenciada de patologias hematológicas, antes da notificação obrigatória.

No âmbito da medicina legal, as energias de ordem mecânica são responsáveis pela maioria das lesões traumáticas observadas em vítimas de agressões, acidentes e homicídios. Além dessas, há também as energias físicas não mecânicas, como térmicas, elétricas, químicas e radioativas, que produzem efeitos lesivos com características distintas. No que se refere a esse assunto, julgue os seguintes itens.

- 59** Projéteis de alta energia, como os disparados por fuzis, provocam lesões extensas por cavitação temporária, podendo causar danos em tecidos distantes do trajeto principal do projétil.
- 60** As lesões por ação contundente, como hematomas, equimoses e escoriações, produzem necessariamente solução de continuidade da pele, sendo consideradas obrigatoriamente lesões abertas, de acordo com a classificação médico-legal.
- 61** Lesões do tipo contragolpe observadas em traumatismos cranianos apresentam-se obrigatoriamente no mesmo lado que sofreu o impacto direto, sendo indicativas de trauma contuso com fratura óssea subjacente.
- 62** As feridas incisivas tendem a apresentar bordas regulares, ausência de pontes de tecido no fundo da lesão e maior extensão no plano horizontal que na profundidade, sendo frequente a presença de lesões de defesa em membros superiores, quando associadas a homicídio.

- 63** Presença do sinal de Paltauf, queimaduras de vias aéreas e rigidez precoce são achados compatíveis com morte por ação térmica intensa.

- 64** A queimadura elétrica de entrada geralmente apresenta aspecto circular e bordas endurecidas, podendo não haver lesão visível de saída.

A respeito da asfíxiologia forense e do estudo médico-legal das baropatas, julgue os próximos itens.

- 65** A sufocação é um tipo de asfixia mecânica sempre causada pela obstrução externa das vias aéreas superiores, como ocorre nos casos de estrangulamento e enforcamento, caracterizando-se pela ausência de oxigenação pulmonar direta.
- 66** As baropatas ocorrem exclusivamente em ambientes hiperbáricos e são caracterizadas por hemorragias internas causadas pela rarefação súbita do ar atmosférico, sendo típicas de acidentes aeronáuticos.
- 67** A asfixia por confinamento em ambiente com baixa concentração de oxigênio é classificada como asfixia por alteração do meio ambiente, podendo não deixar sinais externos visíveis no cadáver.

Após a morte, iniciam-se diversos procedimentos relacionados ao destino do cadáver, que dependem da causa médica da morte. Considerando aspectos relativos à tanatologia forense, julgue os itens a seguir.

- 68** O conceito de morte suspeita contempla os casos em que não é possível determinar a causa exata da morte, havendo apenas uma suspeita do diagnóstico.
- 69** Os transplantes de órgãos e tecidos são chamados de alotransplantes, quando realizados entre gêmeos bivitelinos; de isotransplantes, quando realizados entre gêmeos univitelinos; e de xenotransplantes, quando realizados entre irmãos não gêmeos.
- 70** O diagnóstico de morte encefálica é feito mediante diversas avaliações clínicas, realizadas em intervalos relacionados à faixa etária do paciente analisado, sendo o intervalo de 24 h adequado para pacientes com idade entre 7 dias e 2 meses; o de 12 horas, para pacientes com idade entre 2 e 24 meses; e o de 1 hora, para pacientes acima de 2 anos de idade.
- 71** O embalsamamento é uma técnica aplicada aos cadáveres que não foram abertos após a morte.
- 72** Quando a causa da morte é violenta ou suspeita, o preenchimento de todos os campos da declaração de óbito é de responsabilidade do médico-legista, estando o médico-assistente impedido de fazê-lo.

Acerca da estimativa do tempo de morte e das lesões *intra vitam* e *post mortem*, julgue os itens que se seguem.

- 73 A presença de embolia não contribui para a análise da sobrevivência do indivíduo, pois pode ocorrer no período *post mortem*.
- 74 Pode-se estimar o tempo de morte de um indivíduo por meio da entomologia forense, uma vez que, logo que ocorre a morte, moscas adultas de espécies necrófagas colocam ovos imaturos no cadáver, de modo que a idade dos insetos nascidos coincide com o tempo decorrido desde a morte.
- 75 O intervalo *post mortem* (IPM) em cadáveres frescos pode ser estimado com base na dosagem de potássio no humor vítreo.
- 76 A técnica do radiocarbono, também conhecida como técnica do carbono-14, possibilita a estimativa do intervalo *peri mortem*.
- 77 No curso da rigidez cadavérica, o miocárdio fica rígido usualmente depois de a rigidez se instalar nos membros superiores.
- 78 A adipocera ou saponificação é um processo que inibe a putrefação do cadáver ao aumentar a sua acidez e a sua desidratação.

A respeito da morte súbita e das causas jurídicas da morte, julgue os itens subsequentes.

- 79 A morte que ocorre de forma inesperada é denominada morte súbita e, para ser classificada como tal, sua evolução deve dar-se em até 48 h do início do processo.
- 80 Em suicídios causados por arma de fogo, o projétil, em regra, penetra o meato acústico externo, dirigindo-se para trás e para cima no lado dominante da vítima.
- 81 Nas mortes por homicídio, as lesões externas denominadas lesões de defesa restringem-se à borda medial do antebraço e à face palmar dos dedos.
- 82 Acidente, suicídio e homicídio são causas jurídicas da morte, mas determiná-las não é competência médica, que deve ser restrita à determinação da causa médica da morte.

Desde o encontro do cadáver até o término da necropsia, diversas etapas são estipuladas para que o exame do cadáver seja determinante para a investigação de um crime. Acerca do exame perinecropsópico e da necropsia médico-legal, julgue os itens seguintes.

- 83 A incisão submento-esterno-pubiana é obrigatória para se iniciar uma necropsia.
- 84 O estudo de torturas em mortos pode ser feito mediante a aplicação do protocolo de Minnesota.
- 85 O exame de local de crime ou perinecropsia tem início não com o isolamento da área a ser examinada, mas com a chegada do perito ao local.
- 86 De acordo com a legislação vigente, nos casos de exame de morte violenta em que as lesões externas permitam precisar a causa da morte ou em que não haja infração penal a apurar, bastará o simples exame externo do cadáver, dispensada a sua abertura.
- 87 A necropsia forense é indicada para casos de morte violenta ou de morte natural de causa indeterminada.

No que se refere à perícia nos crimes contra a liberdade sexual, julgue os itens a seguir.

- 88 Drogas utilizadas para cometer o crime de estupro podem ser identificadas na urina da vítima.
- 89 A presença de espermatozoides em *swab* vaginal, nos casos de investigação de crimes de estupro com conjunção carnal, é sinal incontestável de presença do vestígio.
- 90 Carúnculas himenais são formações na borda livre do hímen que correspondem a cicatrizes causadas por doenças sexualmente transmissíveis.
- 91 Em caso de crime de estupro, é imprescindível a coleta de referência do material genético da vítima, devendo este também ser coletado caso tenha ocorrido alguma relação consensual com menos de 72 horas, para que o material seja confrontado com o do agressor.
- 92 No crime de violência sexual com conjunção carnal, deve ser realizado estudo do hímen na vítima, além de ser feita a coleta de material da região vaginal por *swab*, desde que a agressão tenha ocorrido em até 24 horas.
- 93 Na vítima de violência sexual com conjunção carnal com vida sexual prévia, deve-se realizar a coleta de material da região vaginal por *swab* e investigar a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, quando a agressão tiver ocorrido dentro do prazo de 72 horas.
- 94 No estudo do hímen, é imprescindível descrever a localização e o número de roturas, sendo tais informações suficientes para concluir que houve crime de conjunção carnal.
- 95 Roturas himenais ocorridas há mais de 20 dias são consideradas antigas.
- 96 Deve-se diferenciar entalhes de roturas himenais em exames que investigam violência sexual em vítimas sem vida sexual prévia.
- 97 Roturas himenais com ocorrência entre 6 e 10 dias são classificadas como muito recentes.

Acerca de antropologia forense, julgue os itens subsequentes.

- 98 As bordas de fraturas ocorridas *ante mortem* são espessas, arredondadas ou polidas, com perda de nitidez do contorno e formação de osso no local.
- 99 O desastre aberto é um evento catastrófico que resulta na morte de um número desconhecido de pessoas.
- 100 Na fase 3 *post mortem*, iniciam-se os procedimentos relacionados aos exames específicos dos corpos ou dos fragmentos de corpos no necrotério.

A respeito de estudos médico-legais das lesões causadas por substâncias cáusticas e venenos, julgue o próximo item.

- 101 A intoxicação exógena por cianeto cursa com pele rosada e aroma de amêndoas doces.

Com relação à legislação relacionada à sexologia forense, julgue os itens que se seguem.

- 102 Para o exame médico-legal em face da investigação de aborto recente em mulher viva, deve-se solicitar o exame histopatológico do material proveniente da cavidade uterina.
- 103 O crime de estupro é regido pelo Código Penal Brasileiro e engloba a conjunção carnal e o ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Em relação à avaliação da imputabilidade, da responsabilidade penal e da capacidade civil, julgue os itens a seguir.

- 104** Durante a avaliação da capacidade civil de determinado indivíduo que praticou conduta ilícita devido a alteração de seu entendimento da realidade em decorrência de transtorno mental, é necessário que o perito analise se tal transtorno é passível de cura ou tratamento, apesar da impossibilidade de levantamento de eventual interdição.
- 105** A prodigalidade, condição elencada no Código Civil como uma das hipóteses de incapacidade relativa, caracteriza-se pela dilapidação do patrimônio desordenada, voluntária e deliberada, não se confundindo com gastos excessivos que podem ocorrer nos episódios de mania em indivíduos com transtorno afetivo bipolar.
- 106** Como o ordenamento jurídico brasileiro adota o critério biopsicológico para a avaliação da imputabilidade, o diagnóstico de esquizofrenia grave em agente de conduta tipificada como crime implica a sua inimputabilidade penal.
- 107** A emoção e a paixão, quando não decorrentes de algum transtorno mental, são irrelevantes para a análise da imputabilidade do réu.
- 108** Quando um indivíduo é submetido a medida de segurança, considera-se que ele foi, de certo modo, absolvido da pena por não possuir, no momento do crime, plena capacidade de entendimento e autodeterminação quanto à ilicitude do ato.
- 109** Suponha que um indivíduo psicótico com sintomas paranoides mate uma pessoa, reconhecendo que o ato é ilícito, mas movido por ideias delirantes que alteram seu juízo de realidade. Nesse caso, ele tem preservada sua capacidade de entendimento e prejudicada sua capacidade de autodeterminação.
- 110** Desde a publicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Código Civil passou a definir como absolutamente incapazes para os atos da vida civil apenas os menores de dezesseis anos de idade, enquanto os dependentes de álcool ou outras drogas podem ter incapacidade civil relativa.
- 111** A avaliação da imputabilidade pode ser retroativa, quando analisa o estado mental do agente ao tempo da prática do ato ilícito, ou prospectiva, quando avalia o estado mental do agente ao tempo do planejamento do crime.

Julgue os itens a seguir, referentes à perícia oficial em saúde do servidor público federal.

- 112** Considere que um delegado da Polícia Federal tenha desenvolvido quadro de transtorno do estresse pós-traumático por envolvimento em evento crítico no trabalho e que isso tenha motivado sua incapacidade laborativa por doze meses. Considere, ainda, que ele tenha retornado ao trabalho e se aposentado por tempo de serviço quatro anos depois. Nessa situação, o servidor faz jus à isenção de imposto de renda dos proventos, em razão do antecedente de doença ocupacional.
- 113** São excepcionalmente considerados casos de alienação mental os graves e persistentes transtornos mentais refratários a tratamento e decorrentes do uso de substâncias psicoativas.
- 114** Suponha que um servidor público federal portador de diabetes tipo 2 e insulino dependente de longa data tenha desenvolvido neuropatia periférica e vasculite seguida de trombose em membro inferior direito, com grave e irreversível comprometimento da capacidade de deambular e alteração da sensibilidade. Nesse caso, trata-se de doença especificada em lei como equivalente a paralisia incapacitante.

115 Considere que uma servidora pública federal da área administrativa apresente, aos pequenos esforços, fadiga, palpitação e dispnéia, apesar de assintomática em repouso. Considere, ainda, que, ao exame de ecocardiograma, ela apresente fração de ejeção de 38%, devido a hipocontratibilidade, e dilatação ventricular. Nessa situação, a referida servidora deverá ser considerada portadora de cardiopatia grave especificada em lei.

116 Comprovação radiológica de anquilose da coluna vertebral e respectiva cintilografia óssea não são suficientes para a caracterização pericial da doença especificada em lei como espondilite anquilosante, pois é necessária, também, a apresentação do resultado do teste sorológico HLA-B 27 positivo.

Em relação à perícia médica previdenciária, julgue os itens que se seguem.

- 117** O nexo técnico epidemiológico previdenciário entre o trabalho e o agravo à saúde é decorrente da relação entre a atividade empresarial e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID).
- 118** Caracteriza-se como acidente de trabalho tipificado como de trajeto o acidente sofrido por policial federal em viatura durante diligência rotineira.
- 119** Caso um médico-assistente psiquiatra emita, com base na anamnese médica, relatório de incapacidade laborativa de trabalhador por trinta dias devido à síndrome de *burnout*, o médico do trabalho perito da empresa poderá discordar do período do afastamento, mas não do nexo entre o trabalho e a doença, por aspectos éticos.
- 120** Pintor com antecedentes de asma brônquica que apresenta quadro de broncoespasmo relacionado ao trabalho integra o grupo II da classificação de Schilling.

Espaço livre