

Fluxograma 3


MANEJO DAS MANIFESTAÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS DA CHIKUNGUNYA NA CRIANÇA

Tratamento da fase aguda (até 14 dias)

ATENÇÃO: este fluxograma destina-se ao tratamento das manifestações musculoesqueléticas, entretanto, é preciso estar atento aos sinais de gravidade e às complicações descritos nas diretrizes do MS de manejo da febre chikungunya.


NÃO É RECOMENDADO, NESTA FASE, O USO DE GLICOCORTICÓIDES.

OBSERVAÇÃO: crianças menores de 3 meses de idade ou pesando menos de 5 kg não devem ser tratadas com Dipirona.



*Analgésicos: utilizar sempre em doses fixas. Perguntar sempre sobre história de alergia à Dipirona.
- Não utilizar anti-inflamatório não hormonal (AINH) ou aspirina (ácido acetilsalicílico) pelo risco de infecção/coinfecção por dengue.
- Não utilizar glicocorticoide devido ao risco de complicações.

Tratamento da fase pós-aguda (15 dias a 90 dias)



Tratamento da fase crônica (maior que 90 dias)

Encaminhar para o Serviço de Reumatologia Pediátrica (avaliação do especialista).

Deve-se consultar o manual sobre as observações e contraindicações de cada medicamento.

Fonte: DEDT/SUSA/MS.