

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Amapá	Serra do Navio	160005	50,00	348,75	22,6197	MUITO INTENSO
Amazonas	Presidente Figueiredo	130353	162,00	169,62	22,54737	MUITO INTENSO
Amazonas	Rio Preto da Eva	130356	120,67	160,61	18,4493	MUITO INTENSO
Roraima	Caroebe	140023	72,33	215,12	17,22901	MUITO INTENSO
Amapá	Pedra Branca do Amapari	160015	62,67	157,35	13,21426	INTENSO
Pará	Portel	150580	118,33	62,01	12,83193	INTENSO
Pará	Almeirim	150050	95,67	92,03	12,50456	INTENSO
Pará	Itaituba	150360	126,00	33,36	11,92711	INTENSO
Amapá	Calçoene	160020	49,67	152,79	11,83026	INTENSO
Amazonas	Manaus	130260	138,33	2,17	11,28971	INTENSO
Acre	Xapuri	120070	62,33	112,87	10,74261	INTENSO
Mato Grosso	Vila Bela da Santíssima Trindade	510550	57,67	113,41	10,36556	INTENSO
Pará	Uruará	150815	83,67	63,63	9,898738	INTENSO
Mato Grosso	Tesouro	510810	15,33	169,79	9,770951	INTENSO
Acre	Marechal Thaumaturgo	120035	52,67	101,99	9,30272	INTENSO
Ceará	Pacoti	230980	40,00	118,24	9,090704	INTENSO
Rondônia	Vilhena	110030	92,33	31,06	8,865728	INTENSO
Mato Grosso	Guiratinga	510420	37,00	114,14	8,603858	INTENSO
Amazonas	Boca do Acre	130070	67,67	62,53	8,443501	INTENSO
Amapá	Laranjal do Jari	160027	63,67	59,44	7,925059	INTENSO
Ceará	Graça	230465	40,33	95,93	7,894839	INTENSO
Acre	Assis Brasil	120005	28,33	113,95	7,83795	INTENSO
Pará	Monte Alegre	150480	72,67	39,98	7,641285	INTENSO
Bahia	Mutuípe	292240	48,00	79,14	7,641074	INTENSO
Acre	Sena Madureira	120050	64,00	50,88	7,483965	INTENSO
Amapá	Porto Grande	160053	44,00	80,53	7,368751	INTENSO
Pará	Medicilândia	150445	53,00	64,61	7,279115	INTENSO
Rondônia	Espigão D'Oeste	110009	54,33	60,20	7,153198	INTENSO
Goiás	Baliza	520310	12,67	126,33	7,152205	INTENSO
Pará	Prainha	150600	57,33	53,27	7,034202	INTENSO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Maranhão	Axixá	210110	32,67	92,22	7,022642	INTENSO
Mato Grosso	Brasnorte	510190	40,67	79,10	6,999333	INTENSO
Bahia	Wenceslau Guimarães	293350	47,67	64,75	6,821857	INTENSO
Pará	Placas	150565	41,00	73,16	6,702653	INTENSO
Roraima	Mucajá	140030	40,67	73,53	6,693789	INTENSO
Mato Grosso	Conquista D'Oeste	510336	13,00	113,86	6,496169	INTENSO
Tocantins	Tocantínia	172110	22,00	97,08	6,359554	INTENSO
Minas Gerais	Varzelândia	317090	38,67	68,05	6,218222	INTENSO
Acre	Brasiléia	120010	45,33	57,13	6,200089	INTENSO
Minas Gerais	Montes Claros	314330	77,33	6,14	6,18983	INTENSO
Rondônia	Chupinguaia	110092	24,33	84,53	5,873845	ALTO
Maranhão	Marajá do Sena	210635	19,33	91,65	5,828858	ALTO
Roraima	Rorainópolis	140047	47,00	46,05	5,73698	ALTO
Mato Grosso	Chapada dos Guimarães	510300	34,67	60,55	5,457931	ALTO
Rondônia	Parecis	110145	12,00	95,51	5,40139	ALTO
Mato Grosso	Aripuanã	510140	39,00	51,90	5,360787	ALTO
Pará	Goianésia do Pará	150309	39,33	49,63	5,264956	ALTO
Pará	Parauapebas	150553	64,00	7,78	5,117276	ALTO
Amapá	Oiapoque	160050	40,00	45,17	5,078602	ALTO
Pará	Altamira	150060	58,33	15,21	5,031621	ALTO
Pará	Senador José Porfírio	150780	35,00	51,08	4,966746	ALTO
Acre	Mâncio Lima	120033	32,33	55,04	4,951901	ALTO
Rondônia	Machadinho D'Oeste	110013	40,00	42,74	4,945109	ALTO
Mato Grosso	General Carneiro	510390	15,00	81,82	4,911324	ALTO
Pará	Santarém	150680	62,33	6,19	4,8851	ALTO
Goiás	Cavalcante	520530	20,67	71,56	4,841888	ALTO
Pará	Oriximiná	150530	50,33	24,15	4,824733	ALTO
Mato Grosso	Araguainha	510120	3,00	99,14	4,816363	ALTO
Mato Grosso	Juína	510515	45,00	32,33	4,809258	ALTO
Minas Gerais	Januária	313520	49,00	24,90	4,750107	ALTO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Maranhão	Açailândia	210005	53,33	16,58	4,671022	ALTO
Pará	Anapu	150085	38,00	39,40	4,587111	ALTO
Pará	Alenquer	150040	48,33	22,91	4,582412	ALTO
Pará	Jacareacanga	150375	33,33	45,31	4,504742	ALTO
Rondônia	Porto Velho	110020	59,00	4,18	4,484079	ALTO
Acre	Manoel Urbano	120034	22,67	61,74	4,477147	ALTO
Mato Grosso	Pontes e Lacerda	510675	43,67	27,68	4,437568	ALTO
Amapá	Tartarugalzinho	160070	23,33	59,09	4,389692	ALTO
Pará	São Félix do Xingu	150730	45,33	23,06	4,329117	ALTO
Acre	Feijó	120030	37,67	35,05	4,319497	ALTO
Pará	Rurópolis	150619	37,67	34,90	4,3112	ALTO
Pará	Óbidos	150510	42,67	26,65	4,29365	ALTO
Mato Grosso	Ribeirão Cascalheira	510718	19,33	63,15	4,264224	ALTO
Pará	Oeiras do Pará	150520	36,33	35,60	4,23334	ALTO
Bahia	Valença	293290	47,00	18,23	4,209562	ALTO
Pará	Brasil Novo	150172	31,33	41,90	4,143448	ALTO
Acre	Rio Branco	120040	54,33	4,90	4,116666	ALTO
Acre	Santa Rosa do Purus	120043	14,00	68,73	4,105616	ALTO
Mato Grosso	Campinápolis	510260	24,33	52,28	4,10287	ALTO
Pará	Pacajá	150548	38,00	30,53	4,099936	ALTO
Ceará	Itapagé	230630	39,67	27,47	4,077267	ALTO
Rondônia	Cabixi	110003	11,67	69,95	3,969193	ALTO
Pará	Trairão	150805	23,33	50,71	3,929667	ALTO
Goiás	Bom Jardim de Goiás	520340	15,00	63,90	3,92715	ALTO
Amazonas	Humaitá	130170	40,67	23,08	3,923266	ALTO
Amapá	Vitória do Jari	160080	19,33	56,66	3,907552	ALTO
Maranhão	Brejo de Areia	210215	16,67	60,07	3,862628	ALTO
Mato Grosso	Torixoréu	510820	9,00	71,55	3,824211	ALTO
Maranhão	Arame	210095	29,67	38,52	3,812313	ALTO
Maranhão	Santa Luzia	211000	39,33	22,67	3,785005	ALTO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Roraima	Amajari	140002	21,67	50,42	3,768143	ALTO
Roraima	Alto Alegre	140005	26,67	41,60	3,719965	ALTO
Amazonas	Novo Aripuanã	130330	28,00	39,06	3,696486	ALTO
Mato Grosso	Comodoro	510330	24,00	43,69	3,602133	ALTO
Amazonas	Itacoatiara	130190	42,33	13,56	3,546122	ALTO
Minas Gerais	São João do Pacuí	316265	8,00	66,92	3,482738	ALTO
Tocantins	Rio Sono	171875	9,33	64,62	3,472681	ALTO
Bahia	Palmeiras	292350	16,67	52,73	3,459465	ALTO
Mato Grosso	Nova Nazaré	510617	8,33	65,82	3,451701	ALTO
Pará	Juruti	150390	35,00	22,92	3,420537	ALTO
Mato Grosso	Barra do Garças	510180	38,00	18,01	3,412582	ALTO
Minas Gerais	São João das Missões	316245	19,00	48,07	3,406753	ALTO
Pará	Baião	150120	35,00	22,28	3,385395	ALTO
Rondônia	São Francisco do Guaporé	110149	21,67	43,10	3,366688	ALTO
Maranhão	Barreirinhas	210170	37,00	18,66	3,361158	ALTO
Maranhão	São Benedito do Rio Preto	211040	22,33	40,36	3,273987	ALTO
Pará	Novo Progresso	150503	29,67	28,54	3,264309	ALTO
Mato Grosso	Rondonópolis	510760	43,67	5,82	3,23717	ALTO
Rondônia	Castanheiras	110090	6,33	63,97	3,17558	ALTO
Pará	Tailândia	150795	36,00	16,51	3,155924	ALTO
Pará	Ipixuna do Pará	150345	27,33	30,07	3,144908	ALTO
Pará	Paragominas	150550	38,67	12,03	3,142277	ALTO
Mato Grosso	Nova Mutum	510622	33,67	19,22	3,101439	ALTO
Acre	Bujari	120013	17,33	44,36	3,057802	ALTO
Goiás	Colinas do Sul	520552	7,33	60,17	3,054038	ALTO
Rondônia	Pimenteiras do Oeste	110146	4,33	64,92	3,053634	ALTO
Mato Grosso	Porto Estrela	510685	6,00	62,22	3,050611	ALTO
Mato Grosso	Alta Floresta	510025	33,33	18,70	3,043765	ALTO
Goiás	Alto Paraíso de Goiás	520060	15,00	47,71	3,038277	ALTO
Pará	Marabá	150420	41,33	5,09	2,993978	ALTO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Maranhão	Luís Domingues	210620	11,33	52,71	2,993544	ALTO
Pará	Mojuí dos Campos	150475	23,33	32,96	2,95489	ALTO
Pará	Ulianópolis	150812	28,33	24,75	2,940207	ALTO
Maranhão	Paulo Ramos	210810	21,67	35,30	2,938328	ALTO
Amazonas	Apuí	130014	21,67	34,68	2,904284	ALTO
Maranhão	São João do Carú	211102	16,00	43,36	2,886717	ALTO
Mato Grosso	Nova Maringá	510890	9,33	53,41	2,857138	ALTO
Mato Grosso	São José do Rio Claro	510730	17,67	39,82	2,837752	ALTO
Ceará	Baturité	230210	26,67	24,85	2,800159	ALTO
Acre	Capixaba	120017	14,00	44,34	2,76593	ALTO
Ceará	Uruburetama	231380	20,67	33,53	2,753777	ALTO
Pará	Novo Repartimento	150506	31,00	16,89	2,740659	ALTO
Bahia	Itamari	291570	10,33	48,52	2,676049	ALTO
Ceará	São Benedito	231230	28,00	19,34	2,613657	ALTO
Pará	Rondon do Pará	150618	28,33	17,59	2,547112	ALTO
Mato Grosso	Santa Rita do Trivelato	510776	5,33	54,08	2,545707	ALTO
Ceará	Guaramiranga	230510	8,33	48,46	2,498461	ALTO
Mato Grosso	Juara	510510	24,33	23,00	2,495162	ALTO
Ceará	Guaraciaba do Norte	230500	25,67	20,04	2,448803	ALTO
Maranhão	Buriticupu	210232	27,67	16,60	2,434206	ALTO
Bahia	Una	293250	17,67	32,44	2,432576	ALTO
Pará	Belterra	150145	17,67	32,20	2,419459	ALTO
Mato Grosso	Canabrava do Norte	510269	6,67	49,57	2,414055	ALTO
Pará	Moju	150470	30,33	11,91	2,40921	ALTO
Amapá	Mazagão	160040	19,67	28,69	2,401079	ALTO
Mato Grosso	Ponte Branca	510670	3,33	54,61	2,40015	ALTO
Mato Grosso	Colniza	510325	20,67	26,65	2,376056	ALTO
Mato Grosso	Confresa	510335	23,67	21,89	2,376032	ALTO
Amazonas	Itapiranga	130200	12,33	39,68	2,364753	ALTO
Mato Grosso	Rondolândia	510757	5,33	50,56	2,352302	ALTO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Mato Grosso	Sinop	510790	33,33	5,52	2,320049	ALTO
Rondônia	Vale do Anari	110175	10,00	41,98	2,287694	ALTO
Pará	Tomé-Açu	150800	27,67	13,43	2,260262	ALTO
Tocantins	Dois Irmãos do Tocantins	170720	8,33	43,79	2,242031	ALTO
Amazonas	Lábrea	130240	24,67	17,74	2,235698	ALTO
Pará	Vitória do Xingu	150835	15,33	32,47	2,230566	ALTO
Acre	Cruzeiro do Sul	120020	29,00	10,31	2,205423	MÉDIO
Amazonas	Eirunepé	130140	21,67	21,37	2,173369	MÉDIO
Maranhão	Icatu	210510	19,00	25,37	2,160537	MÉDIO
Pará	Bagre	150110	21,00	21,67	2,131785	MÉDIO
Rondônia	Alta Floresta D'Oeste	110001	17,67	26,60	2,111657	MÉDIO
Mato Grosso	Nova Bandeirantes	510615	13,67	32,90	2,10876	MÉDIO
Mato Grosso	Apiacás	510080	10,00	38,65	2,10521	MÉDIO
Minas Gerais	Reduto	315415	9,33	39,20	2,076865	MÉDIO
Amazonas	Envira	130150	15,33	29,34	2,058941	MÉDIO
Acre	Porto Acre	120080	15,00	29,75	2,052151	MÉDIO
Mato Grosso	Cáceres	510250	27,00	9,98	2,012948	MÉDIO
Acre	Porto Walter	120039	11,33	34,70	2,004124	MÉDIO
Piauí	Barro Duro	220140	8,00	39,98	2,003703	MÉDIO
Acre	Epitaciolândia	120025	15,67	27,61	1,99264	MÉDIO
Tocantins	Brejinho de Nazaré	170370	6,00	42,29	1,956374	MÉDIO
Bahia	Ibicoara	291220	16,33	25,86	1,954848	MÉDIO
Tocantins	Centenário	170410	3,00	46,92	1,94871	MÉDIO
Rondônia	Campo Novo de Rondônia	110070	9,67	35,86	1,922951	MÉDIO
Mato Grosso	Marcelândia	510558	11,33	33,13	1,91822	MÉDIO
Mato Grosso	Santa Cruz do Xingu	510774	3,67	45,17	1,910735	MÉDIO
Roraima	Cantá	140017	15,00	26,17	1,855512	MÉDIO
Minas Gerais	São Domingos das Dores	316095	6,67	39,34	1,852507	MÉDIO
Amazonas	Pauini	130350	15,00	25,57	1,822444	MÉDIO
Pará	Tucumã	150808	20,33	16,96	1,81504	MÉDIO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Roraima	Pacaraima	140045	15,00	25,10	1,796758	MÉDIO
Mato Grosso	Paranaíta	510629	11,00	31,09	1,777022	MÉDIO
Pernambuco	Escada	260520	22,67	12,49	1,772883	MÉDIO
Maranhão	Lago da Pedra	210570	20,67	15,46	1,761428	MÉDIO
Amazonas	Maués	130290	22,67	12,18	1,755983	MÉDIO
Maranhão	Alto Alegre do Pindaré	210047	16,67	21,46	1,742242	MÉDIO
Amazonas	Atalaia do Norte	130020	12,67	27,20	1,708839	MÉDIO
Bahia	São José da Vitória	292935	6,00	37,47	1,691707	MÉDIO
Amazonas	Manicoré	130270	21,33	13,03	1,685993	MÉDIO
Mato Grosso	Poxoréu	510700	15,67	22,00	1,684716	MÉDIO
Goiás	Santa Helena de Goiás	521930	18,67	16,00	1,616786	MÉDIO
Mato Grosso	Serra Nova Dourada	510788	2,33	41,90	1,615065	MÉDIO
Mato Grosso	Diamantino	510350	14,67	22,15	1,605775	MÉDIO
Roraima	São João da Baliza	140050	8,67	31,60	1,601918	MÉDIO
Mato Grosso	Porto dos Gaúchos	510680	6,00	35,52	1,584571	MÉDIO
Pará	Breu Branco	150178	19,33	13,95	1,562217	MÉDIO
Acre	Jordão	120032	8,67	30,84	1,559881	MÉDIO
Pará	Cumaru do Norte	150276	11,33	26,58	1,558497	MÉDIO
Rondônia	Alto Alegre dos Parecis	110037	10,00	28,36	1,539879	MÉDIO
Tocantins	Lavandeira	171215	2,00	41,00	1,536648	MÉDIO
Mato Grosso	Nova Brasilândia	510620	4,33	37,08	1,524935	MÉDIO
Maranhão	Sucupira do Riachão	211195	5,33	35,48	1,524256	MÉDIO
Ceará	Ibiapina	230530	14,67	20,21	1,499127	MÉDIO
Ceará	Ipu	230580	18,00	14,46	1,474351	MÉDIO
Pará	Abel Figueiredo	150013	6,67	32,34	1,468014	MÉDIO
Maranhão	Itinga do Maranhão	210542	14,00	20,67	1,466695	MÉDIO
Paraná	São Jorge do Ivaí	412530	5,33	34,39	1,464282	MÉDIO
Paraná	Cerro Azul	410520	11,67	23,97	1,444424	MÉDIO
Tocantins	Palmas	172100	25,00	2,70	1,438604	MÉDIO
Mato Grosso	Paranatinga	510630	15,00	18,47	1,432948	MÉDIO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Amazonas	Nhamundá	130300	13,00	21,32	1,414782	MÉDIO
Rondônia	Ji-Paraná	110012	22,67	5,96	1,414319	MÉDIO
Acre	Rodrigues Alves	120042	11,00	24,43	1,411442	MÉDIO
Pará	Bannach	150125	4,33	34,97	1,409136	MÉDIO
Maranhão	Alcântara	210020	12,33	22,18	1,404253	MÉDIO
Rondônia	Cujubim	110094	11,00	24,24	1,400765	MÉDIO
Maranhão	Santa Quitéria do Maranhão	211010	14,00	19,40	1,396654	MÉDIO
Mato Grosso	Canarana	510270	14,67	18,32	1,39553	MÉDIO
Pará	Ourilândia do Norte	150543	16,00	16,12	1,39072	MÉDIO
Minas Gerais	Manhuaçu	313940	21,33	7,62	1,38899	MÉDIO
Maranhão	Turiaçu	211240	16,67	14,78	1,375259	MÉDIO
Amazonas	Guajará	130165	10,33	24,73	1,369675	MÉDIO
Goiás	Niquelândia	521460	16,00	15,30	1,345877	MÉDIO
Rio Grande do Norte	São Miguel	241250	13,67	19,00	1,345814	MÉDIO
Mato Grosso	Peixoto de Azevedo	510642	15,67	15,76	1,341954	MÉDIO
Rondônia	Nova Mamoré	110033	14,00	18,15	1,32826	MÉDIO
Minas Gerais	Simonésia	316760	12,33	20,57	1,315725	MÉDIO
Bahia	Maraú	292070	13,67	18,38	1,311586	MÉDIO
Mato Grosso	Itanhangá	510454	6,67	28,92	1,279916	MÉDIO
Pará	Rio Maria	150616	11,67	20,87	1,274019	MÉDIO
Mato Grosso	Nova Xavantina	510625	13,33	17,97	1,260075	MÉDIO
Maranhão	Belágua	210173	7,00	27,58	1,23564	MÉDIO
Mato Grosso	Cotriguaçu	510337	8,33	25,41	1,232477	MÉDIO
Mato Grosso	Novo Horizonte do Norte	510627	3,33	33,26	1,228001	MÉDIO
Rondônia	Cacaulândia	110060	4,00	31,89	1,210649	MÉDIO
Mato Grosso	Ribeirãozinho	510719	2,67	33,95	1,207649	MÉDIO
Amazonas	Manacapuru	130250	20,00	6,36	1,203811	MÉDIO
Mato Grosso	Novo São Joaquim	510628	6,00	28,42	1,194587	MÉDIO
Maranhão	Itapecuru Mirim	210540	17,67	9,66	1,181662	MÉDIO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Minas Gerais	Almenara	310170	15,67	12,73	1,175637	MÉDIO
Bahia	Teolândia	293160	10,00	21,66	1,172225	MÉDIO
Tocantins	Pium	171750	6,00	28,01	1,17183	MÉDIO
Maranhão	Chapadinha	210320	18,67	7,58	1,154626	MÉDIO
Amapá	Pracuúba	160055	3,67	31,27	1,147911	MÉDIO
Amazonas	Japurá	130210	7,00	25,98	1,147905	MÉDIO
Minas Gerais	Cônego Marinho	311783	6,00	27,45	1,141141	MÉDIO
Goiás	Trombas	522145	3,00	32,15	1,137687	MÉDIO
Amazonas	Novo Airão	130320	10,00	21,00	1,13574	MÉDIO
Amazonas	São Gabriel da Cachoeira	130380	16,67	10,41	1,135545	MÉDIO
Paraná	Adrianópolis	410020	5,33	28,30	1,129757	MÉDIO
Maranhão	Caxias	210300	20,33	4,28	1,11884	MÉDIO
Paraná	Japurá	411240	7,00	25,22	1,105991	MÉDIO
Goiás	Divinópolis de Goiás	520830	4,00	29,96	1,104977	MÉDIO
Pará	Irituia	150350	13,67	14,60	1,104209	MÉDIO
Mato Grosso	Primavera do Leste	510704	18,33	6,98	1,09256	MÉDIO
Ceará	Pereiro	231080	9,67	20,69	1,089659	MÉDIO
São Paulo	Eldorado	351480	8,67	22,07	1,078624	MÉDIO
Ceará	Barbalha	230190	17,67	7,75	1,076783	MÉDIO
Rondônia	Colorado do Oeste	110006	9,67	20,26	1,065926	MÉDIO
Mato Grosso	Nova Canaã do Norte	510621	8,00	22,73	1,056625	MÉDIO
Pernambuco	Jaqueira	260795	7,33	23,59	1,045424	MÉDIO
Acre	Tarauacá	120060	15,00	11,37	1,042903	MÉDIO
Bahia	Santa Maria da Vitória	292810	14,33	12,26	1,033593	MÉDIO
Rondônia	Costa Marques	110008	8,33	21,65	1,026198	MÉDIO
Mato Grosso	Tabaporã	510794	7,00	23,72	1,02393	MÉDIO
São Paulo	Itariri	352330	9,33	19,98	1,021858	MÉDIO
Maranhão	Bom Jesus das Selvas	210203	12,67	14,67	1,020876	MÉDIO
Minas Gerais	São Francisco	316110	15,67	9,85	1,017374	MÉDIO
Minas Gerais	Martins Soares	314053	6,33	24,64	1,01633	MÉDIO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Tocantins	São Bento do Tocantins	172010	4,67	27,23	1,01319	MÉDIO
Maranhão	Zé Doca	211400	14,33	11,66	1,000647	MÉDIO
Mato Grosso do Sul	Corguinho	500310	4,00	27,88	0,9903368	MÉDIO
Maranhão	Amarante do Maranhão	210060	13,67	12,22	0,9731569	MÉDIO
Bahia	Utinga	293280	9,33	19,06	0,9713405	MÉDIO
Minas Gerais	São João do Paraíso	316270	11,33	15,63	0,957231	MÉDIO
Mato Grosso	Nortelândia	510600	4,67	26,17	0,9548026	MÉDIO
Mato Grosso	Querência	510706	12,00	14,35	0,9450032	MÉDIO
Amazonas	Ipixuna	130180	11,33	15,40	0,9443577	MÉDIO
Goiás	Mimoso de Goiás	521305	2,33	29,63	0,9415003	MÉDIO
Mato Grosso	Feliz Natal	510370	7,00	22,16	0,9378434	MÉDIO
Tocantins	Xambioá	172210	7,00	22,15	0,9376604	MÉDIO
Minas Gerais	Araçuaí	310340	13,00	12,57	0,9346844	MÉDIO
Minas Gerais	Santa Bárbara do Leste	315725	6,00	23,39	0,9186328	MÉDIO
Maranhão	Vitorino Freire	211300	12,33	13,18	0,9101224	MÉDIO
Mato Grosso	Itaúba	510455	4,00	26,38	0,9081547	MÉDIO
Bahia	Coribe	290910	8,33	19,49	0,9077136	MÉDIO
Roraima	Caracará	140020	10,33	16,26	0,9046472	MÉDIO
Mato Grosso	Nova Lacerda	510618	5,00	24,71	0,9034489	MÉDIO
Mato Grosso	Alto Paraguai	510050	5,67	23,58	0,9000066	MÉDIO
Paraná	Ivatuba	411160	2,33	28,73	0,8917151	MÉDIO
Pará	Porto de Moz	150590	13,33	10,87	0,8702741	MÉDIO
Bahia	Caém	290510	6,67	21,33	0,8634529	MÉDIO
Mato Grosso	Gaúcha do Norte	510385	6,00	22,39	0,8633565	MÉDIO
Minas Gerais	São João da Ponte	316240	10,67	14,81	0,8542086	MÉDIO
Tocantins	Goianorte	170830	3,67	25,70	0,8416346	MÉDIO
Rio Grande do Norte	Doutor Severiano	240320	5,00	23,57	0,8410953	MÉDIO
Mato Grosso	Pontal do Araguaia	510665	5,00	23,56	0,8404852	MÉDIO
Bahia	São Félix do Coribe	292905	8,33	18,13	0,8329748	MÉDIO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Amazonas	Silves	130400	7,00	19,92	0,8152717	MÉDIO
Pará	Redenção	150613	15,67	6,02	0,8073733	MÉDIO
Tocantins	Cachoeirinha	170382	1,67	28,24	0,807179	MÉDIO
Rondônia	Cacoal	110004	15,67	5,91	0,8013942	MÉDIO
Mato Grosso	União do Sul	510830	3,00	26,01	0,8007827	MÉDIO
Mato Grosso	Juruena	510517	6,33	20,71	0,8000445	MÉDIO
Bahia	Buerarema	290470	8,00	17,95	0,7940319	MÉDIO
Bahia	Piraí do Norte	292467	6,67	20,05	0,7930459	MÉDIO
Minas Gerais	São João da Lagoa	316225	3,67	24,81	0,7930086	MÉDIO
Minas Gerais	Francisco Badaró	312650	5,00	22,63	0,7892967	MÉDIO
Rondônia	Nova Brasilândia D'Oeste	110014	8,33	17,33	0,7889246	MÉDIO
Minas Gerais	Brasília de Minas	310860	11,67	12,03	0,7888576	MÉDIO
Maranhão	Matões	210660	11,67	12,02	0,7879424	MÉDIO
Paraná	Tuneiras do Oeste	412790	5,33	22,02	0,7852266	MÉDIO
Bahia	Camamu	290580	11,33	12,34	0,7765156	MÉDIO
Maranhão	Cândido Mendes	210260	9,33	15,50	0,7759213	MÉDIO
Tocantins	Recursolândia	171850	2,67	25,94	0,7675748	MÉDIO
Pará	Dom Eliseu	150293	14,00	7,93	0,7670785	MÉDIO
Maranhão	Codó	210330	16,00	4,64	0,7604734	MÉDIO
Maranhão	Formosa da Serra Negra	210409	8,67	16,22	0,7570334	MÉDIO
Pará	Tucuruí	150810	15,33	5,54	0,7519574	MÉDIO
Rondônia	Rio Crespo	110026	2,67	25,61	0,7496375	MÉDIO
Bahia	Cocos	290810	9,00	15,47	0,745032	MÉDIO
Maranhão	Buriti	210220	11,00	12,26	0,7429417	MÉDIO
Tocantins	Ponte Alta do Tocantins	171790	5,00	21,68	0,7374982	MÉDIO
Maranhão	Urbano Santos	211260	11,33	11,48	0,7291098	MÉDIO
Bahia	Jiquiriçá	291820	7,33	17,81	0,7282263	MÉDIO
Bahia	Iguaí	291350	9,33	14,38	0,7142389	MÉDIO
Mato Grosso	Santo Antônio do Leste	510779	3,00	24,32	0,7081065	MÉDIO
Maranhão	Viana	211280	13,00	8,42	0,7064412	MÉDIO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Bahia	Nova Ibiá	292275	4,33	22,17	0,7059809	MÉDIO
Maranhão	Lago do Junco	210580	5,67	19,82	0,6935444	MÉDIO
Amazonas	Borba	130080	11,00	11,05	0,6766225	MÉDIO
Bahia	Saúde	292980	6,00	18,97	0,6756858	MÉDIO
Mato Grosso	Vera	510850	6,67	17,72	0,6654103	MÉDIO
Minas Gerais	Umburatiba	317030	2,00	24,84	0,6492386	MÉDIO
Bahia	Jacobina	291750	14,00	5,63	0,640358	MÉDIO
Maranhão	Centro Novo do Maranhão	210317	7,67	15,67	0,6395946	MÉDIO
Paraíba	Pilões	251160	4,33	20,73	0,6272764	MÉDIO
Rondônia	Alto Paraíso	110040	7,67	15,44	0,6269042	MÉDIO
Bahia	Laje	291880	8,67	13,71	0,6191479	MÉDIO
Mato Grosso	Carlinda	510279	5,67	18,29	0,6091657	MÉDIO
Mato Grosso	Tangará da Serra	510795	14,33	4,44	0,6045011	MÉDIO
Maranhão	Passagem Franca	210790	7,67	14,74	0,5889552	MÉDIO
Tocantins	Aurora do Tocantins	170270	2,33	23,20	0,5881839	MÉDIO
Minas Gerais	Nova Lima	314480	14,33	4,13	0,5874789	MÉDIO
Rondônia	Governador Jorge Teixeira	110100	4,67	19,37	0,5815966	MÉDIO
Mato Grosso	Guarantã do Norte	510410	10,00	10,73	0,571752	MÉDIO
Rondônia	Guajará-Mirim	110010	11,00	9,12	0,5707068	MÉDIO
Mato Grosso	Nova Guarita	510880	3,00	21,80	0,5694889	MÉDIO
Tocantins	Riachinho	171855	2,67	22,23	0,5639191	MÉDIO
Piauí	Teresina	221100	16,00	0,61	0,5390635	MÉDIO
Tocantins	São Salvador do Tocantins	172025	1,67	23,29	0,5353737	MÉDIO
Bahia	Amargosa	290100	10,33	9,37	0,5263162	MÉDIO
Mato Grosso	Cuiabá	510340	15,67	0,80	0,5204372	MÉDIO
Maranhão	Carutapera	210290	8,67	11,90	0,5197605	MÉDIO
Minas Gerais	Teófilo Otoni	316860	14,00	3,38	0,5169932	MÉDIO
Maranhão	Cantanhede	210270	8,67	11,83	0,5158558	MÉDIO
Bahia	Pindobaçu	292460	7,67	13,28	0,5084813	MÉDIO
Mato Grosso	Cláudia	510305	5,00	17,47	0,5061433	MÉDIO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Maranhão	Presidente Vargas	210930	5,33	16,81	0,4987176	MÉDIO
Ceará	Ubajara	231360	9,67	9,82	0,4927856	MÉDIO
Pará	Mocajuba	150460	9,00	10,87	0,4923842	MÉDIO
Rondônia	Ariquemes	110002	13,00	4,36	0,483933	MÉDIO
Ceará	Horizonte	230523	12,33	5,40	0,4828604	MÉDIO
Paraná	Alto Paraíso	412862	2,00	21,72	0,4779189	MÉDIO
Pará	Itupiranga	150370	11,00	7,30	0,4705873	MÉDIO
Bahia	Barra da Estiva	290280	8,67	10,98	0,4694262	MÉDIO
Pará	Jacundá	150380	10,00	8,82	0,4673006	MÉDIO
Maranhão	Fernando Falcão	210408	5,33	16,21	0,4659546	MÉDIO
Pará	São Geraldo do Araguaia	150745	8,33	11,39	0,4626973	MÉDIO
Goiás	Campinaçu	520465	2,33	20,82	0,4574367	MÉDIO
Mato Grosso	Matupá	510560	7,67	12,34	0,4571098	MÉDIO
Mato Grosso	Luciara	510530	1,67	21,58	0,4413553	MÉDIO
Piauí	Antônio Almeida	220080	2,00	20,98	0,4375904	MÉDIO
Maranhão	Jatobá	210545	4,00	17,79	0,4366594	MÉDIO
Mato Grosso	Nova Monte Verde	510895	4,33	17,25	0,4357009	MÉDIO
Minas Gerais	Felício dos Santos	312540	3,00	19,34	0,4344099	MÉDIO
Acre	Plácido de Castro	120038	6,67	13,42	0,4289915	MÉDIO
Paraíba	Baía da Traição	250140	4,67	16,44	0,4205878	MÉDIO
Mato Grosso do Sul	Bodoquena	500215	4,33	16,86	0,41453	MÉDIO
Mato Grosso	São José do Xingu	510735	3,33	18,38	0,4109992	MÉDIO
Maranhão	Coroatá	210360	11,00	6,12	0,4058543	MÉDIO
Maranhão	Nina Rodrigues	210720	6,00	14,03	0,4043076	MÉDIO
Maranhão	Jenipapo dos Vieiras	210547	6,67	12,95	0,4033057	MÉDIO
Maranhão	Bom Jardim	210200	9,00	9,02	0,3907394	MÉDIO
Rondônia	São Miguel do Guaporé	110032	7,33	11,60	0,3871732	MÉDIO
Paraíba	Matinhas	250933	2,67	18,94	0,3835087	MÉDIO
Roraima	Iracema	140028	4,67	15,52	0,3700094	MÉDIO
Pará	Água Azul do Norte	150034	6,67	12,32	0,3684073	MÉDIO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Paraíba	Marcação	250905	4,33	15,94	0,3638906	MÉDIO
São Paulo	Iporanga	352120	2,33	19,10	0,3633573	MÉDIO
Minas Gerais	Três Marias	316935	8,33	9,51	0,3595272	MÉDIO
Bahia	Ituberá	291730	7,33	11,06	0,3576437	MÉDIO
Mato Grosso	Barra do Bugres	510170	8,33	9,45	0,3561105	MÉDIO
Maranhão	São Luís	211130	14,00	0,44	0,3558624	MÉDIO
Minas Gerais	Medina	314140	7,00	11,48	0,3514029	MÉDIO
Rondônia	Pimenta Bueno	110018	9,00	8,29	0,351021	MÉDIO
Goiás	São Patrício	522028	1,33	20,41	0,3476853	MÉDIO
Maranhão	Peritoró	210845	7,00	11,39	0,3468271	MÉDIO
Ceará	Itatira	230660	7,00	11,36	0,3448137	MÉDIO
Amazonas	Barcelos	130040	6,67	11,82	0,3411963	MÉDIO
Minas Gerais	Piau	315010	1,67	19,71	0,3384903	MÉDIO
Roraima	São Luiz	140060	3,67	16,53	0,3381694	MÉDIO
Maranhão	Poção de Pedras	210890	6,33	12,25	0,3356876	MÉDIO
Mato Grosso	São José do Povo	510729	1,67	19,59	0,3318401	MÉDIO
Tocantins	Carmolândia	170388	1,33	20,09	0,3304191	MÉDIO
Espírito Santo	Brejetuba	320115	5,33	13,61	0,3231882	MÉDIO
Mato Grosso	Terra Nova do Norte	510805	4,67	14,64	0,3217495	MÉDIO
Minas Gerais	Ipatinga	313130	12,67	1,84	0,3160731	MÉDIO
Amazonas	Parintins	130340	11,33	3,86	0,3111215	MÉDIO
Amazonas	Tapauá	130410	6,67	11,26	0,3106296	MÉDIO
Goiás	Minaçu	521308	7,67	9,46	0,2985415	MÉDIO
Mato Grosso	Água Boa	510020	8,00	8,80	0,2913599	MÉDIO
Maranhão	João Lisboa	210550	7,33	9,84	0,2906533	MÉDIO
Mato Grosso	Porto Alegre do Norte	510677	5,00	13,54	0,2903464	MÉDIO
Maranhão	Campestre do Maranhão	210255	5,00	13,48	0,2868688	MÉDIO
Maranhão	Morros	210710	6,33	11,27	0,2818146	MÉDIO
Amazonas	Canutama	130090	6,00	11,78	0,2809428	MÉDIO
Mato Grosso	Rosário Oeste	510770	5,67	12,29	0,2800709	MÉDIO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Maranhão	Sítio Novo	211180	6,00	11,69	0,2756958	MÉDIO
Mato Grosso	Nobres	510590	5,67	12,13	0,2712242	MÉDIO
Roraima	Boa Vista	140010	12,67	0,99	0,2696436	MÉDIO
Maranhão	Grajaú	210480	10,33	4,63	0,265798	MÉDIO
Paraíba	Alagoa Nova	250040	6,67	10,39	0,2624307	MÉDIO
Minas Gerais	Cachoeira de Pajeú	310270	4,00	14,61	0,261679	MÉDIO
Minas Gerais	Novorizonte	314537	2,33	16,98	0,2470088	MÉDIO
Rondônia	Theobroma	110160	3,67	14,86	0,2465305	MÉDIO
Pará	Curionópolis	150277	6,33	10,58	0,2441706	MÉDIO
Mato Grosso	Jauru	510500	3,67	14,70	0,2379279	MÉDIO
Paraná	Doutor Camargo	410730	3,00	15,72	0,2357571	MÉDIO
Tocantins	Rio da Conceição	171865	1,00	18,85	0,2333935	MÉDIO
Maranhão	Vargem Grande	211270	8,67	6,63	0,2303839	MÉDIO
São Paulo	Ribeira	354280	1,67	17,66	0,2261075	MÉDIO
Ceará	Crato	230420	11,00	2,78	0,2225764	MÉDIO
Bahia	Porto Seguro	292530	11,33	2,23	0,2212519	MÉDIO
Rondônia	Buritis	110045	7,33	8,56	0,2200633	MÉDIO
Tocantins	Oliveira de Fátima	171550	0,67	19,09	0,2173908	MÉDIO
Bahia	Wagner	293340	4,00	13,79	0,2166527	MÉDIO
Mato Grosso	Novo Mundo	510626	3,00	15,36	0,2157454	MÉDIO
Tocantins	Combinado	170555	2,33	16,29	0,2086327	MÉDIO
Mato Grosso do Sul	Iguatemi	500430	5,00	12,03	0,2076761	MÉDIO
Ceará	Tianguá	231340	10,00	4,06	0,2056842	MÉDIO
Ceará	Porteiras	231110	5,67	10,93	0,2049049	MÉDIO
Paraíba	Alagoa Grande	250030	7,00	8,80	0,2046708	MÉDIO
Maranhão	Itaipava do Grajaú	210535	5,00	11,96	0,2037714	MÉDIO
Minas Gerais	Congonhas	311800	9,00	5,61	0,2035567	MÉDIO
Bahia	Uruçuca	293270	6,33	9,82	0,2024389	MÉDIO
Roraima	Uiramutã	140070	5,00	11,93	0,2020021	MÉDIO
Tocantins	Goiatins	170900	4,67	12,43	0,200459	MÉDIO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Maranhão	Timbiras	211210	7,00	8,72	0,1999119	MÉDIO
Tocantins	Monte do Carmo	171360	2,67	15,59	0,1995597	MÉDIO
Tocantins	Taguatinga	172090	5,00	11,79	0,1942536	MÉDIO
Mato Grosso	Vila Rica	510860	6,00	10,06	0,1866193	MÉDIO
Mato Grosso	Alto Boa Vista	510035	2,67	15,34	0,1858931	MÉDIO
Maranhão	Presidente Juscelino	210920	4,33	12,65	0,1836022	MÉDIO
Bahia	Jitaúna	291830	5,00	11,56	0,1817463	MÉDIO
Maranhão	São João dos Patos	211110	6,67	8,79	0,1748795	MÉDIO
Ceará	Trairi	231350	9,00	5,05	0,172807	MÉDIO
Minas Gerais	Rio Pardo de Minas	315560	7,00	8,18	0,1706264	MÉDIO
Mato Grosso	Acorizal	510010	2,33	15,52	0,166779	MÉDIO
Bahia	Araças	290205	4,33	12,34	0,1664581	MÉDIO
Mato Grosso	Campo Novo do Parecis	510263	8,33	5,95	0,164291	MÉDIO
Pará	São Domingos do Araguaia	150715	6,00	9,45	0,1531851	MÉDIO
Tocantins	Wanderlândia	172208	4,00	12,60	0,1517367	MÉDIO
Amapá	Amapá	160010	3,33	13,58	0,1473084	MÉDIO
Maranhão	Mata Roma	210640	5,33	10,39	0,1461944	MÉDIO
Minas Gerais	Jenipapo de Minas	313545	2,67	14,56	0,1428192	MÉDIO
Bahia	Nilo Peçanha	292260	4,33	11,84	0,139003	MÉDIO
São Paulo	Itaóca	352215	1,67	15,98	0,1337974	MÉDIO
Pará	Viseu	150830	8,67	4,83	0,1318507	MÉDIO
Maranhão	Junco do Maranhão	210565	2,33	14,85	0,1298061	MÉDIO
Minas Gerais	Luislândia	313868	2,67	14,31	0,1293967	MÉDIO
Goiás	Itajá	521080	2,00	15,22	0,1210638	MÉDIO
Amazonas	Santa Isabel do Rio Negro	130360	4,67	10,98	0,1205953	MÉDIO
Rondônia	Candeias do Jamari	110080	6,00	8,85	0,119995	MÉDIO
Ceará	Itapipoca	230640	10,00	2,49	0,1193532	MÉDIO
Mato Grosso	Cocalinho	510310	2,67	14,12	0,1186587	MÉDIO
Ceará	Icó	230540	8,67	4,56	0,117147	MÉDIO
Minas Gerais	Inhapim	313090	6,00	8,77	0,1158462	MÉDIO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Pará	Bom Jesus do Tocantins	150157	5,33	9,78	0,1129433	MÉDIO
Maranhão	Santa Rita	211020	7,33	6,60	0,1126834	MÉDIO
Goiás	Mutunópolis	521410	1,67	15,59	0,1123214	MÉDIO
Ceará	Missão Velha	230840	7,33	6,59	0,1123173	MÉDIO
Paraíba	Areia	250110	6,00	8,70	0,1118805	MÉDIO
Tocantins	Brasilândia do Tocantins	170360	1,00	16,53	0,106063	MÉDIO
Mato Grosso	Tapurah	510800	4,67	10,69	0,1046713	MÉDIO
Minas Gerais	Setubinha	316555	3,67	12,26	0,1038251	MÉDIO
Pará	Canaã dos Carajás	150215	9,00	3,78	0,1031932	MÉDIO
Mato Grosso	Santa Carmem	510724	2,33	14,36	0,1030222	MÉDIO
Maranhão	Altamira do Maranhão	210040	2,67	13,79	0,1005384	MÉDIO
Minas Gerais	Lajinha	313770	5,67	8,98	0,09801317	MÉDIO
Bahia	Ubaíra	293210	5,33	9,46	0,09537201	MÉDIO
Rondônia	Corumbiara	110007	3,00	13,03	0,08817083	BAIXO
Mato Grosso	Campos de Júlio	510268	3,33	12,49	0,08751737	BAIXO
Maranhão	Godofredo Viana	210430	3,67	11,95	0,08680291	BAIXO
Maranhão	Pedro do Rosário	210825	6,00	8,21	0,08497451	BAIXO
Maranhão	Guimarães	210490	3,67	11,88	0,08283717	BAIXO
Mato Grosso	Colíder	510320	6,67	7,06	0,07994591	BAIXO
Maranhão	Governador Archer	210450	3,67	11,82	0,0797256	BAIXO
Mato Grosso	Reserva do Cabaçal	510715	1,00	16,01	0,07744866	BAIXO
Amazonas	Boa Vista do Ramos	130068	6,00	8,01	0,07405349	BAIXO
Tocantins	Guaraí	170930	6,00	8,01	0,07387046	BAIXO
Maranhão	Gonçalves Dias	210440	5,00	9,58	0,07278016	BAIXO
Tocantins	Angico	170105	1,33	15,40	0,07270745	BAIXO
Paraná	Jussara	411300	2,67	13,26	0,071619	BAIXO
Tocantins	Porto Nacional	171820	8,33	4,26	0,07130983	BAIXO
Pará	Eldorado dos Carajás	150295	6,33	7,41	0,06973936	BAIXO
Mato Grosso	Dom Aquino	510360	3,00	12,69	0,06919631	BAIXO
Minas Gerais	Poté	315240	4,33	10,57	0,06914507	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Mato Grosso do Sul	Camapuã	500260	4,33	10,48	0,06395911	BAIXO
Ceará	Caucaia	230370	10,33	0,94	0,06342356	BAIXO
Mato Grosso	Sapezal	510787	6,33	7,11	0,05332732	BAIXO
Bahia	Ilhéus	291360	9,67	1,79	0,05185699	BAIXO
Pará	Acará	150020	8,00	4,43	0,05164653	BAIXO
Mato Grosso	Nossa Senhora do Livramento	510610	4,00	10,68	0,04618715	BAIXO
Mato Grosso	Campo Verde	510267	7,33	5,38	0,045693	BAIXO
Tocantins	Miracema do Tocantins	171320	5,00	8,94	0,03782069	BAIXO
Minas Gerais	Luisburgo	313867	2,67	12,62	0,03641549	BAIXO
Goiás	Faina	520753	2,67	12,57	0,03385302	BAIXO
Maranhão	Colinas	210350	7,00	5,69	0,03377813	BAIXO
Goiás	São Domingos	521980	3,33	11,50	0,03327833	BAIXO
Maranhão	Governador Luiz Rocha	210462	2,67	12,55	0,03257178	BAIXO
Bahia	Ibirataia	291290	5,00	8,83	0,0319026	BAIXO
Minas Gerais	Berilo	310650	3,33	11,32	0,02321147	BAIXO
Ceará	Aratuba	230140	3,67	10,79	0,0229851	BAIXO
Pará	Santana do Araguaia	150670	6,33	6,55	0,02288269	BAIXO
Tocantins	Araguaína	170210	9,33	1,78	0,0225539	BAIXO
Maranhão	Cidelândia	210325	4,00	10,25	0,02227072	BAIXO
Maranhão	Amapá do Maranhão	210055	2,67	12,19	0,01298716	BAIXO
Amazonas	São Sebastião do Uatumã	130395	3,67	10,38	0,00077699	BAIXO
Tocantins	Piraquê	171720	1,00	14,61	0,000208364	BAIXO
Minas Gerais	Chapada do Norte	311610	3,33	10,78	- 0,006317991	BAIXO
Tocantins	Esperantina	170740	2,67	11,81	- 0,007939715	BAIXO
Mato Grosso	Planalto da Serra	510645	1,33	13,91	- 0,009047681	BAIXO
Minas Gerais	Divisópolis	312245	3,33	10,73	- 0,009490578	BAIXO
Piauí	Piripiri	220840	7,67	3,85	- 0,009504545	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Piauí	São Pedro do Piauí	221050	4,00	9,66	-	BAIXO
Mato Grosso	Pedra Preta	510637	4,67	8,57	0,009882227	BAIXO
Mato Grosso	Santa Terezinha	510777	2,67	11,68	-0,01173823	BAIXO
Tocantins	Ananás	170100	3,33	10,59	-0,01532208	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Bonito	500220	5,33	7,39	-0,01681193	BAIXO
Maranhão	Pinheiro	210860	8,00	3,13	-0,01835303	BAIXO
Maranhão	Barra do Corda	210160	8,00	3,12	-0,01967567	BAIXO
Pará	Aveiro	150100	4,67	8,39	-0,02046882	BAIXO
Minas Gerais	Montalvânia	314270	4,00	8,39	-0,02162206	BAIXO
Rondônia	São Felipe D'Oeste	110148	2,00	9,44	-0,02202347	BAIXO
Bahia	Presidente Tancredo Neves	292575	5,67	12,55	-0,02560732	BAIXO
Ceará	Ipueiras	230590	6,33	6,72	-0,02583975	BAIXO
Mato Grosso	Nova Ubiratã	230590	6,33	5,65	-0,02641443	BAIXO
Tocantins	Couto Magalhães	510624	3,33	5,65	-0,02641443	BAIXO
Bahia	Barra do Choça	170600	2,00	10,42	-0,02645172	BAIXO
Acre	Senador Guiomard	290290	6,33	10,42	-0,02798676	BAIXO
Maranhão	Nova Olinda do Maranhão	120045	5,00	7,73	-0,0280364	BAIXO
Minas Gerais	Ladainha	210735	4,00	9,28	-0,03062607	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Tacuru	313700	4,00	9,27	-0,0313582	BAIXO
Bahia	Lençóis	500795	3,33	10,25	-0,03572543	BAIXO
Minas Gerais	Belo Horizonte	291930	3,33	10,20	-0,03816589	BAIXO
Bahia	Pau Brasil	310620	9,67	0,14	-0,03868376	BAIXO
Pará	Igarapé-Miri	292390	3,00	10,64	-0,04300345	BAIXO
Maranhão	Imperatriz	150330	7,33	3,74	-0,04442067	BAIXO
Mato Grosso	Alto Araguaia	210530	9,00	1,09	-0,04451517	BAIXO
Tocantins	Jaú do Tocantins	510030	4,33	8,37	-0,05177931	BAIXO
Goiás	Padre Bernardo	171150	1,33	13,13	-0,05193862	BAIXO
Rondônia	Rolim de Moura	521560	6,00	5,66	-0,05516842	BAIXO
Amapá	Itaubal	110028	7,00	4,06	-0,05590847	BAIXO
		160025	2,00	11,91	-0,06087185	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Pernambuco	Vicência	261630	5,33	6,61	-0,0608779	BAIXO
Mato Grosso	Santo Afonso	510726	1,00	13,44	-0,06360944	BAIXO
Piauí	Angical do Piauí	220060	2,33	11,32	-0,06396575	BAIXO
São Paulo	Barra do Turvo	350540	2,33	11,30	-0,06506395	BAIXO
Tocantins	Muricilândia	171395	1,33	12,86	-0,06639829	BAIXO
Rondônia	Alvorada D'Oeste	110034	3,67	9,10	-0,06981307	BAIXO
Tocantins	Ipueiras	170980	0,67	13,82	-0,0722298	BAIXO
Pernambuco	Xexéu	261650	3,33	9,50	-0,07690805	BAIXO
Goiás	Aragarças	520170	4,33	7,83	-0,08106473	BAIXO
Minas Gerais	Alto Jequitibá	315350	2,67	10,46	-0,08200742	BAIXO
Maranhão	Rosário	210960	6,00	5,17	-0,08213542	BAIXO
Maranhão	São Pedro da Água Branca	211153	3,67	8,87	-0,08213735	BAIXO
Pará	Pau D'Arco	150555	2,33	10,98	-0,08263521	BAIXO
Paraná	Cianorte	410550	7,33	3,03	-0,08358992	BAIXO
Mato Grosso	Jaciara	510480	5,33	6,14	-0,08668568	BAIXO
Tocantins	Marianópolis do Tocantins	171250	1,67	11,96	-0,08700243	BAIXO
Ceará	Palmácia	231010	3,00	9,71	-0,09419192	BAIXO
Acre	Acrelândia	120001	3,67	8,65	-0,09446163	BAIXO
Bahia	Encruzilhada	291040	4,33	7,51	-0,09894104	BAIXO
Tocantins	Araguacema	170190	2,00	11,18	-0,1008342	BAIXO
Maranhão	Santo Antônio dos Lopes	211030	3,67	8,49	-0,1029422	BAIXO
Pará	Cachoeira do Piriá	150195	4,33	7,36	-0,1068725	BAIXO
Goiás	Santa Rita do Novo Destino	521945	1,00	12,52	-0,1141268	BAIXO
Maranhão	Governador Nunes Freire	210467	4,67	6,68	-0,1152744	BAIXO
Maranhão	Parnarama	210780	5,33	5,62	-0,115361	BAIXO
Mato Grosso	Castanheira	510285	2,33	10,37	-0,1160694	BAIXO
Minas Gerais	Itacarambi	313210	4,00	7,72	-0,1161639	BAIXO
Bahia	Coaraci	290800	4,00	7,63	-0,1211668	BAIXO
Pará	Gurupá	150310	5,33	5,50	-0,1218282	BAIXO
Minas Gerais	Ponto Chique	315213	1,33	11,82	-0,1239929	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Maranhão	Buritirana	210235	3,33	8,59	-0,1269983	BAIXO
Rondônia	Novo Horizonte do Oeste	110050	2,33	10,14	-0,1285767	BAIXO
Minas Gerais	Galiléia	312730	2,00	10,66	-0,1290825	BAIXO
Amapá	Macapá	160030	8,33	0,61	-0,1292343	BAIXO
Minas Gerais	Mutum	314400	5,00	5,89	-0,1298993	BAIXO
Amapá	Santana	160060	7,33	2,18	-0,1300805	BAIXO
Piauí	Palmeira do Piauí	220740	1,67	11,13	-0,1323948	BAIXO
Tocantins	Rio dos Bois	171870	1,00	12,17	-0,1333454	BAIXO
Rondônia	Santa Luzia D'Oeste	110029	2,33	10,05	-0,1338237	BAIXO
Alagoas	União dos Palmares	270930	6,33	3,55	-0,1418478	BAIXO
Mato Grosso	Alto Garças	510040	3,33	8,31	-0,1421291	BAIXO
Pará	Terra Santa	150797	4,00	7,10	-0,1505132	BAIXO
Minas Gerais	Manga	313930	4,00	7,04	-0,1536858	BAIXO
Minas Gerais	José Gonçalves de Minas	313652	1,33	11,18	-0,1588304	BAIXO
Paraná	São Tomé	412610	1,67	10,59	-0,1619853	BAIXO
Minas Gerais	Miravânia	314225	1,33	11,12	-0,1623691	BAIXO
Piauí	Pedro II	220790	5,33	4,67	-0,1674646	BAIXO
Tocantins	Aragominas	170130	1,67	10,45	-0,1700998	BAIXO
Pará	Curuá	150285	3,33	7,79	-0,1704384	BAIXO
Bahia	Tabocas do Brejo Velho	293090	3,00	8,29	-0,1722864	BAIXO
Bahia	Correntina	290930	5,00	5,10	-0,1730953	BAIXO
Rondônia	Seringueiras	110150	3,00	8,16	-0,1791807	BAIXO
Minas Gerais	Olhos-d'Água	314545	1,67	10,27	-0,1799836	BAIXO
Tocantins	Colinas do Tocantins	170550	5,00	4,87	-0,1857857	BAIXO
Goiás	Doverlândia	520725	2,00	9,63	-0,186067	BAIXO
Maranhão	Brejo	210210	5,00	4,83	-0,1879821	BAIXO
Pernambuco	Vitória de Santo Antão	261640	7,00	1,64	-0,188486	BAIXO
Bahia	Apurema	290195	2,00	9,55	-0,1901548	BAIXO
Goiás	Nova Iguaçu de Goiás	521487	1,00	11,07	-0,1937465	BAIXO
Mato Grosso	Nova Santa Helena	510619	1,33	10,48	-0,1970845	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Bahia	Taperoá	293120	3,67	6,76	-0,1984249	BAIXO
Minas Gerais	Icarai de Minas	313005	2,67	8,30	-0,2006744	BAIXO
Tocantins	Presidente Kennedy	171840	1,00	10,94	-0,2013729	BAIXO
Pará	Piçarra	150563	3,00	7,76	-0,2013888	BAIXO
Bahia	Ibirapitanga	291270	4,33	5,63	-0,2021721	BAIXO
Pará	Xinguara	150840	5,67	3,51	-0,2022844	BAIXO
São Paulo	Monções	353100	0,67	11,42	-0,2036481	BAIXO
Minas Gerais	Soledade de Minas	316780	1,67	9,82	-0,2047542	BAIXO
Tocantins	Santa Fé do Araguaia	171886	2,00	9,18	-0,2104715	BAIXO
Maranhão	Nova Iorque	210730	1,33	10,24	-0,210751	BAIXO
Maranhão	Cururupu	210370	4,67	4,92	-0,2120993	BAIXO
Maranhão	São Francisco do Brejão	211085	2,33	8,59	-0,2137485	BAIXO
Paraná	Tapejara	412680	3,33	7,00	-0,2140004	BAIXO
Tocantins	Maurilândia do Tocantins	171280	1,00	10,68	-0,2151615	BAIXO
Tocantins	Tocantinópolis	172120	4,00	5,87	-0,2179307	BAIXO
Amazonas	Nova Olinda do Norte	130310	4,33	5,32	-0,2190723	BAIXO
Maranhão	São Pedro dos Crentes	211157	1,67	9,55	-0,219458	BAIXO
Mato Grosso	Jangada	510490	2,00	8,96	-0,2224297	BAIXO
Minas Gerais	Salinas	315700	5,00	4,14	-0,2259311	BAIXO
Maranhão	Aldeias Altas	210030	4,00	5,72	-0,2264723	BAIXO
Tocantins	Taipas do Tocantins	172093	0,67	11,00	-0,2271375	BAIXO
Mato Grosso	Novo Santo Antônio	510631	0,67	10,96	-0,2290288	BAIXO
Tocantins	São Valério	172049	1,33	9,84	-0,232288	BAIXO
Tocantins	Nazaré	171430	1,33	9,83	-0,2329591	BAIXO
Bahia	Nova Canaã	292270	3,00	7,18	-0,2332367	BAIXO
Mato Grosso	Juscimeira	510520	2,67	7,71	-0,2333154	BAIXO
Paraná	Porto Rico	412020	1,00	10,33	-0,2343801	BAIXO
Maranhão	Anapurus	210080	3,00	7,16	-0,2343959	BAIXO
Bahia	Iraquara	291440	4,00	5,55	-0,235502	BAIXO
Minas Gerais	Jequitinhonha	313580	4,00	5,51	-0,2379424	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Pará	Anajás	150070	4,33	4,97	-0,2382298	BAIXO
Minas Gerais	Minas Novas	314180	4,00	5,49	-0,2387356	BAIXO
Minas Gerais	Capitão Enéas	311270	3,00	7,06	-0,2400089	BAIXO
Goiás	São João d'Aliança	522000	3,00	7,04	-0,24068	BAIXO
Goiás	Amaralina	520082	1,00	10,19	-0,2424946	BAIXO
Goiás	Crixás	520640	3,33	6,47	-0,2432248	BAIXO
Minas Gerais	Pedra Azul	314870	4,00	5,40	-0,2439215	BAIXO
Minas Gerais	Vargem Grande do Rio Pardo	317065	1,33	9,59	-0,2460765	BAIXO
Minas Gerais	Manhumirim	313950	3,67	5,87	-0,2468678	BAIXO
Goiás	Mineiros	521310	5,67	2,67	-0,2483479	BAIXO
Bahia	Irajuba	291420	1,67	9,02	-0,2486823	BAIXO
Minas Gerais	Carvalhópolis	311470	1,00	9,98	-0,2540257	BAIXO
Bahia	Mucugê	292190	2,67	7,32	-0,2543643	BAIXO
Ceará	Pacujá	230990	1,67	8,90	-0,2550275	BAIXO
Amazonas	Barreirinha	130050	4,33	4,60	-0,2586686	BAIXO
Mato Grosso	Lambari D'Oeste	510523	1,33	9,34	-0,2597431	BAIXO
Tocantins	Cristalândia	170610	1,67	8,68	-0,2668637	BAIXO
Mato Grosso	Santo Antônio do Leverger	510780	3,00	6,56	-0,267342	BAIXO
Minas Gerais	Brasilândia de Minas	310855	3,00	6,54	-0,2683792	BAIXO
Minas Gerais	Patis	314795	1,33	9,18	-0,2689558	BAIXO
Tocantins	Palmeirante	171570	1,33	9,16	-0,2699319	BAIXO
Tocantins	Fortaleza do Tabocão	170825	1,00	9,65	-0,272085	BAIXO
Maranhão	Buriti Bravo	210230	3,67	5,41	-0,2721875	BAIXO
Maranhão	Vila Nova dos Martírios	211285	2,33	7,51	-0,2734785	BAIXO
Minas Gerais	São Romão	316420	2,33	7,49	-0,2742717	BAIXO
Minas Gerais	Santa Rita do Sapucaí	315960	4,67	3,77	-0,2750019	BAIXO
Minas Gerais	Felisburgo	312560	1,67	8,51	-0,2765645	BAIXO
Paraná	São Jorge do Patrocínio	412535	1,67	8,50	-0,2768696	BAIXO
Minas Gerais	Rubim	315660	2,33	7,44	-0,2770782	BAIXO
Rondônia	Vale do Paraíso	110180	1,67	8,48	-0,2779678	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Tocantins	Paraíso do Tocantins	171610	5,00	3,15	-0,2801091	BAIXO
Ceará	Redenção	231160	4,00	4,73	-0,2804063	BAIXO
Tocantins	Santa Rita do Tocantins	171889	0,67	10,02	-0,2809494	BAIXO
Minas Gerais	Uaporanga	317005	2,67	6,83	-0,2815754	BAIXO
Goiás	Água Fria de Goiás	520017	1,33	8,94	-0,2820122	BAIXO
Mato Grosso	Nova Marilândia	510885	1,00	9,45	-0,2831891	BAIXO
Mato Grosso	Arenápolis	510130	2,33	7,32	-0,2836064	BAIXO
Minas Gerais	Raul Soares	315400	3,67	5,20	-0,2838407	BAIXO
Pernambuco	São Benedito do Sul	261290	2,67	6,73	-0,2868223	BAIXO
Maranhão	São Vicente Ferrer	211170	3,33	5,67	-0,287336	BAIXO
Pernambuco	Tamandaré	261485	3,67	5,13	-0,2875624	BAIXO
Pernambuco	Moreno	260940	5,00	3,00	-0,2885287	BAIXO
Minas Gerais	Padre Carvalho	314625	1,33	8,79	-0,2903097	BAIXO
Maranhão	Santa Filomena do Maranhão	210975	1,67	8,23	-0,2920004	BAIXO
Goiás	Caiaipônia	520440	3,00	6,05	-0,2952851	BAIXO
Minas Gerais	Josenópolis	313657	1,00	9,22	-0,2954524	BAIXO
Minas Gerais	Ponto dos Volantes	315217	2,33	7,09	-0,2961137	BAIXO
Ceará	Juazeiro do Norte	230730	6,33	0,72	-0,2974266	BAIXO
Bahia	Miguel Calmon	292120	3,67	4,94	-0,2979343	BAIXO
Mato Grosso	São Félix do Araguaia	510785	2,67	6,53	-0,2981704	BAIXO
Tocantins	Itacajá	171050	1,67	8,11	-0,2983455	BAIXO
Bahia	Dário Meira	291000	2,33	7,04	-0,2992863	BAIXO
Amazonas	Caapiranga	130083	2,67	6,50	-0,2994516	BAIXO
Minas Gerais	Santa Rita de Minas	315935	1,67	7,99	-0,3049348	BAIXO
Mato Grosso	Denise	510345	1,67	7,97	-0,306277	BAIXO
Minas Gerais	Joáima	313600	2,67	6,38	-0,3063459	BAIXO
Minas Gerais	Bocaiúva	310730	4,67	3,19	-0,3068498	BAIXO
Minas Gerais	Santana do Manhuaçu	315890	2,00	7,42	-0,3073575	BAIXO
Maranhão	Mirador	210670	3,33	5,26	-0,3096661	BAIXO
Maranhão	Turilândia	211245	4,00	4,20	-0,3096917	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Alagoas	Joaquim Gomes	270380	3,00	5,78	-0,3102329	BAIXO
Pará	Nova Ipixuna	150497	2,67	6,29	-0,3109828	BAIXO
Tocantins	Pedro Afonso	171650	2,67	6,29	-0,3112879	BAIXO
Tocantins	Araguatins	170220	4,00	4,16	-0,3116441	BAIXO
São Paulo	Pedro de Toledo	353720	2,33	6,81	-0,3118546	BAIXO
Goiás	Nova América	521470	0,67	9,43	-0,3129193	BAIXO
Minas Gerais	Malacacheta	313920	3,00	5,69	-0,3149308	BAIXO
Maranhão	Lagoa Grande do Maranhão	210596	2,33	6,74	-0,3153933	BAIXO
Goiás	Montividiu do Norte	521377	1,00	8,83	-0,3171113	BAIXO
Minas Gerais	Mata Verde	314055	2,00	7,23	-0,3177904	BAIXO
Ceará	Brejo Santo	230250	4,67	2,99	-0,3179539	BAIXO
Rondônia	Mirante da Serra	110130	2,00	7,16	-0,3216951	BAIXO
Minas Gerais	Ubaí	317000	2,33	6,62	-0,3219825	BAIXO
Bahia	Jaguarari	291770	4,00	3,97	-0,322077	BAIXO
Goiás	Campos Belos	520490	3,00	5,50	-0,3256077	BAIXO
Maranhão	São Domingos do Maranhão	211070	4,00	3,87	-0,327629	BAIXO
Mato Grosso	Bom Jesus do Araguaia	510185	1,67	7,54	-0,3295833	BAIXO
Minas Gerais	Joaquim Felício	313640	1,00	8,59	-0,3299237	BAIXO
Maranhão	São Francisco do Maranhão	211090	2,33	6,45	-0,3316223	BAIXO
Minas Gerais	Coronel Fabriciano	311940	5,33	1,68	-0,331707	BAIXO
Rondônia	Ouro Preto do Oeste	110015	4,00	3,74	-0,3347063	BAIXO
Paraíba	Poço Dantas	251203	1,00	8,48	-0,3363299	BAIXO
Maranhão	Pastos Bons	210800	3,00	5,29	-0,3369558	BAIXO
Bahia	Jaguaquara	291760	4,33	3,12	-0,3401797	BAIXO
Pernambuco	Timbaúba	261530	4,33	3,11	-0,3405457	BAIXO
Minas Gerais	Buritizinho	310940	3,33	4,63	-0,3439545	BAIXO
São Paulo	Pariquera-Açu	353620	3,00	5,16	-0,3442162	BAIXO
Maranhão	Carolina	210280	3,33	4,59	-0,3465779	BAIXO
Goiás	Montividiu	521375	2,33	6,15	-0,3477903	BAIXO
Paraná	Inajá	411030	0,67	8,76	-0,3497702	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Tocantins	Miranorte	171330	2,33	6,10	-0,3506578	BAIXO
Bahia	Feira da Mata	291077	1,33	7,63	-0,3538225	BAIXO
Goiás	Vila Propício	522230	1,33	7,59	-0,3560189	BAIXO
Minas Gerais	Raposos	315390	2,67	5,39	-0,360829	BAIXO
Maranhão	Sucupira do Norte	211190	2,00	6,42	-0,3623897	BAIXO
Bahia	Barreiras	290320	5,33	1,09	-0,363982	BAIXO
Espírito Santo	Santa Leopoldina	320450	2,33	5,86	-0,3640803	BAIXO
Tocantins	Abreulândia	170025	0,67	8,48	-0,365389	BAIXO
Minas Gerais	Santana do Jacaré	315880	1,00	7,91	-0,3675067	BAIXO
Ceará	Caririaçu	230320	3,33	4,19	-0,368542	BAIXO
Maranhão	Timon	211220	5,33	1,01	-0,3687409	BAIXO
Maranhão	Santana do Maranhão	211023	2,00	6,29	-0,369406	BAIXO
Tocantins	Darcinópolis	170650	1,33	7,34	-0,3696854	BAIXO
Maranhão	Bacabeira	210125	2,67	5,22	-0,3697977	BAIXO
Maranhão	Maracaçumé	210632	3,00	4,68	-0,3706951	BAIXO
Maranhão	Governador Newton Bello	210465	2,00	6,22	-0,3730056	BAIXO
Minas Gerais	Berizal	310665	1,00	7,79	-0,3739129	BAIXO
Minas Gerais	Mirabela	314200	2,33	5,68	-0,3739641	BAIXO
Goiás	Itarumã	521130	1,33	7,26	-0,3741392	BAIXO
Tocantins	Santa Maria do Tocantins	171888	0,67	8,29	-0,3755779	BAIXO
Goiás	Ivolândia	521160	0,67	8,25	-0,3777743	BAIXO
Goiás	Teresina de Goiás	522108	0,67	8,25	-0,3778353	BAIXO
Minas Gerais	Joanésia	313610	1,00	7,70	-0,3790378	BAIXO
Pará	Conceição do Araguaia	150270	4,00	2,94	-0,3790615	BAIXO
Rondônia	Nova União	110143	1,33	7,17	-0,3791422	BAIXO
Maranhão	Governador Eugênio Barros	210460	2,33	5,57	-0,3800042	BAIXO
Minas Gerais	Leme do Prado	313835	1,00	7,68	-0,380197	BAIXO
Maranhão	Pirapemas	210880	2,67	5,00	-0,3817559	BAIXO
Bahia	Santa Luzia	292805	2,33	5,52	-0,3826277	BAIXO
São Paulo	Itapirapuã Paulista	352265	1,00	7,62	-0,3831866	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Maranhão	Trizidela do Vale	211223	3,00	4,42	-0,3845446	BAIXO
Goiás	Alto Horizonte	520055	1,33	7,06	-0,3851823	BAIXO
São Paulo	Cajati	350925	3,33	3,87	-0,3861743	BAIXO
Minas Gerais	Carbonita	311350	1,67	6,49	-0,387361	BAIXO
Mato Grosso	Alto Taquari	510060	2,00	5,94	-0,3886245	BAIXO
Minas Gerais	Engenheiro Navarro	312380	1,33	6,98	-0,3895141	BAIXO
Maranhão	Araguanã	210087	2,00	5,92	-0,3896617	BAIXO
Piauí	Barras	220120	4,00	2,74	-0,3896775	BAIXO
Roraima	Bonfim	140015	2,33	5,38	-0,3900711	BAIXO
Minas Gerais	São Sebastião do Anta	316447	1,33	6,96	-0,3906123	BAIXO
Minas Gerais	Gouveia	312760	2,00	5,88	-0,391614	BAIXO
Minas Gerais	Paracatu	314700	4,67	1,64	-0,3919606	BAIXO
Minas Gerais	Bom Jesus do Galho	310780	2,33	5,34	-0,3923895	BAIXO
Tocantins	Barra do Ouro	170307	1,00	7,45	-0,3929484	BAIXO
São Paulo	Miracatu	352990	2,67	4,79	-0,3937141	BAIXO
Pará	Faro	150300	1,67	6,37	-0,3941943	BAIXO
Pará	Afuá	150030	3,67	3,18	-0,3946982	BAIXO
Rondônia	Ministro Andreazza	110120	1,33	6,87	-0,3953102	BAIXO
Tocantins	Pindorama do Tocantins	171700	1,00	7,38	-0,3966091	BAIXO
Maranhão	Lago dos Rodrigues	210594	1,67	6,31	-0,3970008	BAIXO
Minas Gerais	Machacalis	313890	1,33	6,80	-0,3992149	BAIXO
Tocantins	Santa Tereza do Tocantins	171900	0,67	7,84	-0,4003485	BAIXO
Minas Gerais	Santo Antônio do Retiro	316045	1,33	6,70	-0,4046449	BAIXO
Minas Gerais	Fruta de Leite	312707	1,00	7,21	-0,4056998	BAIXO
Minas Gerais	Capitão Andrade	311265	1,00	7,20	-0,4063709	BAIXO
Amazonas	Tefé	130420	4,33	1,90	-0,4071091	BAIXO
Tocantins	Praia Norte	171830	1,67	6,09	-0,4093861	BAIXO
Maranhão	Santa Helena	210980	3,67	2,91	-0,4094629	BAIXO
Goiás	Formoso	520810	1,00	7,14	-0,4096655	BAIXO
Maranhão	Montes Altos	210700	1,67	6,07	-0,4102403	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Maranhão	Coelho Neto	210340	3,67	2,89	-0,4104391	BAIXO
Bahia	Piripá	292470	1,67	6,06	-0,4110944	BAIXO
Maranhão	Presidente Médici	210923	1,00	7,10	-0,4121059	BAIXO
Minas Gerais	Iapu	312930	2,00	5,51	-0,4121749	BAIXO
Pará	Brejo Grande do Araguaia	150175	1,33	6,55	-0,4130034	BAIXO
Goiás	Uruaçu	522160	3,67	2,84	-0,4131846	BAIXO
Minas Gerais	Glaucilândia	312735	0,67	7,59	-0,4141371	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Miranda	500560	3,00	3,88	-0,4141961	BAIXO
Maranhão	São José de Ribamar	211120	5,00	0,67	-0,4162253	BAIXO
Piauí	São Gonçalo do Gurguéia	220975	0,67	7,54	-0,4168826	BAIXO
Piauí	Boa Hora	220177	1,33	6,44	-0,4191656	BAIXO
Minas Gerais	Montezuma	314345	1,33	6,39	-0,4219111	BAIXO
Pará	Curralinho	150280	3,33	3,21	-0,4222319	BAIXO
Piauí	São Gonçalo do Piauí	220980	1,00	6,84	-0,4261996	BAIXO
Goiás	Campinorte	520470	2,00	5,25	-0,4262685	BAIXO
Minas Gerais	Pintópolis	315057	1,33	6,27	-0,4282562	BAIXO
Pernambuco	Aliança	260070	3,33	3,10	-0,4284551	BAIXO
Maranhão	Fortaleza dos Nogueiras	210410	2,00	5,21	-0,4285869	BAIXO
Ceará	Jardim	230710	3,00	3,57	-0,4312183	BAIXO
Bahia	Poções	292510	3,67	2,51	-0,43161	BAIXO
Bahia	Itacaré	291490	3,00	3,57	-0,4317064	BAIXO
Goiás	Lagoa Santa	521225	0,33	7,79	-0,4320921	BAIXO
Minas Gerais	São Gonçalo do Rio Preto	312550	0,67	7,25	-0,4327455	BAIXO
Maranhão	Cachoeira Grande	210237	1,67	5,65	-0,4336686	BAIXO
Rondônia	Primavera de Rondônia	110147	0,67	7,22	-0,4342098	BAIXO
Maranhão	Matinha	210650	2,67	4,03	-0,4350187	BAIXO
Tocantins	Divinópolis do Tocantins	170710	1,33	6,15	-0,4350895	BAIXO
Ceará	Massapê	230800	3,33	2,90	-0,438949	BAIXO
Bahia	Muniz Ferreira	292220	1,33	6,08	-0,4391163	BAIXO
Amazonas	Benjamin Constant	130060	3,33	2,89	-0,4398032	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Mato Grosso	Sorriso	510792	4,33	1,30	-0,4400552	BAIXO
Rondônia	Jaru	110011	3,67	2,34	-0,4410058	BAIXO
Pará	São Miguel do Guamá	150760	3,67	2,30	-0,4431412	BAIXO
Espírito Santo	Itaguaçu	320270	2,00	4,91	-0,445304	BAIXO
Minas Gerais	Caparaó	311210	1,00	6,48	-0,4460282	BAIXO
Ceará	Mucambo	230900	2,00	4,86	-0,4478665	BAIXO
Minas Gerais	Bonito de Minas	310825	1,67	5,38	-0,4480672	BAIXO
Minas Gerais	Rio Acima	315480	1,67	5,38	-0,4484333	BAIXO
Minas Gerais	Gurinhata	312910	1,00	6,41	-0,4498109	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Rochedo	500750	1,00	6,41	-0,4498109	BAIXO
Ceará	Hidrolândia	230520	2,33	4,29	-0,4499232	BAIXO
Espírito Santo	Afonso Cláudio	320010	3,00	3,20	-0,4517181	BAIXO
Minas Gerais	Grão Mogol	312780	2,00	4,79	-0,4518932	BAIXO
Tocantins	Nova Olinda	171488	1,67	5,31	-0,452155	BAIXO
Maranhão	Porto Franco	210900	2,67	3,71	-0,4530171	BAIXO
Minas Gerais	Águas Vermelhas	310100	2,00	4,72	-0,4552488	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Coxim	500330	3,00	3,10	-0,4574531	BAIXO
Amazonas	Urucará	130430	2,33	4,15	-0,4578546	BAIXO
Minas Gerais	Unaí	317040	4,00	1,50	-0,4580102	BAIXO
Tocantins	Figueirópolis	170765	1,00	6,25	-0,4588406	BAIXO
Goiás	Portelândia	521810	0,67	6,78	-0,4588583	BAIXO
Ceará	Mulungu	230910	1,67	5,17	-0,4595984	BAIXO
Pará	Garrafão do Norte	150307	2,67	3,58	-0,4597893	BAIXO
Bahia	Itajuípe	291550	2,33	4,10	-0,4606001	BAIXO
Minas Gerais	Durandé	312352	1,33	5,65	-0,4627276	BAIXO
Bahia	Guaratinga	291180	2,33	4,04	-0,4635897	BAIXO
Amazonas	Juruá	130220	1,67	5,10	-0,4639302	BAIXO
Amazonas	Itamarati	130195	1,67	5,08	-0,4647844	BAIXO
Tocantins	Nova Rosalândia	171500	0,67	6,61	-0,467949	BAIXO
Minas Gerais	Contagem	311860	4,67	0,25	-0,4685298	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Maranhão	Humberto de Campos	210500	2,67	3,42	-0,468819	BAIXO
Goiás	Mozarlândia	521400	2,00	4,47	-0,4694034	BAIXO
Minas Gerais	São José da Lapa	316295	2,67	3,38	-0,4710764	BAIXO
Tocantins	Arapoema	170230	1,00	6,00	-0,4721411	BAIXO
Tocantins	Sucupira	172085	0,33	7,05	-0,4730916	BAIXO
Tocantins	Araguaçu	170200	1,33	5,44	-0,4739537	BAIXO
Tocantins	Lajeado	171200	0,67	6,47	-0,4758195	BAIXO
Minas Gerais	Bonfinópolis de Minas	310820	1,00	5,94	-0,4758627	BAIXO
Bahia	Itaquara	291670	1,33	5,40	-0,4760281	BAIXO
Minas Gerais	Sete Lagoas	316720	4,33	0,63	-0,476723	BAIXO
Goiás	Rio Verde	521880	4,33	0,63	-0,476906	BAIXO
Minas Gerais	Coronel Murta	311950	1,33	5,38	-0,4773704	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Japorã	500480	1,33	5,37	-0,4779194	BAIXO
Amazonas	Maraã	130280	2,00	4,28	-0,4797144	BAIXO
Goiás	Hidrolina	520980	0,67	6,30	-0,4851542	BAIXO
Rondônia	Monte Negro	110140	1,67	4,70	-0,4855282	BAIXO
Minas Gerais	Juvenília	313695	1,00	5,76	-0,4856856	BAIXO
Piauí	Nossa Senhora dos Remédios	220680	1,33	5,21	-0,486522	BAIXO
Pará	Cametá	150210	4,00	0,97	-0,4869905	BAIXO
São Paulo	Jacupiranga	352460	2,00	4,13	-0,4876458	BAIXO
Ceará	Várzea Alegre	231400	3,00	2,54	-0,4879588	BAIXO
São Paulo	Dirce Reis	351385	0,33	6,77	-0,4881614	BAIXO
Minas Gerais	Piedade de Caratinga	315015	1,33	5,16	-0,4895116	BAIXO
Bahia	Barro Preto	290330	1,00	5,67	-0,4903834	BAIXO
Mato Grosso	Nova Olímpia	510623	2,00	4,08	-0,4906964	BAIXO
Minas Gerais	Caratinga	311340	3,67	1,38	-0,4933535	BAIXO
São Paulo	Turmalina	355530	0,33	6,66	-0,4943846	BAIXO
Tocantins	Itapiratins	171090	0,67	6,13	-0,4944889	BAIXO
Paraná	Londrina	411370	4,33	0,25	-0,4972838	BAIXO
Mato Grosso	Salto do Céu	510775	0,67	6,04	-0,4992478	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Minas Gerais	Caputira	311290	1,33	4,97	-0,4997005	BAIXO
Maranhão	Graça Aranha	210470	1,00	5,49	-0,5002062	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Campo Grande	500270	4,33	0,16	-0,5026528	BAIXO
Tocantins	Sandolândia	171884	0,67	5,97	-0,5031525	BAIXO
Goiás	Porangatu	521800	3,00	2,24	-0,5042488	BAIXO
Pará	Augusto Corrêa	150090	3,00	2,24	-0,5043098	BAIXO
São Paulo	Murutinga do Sul	353210	0,67	5,93	-0,505532	BAIXO
Minas Gerais	Campo Azul	311115	0,67	5,91	-0,5061421	BAIXO
Maranhão	Matões do Norte	210663	2,00	3,79	-0,5066203	BAIXO
Minas Gerais	Juramento	313680	0,67	5,90	-0,5070572	BAIXO
Maranhão	Presidente Sarney	210927	2,00	3,78	-0,5071694	BAIXO
Distrito Federal	Brasília	530010	4,33	0,05	-0,5085098	BAIXO
Maranhão	São Luís Gonzaga do Maranhão	211140	2,00	3,74	-0,5092438	BAIXO
Ceará	Croatá	230423	2,00	3,74	-0,5093659	BAIXO
Minas Gerais	Chalé	311600	1,00	5,32	-0,5094799	BAIXO
Minas Gerais	Taiobeiras	316800	2,67	2,68	-0,5095745	BAIXO
Maranhão	Estreito	210405	2,67	2,67	-0,5099406	BAIXO
Tocantins	Dianópolis	170700	2,00	3,73	-0,509976	BAIXO
Maranhão	Olho d'Água das Cunhãs	210740	2,00	3,71	-0,5110742	BAIXO
Pará	Floresta do Araguaia	150304	2,00	3,70	-0,5113182	BAIXO
Piauí	Altos	220040	3,00	2,11	-0,5117532	BAIXO
Bahia	Jaborandi	291735	1,33	4,75	-0,5118417	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Aquidauana	500110	3,00	2,09	-0,5129734	BAIXO
Pernambuco	Maraial	260920	1,33	4,72	-0,51355	BAIXO
São Paulo	Fernandópolis	351550	3,33	1,54	-0,5137489	BAIXO
Minas Gerais	Várzea da Palma	317080	2,67	2,59	-0,5142724	BAIXO
Bahia	Igrapiúna	291345	1,67	4,18	-0,5143865	BAIXO
Paraná	Foz do Iguaçu	410830	4,00	0,46	-0,5149947	BAIXO
Mato Grosso	Várzea Grande	510840	4,00	0,44	-0,5159099	BAIXO
Bahia	Wanderley	293345	1,67	4,13	-0,516705	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Tocantins	Conceição do Tocantins	170560	0,67	5,72	-0,5169411	BAIXO
Bahia	Senhor do Bonfim	293010	3,33	1,45	-0,5187518	BAIXO
Piauí	Luzilândia	220580	2,33	3,02	-0,5195981	BAIXO
Minas Gerais	Coração de Jesus	311880	2,33	3,00	-0,5208793	BAIXO
Minas Gerais	Itinga	313400	1,67	4,01	-0,5232942	BAIXO
Maranhão	Tuntum	211230	2,67	2,42	-0,5234241	BAIXO
Goiás	Itapuranga	521120	2,33	2,94	-0,5240519	BAIXO
Pará	São João do Araguaia	150750	1,67	4,00	-0,5240873	BAIXO
Espírito Santo	Dores do Rio Preto	320200	1,00	5,05	-0,5243667	BAIXO
Paraná	São Carlos do Ivaí	412460	1,00	5,03	-0,525709	BAIXO
Maranhão	Maranhãozinho	210637	1,67	3,96	-0,5261007	BAIXO
Goiás	Monte Alegre de Goiás	521350	1,00	5,02	-0,5261971	BAIXO
Goiás	Pirenópolis	521730	2,33	2,90	-0,5264924	BAIXO
Pará	Concórdia do Pará	150275	2,33	2,89	-0,5267364	BAIXO
Maranhão	Santa Inês	210990	3,33	1,30	-0,5271714	BAIXO
Amazonas	Tonantins	130423	2,00	3,41	-0,5275472	BAIXO
Maranhão	São João do Paraíso	211105	1,33	4,47	-0,5275826	BAIXO
Amazonas	Anamã	130008	1,33	4,46	-0,5278267	BAIXO
Minas Gerais	Caraí	311300	2,00	3,40	-0,5279133	BAIXO
Bahia	Jequié	291800	3,67	0,75	-0,5282519	BAIXO
Tocantins	Novo Acordo	171510	0,67	5,51	-0,5284112	BAIXO
Minas Gerais	Pirapora	315120	3,00	1,79	-0,5291414	BAIXO
Minas Gerais	Ipanema	313120	2,00	3,37	-0,5298656	BAIXO
Minas Gerais	Machado	313900	2,67	2,30	-0,5303794	BAIXO
Goiás	Porteirão	521805	0,67	5,46	-0,5310957	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Rio Verde de Mato Grosso	500740	2,00	3,33	-0,531635	BAIXO
Goiás	Guarani de Goiás	520940	0,67	5,44	-0,5321939	BAIXO
Mato Grosso	Porto Esperidião	510682	1,33	4,36	-0,5333787	BAIXO
Tocantins	Bom Jesus do Tocantins	170330	0,67	5,41	-0,5339022	BAIXO
Tocantins	Tupiratis	172130	0,33	5,93	-0,534408	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Goiás	Maurilândia	521300	1,33	4,34	-0,5344159	BAIXO
Tocantins	São Félix do Tocantins	172015	0,33	5,93	-0,534591	BAIXO
Minas Gerais	Riachinho	315445	1,00	4,86	-0,5351657	BAIXO
Minas Gerais	São José do Alegre	316320	0,67	5,38	-0,5356715	BAIXO
Pará	Palestina do Pará	150549	1,00	4,84	-0,5360199	BAIXO
Minas Gerais	Ribeirão Vermelho	315470	0,67	5,37	-0,5361596	BAIXO
Tocantins	São Sebastião do Tocantins	172030	0,67	5,36	-0,5364647	BAIXO
Pará	Nova Esperança do Piriá	150495	2,00	3,24	-0,5370039	BAIXO
Tocantins	Axixá do Tocantins	170290	1,33	4,29	-0,5372224	BAIXO
Minas Gerais	Divino das Laranjeiras	312210	0,67	5,32	-0,5388442	BAIXO
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	330455	4,00	0,02	-0,5391552	BAIXO
Maranhão	Balsas	210140	3,33	1,07	-0,5394956	BAIXO
Tocantins	Arraias	170240	1,33	4,25	-0,5395408	BAIXO
Minas Gerais	Imbé de Minas	313055	1,00	4,77	-0,5398636	BAIXO
Pará	São Francisco do Pará	150740	1,67	3,70	-0,5403163	BAIXO
Maranhão	Lajeado Novo	210598	1,00	4,72	-0,5424871	BAIXO
Pará	Tracuateua	150803	2,33	2,61	-0,5425383	BAIXO
Minas Gerais	São João Evangelista	316280	1,67	3,63	-0,5445261	BAIXO
Pará	São Domingos do Capim	150720	2,33	2,52	-0,5471752	BAIXO
Goiás	São Miguel do Araguaia	522020	2,00	3,04	-0,5477419	BAIXO
Tocantins	Araguanã	170215	0,67	5,16	-0,5478128	BAIXO
Paraná	Miraselva	411600	0,33	5,65	-0,5496608	BAIXO
Amazonas	Careiro	130110	2,33	2,47	-0,5498596	BAIXO
Minas Gerais	Jacinto	313470	1,33	4,03	-0,5517431	BAIXO
Bahia	Vitória da Conquista	293330	3,67	0,32	-0,5520463	BAIXO
Bahia	Pojuca	292520	2,33	2,42	-0,5527272	BAIXO
Minas Gerais	Betim	310670	3,67	0,30	-0,5531445	BAIXO
Paraná	Maringá	411520	3,67	0,29	-0,5532055	BAIXO
Bahia	Camacan	290560	2,00	2,94	-0,553355	BAIXO
Minas Gerais	Diamantina	312160	2,67	1,86	-0,5541738	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Bahia	Contendas do Sincorá	290880	0,67	5,04	-0,554219	BAIXO
Bahia	Ubatã	293230	1,67	3,45	-0,5542269	BAIXO
Minas Gerais	Pedra Bonita	314875	1,00	4,51	-0,5544453	BAIXO
Bahia	Cravolândia	290950	0,67	5,03	-0,5545241	BAIXO
Pará	São João da Ponta	150746	0,67	5,02	-0,5555002	BAIXO
Bahia	Bonito	290405	1,67	3,41	-0,5563623	BAIXO
Maranhão	São Félix de Balsas	211080	0,67	5,00	-0,5565374	BAIXO
Rondônia	Cerejeiras	110005	1,67	3,41	-0,5566673	BAIXO
Amapá	Cutias	160021	0,67	4,98	-0,5573916	BAIXO
Maranhão	Capinzal do Norte	210275	1,33	3,91	-0,5582713	BAIXO
Minas Gerais	Itamarandiba	313250	2,33	2,31	-0,5585233	BAIXO
Minas Gerais	Francisco Sá	312670	2,00	2,84	-0,558724	BAIXO
Santa Catarina	Lebon Régis	420970	1,33	3,87	-0,5600407	BAIXO
Minas Gerais	Cordisburgo	311890	1,00	4,39	-0,5607294	BAIXO
Ceará	Pindoretama	231085	2,00	2,78	-0,5620186	BAIXO
Pernambuco	Macaparana	260900	2,00	2,78	-0,5621406	BAIXO
Maranhão	São Roberto	211167	0,67	4,89	-0,5623335	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Anastácio	500070	2,00	2,76	-0,5628728	BAIXO
Amazonas	Codajás	130130	2,00	2,76	-0,5630558	BAIXO
Tocantins	Gurupi	170950	3,00	1,17	-0,5633077	BAIXO
Minas Gerais	Francisco Dumont	312660	0,67	4,87	-0,5635537	BAIXO
Minas Gerais	Espera Feliz	312420	2,00	2,73	-0,5647641	BAIXO
Maranhão	Bela Vista do Maranhão	210177	1,33	3,78	-0,5651046	BAIXO
Minas Gerais	Marliéria	314030	0,67	4,84	-0,56514	BAIXO
Tocantins	Filadélfia	170770	1,00	4,30	-0,5656103	BAIXO
Bahia	Prado	292550	2,33	2,18	-0,5657226	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Ponta Porã	500660	3,00	1,07	-0,5685547	BAIXO
São Paulo	São Paulo	355030	3,67	0,01	-0,5687634	BAIXO
Tocantins	Babaçulândia	170300	1,00	4,23	-0,5695761	BAIXO
Minas Gerais	Arinos	310450	1,67	3,17	-0,5697238	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Ceará	Capistrano	230290	1,67	3,16	-0,5699678	BAIXO
Minas Gerais	Pingo-d'Água	315053	0,67	4,72	-0,5716072	BAIXO
Ceará	Cariré	230310	1,67	3,13	-0,5716151	BAIXO
Bahia	Ubaitaba	293220	1,67	3,13	-0,5717981	BAIXO
Piauí	Santo Antônio dos Milagres	220945	0,33	5,20	-0,5746144	BAIXO
Pará	São Sebastião da Boa Vista	150770	2,00	2,54	-0,575014	BAIXO
Maranhão	Centro do Guilherme	210315	1,33	3,60	-0,5750494	BAIXO
Goiás	Serranópolis	522050	1,00	4,12	-0,5754331	BAIXO
Bahia	Itamaraju	291560	2,67	1,48	-0,5754668	BAIXO
Espírito Santo	Ibatiba	320245	2,00	2,53	-0,5755021	BAIXO
Ceará	Milagres	230830	2,00	2,53	-0,5758681	BAIXO
Goiás	Planaltina	521760	3,00	0,94	-0,5760591	BAIXO
Piauí	Batalha	220150	2,00	2,50	-0,5775765	BAIXO
Mato Grosso	Mirassol d'Oeste	510562	2,00	2,48	-0,5786136	BAIXO
Minas Gerais	Japonvar	313535	1,00	4,06	-0,5786667	BAIXO
Bahia	Eunápolis	291072	3,00	0,86	-0,5800858	BAIXO
Goiás	Formosa	520800	3,00	0,86	-0,5805129	BAIXO
Minas Gerais	Chapada Gaúcha	311615	1,33	3,50	-0,5805404	BAIXO
Pernambuco	Pombos	261130	2,00	2,44	-0,580627	BAIXO
Paraná	Altônia	410050	1,67	2,96	-0,5810109	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Rio Negro	500730	0,67	4,55	-0,581186	BAIXO
Paraná	Guaporema	410910	0,33	5,07	-0,5815087	BAIXO
Tocantins	Pugmil	171845	0,33	5,07	-0,5817528	BAIXO
Mato Grosso	Indiavaí	510450	0,33	5,06	-0,5818748	BAIXO
Piauí	Corrente	220290	2,00	2,41	-0,5820913	BAIXO
Minas Gerais	Monjolos	314250	0,33	5,06	-0,5821188	BAIXO
Tocantins	Formoso do Araguaia	170820	1,67	2,93	-0,5830852	BAIXO
Goiás	Aruanã	520250	1,00	3,98	-0,5831816	BAIXO
São Paulo	Dolcinópolis	351420	0,33	5,03	-0,5835221	BAIXO
Tocantins	Aparecida do Rio Negro	170110	0,67	4,48	-0,5848467	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Ceará	Granjeiro	230480	0,67	4,48	-0,5849077	BAIXO
Pará	Nova Timboteua	150500	1,33	3,42	-0,5850553	BAIXO
Minas Gerais	Vermelho Novo	317115	0,67	4,47	-0,5852127	BAIXO
Pará	Colares	150260	1,33	3,41	-0,5854824	BAIXO
Minas Gerais	Barão de Monte Alto	310550	0,67	4,47	-0,5857008	BAIXO
Paraná	Tomazina	412780	1,00	3,93	-0,5858051	BAIXO
Tocantins	Pequizeiro	171665	0,67	4,46	-0,5858228	BAIXO
Minas Gerais	Vespasiano	317120	3,00	0,76	-0,586004	BAIXO
Pernambuco	Araçoiaba	260105	1,67	2,87	-0,5862578	BAIXO
Tocantins	Novo Jardim	171525	0,33	4,98	-0,5863896	BAIXO
Amazonas	Autazes	130030	2,33	1,81	-0,5864664	BAIXO
Pernambuco	Chã de Alegria	260440	1,33	3,36	-0,5881668	BAIXO
Rondônia	Presidente Médici	110025	1,67	2,81	-0,5895525	BAIXO
Paraná	Mirador	411590	0,33	4,92	-0,5897452	BAIXO
Bahia	Itaeté	291500	1,33	3,30	-0,5916445	BAIXO
Minas Gerais	Turmalina	316970	1,67	2,76	-0,5921759	BAIXO
Rondônia	Itapuã do Oeste	110110	1,00	3,81	-0,5928214	BAIXO
Minas Gerais	Guaraciama	312825	0,67	4,34	-0,5928391	BAIXO
Minas Gerais	Ibiracatu	312965	0,67	4,32	-0,5934492	BAIXO
Piauí	União	221110	2,33	1,68	-0,5934827	BAIXO
Pará	Belém	150140	3,33	0,08	-0,5938567	BAIXO
Maranhão	Olinda Nova do Maranhão	210745	1,33	3,25	-0,5940849	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Deodápolis	500345	1,33	3,25	-0,594146	BAIXO
Goiás	Montes Claros de Goiás	521370	1,00	3,78	-0,5944687	BAIXO
Tocantins	Itaguatins	171070	0,67	4,30	-0,5950356	BAIXO
Bahia	Salvador	292740	3,33	0,05	-0,5959311	BAIXO
Maranhão	Milagres do Maranhão	210667	1,00	3,75	-0,596055	BAIXO
Bahia	Boa Nova	290370	1,33	3,20	-0,5968915	BAIXO
Maranhão	Tasso Fragoso	211200	1,00	3,73	-0,5971532	BAIXO
Tocantins	Colméia	171670	1,00	3,73	-0,5971532	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Minas Gerais	Timóteo	316870	2,67	1,07	-0,5975528	BAIXO
Paraná	Icaraíma	410990	1,00	3,71	-0,5982514	BAIXO
Roraima	Normandia	140040	1,33	3,18	-0,5982947	BAIXO
Maranhão	Mirinzal	210680	1,33	3,16	-0,5992099	BAIXO
Pará	Castanhal	150240	3,00	0,51	-0,5994264	BAIXO
Mato Grosso	Lucas do Rio Verde	510525	2,67	1,02	-0,6002983	BAIXO
Bahia	Ibiciuí	291230	1,33	3,13	-0,6010402	BAIXO
Piauí	Alvorada do Gurguéia	220045	0,67	4,18	-0,6016248	BAIXO
Minas Gerais	São Sebastião do Rio Verde	316490	0,33	4,68	-0,6028627	BAIXO
Amazonas	Uarini	130426	1,33	3,08	-0,6036637	BAIXO
Minas Gerais	Caiana	311010	0,67	4,13	-0,6042482	BAIXO
Minas Gerais	São José do Goiabal	316340	0,67	4,12	-0,6047974	BAIXO
Bahia	Jacaraci	291740	1,33	3,05	-0,605067	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Sonora	500793	1,33	3,05	-0,605494	BAIXO
Paraíba	Cachoeira dos Índios	250330	1,00	3,56	-0,6061218	BAIXO
Minas Gerais	Rio Espera	315520	0,67	4,09	-0,6061396	BAIXO
Tocantins	Itaporã do Tocantins	171110	0,33	4,62	-0,6061572	BAIXO
São Paulo	São Carlos	354890	3,00	0,39	-0,6062597	BAIXO
Minas Gerais	Itaú de Minas	313375	1,33	3,03	-0,6062872	BAIXO
Rio de Janeiro	São José do Vale do Rio Preto	330515	1,67	2,50	-0,6063915	BAIXO
Bahia	Morro do Chapéu	292170	2,00	1,95	-0,607411	BAIXO
Pará	Capitão Poço	150230	2,33	1,38	-0,6100168	BAIXO
Espírito Santo	Santa Teresa	320460	1,67	2,42	-0,6110894	BAIXO
Pernambuco	Paudalho	261060	2,33	1,35	-0,6113591	BAIXO
Bahia	Gongogi	291150	0,67	3,99	-0,6116916	BAIXO
Bahia	Jucuruçu	291845	1,00	3,42	-0,6141143	BAIXO
Paraná	Alto Piquiri	410070	1,00	3,40	-0,6150905	BAIXO
Goiás	Morro Agudo de Goiás	521385	0,33	4,45	-0,615797	BAIXO
Tocantins	Monte Santo do Tocantins	171370	0,33	4,44	-0,6159191	BAIXO
Ceará	Irauçuba	230610	1,67	2,32	-0,6161534	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Minas Gerais	Frei Gaspar	312680	0,67	3,91	-0,6164505	BAIXO
Minas Gerais	Belo Oriente	310630	1,67	2,31	-0,6168245	BAIXO
Minas Gerais	Buritiz	310930	1,67	2,30	-0,6174956	BAIXO
Alagoas	Colônia Leopoldina	270210	1,33	2,83	-0,6175133	BAIXO
Pernambuco	Sirinhaém	261420	2,00	1,75	-0,6186371	BAIXO
Maranhão	Santa Luzia do Paruá	211003	1,67	2,27	-0,6188378	BAIXO
Minas Gerais	Botumirim	310850	0,67	3,84	-0,6201722	BAIXO
Maranhão	São Mateus do Maranhão	211150	2,00	1,71	-0,6208945	BAIXO
Alagoas	Novo Lino	270560	1,00	3,27	-0,6220458	BAIXO
Maranhão	Senador Alexandre Costa	211174	1,00	3,27	-0,6225339	BAIXO
Alagoas	Murici	270550	1,67	2,19	-0,6232917	BAIXO
Minas Gerais	São Geraldo	316150	1,00	3,24	-0,6238151	BAIXO
Piauí	Uruçuí	221120	1,67	2,18	-0,6239018	BAIXO
Minas Gerais	Pouso Alegre	315250	2,67	0,57	-0,625374	BAIXO
Minas Gerais	Jordânia	313650	1,00	3,21	-0,6255234	BAIXO
Ceará	Santa Quitéria	231220	2,00	1,61	-0,6262025	BAIXO
Pará	Abaetetuba	150010	2,67	0,55	-0,6262891	BAIXO
Goiás	Barro Alto	520320	1,00	3,18	-0,6274148	BAIXO
Maranhão	Porto Rico do Maranhão	210905	0,67	3,69	-0,6282257	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Paranaíba	500630	2,00	1,57	-0,6286429	BAIXO
Maranhão	Lagoa do Mato	210592	1,00	3,15	-0,628696	BAIXO
Pará	Marapanim	150440	1,67	2,09	-0,6289657	BAIXO
Minas Gerais	Ninheira	314465	1,00	3,15	-0,6290011	BAIXO
Maranhão	São João do Soter	211107	1,33	2,62	-0,6290444	BAIXO
Bahia	Condeúba	290870	1,33	2,61	-0,6296545	BAIXO
Minas Gerais	Três Corações	316930	2,33	1,02	-0,6298454	BAIXO
Rondônia	Urupá	110170	1,00	3,11	-0,6311975	BAIXO
Piauí	Santa Filomena	220920	0,67	3,62	-0,6323745	BAIXO
São Paulo	Araçatuba	350280	2,67	0,44	-0,6325123	BAIXO
Rio Grande do Sul	Triunfo	432200	1,67	2,02	-0,6327484	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Pernambuco	Cabo de Santo Agostinho	260290	2,67	0,43	-0,6327564	BAIXO
Pará	Sapucaia	150775	0,67	3,61	-0,6328015	BAIXO
Minas Gerais	Ibituruna	313000	0,33	4,12	-0,6338564	BAIXO
Minas Gerais	Urucuia	317052	1,33	2,51	-0,6347185	BAIXO
Tocantins	Luzinópolis	171245	0,33	4,09	-0,6353817	BAIXO
Minas Gerais	São Lourenço	316370	2,00	1,44	-0,6356592	BAIXO
Paraná	Terra Boa	412720	1,33	2,50	-0,6357557	BAIXO
São Paulo	Rancharia	354220	1,67	1,93	-0,6375073	BAIXO
Minas Gerais	Divisa Alegre	312235	0,67	3,52	-0,6378655	BAIXO
Tocantins	Mateiros	171270	0,33	4,04	-0,6379442	BAIXO
Bahia	Seabra	292990	2,00	1,39	-0,6385878	BAIXO
Ceará	Farias Brito	230430	1,33	2,44	-0,6388062	BAIXO
Paraná	Manfrinópolis	411435	0,33	4,02	-0,6389813	BAIXO
Bahia	Ituaçu	291720	1,33	2,42	-0,6397824	BAIXO
Alagoas	Santana do Mundaú	270810	1,00	2,94	-0,6402271	BAIXO
Bahia	Santa Cruz Cabralia	292770	1,67	1,86	-0,6414731	BAIXO
Minas Gerais	Jequitaiá	313560	0,67	3,43	-0,6427464	BAIXO
São Paulo	Gabriel Monteiro	351650	0,33	3,95	-0,6429471	BAIXO
Tocantins	Almas	170040	0,67	3,42	-0,6431124	BAIXO
Bahia	Cachoeira	290490	1,67	1,82	-0,6438525	BAIXO
Minas Gerais	Periquito	314995	0,67	3,39	-0,6446987	BAIXO
São Paulo	Nova Luzitânia	353330	0,33	3,92	-0,6449605	BAIXO
Minas Gerais	Serra do Salitre	316680	1,00	2,82	-0,6467553	BAIXO
Minas Gerais	Córrego Novo	312000	0,33	3,86	-0,6477669	BAIXO
Paraná	Umuarama	412810	2,33	0,66	-0,6495521	BAIXO
Maranhão	Penalva	210830	1,67	1,71	-0,6498926	BAIXO
Bahia	Gandu	291120	1,67	1,71	-0,6498926	BAIXO
Mato Grosso	Vale de São Domingos	510835	0,33	3,82	-0,6500854	BAIXO
Paraná	Marechal Cândido Rondon	411460	2,00	1,16	-0,650851	BAIXO
São Paulo	Alvinlândia	350150	0,33	3,80	-0,6512446	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Minas Gerais	Campanário	311080	0,33	3,80	-0,6512446	BAIXO
Alagoas	Maceió	270430	2,67	0,09	-0,6515478	BAIXO
Goiás	Arenópolis	520235	0,33	3,79	-0,6517327	BAIXO
Pará	Bragança	150170	2,33	0,61	-0,6518705	BAIXO
Piauí	Lagoinha do Piauí	220554	0,33	3,78	-0,6523428	BAIXO
Goiás	Rialma	521860	1,00	2,71	-0,6529175	BAIXO
Minas Gerais	Simão Pereira	316750	0,33	3,77	-0,6529529	BAIXO
Ceará	Quiterianópolis	231126	1,33	2,18	-0,6533269	BAIXO
São Paulo	Santa Mercedes	354710	0,33	3,76	-0,653563	BAIXO
Amapá	Ferreira Gomes	160023	0,67	3,22	-0,6539724	BAIXO
Pará	Santa Luzia do Pará	150655	1,33	2,16	-0,6541811	BAIXO
Ceará	Viçosa do Ceará	231410	2,00	1,09	-0,6548167	BAIXO
Pará	São João de Pirabas	150747	1,33	2,13	-0,6558894	BAIXO
Tocantins	Palmeirópolis	171575	0,67	3,19	-0,6559248	BAIXO
Minas Gerais	Água Boa	310060	1,00	2,65	-0,6563341	BAIXO
Tocantins	Lizarda	171240	0,33	3,70	-0,6565526	BAIXO
Goiás	Amorinópolis	520090	0,33	3,70	-0,6570407	BAIXO
Pernambuco	Salgueiro	261220	2,00	1,04	-0,6574402	BAIXO
São Paulo	Platina	353970	0,33	3,67	-0,6582609	BAIXO
São Paulo	Bertioga	350635	2,00	1,03	-0,6583554	BAIXO
Minas Gerais	Patos de Minas	314800	2,33	0,49	-0,6587648	BAIXO
Maranhão	Central do Maranhão	210312	0,67	3,13	-0,6588534	BAIXO
Rio Grande do Sul	Nova Bréscia	431300	0,33	3,65	-0,6595421	BAIXO
Minas Gerais	Claro dos Poções	311650	0,67	3,10	-0,6606837	BAIXO
São Paulo	Santo Expedito	354830	0,33	3,63	-0,6607624	BAIXO
Minas Gerais	Serro	316710	1,33	2,02	-0,6616244	BAIXO
Ceará	Antonina do Norte	230080	0,67	3,07	-0,662514	BAIXO
Goiás	Ceres	520540	1,33	2,01	-0,6626006	BAIXO
Mato Grosso	Barão de Melgaço	510160	0,67	3,06	-0,662636	BAIXO
Bahia	Cotegipe	290940	1,00	2,53	-0,6631674	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Minas Gerais	Jaíba	313505	1,67	1,46	-0,6633761	BAIXO
Piauí	Palmeirais	220750	1,00	2,51	-0,6638385	BAIXO
São Paulo	Bilac	350640	0,67	3,04	-0,6642224	BAIXO
Bahia	Campo Formoso	290600	2,00	0,91	-0,6645786	BAIXO
Minas Gerais	Sericita	316630	0,67	3,02	-0,6648325	BAIXO
Ceará	Sobral	231290	2,33	0,38	-0,664866	BAIXO
São Paulo	Águas da Prata	350040	0,67	3,02	-0,6653206	BAIXO
Pernambuco	Joaquim Nabuco	260820	1,00	2,48	-0,6654858	BAIXO
Maranhão	Ribamar Fiquene	210955	0,67	3,00	-0,6664187	BAIXO
Minas Gerais	Caeté	311000	1,67	1,40	-0,6667317	BAIXO
Minas Gerais	São Gonçalo do Abaeté	316170	0,67	2,98	-0,6670288	BAIXO
Paraná	Diamante do Sul	410712	0,33	3,51	-0,6674736	BAIXO
Minas Gerais	Jaguarapu	313500	0,33	3,50	-0,6676567	BAIXO
Ceará	Maracanaú	230765	2,33	0,32	-0,6679165	BAIXO
Minas Gerais	Baldim	310500	0,67	2,97	-0,668005	BAIXO
Bahia	Lajedo do Tabocal	291905	0,67	2,97	-0,6680661	BAIXO
Maranhão	Dom Pedro	210380	1,33	1,91	-0,6680917	BAIXO
Paraná	Ourizona	411740	0,33	3,49	-0,6685108	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Dourados	500370	2,33	0,31	-0,6685876	BAIXO
Minas Gerais	Leandro Ferreira	313830	0,33	3,47	-0,6692429	BAIXO
Paraíba	Alagoinha	250050	1,00	2,41	-0,6697566	BAIXO
São Paulo	São Sebastião	355070	2,00	0,81	-0,6700085	BAIXO
Minas Gerais	Abre Campo	310030	1,00	2,39	-0,6704277	BAIXO
Piauí	Campo Largo do Piauí	220217	0,67	2,91	-0,6711166	BAIXO
Maranhão	Santo Amaro do Maranhão	211027	1,00	2,37	-0,671648	BAIXO
Amazonas	Urucurituba	130440	1,33	1,83	-0,6724845	BAIXO
Bahia	Itambé	291580	1,33	1,82	-0,6727285	BAIXO
Pernambuco	Camutanga	260360	0,67	2,87	-0,6734961	BAIXO
Pernambuco	Lagoa dos Gatos	260870	1,00	2,33	-0,6737223	BAIXO
Minas Gerais	Lagoa dos Patos	313730	0,33	3,38	-0,6742459	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Goiás	Santa Tereza de Goiás	521960	0,33	3,37	-0,674673	BAIXO
Maranhão	Davinópolis	210375	1,00	2,31	-0,6747596	BAIXO
Mato Grosso	Ipiranga do Norte	510452	0,67	2,84	-0,6747773	BAIXO
Goiás	Bonópolis	520357	0,33	3,37	-0,675039	BAIXO
Bahia	Santana	292820	1,33	1,77	-0,675657	BAIXO
Paraíba	Duas Estradas	250580	0,33	3,34	-0,6765643	BAIXO
Minas Gerais	Pará de Minas	314710	2,00	0,68	-0,6772689	BAIXO
Maranhão	São Domingos do Azeitão	211065	0,67	2,78	-0,6781939	BAIXO
Mato Grosso	Araputanga	510125	1,00	2,25	-0,6782982	BAIXO
Minas Gerais	Santana do Paraíso	315895	1,67	1,19	-0,6786289	BAIXO
Maranhão	Senador La Rocque	211176	1,00	2,23	-0,6792133	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Costa Rica	500325	1,33	1,67	-0,680843	BAIXO
Tocantins	Bandeirantes do Tocantins	170305	0,33	3,26	-0,6808961	BAIXO
Paraíba	São José de Princesa	251455	0,33	3,25	-0,6813842	BAIXO
São Paulo	Holambra	351905	1,00	2,19	-0,6818368	BAIXO
Minas Gerais	Coluna	311680	0,67	2,71	-0,6822207	BAIXO
Bahia	Catolândia	290740	0,33	3,24	-0,6822994	BAIXO
Bahia	Itagibá	291520	1,00	2,15	-0,6835452	BAIXO
Ceará	Meruoca	230820	1,00	2,14	-0,6840943	BAIXO
Tocantins	Lagoa da Confusão	171190	1,00	2,13	-0,6846434	BAIXO
Minas Gerais	Pocrane	315190	0,67	2,66	-0,6847832	BAIXO
Maranhão	Monção	210690	1,33	1,60	-0,6848698	BAIXO
Goiás	Morrinhos	521380	1,67	1,07	-0,6849131	BAIXO
Ceará	Frecheirinha	230450	1,00	2,13	-0,6849484	BAIXO
Minas Gerais	Santana de Cataguases	315840	0,33	3,18	-0,6851059	BAIXO
Paraná	Iporã	411060	1,00	2,12	-0,6856195	BAIXO
Minas Gerais	Orizânia	314587	0,67	2,63	-0,6863084	BAIXO
Minas Gerais	Cruzeiro da Fortaleza	312070	0,33	3,16	-0,6866922	BAIXO
Minas Gerais	Santa Fé de Minas	315760	0,33	3,15	-0,6867532	BAIXO
Pará	Barcarena	150130	2,00	0,51	-0,6869087	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Goiás	Novo Brasil	521520	0,33	3,15	-0,6869972	BAIXO
Bahia	Cardeal da Silva	290700	0,67	2,61	-0,6873456	BAIXO
São Paulo	Mariápolis	352890	0,33	3,14	-0,6875463	BAIXO
Rio Grande do Sul	São Pedro da Serra	431935	0,33	3,13	-0,6880344	BAIXO
Minas Gerais	Tocantins	316900	1,00	2,04	-0,6896463	BAIXO
Amazonas	Carauari	130100	1,33	1,49	-0,6908488	BAIXO
Minas Gerais	Santa Margarida	315790	1,00	2,01	-0,6912936	BAIXO
Rio Grande do Norte	Pedra Grande	240950	0,33	3,07	-0,691329	BAIXO
Bahia	Lajedinho	291900	0,33	3,07	-0,6914511	BAIXO
Tocantins	Natividade	171420	0,67	2,54	-0,6914944	BAIXO
Tocantins	Campos Lindos	170384	0,67	2,53	-0,6922265	BAIXO
Pernambuco	Cabrobó	260300	1,33	1,45	-0,6931673	BAIXO
Pará	São Caetano de Odivelas	150710	1,00	1,98	-0,6932459	BAIXO
Ceará	Potengi	231120	0,67	2,50	-0,6935078	BAIXO
Pará	Santa Maria das Barreiras	150658	1,00	1,97	-0,693551	BAIXO
Maranhão	Fortuna	210420	1,00	1,96	-0,6940391	BAIXO
Minas Gerais	Matias Cardoso	314085	0,67	2,49	-0,6943619	BAIXO
Mato Grosso	Poconé	510650	1,33	1,42	-0,6946316	BAIXO
Minas Gerais	Dom Bosco	312247	0,33	3,01	-0,6949287	BAIXO
Goiás	Abadiânia	520010	1,00	1,93	-0,6956254	BAIXO
Amazonas	Iranduba	130185	1,67	0,88	-0,6956511	BAIXO
Minas Gerais	Prados	315270	0,67	2,46	-0,6960703	BAIXO
Bahia	Brejolândia	290440	0,67	2,44	-0,6969244	BAIXO
Ceará	Umirim	231375	1,00	1,91	-0,6970897	BAIXO
Ceará	Parambu	231030	1,33	1,37	-0,6976211	BAIXO
Piauí	Água Branca	220020	1,00	1,90	-0,6976998	BAIXO
Minas Gerais	Cachoeira da Prata	310960	0,33	2,94	-0,6985894	BAIXO
Mato Grosso	Araguaiana	510100	0,33	2,93	-0,6991995	BAIXO
Mato Grosso	São José dos Quatro Marcos	510710	1,00	1,87	-0,6992861	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Rio de Janeiro	Sapucaia	330540	1,00	1,86	-0,6996521	BAIXO
Pernambuco	Quipapá	261150	1,00	1,86	-0,6997741	BAIXO
São Paulo	Rinópolis	354380	0,67	2,39	-0,6997919	BAIXO
Pernambuco	Ribeirão	261180	1,33	1,33	-0,6999395	BAIXO
Bahia	Cairu	290540	1,00	1,85	-0,7001402	BAIXO
Paraná	Douradina	410725	0,67	2,38	-0,700219	BAIXO
Minas Gerais	Governador Valadares	312770	2,00	0,26	-0,7003922	BAIXO
Bahia	Inhambupe	291370	1,33	1,32	-0,7005497	BAIXO
Bahia	São Desidério	292890	1,33	1,32	-0,7005497	BAIXO
Minas Gerais	Campina Verde	311110	1,00	1,83	-0,7011164	BAIXO
Ceará	Solonópole	231300	1,00	1,83	-0,7011774	BAIXO
São Paulo	Itapira	352260	1,67	0,77	-0,7013862	BAIXO
Minas Gerais	União de Minas	317043	0,33	2,89	-0,7013959	BAIXO
São Paulo	Jeriquara	352540	0,33	2,88	-0,702006	BAIXO
Maranhão	Governador Edison Lobão	210455	1,00	1,81	-0,7024587	BAIXO
Maranhão	Esperantinópolis	210400	1,00	1,81	-0,7026417	BAIXO
Pernambuco	Amaraji	260090	1,00	1,80	-0,7027637	BAIXO
São Paulo	Estrela d'Oeste	351520	0,67	2,33	-0,7029035	BAIXO
Pará	Ourém	150540	1,00	1,78	-0,703862	BAIXO
Espírito Santo	Cariacica	320130	2,00	0,19	-0,7043579	BAIXO
Maranhão	São Raimundo das Mangabeiras	211160	1,00	1,77	-0,7045941	BAIXO
Goiás	Iporá	521020	1,33	1,22	-0,7056136	BAIXO
Espírito Santo	Ibitirama	320255	0,67	2,28	-0,705649	BAIXO
Piauí	Pau D'Arco do Piauí	220779	0,33	2,80	-0,7063378	BAIXO
Goiás	Carmo do Rio Verde	520500	0,67	2,26	-0,7066862	BAIXO
Bahia	Lajedão	291890	0,33	2,79	-0,7068869	BAIXO
Paraná	Lidianópolis	411342	0,33	2,79	-0,707009	BAIXO
Minas Gerais	Senador Modestino Gonçalves	316590	0,33	2,77	-0,7077411	BAIXO
São Paulo	Lavínia	352650	0,67	2,24	-0,7077844	BAIXO
Espírito Santo	Vargem Alta	320503	1,00	1,70	-0,7082548	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Maranhão	Bequimão	210190	1,00	1,70	-0,7083768	BAIXO
São Paulo	Paranapuã	353590	0,33	2,76	-0,7085952	BAIXO
Minas Gerais	Bugre	310925	0,33	2,75	-0,7089613	BAIXO
Goiás	Jussara	521220	1,00	1,69	-0,7089869	BAIXO
Piauí	Beneditinos	220160	0,67	2,22	-0,7090656	BAIXO
Tocantins	Pau D'Arco	171630	0,33	2,75	-0,7090833	BAIXO
Goiás	Abadia de Goiás	520005	1,00	1,69	-0,7092309	BAIXO
São Paulo	Macedônia	352820	0,33	2,74	-0,7092664	BAIXO
Goiás	Rubiataba	521890	1,00	1,66	-0,7104511	BAIXO
Maranhão	Cedral	210310	0,67	2,18	-0,7113231	BAIXO
São Paulo	Mairiporã	352850	1,67	0,59	-0,711453	BAIXO
São Paulo	Lucélia	352740	1,00	1,64	-0,7115493	BAIXO
Maranhão	Cajapió	210240	0,67	2,17	-0,7116281	BAIXO
Piauí	Monsenhor Gil	220640	0,67	2,17	-0,7119332	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Corumbá	500320	1,67	0,58	-0,7120021	BAIXO
Bahia	Arataca	290225	0,67	2,15	-0,7127263	BAIXO
Piauí	Itaueira	220510	0,67	2,15	-0,7127263	BAIXO
Minas Gerais	Pequi	314960	0,33	2,67	-0,71311	BAIXO
Ceará	Fortaleza	230440	2,00	0,03	-0,7132046	BAIXO
Piauí	Guadalupe	220450	0,67	2,14	-0,7132754	BAIXO
Minas Gerais	Alvorada de Minas	310240	0,33	2,67	-0,7132931	BAIXO
Minas Gerais	Jaboticatubas	313460	1,00	1,61	-0,7133186	BAIXO
Minas Gerais	Novo Oriente de Minas	314535	0,67	2,14	-0,7134585	BAIXO
Piauí	Riacho Frio	220885	0,33	2,67	-0,7134761	BAIXO
Rio de Janeiro	Itaperuna	330220	1,67	0,54	-0,7138934	BAIXO
Minas Gerais	Pedras de Maria da Cruz	314915	0,67	2,13	-0,7140076	BAIXO
Piauí	Jardim do Mulato	220525	0,33	2,66	-0,7140252	BAIXO
Bahia	Itapitanga	291660	0,67	2,13	-0,7141296	BAIXO
Paraná	Floresta	410790	0,67	2,12	-0,7142516	BAIXO
Mato Grosso	São Pedro da Cipa	510740	0,33	2,65	-0,7143913	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Maranhão	Palmeirândia	210760	1,00	1,58	-0,714905	BAIXO
Minas Gerais	Itambacuri	313270	1,00	1,58	-0,714905	BAIXO
Minas Gerais	Santa Bárbara do Tugúrio	315730	0,33	2,64	-0,7150014	BAIXO
Tocantins	Sampaio	171880	0,33	2,64	-0,7152454	BAIXO
Pernambuco	Belém de Maria	260150	0,67	2,10	-0,7153498	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Cassilândia	500290	1,00	1,57	-0,7153931	BAIXO
Bahia	Lafaiete Coutinho	291870	0,33	2,63	-0,7154285	BAIXO
Paraná	Tamarana	412667	0,67	2,09	-0,716265	BAIXO
Rondônia	Teixeirópolis	110155	0,33	2,61	-0,7165877	BAIXO
Bahia	Tanhaçu	293100	1,00	1,55	-0,7166743	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Ladário	500520	1,00	1,55	-0,7167963	BAIXO
Minas Gerais	Itacambira	313200	0,33	2,61	-0,7168928	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Angélica	500085	0,67	2,07	-0,7171801	BAIXO
Pará	Terra Alta	150796	0,67	2,05	-0,7180953	BAIXO
Ceará	Assaré	230160	1,00	1,52	-0,7181386	BAIXO
Tocantins	Sítio Novo do Tocantins	172080	0,67	2,05	-0,7182173	BAIXO
Tocantins	Bernardo Sayão	170320	0,33	2,57	-0,718601	BAIXO
Tocantins	Dueré	170730	0,33	2,57	-0,7187841	BAIXO
Espírito Santo	São Roque do Canaã	320495	0,67	2,04	-0,7188274	BAIXO
Paraíba	Assunção	250135	0,33	2,56	-0,7194552	BAIXO
Minas Gerais	Santo Antônio do Grama	316010	0,33	2,56	-0,7194552	BAIXO
Minas Gerais	José Raydan	313655	0,33	2,55	-0,7197603	BAIXO
Maranhão	São Bento	211050	1,33	0,95	-0,7206224	BAIXO
Espírito Santo	Laranja da Terra	320316	0,67	2,00	-0,7209018	BAIXO
Maranhão	Alto Parnaíba	210050	0,67	2,00	-0,7210849	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Sidrolândia	500790	1,33	0,93	-0,7215986	BAIXO
Minas Gerais	Abaeté	310020	1,00	1,46	-0,7216772	BAIXO
Piauí	Curralinhos	220325	0,33	2,52	-0,7217126	BAIXO
Minas Gerais	João Pinheiro	313630	1,33	0,92	-0,7220256	BAIXO
Paraná	Indianópolis	411040	0,33	2,50	-0,7228109	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Minas Gerais	Conceição do Mato Dentro	311750	1,00	1,44	-0,7228364	BAIXO
Maranhão	Paço do Lumiar	210750	1,67	0,38	-0,7229231	BAIXO
Piauí	Francisco Ayres	220410	0,33	2,47	-0,7242141	BAIXO
Paraná	Florestópolis	410800	0,67	1,94	-0,7242575	BAIXO
Bahia	Floresta Azul	291100	0,67	1,94	-0,7242575	BAIXO
Tocantins	Aguiarnópolis	170030	0,33	2,47	-0,7242751	BAIXO
Pará	Aurora do Pará	150095	1,00	1,40	-0,7248498	BAIXO
Paraná	Itaguajé	411090	0,33	2,45	-0,7253123	BAIXO
Mato Grosso	Rio Branco	510720	0,33	2,45	-0,7254344	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Alcinópolis	500025	0,33	2,45	-0,7254953	BAIXO
Maranhão	Alto Alegre do Maranhão	210043	1,00	1,39	-0,725704	BAIXO
Paraná	Cruzeiro do Sul	410670	0,33	2,44	-0,7258004	BAIXO
Minas Gerais	Virgolândia	317190	0,33	2,44	-0,7259224	BAIXO
Ceará	Forquilha	230435	1,00	1,38	-0,726131	BAIXO
Paraná	Kaloré	411310	0,33	2,42	-0,7268376	BAIXO
Espírito Santo	Cachoeiro de Itapemirim	320120	1,67	0,30	-0,7273159	BAIXO
Minas Gerais	Itabirito	313190	1,33	0,81	-0,7280657	BAIXO
Minas Gerais	Rio do Prado	315510	0,33	2,40	-0,7284239	BAIXO
Rio Grande do Norte	Sítio Novo	241370	0,33	2,39	-0,728851	BAIXO
Bahia	Brotas de Macaúbas	290450	0,67	1,86	-0,7288943	BAIXO
Minas Gerais	Três Pontas	316940	1,33	0,80	-0,7289809	BAIXO
Minas Gerais	Santa Cruz do Escalvado	315740	0,33	2,38	-0,7294001	BAIXO
Paraná	Santa Helena	412350	1,00	1,31	-0,7300358	BAIXO
Ceará	Jijoca de Jericoacoara	230725	1,00	1,30	-0,7302188	BAIXO
Bahia	Santo Amaro	292860	1,33	0,77	-0,7305062	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Novo Horizonte do Sul	500625	0,33	2,35	-0,7307423	BAIXO
Maranhão	Bom Lugar	210207	0,67	1,82	-0,7309687	BAIXO
Mato Grosso	Itiquira	510460	0,67	1,82	-0,7312127	BAIXO
Minas Gerais	Bandeira	310520	0,33	2,34	-0,7312914	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
São Paulo	Salmourão	354510	0,33	2,31	-0,7330608	BAIXO
Piauí	Lagoa do Piauí	220558	0,33	2,31	-0,7331218	BAIXO
Rio Grande do Norte	Santa Maria	240933	0,33	2,29	-0,734098	BAIXO
Espírito Santo	Sooretama	320501	1,00	1,23	-0,7343675	BAIXO
Minas Gerais	Presidente Bernardes	315310	0,33	2,28	-0,7350131	BAIXO
São Paulo	Maracaí	352880	0,67	1,74	-0,7351785	BAIXO
Minas Gerais	Dom Joaquim	312260	0,33	2,27	-0,7354402	BAIXO
Goiás	Itaguaru	521060	0,33	2,27	-0,7355622	BAIXO
Pará	Bonito	150160	0,67	1,73	-0,7356666	BAIXO
Pernambuco	Ouricuri	260990	1,33	0,67	-0,7358142	BAIXO
Minas Gerais	Santa Maria do Suaçuí	315820	0,67	1,73	-0,7359106	BAIXO
Goiás	São Luíz do Norte	522015	0,33	2,26	-0,7361113	BAIXO
Bahia	Bom Jesus da Lapa	290390	1,33	0,66	-0,7364243	BAIXO
Piauí	Agricolândia	220010	0,33	2,25	-0,7364774	BAIXO
Amazonas	Tabatinga	130406	1,33	0,65	-0,7369124	BAIXO
São Paulo	Mirandópolis	353010	1,00	1,18	-0,7370521	BAIXO
Bahia	Candiba	290660	0,67	1,71	-0,7371919	BAIXO
Bahia	Caldeirão Grande	290550	0,67	1,70	-0,7376189	BAIXO
Santa Catarina	Florianópolis	420540	1,67	0,10	-0,7380539	BAIXO
Ceará	Pacajus	230960	1,33	0,63	-0,7383766	BAIXO
Amazonas	Coari	130120	1,33	0,62	-0,7386207	BAIXO
Pernambuco	Ipupi	260730	1,00	1,15	-0,7387604	BAIXO
Bahia	Andaraí	290130	0,67	1,67	-0,7391442	BAIXO
Minas Gerais	Franciscópolis	312675	0,33	2,20	-0,7394059	BAIXO
Bahia	Carinhanha	290710	1,00	1,13	-0,7395535	BAIXO
Rio de Janeiro	Nova Iguaçu	330350	1,67	0,07	-0,7399453	BAIXO
São Paulo	São Simão	355090	0,67	1,65	-0,7401204	BAIXO
Paraíba	João Pessoa	250750	1,67	0,07	-0,7401283	BAIXO
Minas Gerais	São Pedro do Suaçuí	316410	0,33	2,18	-0,7403821	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Tocantins	Silvanópolis	172065	0,33	2,18	-0,7405041	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Caracol	500280	0,33	2,17	-0,7406871	BAIXO
Minas Gerais	Cristália	312030	0,33	2,17	-0,7408092	BAIXO
Bahia	Mascote	292090	0,67	1,64	-0,7408525	BAIXO
Tocantins	São Miguel do Tocantins	172020	0,67	1,64	-0,7410966	BAIXO
Minas Gerais	Engenheiro Caldas	312370	0,67	1,63	-0,7413406	BAIXO
Goiás	Goiânia	520870	1,67	0,04	-0,7416536	BAIXO
São Paulo	Ilha Comprida	352042	0,67	1,62	-0,7417067	BAIXO
Pernambuco	Recife	261160	1,67	0,04	-0,7417146	BAIXO
Espírito Santo	Irupi	320265	0,67	1,62	-0,7419508	BAIXO
Pernambuco	Floresta	260570	1,00	1,09	-0,741994	BAIXO
Minas Gerais	Piedade dos Gerais	315040	0,33	2,15	-0,7420904	BAIXO
Pernambuco	Belo Jardim	260170	1,33	0,56	-0,7420983	BAIXO
Bahia	Acajutiba	290030	0,67	1,61	-0,7424388	BAIXO
Minas Gerais	Curvelo	312090	1,33	0,55	-0,7425254	BAIXO
Bahia	Baianópolis	290250	0,67	1,60	-0,7428049	BAIXO
Goiás	Caçu	520430	0,67	1,60	-0,7430489	BAIXO
Minas Gerais	Papagaios	314690	0,67	1,60	-0,743232	BAIXO
Ceará	Aquiraz	230100	1,33	0,54	-0,7432575	BAIXO
São Paulo	Barra do Chapéu	350535	0,33	2,11	-0,7438598	BAIXO
Maranhão	Raposa	210945	1,00	1,05	-0,7440073	BAIXO
Minas Gerais	Crisólita	312015	0,33	2,11	-0,7441038	BAIXO
São Paulo	Itaporanga	352280	0,67	1,57	-0,7448183	BAIXO
Minas Gerais	Brasópolis	310890	0,67	1,56	-0,7452453	BAIXO
Minas Gerais	São João do Manteninha	316257	0,33	2,08	-0,7455071	BAIXO
Bahia	Canavieiras	290630	1,00	1,02	-0,7458377	BAIXO
São Paulo	Braúna	350770	0,33	2,07	-0,7460561	BAIXO
Minas Gerais	Conceição do Pará	311760	0,33	2,05	-0,7472764	BAIXO
Piauí	Santa Luz	220930	0,33	2,05	-0,7475204	BAIXO
Amazonas	São Paulo de Olivença	130390	1,00	0,99	-0,747546	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Ceará	Bela Cruz	230230	1,00	0,98	-0,74779	BAIXO
Minas Gerais	Datas	312100	0,33	2,03	-0,7483135	BAIXO
Bahia	Serra do Ramalho	293015	1,00	0,97	-0,7484002	BAIXO
Paraná	Santana do Itararé	412400	0,33	2,02	-0,7492898	BAIXO
Pernambuco	Ipojuca	260720	1,33	0,43	-0,7492977	BAIXO
Pernambuco	Ferreiros	260550	0,67	1,48	-0,7496992	BAIXO
Piauí	Joca Marques	220545	0,33	2,01	-0,7497168	BAIXO
Bahia	Ibitiara	291300	0,67	1,48	-0,7498822	BAIXO
Paraná	Jaguapitã	411190	0,67	1,47	-0,7501873	BAIXO
Pernambuco	Bodocó	260200	1,00	0,94	-0,7503525	BAIXO
Piauí	São Francisco de Assis do Piauí	220965	0,33	1,99	-0,7504489	BAIXO
Minas Gerais	Nova Serrana	314520	1,33	0,41	-0,7504569	BAIXO
Paraná	Grandes Rios	410870	0,33	1,99	-0,750754	BAIXO
Paraná	Cândido de Abreu	410440	0,67	1,46	-0,7508584	BAIXO
São Paulo	Poloni	353990	0,33	1,99	-0,7508761	BAIXO
Minas Gerais	Crucilândia	312060	0,33	1,97	-0,7516692	BAIXO
Ceará	Nova Olinda	230920	0,67	1,44	-0,7517126	BAIXO
Piauí	Caxingó	220265	0,33	1,96	-0,7520963	BAIXO
Bahia	Igaporã	291340	0,67	1,43	-0,7523227	BAIXO
Minas Gerais	Rubelita	315650	0,33	1,96	-0,7525234	BAIXO
Bahia	Urandi	293260	0,67	1,43	-0,7525667	BAIXO
São Paulo	Birigui	350650	1,33	0,37	-0,7525923	BAIXO
Paraná	Salto do Lontra	412300	0,67	1,42	-0,7528718	BAIXO
Paraná	Doutor Ulysses	412863	0,33	1,95	-0,7528894	BAIXO
Maranhão	Sambaíba	210970	0,33	1,95	-0,7529504	BAIXO
Minas Gerais	Porteirinha	315220	1,00	0,89	-0,752976	BAIXO
Minas Gerais	Ouro Verde de Minas	314620	0,33	1,93	-0,7539876	BAIXO
Amazonas	Alvarães	130002	0,67	1,40	-0,7540309	BAIXO
Alagoas	Belo Monte	270090	0,33	1,92	-0,7545367	BAIXO
Paraná	Xambrê	412880	0,33	1,92	-0,7547197	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
São Paulo	Tupi Paulista	355510	0,67	1,39	-0,7547631	BAIXO
Rio Grande do Norte	Senador Elói de Souza	241310	0,33	1,91	-0,7549028	BAIXO
Paraná	Rio Branco do Sul	412220	1,00	0,85	-0,7552944	BAIXO
Bahia	Tremedal	293180	0,67	1,36	-0,7559834	BAIXO
Bahia	Alagoinhas	290070	1,33	0,29	-0,756619	BAIXO
Pernambuco	Camaragibe	260345	1,33	0,29	-0,7568631	BAIXO
Bahia	Ipiaú	291390	1,00	0,82	-0,7568808	BAIXO
Goiás	Santa Rita do Araguaia	521940	0,33	1,88	-0,7569772	BAIXO
São Paulo	Atibaia	350410	1,33	0,28	-0,7574121	BAIXO
Minas Gerais	Poço Fundo	315170	0,67	1,32	-0,7582408	BAIXO
Bahia	Serra Dourada	293030	0,67	1,30	-0,7594	BAIXO
Piauí	José de Freitas	220550	1,00	0,77	-0,7594432	BAIXO
Amazonas	Manaquiri	130255	0,67	1,30	-0,759583	BAIXO
Minas Gerais	Ipaba	313115	0,67	1,30	-0,759644	BAIXO
Ceará	Santana do Cariri	231210	0,67	1,29	-0,759827	BAIXO
Piauí	Regeneração	220880	0,67	1,29	-0,7602541	BAIXO
São Paulo	Santo Antônio do Jardim	354810	0,33	1,81	-0,7603938	BAIXO
Minas Gerais	Padre Paraíso	314630	0,67	1,28	-0,7604982	BAIXO
Piauí	Amarante	220050	0,67	1,28	-0,7608032	BAIXO
Bahia	Itaju do Colônia	291540	0,33	1,80	-0,7608819	BAIXO
Bahia	Lauro de Freitas	291920	1,33	0,21	-0,7610118	BAIXO
Santa Catarina	Vidal Ramos	421920	0,33	1,80	-0,76137	BAIXO
Pará	Muaná	150490	1,00	0,73	-0,7615176	BAIXO
Minas Gerais	Peçanha	314860	0,67	1,26	-0,7617794	BAIXO
Piauí	Ribeiro Gonçalves	220890	0,33	1,79	-0,7617971	BAIXO
São Paulo	Paraibuna	353560	0,67	1,26	-0,7618404	BAIXO
Paraná	Corbélia	410630	0,67	1,26	-0,7618404	BAIXO
Piauí	Sussuapara	221093	0,33	1,79	-0,7618581	BAIXO
Pernambuco	Camocim de São Félix	260350	0,67	1,26	-0,7619624	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Minas Gerais	Aiuruoca	310120	0,33	1,78	-0,7621021	BAIXO
Minas Gerais	Ibiaí	312960	0,33	1,78	-0,7624072	BAIXO
Amazonas	Anori	130010	0,67	1,24	-0,7628776	BAIXO
Paraíba	São João do Rio do Peixe	250070	0,67	1,24	-0,7629996	BAIXO
São Paulo	Echaporã	351470	0,33	1,77	-0,7630173	BAIXO
Ceará	Itapiúna	230650	0,67	1,23	-0,7631826	BAIXO
São Paulo	Monte Alto	353130	1,00	0,70	-0,763409	BAIXO
Ceará	Varjota	231395	0,67	1,23	-0,7635487	BAIXO
Minas Gerais	São Miguel do Anta	316380	0,33	1,75	-0,7636274	BAIXO
Minas Gerais	Indaibara	313065	0,33	1,75	-0,7638105	BAIXO
São Paulo	Nazaré Paulista	353240	0,67	1,21	-0,7646469	BAIXO
Pernambuco	Serrita	261400	0,67	1,20	-0,764891	BAIXO
Pernambuco	Belém do São Francisco	260160	0,67	1,20	-0,765013	BAIXO
Minas Gerais	Naque	314435	0,33	1,72	-0,7652747	BAIXO
Paraná	Morretes	411620	0,67	1,19	-0,765318	BAIXO
Minas Gerais	Águas Formosas	310090	0,67	1,19	-0,76544	BAIXO
Paraíba	Conceição	250440	0,67	1,19	-0,7657451	BAIXO
Paraná	Quitandinha	412120	0,67	1,18	-0,7660502	BAIXO
Piauí	Acauã	220005	0,33	1,71	-0,7663119	BAIXO
São Paulo	Bauru	350600	1,33	0,11	-0,7665029	BAIXO
Minas Gerais	Guarda-Mor	312860	0,33	1,70	-0,766678	BAIXO
Goiás	Anápolis	520110	1,33	0,11	-0,7668689	BAIXO
Alagoas	Paulo Jacinto	270660	0,33	1,69	-0,7671661	BAIXO
Alagoas	Taquarana	270910	0,67	1,16	-0,7674534	BAIXO
Minas Gerais	Itaobim	313330	0,67	1,15	-0,7675145	BAIXO
Espírito Santo	Pancas	320400	0,67	1,15	-0,7675754	BAIXO
Rio Grande do Norte	Serrinha	241350	0,33	1,68	-0,7676542	BAIXO
Pernambuco	Afrânio	260020	0,67	1,15	-0,7678195	BAIXO
Minas Gerais	Capetinga	311240	0,33	1,67	-0,7682643	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Bahia	Boquira	290410	0,67	1,14	-0,7685516	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Itaquiraí	500460	0,67	1,13	-0,7689787	BAIXO
Pernambuco	Palmares	261000	1,00	0,60	-0,769144	BAIXO
Piauí	Nazaré do Piauí	220670	0,33	1,65	-0,7693015	BAIXO
Rio de Janeiro	Cachoeiras de Macacu	330080	1,00	0,59	-0,7696931	BAIXO
Pernambuco	Limoeiro	260890	1,00	0,58	-0,7699372	BAIXO
São Paulo	Buri	350800	0,67	1,10	-0,770626	BAIXO
Minas Gerais	Iguatama	313030	0,33	1,62	-0,7708268	BAIXO
Rio Grande do Sul	Porto Alegre	431490	1,33	0,03	-0,7709567	BAIXO
Bahia	Paramirim	292360	0,67	1,09	-0,7709921	BAIXO
Minas Gerais	Alfredo Vasconcelos	310163	0,33	1,60	-0,7719249	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Pedro Gomes	500640	0,33	1,60	-0,772047	BAIXO
Minas Gerais	Varjão de Minas	317075	0,33	1,59	-0,772413	BAIXO
Minas Gerais	Pedro Leopoldo	314930	1,00	0,53	-0,7725607	BAIXO
Bahia	Governador Mangabeira	291160	0,67	1,06	-0,7727004	BAIXO
São Paulo	Natividade da Serra	353230	0,33	1,59	-0,7727791	BAIXO
Alagoas	São José da Laje	270830	0,67	1,06	-0,7728224	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Juti	500515	0,33	1,59	-0,7729011	BAIXO
São Paulo	Três Fronteiras	355490	0,33	1,58	-0,7729622	BAIXO
Paraná	Ouro Verde do Oeste	411745	0,33	1,58	-0,7732062	BAIXO
Ceará	Itaitinga	230625	1,00	0,52	-0,7735368	BAIXO
Minas Gerais	Santana de Pirapama	315850	0,33	1,57	-0,7737553	BAIXO
São Paulo	Irapuru	352160	0,33	1,57	-0,7738773	BAIXO
Pará	Chaves	150250	0,67	1,03	-0,7741037	BAIXO
Bahia	Macarani	291970	0,67	1,03	-0,7744088	BAIXO
São Paulo	Lindóia	352700	0,33	1,55	-0,7746094	BAIXO
Goiás	Araguapaz	520215	0,33	1,55	-0,7746704	BAIXO
Minas Gerais	São Pedro dos Ferros	316400	0,33	1,55	-0,7748535	BAIXO
Goiás	Ouvidor	521550	0,33	1,54	-0,7752196	BAIXO
Bahia	Ibicaraí	291210	0,67	1,01	-0,7752629	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
São Paulo	Peruíbe	353760	1,00	0,48	-0,7756112	BAIXO
Paraná	Abatiá	410010	0,33	1,53	-0,7757077	BAIXO
Maranhão	Riachão	210950	0,67	1,00	-0,775751	BAIXO
Paraná	Marilena	411500	0,33	1,53	-0,7758297	BAIXO
São Paulo	Teodoro Sampaio	355430	0,67	1,00	-0,775873	BAIXO
Ceará	Senador Sá	231280	0,33	1,53	-0,7759517	BAIXO
Minas Gerais	Inconfidentes	313060	0,33	1,52	-0,7763788	BAIXO
São Paulo	Pirajuí	353890	0,67	0,99	-0,7764831	BAIXO
Alagoas	Palmeira dos Índios	270630	1,00	0,46	-0,7765264	BAIXO
São Paulo	Guataporá	351885	0,33	1,52	-0,7766228	BAIXO
Minas Gerais	Maravilhas	313970	0,33	1,52	-0,7767448	BAIXO
Sergipe	Santana do São Francisco	280640	0,33	1,51	-0,7769279	BAIXO
Minas Gerais	Inimutaba	313110	0,33	1,51	-0,7771719	BAIXO
Espírito Santo	Viana	320510	1,00	0,44	-0,7775025	BAIXO
Goiás	Campo Alegre de Goiás	520480	0,33	1,50	-0,777782	BAIXO
Pará	Santa Cruz do Arari	150640	0,33	1,49	-0,778026	BAIXO
São Paulo	Ibiúna	351970	1,00	0,43	-0,7782957	BAIXO
Rio de Janeiro	Itaocara	330210	0,67	0,95	-0,7784965	BAIXO
Bahia	Planalto	292500	0,67	0,95	-0,7786185	BAIXO
Ceará	Tarrafas	231325	0,33	1,48	-0,7789412	BAIXO
Bahia	Nova Redenção	292285	0,33	1,47	-0,7790022	BAIXO
Bahia	Cordeiros	290900	0,33	1,47	-0,7791243	BAIXO
Rio de Janeiro	Seropédica	330555	1,00	0,41	-0,7791498	BAIXO
Pernambuco	Goiana	260620	1,00	0,41	-0,7792719	BAIXO
Alagoas	Traipu	270920	0,67	0,94	-0,7794117	BAIXO
Maranhão	Boa Vista do Gurupi	210197	0,33	1,47	-0,7794293	BAIXO
Minas Gerais	Corinto	311910	0,67	0,94	-0,7795337	BAIXO
Pernambuco	São João	261320	0,67	0,93	-0,7796557	BAIXO
Goiás	Paranaiguara	521630	0,33	1,46	-0,7797344	BAIXO
São Paulo	Angatuba	350220	0,67	0,92	-0,7801438	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Mato Grosso do Sul	Anaurilândia	500080	0,33	1,45	-0,7802225	BAIXO
Minas Gerais	Monte Sião	314340	0,67	0,92	-0,7802658	BAIXO
Bahia	Ouriçangas	292330	0,33	1,44	-0,7808936	BAIXO
Espírito Santo	Venda Nova do Imigrante	320506	0,67	0,91	-0,781059	BAIXO
Rio de Janeiro	São Sebastião do Alto	330530	0,33	1,43	-0,7812597	BAIXO
Rio Grande do Sul	General Câmara	430880	0,33	1,43	-0,7812597	BAIXO
Pará	Cachoeira do Arari	150200	0,67	0,90	-0,781303	BAIXO
Minas Gerais	Guiricema	312900	0,33	1,43	-0,7815037	BAIXO
Pará	Bujaru	150190	0,67	0,90	-0,781608	BAIXO
Sergipe	Muribeca	280430	0,33	1,42	-0,7819918	BAIXO
Goiás	Cocalzinho de Goiás	520551	0,67	0,89	-0,7820961	BAIXO
Minas Gerais	Itajubá	313240	1,00	0,35	-0,7825055	BAIXO
São Paulo	Ubatuba	355540	1,00	0,35	-0,7826275	BAIXO
Minas Gerais	Aimorés	310110	0,67	0,88	-0,7826453	BAIXO
Maranhão	Anajatuba	210070	0,67	0,88	-0,7827063	BAIXO
São Paulo	Pirapozinho	353920	0,67	0,88	-0,7827063	BAIXO
São Paulo	Cajamar	350920	1,00	0,35	-0,7827495	BAIXO
Pernambuco	Serra Talhada	261390	1,00	0,35	-0,7828105	BAIXO
Paraíba	Rio Tinto	251290	0,67	0,88	-0,7828283	BAIXO
Paraná	Boa Vista da Aparecida	410305	0,33	1,40	-0,782968	BAIXO
Minas Gerais	Formoso	312620	0,33	1,40	-0,783212	BAIXO
São Paulo	Votuporanga	355710	1,00	0,34	-0,7833596	BAIXO
Amazonas	Fonte Boa	130160	0,67	0,86	-0,7836825	BAIXO
Bahia	Formosa do Rio Preto	291110	0,67	0,86	-0,7838045	BAIXO
Minas Gerais	Araponga	310370	0,33	1,38	-0,7841272	BAIXO
Bahia	Guajeru	291165	0,33	1,38	-0,7841882	BAIXO
Minas Gerais	Ubá	316990	1,00	0,32	-0,7843358	BAIXO
Bahia	Santo Antônio de Jesus	292870	1,00	0,32	-0,7843968	BAIXO
Paraná	São Sebastião da Amoreira	412600	0,33	1,37	-0,7846153	BAIXO
Ceará	Maranguape	230770	1,00	0,31	-0,7846408	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
São Paulo	Vista Alegre do Alto	355690	0,33	1,37	-0,7847373	BAIXO
Pará	Magalhães Barata	150410	0,33	1,37	-0,7847983	BAIXO
Goiás	Mambaí	521270	0,33	1,37	-0,7848594	BAIXO
Pará	Maracanã	150430	0,67	0,84	-0,7849637	BAIXO
Pará	Breves	150180	1,00	0,30	-0,785129	BAIXO
Minas Gerais	Pitangui	315140	0,67	0,83	-0,7852077	BAIXO
São Paulo	Paulicéia	353640	0,33	1,36	-0,7855304	BAIXO
Minas Gerais	Itabira	313170	1,00	0,29	-0,7857391	BAIXO
Minas Gerais	Novo Cruzeiro	314530	0,67	0,82	-0,7860619	BAIXO
Santa Catarina	Praia Grande	421380	0,33	1,34	-0,7862016	BAIXO
Pará	Peixe-Boi	150560	0,33	1,34	-0,7863236	BAIXO
Bahia	Santa Rita de Cássia	292840	0,67	0,81	-0,7863669	BAIXO
Paraná	Sarandi	412625	1,00	0,28	-0,7866542	BAIXO
Minas Gerais	Frei Inocência	312690	0,33	1,33	-0,7867507	BAIXO
Bahia	Várzea do Poço	293310	0,33	1,33	-0,7868727	BAIXO
Pernambuco	Igarassu	260680	1,00	0,27	-0,7868983	BAIXO
Espírito Santo	Colatina	320150	1,00	0,27	-0,7869593	BAIXO
Pernambuco	Passira	261050	0,67	0,78	-0,7878312	BAIXO
Espírito Santo	Iúna	320300	0,67	0,78	-0,7881973	BAIXO
Pará	Melgaço	150450	0,67	0,77	-0,7885634	BAIXO
Paraná	São Miguel do Iguaçu	412570	0,67	0,76	-0,7889904	BAIXO
Pará	Santo Antônio do Tauá	150700	0,67	0,76	-0,7890514	BAIXO
Minas Gerais	Tombos	316920	0,33	1,29	-0,7890691	BAIXO
Minas Gerais	Belo Vale	310640	0,33	1,29	-0,7892522	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Aparecida do Taboado	500100	0,67	0,75	-0,7894785	BAIXO
Minas Gerais	Paula Cândido	314830	0,33	1,28	-0,7894962	BAIXO
Piauí	Bom Jesus	220190	0,67	0,75	-0,7896006	BAIXO
Minas Gerais	Carmo do Paranaíba	311430	0,67	0,74	-0,7900887	BAIXO
Piauí	Queimada Nova	220865	0,33	1,27	-0,7901673	BAIXO
Rio de Janeiro	Comendador Levy Gasparian	330095	0,33	1,27	-0,7901673	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Minas Gerais	Riacho dos Machados	315450	0,33	1,27	-0,7902893	BAIXO
Piauí	Marcolândia	220595	0,33	1,27	-0,7904724	BAIXO
Paraná	Sabáudia	412270	0,33	1,26	-0,7907774	BAIXO
São Paulo	Pindamonhangaba	353800	1,00	0,20	-0,790803	BAIXO
Minas Gerais	Espinosa	312430	0,67	0,73	-0,7908208	BAIXO
Santa Catarina	Armazém	420150	0,33	1,26	-0,7908995	BAIXO
Rio de Janeiro	Teresópolis	330580	1,00	0,20	-0,7909861	BAIXO
Pará	Limoeiro do Ajuru	150400	0,67	0,73	-0,7910648	BAIXO
Espírito Santo	Baixo Guandu	320080	0,67	0,72	-0,7911258	BAIXO
Minas Gerais	Lontra	313865	0,33	1,24	-0,7919366	BAIXO
São Paulo	Santa Bárbara d'Oeste	354580	1,00	0,18	-0,7919622	BAIXO
Paraná	Mandaguaçu	411410	0,67	0,71	-0,792102	BAIXO
Bahia	Itabuna	291480	1,00	0,17	-0,7923283	BAIXO
Minas Gerais	Juatuba	313665	0,67	0,70	-0,7923461	BAIXO
São Paulo	Descalvado	351370	0,67	0,70	-0,7924681	BAIXO
Pernambuco	Exu	260530	0,67	0,70	-0,7925901	BAIXO
Minas Gerais	Morada Nova de Minas	314350	0,33	1,23	-0,7926688	BAIXO
Minas Gerais	Ouro Fino	314600	0,67	0,69	-0,7928951	BAIXO
Pernambuco	Catende	260420	0,67	0,69	-0,7929562	BAIXO
Piauí	Miguel Alves	220620	0,67	0,69	-0,7929562	BAIXO
Minas Gerais	Antônio Dias	310300	0,33	1,21	-0,793767	BAIXO
Paraná	Itaperuçu	411125	0,67	0,68	-0,7938103	BAIXO
Bahia	Sebastião Laranjeiras	293000	0,33	1,19	-0,7948042	BAIXO
Rio de Janeiro	Vassouras	330620	0,67	0,65	-0,7949696	BAIXO
Minas Gerais	Carneirinho	311455	0,33	1,18	-0,7952313	BAIXO
Rio de Janeiro	Petrópolis	330390	1,00	0,12	-0,7953789	BAIXO
Minas Gerais	Piranguinho	315100	0,33	1,18	-0,7954143	BAIXO
Alagoas	Jequiá da Praia	270375	0,33	1,17	-0,7955363	BAIXO
São Paulo	Santa Fé do Sul	354660	0,67	0,64	-0,7958237	BAIXO
São Paulo	Adamantina	350010	0,67	0,63	-0,7961898	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Goiás	Petrolina de Goiás	521680	0,33	1,16	-0,7962074	BAIXO
São Paulo	Presidente Venceslau	354150	0,67	0,63	-0,7962508	BAIXO
Espírito Santo	Domingos Martins	320190	0,67	0,63	-0,7964338	BAIXO
Piauí	Ipiranga do Piauí	220480	0,33	1,16	-0,7965125	BAIXO
Rio Grande do Sul	Charqueadas	430535	0,67	0,63	-0,7965558	BAIXO
São Paulo	Palmares Paulista	353510	0,33	1,15	-0,7967566	BAIXO
Paraná	Ponta Grossa	411990	1,00	0,09	-0,7967821	BAIXO
Paraná	Cascavel	410480	1,00	0,09	-0,7968431	BAIXO
Rio Grande do Norte	Carnaubais	240250	0,33	1,14	-0,7971836	BAIXO
Bahia	Ribeirão do Largo	292665	0,33	1,14	-0,7973056	BAIXO
Maranhão	Pedreiras	210820	0,67	0,60	-0,7979591	BAIXO
São Paulo	São José do Rio Preto	354980	1,00	0,07	-0,7980633	BAIXO
Rio Grande do Norte	Lajes	240670	0,33	1,13	-0,7980988	BAIXO
Bahia	Varzedo	293317	0,33	1,12	-0,7984039	BAIXO
Bahia	Caraíbas	290689	0,33	1,12	-0,7985869	BAIXO
Minas Gerais	Juiz de Fora	313670	1,00	0,06	-0,7986125	BAIXO
São Paulo	Pontal	354020	0,67	0,59	-0,7987522	BAIXO
Sergipe	Aracaju	280030	1,00	0,05	-0,7988565	BAIXO
São Paulo	Ribeirão Preto	354340	1,00	0,05	-0,7992226	BAIXO
Minas Gerais	Ouro Branco	314590	0,67	0,57	-0,7994233	BAIXO
Minas Gerais	São Sebastião do Maranhão	316450	0,33	1,10	-0,799441	BAIXO
Minas Gerais	Mateus Leme	314070	0,67	0,57	-0,7996064	BAIXO
Maranhão	Araíoses	210090	0,67	0,57	-0,7996674	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Guia Lopes da Laguna	500410	0,33	1,10	-0,7997461	BAIXO
Minas Gerais	Visconde do Rio Branco	317200	0,67	0,57	-0,7997894	BAIXO
Minas Gerais	Capelinha	311230	0,67	0,56	-0,8001555	BAIXO
Piauí	São Raimundo Nonato	221060	0,67	0,56	-0,8002775	BAIXO
Maranhão	Duque Bacelar	210390	0,33	1,09	-0,8002952	BAIXO
São Paulo	Getulina	351700	0,33	1,09	-0,8003562	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Tocantins	Buriti do Tocantins	170380	0,33	1,08	-0,8007833	BAIXO
Bahia	São Miguel das Matas	292940	0,33	1,08	-0,8009053	BAIXO
São Paulo	São Luís do Paraitinga	355000	0,33	1,07	-0,8009663	BAIXO
São Paulo	Guaraci	351790	0,33	1,07	-0,8010273	BAIXO
Pernambuco	Cortês	260480	0,33	1,07	-0,8010273	BAIXO
Minas Gerais	Arcos	310420	0,67	0,54	-0,8014367	BAIXO
Bahia	Ibiassucê	291200	0,33	1,07	-0,8014544	BAIXO
Piauí	Esperantina	220370	0,67	0,53	-0,8016808	BAIXO
Pernambuco	Moreilândia	261430	0,33	1,05	-0,8020645	BAIXO
Goiás	Corumbá de Goiás	520580	0,33	1,05	-0,8021865	BAIXO
Bahia	Mata de São João	292100	0,67	0,52	-0,8022299	BAIXO
São Paulo	Garça	351670	0,67	0,52	-0,8022909	BAIXO
Goiás	Iaciara	520990	0,33	1,05	-0,8023086	BAIXO
Ceará	Pires Ferreira	231095	0,33	1,05	-0,8024306	BAIXO
Bahia	Canápolis	290610	0,33	1,05	-0,8024916	BAIXO
Paraíba	Seridó	251540	0,33	1,05	-0,8024916	BAIXO
Paraná	Catanduvás	410500	0,33	1,05	-0,8025526	BAIXO
Bahia	Matina	292105	0,33	1,05	-0,8025526	BAIXO
Bahia	Santa Inês	292790	0,33	1,05	-0,8025526	BAIXO
Piauí	Monte Alegre do Piauí	220660	0,33	1,04	-0,8027356	BAIXO
Paraná	São João do Ivaí	412500	0,33	1,04	-0,8027967	BAIXO
Paraná	Querência do Norte	412100	0,33	1,04	-0,8028576	BAIXO
Goiás	Mara Rosa	521280	0,33	1,04	-0,8029187	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Batayporã	500200	0,33	1,04	-0,8029797	BAIXO
Pará	Inhangapi	150340	0,33	1,03	-0,8032237	BAIXO
São Paulo	Vargem	355635	0,33	1,03	-0,8035288	BAIXO
Alagoas	Coité do Nória	270200	0,33	1,03	-0,8035288	BAIXO
Amazonas	Amaturá	130006	0,33	1,03	-0,8035898	BAIXO
Ceará	São Luís do Curu	231260	0,33	1,03	-0,8035898	BAIXO
Ceará	Catunda	230365	0,33	1,03	-0,8035898	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Santa Catarina	Urubici	421890	0,33	1,03	-0,8036508	BAIXO
Bahia	Antônio Gonçalves	290180	0,33	1,02	-0,8037728	BAIXO
Bahia	Gentio do Ouro	291130	0,33	1,02	-0,8038949	BAIXO
Goiás	Jaraguá	521180	0,67	0,48	-0,8043042	BAIXO
Espírito Santo	Itarana	320290	0,33	1,01	-0,804444	BAIXO
Bahia	Botuporã	290420	0,33	1,01	-0,804627	BAIXO
Bahia	Iramaia	291430	0,33	1,00	-0,80481	BAIXO
Bahia	Milagres	292130	0,33	1,00	-0,804871	BAIXO
Minas Gerais	Eugenópolis	312490	0,33	1,00	-0,804871	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Dois Irmãos do Buriti	500348	0,33	1,00	-0,804993	BAIXO
Piauí	Capitão de Campos	220240	0,33	1,00	-0,804993	BAIXO
Minas Gerais	Capim Branco	311250	0,33	1,00	-0,8050541	BAIXO
Maranhão	Peri Mirim	210840	0,33	1,00	-0,8050541	BAIXO
Bahia	Iuiú	291733	0,33	1,00	-0,8051151	BAIXO
Ceará	Mauriti	230810	0,67	0,47	-0,8051584	BAIXO
Bahia	Aurelino Leal	290240	0,33	0,99	-0,8053591	BAIXO
Minas Gerais	Resende Costa	315420	0,33	0,99	-0,8056642	BAIXO
Minas Gerais	São João do Manhuaçu	316255	0,33	0,99	-0,8057252	BAIXO
Paraná	Missal	411605	0,33	0,98	-0,8059692	BAIXO
Maranhão	Lima Campos	210600	0,33	0,98	-0,8059692	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Sete Quedas	500770	0,33	0,98	-0,8059692	BAIXO
Paraná	Prudentópolis	412060	0,67	0,44	-0,8066837	BAIXO
Bahia	Mortugaba	292180	0,33	0,97	-0,8068234	BAIXO
Bahia	Caetanos	290515	0,33	0,97	-0,8068844	BAIXO
Goiás	Cachoeira Alta	520410	0,33	0,97	-0,8069454	BAIXO
São Paulo	Tremembé	355480	0,67	0,43	-0,8071108	BAIXO
Minas Gerais	Carmo da Cachoeira	311390	0,33	0,96	-0,8071284	BAIXO
Alagoas	Coruripe	270230	0,67	0,43	-0,8073548	BAIXO
Goiás	Inhumas	521000	0,67	0,43	-0,8074769	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Eldorado	500375	0,33	0,96	-0,8074945	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Pernambuco	Betânia	260180	0,33	0,95	-0,8076165	BAIXO
Goiás	Piranhas	521720	0,33	0,95	-0,8078606	BAIXO
Ceará	Granja	230470	0,67	0,42	-0,808026	BAIXO
Minas Gerais	Extrema	312510	0,67	0,42	-0,808087	BAIXO
Minas Gerais	São Gonçalo do Pará	316180	0,33	0,94	-0,8081046	BAIXO
Minas Gerais	Virgem da Lapa	317160	0,33	0,94	-0,8082877	BAIXO
Minas Gerais	Prudente de Moraes	315360	0,33	0,93	-0,8088368	BAIXO
Paraná	Jataizinho	411270	0,33	0,93	-0,8090198	BAIXO
Paraná	Jardim Alegre	411250	0,33	0,93	-0,8091418	BAIXO
Ceará	Poranga	231100	0,33	0,92	-0,8093859	BAIXO
Paraíba	Guarabira	250630	0,67	0,39	-0,8096732	BAIXO
Ceará	Ibaretama	230526	0,33	0,91	-0,809935	BAIXO
Bahia	Licínio de Almeida	291940	0,33	0,91	-0,809996	BAIXO
Minas Gerais	Mato Verde	314100	0,33	0,91	-0,810118	BAIXO
São Paulo	Cananéia	350990	0,33	0,90	-0,8103011	BAIXO
Bahia	Dom Basílio	291010	0,33	0,90	-0,8104231	BAIXO
Alagoas	Marechal Deodoro	270470	0,67	0,37	-0,8107104	BAIXO
Espírito Santo	Marilândia	320335	0,33	0,90	-0,8107281	BAIXO
São Paulo	Andradina	350210	0,67	0,37	-0,8107715	BAIXO
São Paulo	Chavantes	355720	0,33	0,90	-0,8107891	BAIXO
Paraná	Engenheiro Beltrão	410750	0,33	0,89	-0,8109722	BAIXO
Bahia	Cruz das Almas	290980	0,67	0,36	-0,8111376	BAIXO
Paraíba	Lucena	250860	0,33	0,88	-0,8113992	BAIXO
Pará	Benevides	150150	0,67	0,35	-0,8117477	BAIXO
Pernambuco	Carnaubeira da Penha	260392	0,33	0,88	-0,8118263	BAIXO
Minas Gerais	Mariana	314000	0,67	0,35	-0,8118697	BAIXO
São Paulo	Tupã	355500	0,67	0,34	-0,8120527	BAIXO
Minas Gerais	Lagoa Dourada	313740	0,33	0,87	-0,8121924	BAIXO
Minas Gerais	Conceição do Rio Verde	311770	0,33	0,87	-0,8122534	BAIXO
Goiás	Nova Crixás	521483	0,33	0,87	-0,8123754	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Mato Grosso do Sul	Porto Murtinho	500690	0,33	0,86	-0,8124974	BAIXO
Goiás	Chapadão do Céu	520547	0,33	0,86	-0,8125585	BAIXO
Sergipe	Estância	280210	0,67	0,33	-0,8126628	BAIXO
Paraná	Santa Tereza do Oeste	412402	0,33	0,84	-0,8136567	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Nioaque	500580	0,33	0,84	-0,8138397	BAIXO
Piauí	Baixa Grande do Ribeiro	220115	0,33	0,84	-0,8140227	BAIXO
Paraná	Bocaiúva do Sul	410310	0,33	0,84	-0,8140838	BAIXO
Pará	Santa Isabel do Pará	150650	0,67	0,30	-0,8141881	BAIXO
Bahia	Várzea Nova	293315	0,33	0,83	-0,8143278	BAIXO
Ceará	Cascavel	230350	0,67	0,30	-0,8144932	BAIXO
Minas Gerais	Ouro Preto	314610	0,67	0,30	-0,8146152	BAIXO
São Paulo	Cruzeiro	351340	0,67	0,30	-0,8146152	BAIXO
Piauí	Alto Longá	220030	0,33	0,82	-0,8146939	BAIXO
Paraíba	Serra Branca	251550	0,33	0,82	-0,8151209	BAIXO
Paraná	Paraíso do Norte	411800	0,33	0,81	-0,8152429	BAIXO
Goiás	Flores de Goiás	520790	0,33	0,81	-0,815548	BAIXO
Alagoas	Ibateguara	270300	0,33	0,81	-0,815548	BAIXO
Bahia	Angical	290140	0,33	0,81	-0,815548	BAIXO
Minas Gerais	João Monlevade	313620	0,67	0,28	-0,8157134	BAIXO
Minas Gerais	Carmo de Minas	311410	0,33	0,81	-0,815731	BAIXO
Alagoas	Paripueira	270644	0,33	0,80	-0,8158531	BAIXO
Pernambuco	Carpina	260400	0,67	0,27	-0,8158964	BAIXO
Pernambuco	Primavera	261140	0,33	0,80	-0,8159141	BAIXO
Bahia	Uibaí	293240	0,33	0,80	-0,8160361	BAIXO
Maranhão	Primeira Cruz	210940	0,33	0,80	-0,8161581	BAIXO
Piauí	Picos	220800	0,67	0,27	-0,8162014	BAIXO
Goiás	Goianápolis	520840	0,33	0,80	-0,8162801	BAIXO
Minas Gerais	Candeias	311200	0,33	0,79	-0,8164022	BAIXO
Ceará	Pacatuba	230970	0,67	0,26	-0,8166896	BAIXO
Bahia	Boninal	290400	0,33	0,79	-0,8167073	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Espírito Santo	Muqui	320380	0,33	0,78	-0,8170123	BAIXO
Minas Gerais	Maria da Fé	313990	0,33	0,78	-0,8171343	BAIXO
Bahia	Várzea da Roça	293305	0,33	0,78	-0,8172563	BAIXO
Ceará	Acarape	230015	0,33	0,78	-0,8173174	BAIXO
Bahia	Itagi	291510	0,33	0,78	-0,8173174	BAIXO
Bahia	Guanambi	291170	0,67	0,25	-0,8174217	BAIXO
Bahia	Barra do Mendes	290300	0,33	0,77	-0,8174394	BAIXO
São Paulo	Itapeva	352240	0,67	0,24	-0,8175437	BAIXO
São Paulo	Borborema	350740	0,33	0,77	-0,8176224	BAIXO
Minas Gerais	São João del Rei	316250	0,67	0,24	-0,8176658	BAIXO
São Paulo	Moji Mirim	353080	0,67	0,24	-0,8177267	BAIXO
São Paulo	Presidente Bernardes	354120	0,33	0,77	-0,8178664	BAIXO
São Paulo	Caieiras	350900	0,67	0,23	-0,8180928	BAIXO
Alagoas	Rio Largo	270770	0,67	0,23	-0,8181538	BAIXO
Minas Gerais	Capinópolis	311260	0,33	0,76	-0,8183545	BAIXO
Pernambuco	Abreu e Lima	260005	0,67	0,23	-0,8184589	BAIXO
Pernambuco	Triunfo	261570	0,33	0,76	-0,8184766	BAIXO
Paraná	Campo Mourão	410430	0,67	0,22	-0,8185809	BAIXO
Maranhão	Lago Verde	210590	0,33	0,75	-0,8186596	BAIXO
Minas Gerais	Itamonte	313300	0,33	0,75	-0,8187206	BAIXO
Paraíba	Uiraúna	251690	0,33	0,74	-0,8190867	BAIXO
Maranhão	Joselândia	210560	0,33	0,74	-0,8190867	BAIXO
Maranhão	Conceição do Lago-Açu	210355	0,33	0,74	-0,8190867	BAIXO
Maranhão	Bacabal	210120	0,67	0,21	-0,81913	BAIXO
São Paulo	Panorama	353540	0,33	0,74	-0,8192087	BAIXO
Goiás	Caldas Novas	520450	0,67	0,21	-0,819252	BAIXO
Minas Gerais	Tarumirim	316840	0,33	0,74	-0,8195137	BAIXO
Minas Gerais	Rio Paranaíba	315550	0,33	0,73	-0,8196968	BAIXO
Bahia	Pindaí	292450	0,33	0,73	-0,8196968	BAIXO
Goiás	Jataí	521190	0,67	0,20	-0,8198621	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Bahia	Luís Eduardo Magalhães	291955	0,67	0,20	-0,8199841	BAIXO
Minas Gerais	Araxá	310400	0,67	0,19	-0,8202282	BAIXO
Alagoas	Messias	270520	0,33	0,72	-0,8203679	BAIXO
Ceará	Tururu	231355	0,33	0,72	-0,8203679	BAIXO
São Paulo	Pedregulho	353700	0,33	0,72	-0,820673	BAIXO
Minas Gerais	Araguari	310350	0,67	0,18	-0,8207773	BAIXO
São Paulo	Itatiba	352340	0,67	0,18	-0,8208993	BAIXO
Paraná	Arapongas	410150	0,67	0,18	-0,8210824	BAIXO
Alagoas	Estrela de Alagoas	270255	0,33	0,71	-0,8211001	BAIXO
Bahia	Mirangaba	292140	0,33	0,71	-0,821161	BAIXO
Pernambuco	Jataúba	260800	0,33	0,70	-0,8214661	BAIXO
Rio de Janeiro	Resende	330420	0,67	0,17	-0,8215094	BAIXO
Paraná	Marmeleiro	411540	0,33	0,70	-0,8215882	BAIXO
Alagoas	Piaçabuçu	270680	0,33	0,70	-0,8215882	BAIXO
Ceará	Quixelô	231135	0,33	0,70	-0,8215882	BAIXO
Minas Gerais	Campanha	311090	0,33	0,70	-0,8216491	BAIXO
Minas Gerais	Sabará	315670	0,67	0,17	-0,8216925	BAIXO
São Paulo	Caraguatatuba	351050	0,67	0,16	-0,8218755	BAIXO
Rio Grande do Sul	Giruí	430900	0,33	0,69	-0,8218932	BAIXO
São Paulo	São Lourenço da Serra	354995	0,33	0,69	-0,8220152	BAIXO
Pernambuco	Cumaru	260490	0,33	0,68	-0,8224423	BAIXO
Maranhão	Cajari	210250	0,33	0,68	-0,8228084	BAIXO
Bahia	Teixeira de Freitas	293135	0,67	0,14	-0,8229737	BAIXO
Pernambuco	Itaquitinga	260780	0,33	0,67	-0,8231134	BAIXO
Pernambuco	São Vicente Ferrer	261380	0,33	0,67	-0,8233575	BAIXO
Piauí	Parnaíba	220770	0,67	0,13	-0,8235228	BAIXO
Paraíba	Pitimbu	251190	0,33	0,66	-0,8235405	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Água Clara	500020	0,33	0,66	-0,8235405	BAIXO
Rio de Janeiro	Angra dos Reis	330010	0,67	0,13	-0,8235838	BAIXO
Bahia	Boa Vista do Tupim	290380	0,33	0,66	-0,8237845	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Santa Catarina	Governador Celso Ramos	420600	0,33	0,66	-0,8239065	BAIXO
Bahia	Itororó	291710	0,33	0,66	-0,8239676	BAIXO
Ceará	Cariús	230330	0,33	0,65	-0,8240896	BAIXO
Goiás	São Simão	522040	0,33	0,65	-0,8240896	BAIXO
Paraíba	Piancó	251130	0,33	0,65	-0,8240896	BAIXO
Minas Gerais	Piranga	315080	0,33	0,65	-0,8240896	BAIXO
Maranhão	Paulino Neves	210805	0,33	0,65	-0,8242116	BAIXO
Bahia	Tanque Novo	293105	0,33	0,65	-0,8243946	BAIXO
São Paulo	Juquiá	352610	0,33	0,65	-0,8243946	BAIXO
Rio de Janeiro	Nova Friburgo	330340	0,67	0,12	-0,824438	BAIXO
Ceará	Jaguaretama	230670	0,33	0,64	-0,8245777	BAIXO
Rio de Janeiro	Porciúncula	330410	0,33	0,64	-0,8246997	BAIXO
Bahia	Mundo Novo	292210	0,33	0,64	-0,8249438	BAIXO
Tocantins	Augustinópolis	170255	0,33	0,64	-0,8250658	BAIXO
Maranhão	Apicum-Açu	210083	0,33	0,63	-0,8251268	BAIXO
Piauí	São Miguel do Tapuio	221040	0,33	0,63	-0,8251878	BAIXO
São Paulo	Buritama	350810	0,33	0,63	-0,8253098	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Terenos	500800	0,33	0,63	-0,8253708	BAIXO
Bahia	Jaguaripe	291780	0,33	0,63	-0,8254318	BAIXO
Bahia	Souto Soares	293080	0,33	0,63	-0,8254318	BAIXO
São Paulo	Presidente Prudente	354140	0,67	0,10	-0,8255362	BAIXO
Pernambuco	Dormentes	260515	0,33	0,63	-0,8256149	BAIXO
Ceará	Carnaubal	230340	0,33	0,63	-0,8256149	BAIXO
Alagoas	Major Isidoro	270440	0,33	0,62	-0,8257369	BAIXO
Rio Grande do Norte	Tibau do Sul	241420	0,33	0,62	-0,8257369	BAIXO
São Paulo	Marília	352900	0,67	0,09	-0,8257802	BAIXO
Bahia	Juazeiro	291840	0,67	0,09	-0,8257802	BAIXO
Bahia	Filadélfia	291085	0,33	0,62	-0,825859	BAIXO
Bahia	Cafarnaum	290530	0,33	0,62	-0,826164	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Rio de Janeiro	Volta Redonda	330630	0,67	0,08	-0,8262683	BAIXO
Paraná	Terra Roxa	412740	0,33	0,61	-0,826286	BAIXO
Espírito Santo	Muniz Freire	320370	0,33	0,61	-0,826347	BAIXO
São Paulo	Cotia	351300	0,67	0,08	-0,8265734	BAIXO
Maranhão	Paraibano	210770	0,33	0,61	-0,8265911	BAIXO
Goiás	Pontalina	521770	0,33	0,61	-0,8266521	BAIXO
Bahia	Camaçari	290570	0,67	0,07	-0,8270004	BAIXO
Minas Gerais	Matipó	314090	0,33	0,60	-0,8270792	BAIXO
Bahia	São Gabriel	292925	0,33	0,60	-0,8271402	BAIXO
Minas Gerais	Ribeirão das Neves	315460	0,67	0,07	-0,8273055	BAIXO
Pernambuco	Lagoa do Carro	260845	0,33	0,59	-0,8273232	BAIXO
Pernambuco	Paulista	261070	0,67	0,06	-0,8273665	BAIXO
Santa Catarina	Blumenau	420240	0,67	0,06	-0,8274885	BAIXO
São Paulo	Potirendaba	354080	0,33	0,58	-0,8278723	BAIXO
Ceará	Reriutaba	231170	0,33	0,58	-0,8279333	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Mundo Novo	500568	0,33	0,58	-0,8281773	BAIXO
Minas Gerais	Presidente Olegário	315340	0,33	0,58	-0,8281773	BAIXO
Ceará	Barro	230200	0,33	0,57	-0,8284824	BAIXO
Pernambuco	Lagoa de Itaenga	260850	0,33	0,57	-0,8285434	BAIXO
Goiás	Aparecida de Goiânia	520140	0,67	0,04	-0,8285868	BAIXO
Maranhão	Barão de Grajaú	210150	0,33	0,57	-0,8286045	BAIXO
Paraná	Ampére	410100	0,33	0,57	-0,8288485	BAIXO
Bahia	Feira de Santana	291080	0,67	0,04	-0,8289528	BAIXO
Paraná	Contenda	410620	0,33	0,56	-0,8292146	BAIXO
São Paulo	Sorocaba	355220	0,67	0,03	-0,8292579	BAIXO
Rio de Janeiro	Cantagalo	330110	0,33	0,56	-0,8294586	BAIXO
Ceará	Orós	230950	0,33	0,56	-0,8294586	BAIXO
Bahia	Belmonte	290340	0,33	0,55	-0,8296416	BAIXO
Minas Gerais	Ervália	312400	0,33	0,55	-0,8298246	BAIXO
São Paulo	Castilho	351100	0,33	0,54	-0,8300687	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Pernambuco	São Joaquim do Monte	261330	0,33	0,54	-0,8301297	BAIXO
Paraná	Curitiba	410690	0,67	0,01	-0,8302341	BAIXO
Pernambuco	Chã Grande	260450	0,33	0,54	-0,8302518	BAIXO
Pernambuco	Riacho das Almas	261170	0,33	0,54	-0,8304347	BAIXO
Alagoas	Olho d'Água das Flores	270570	0,33	0,54	-0,8304958	BAIXO
Bahia	Oliveira dos Brejinhos	292320	0,33	0,54	-0,8304958	BAIXO
Bahia	Piatã	292430	0,33	0,53	-0,8307398	BAIXO
Minas Gerais	Itapecerica	313350	0,33	0,53	-0,8309839	BAIXO
Paraíba	Princesa Isabel	251230	0,33	0,53	-0,8310449	BAIXO
Minas Gerais	Conselheiro Pena	311840	0,33	0,53	-0,8310449	BAIXO
Bahia	Caravelas	290690	0,33	0,52	-0,8312279	BAIXO
São Paulo	Tambaú	355330	0,33	0,52	-0,831472	BAIXO
São Paulo	Araçariguama	350275	0,33	0,52	-0,831594	BAIXO
Paraíba	Mari	250910	0,33	0,52	-0,831594	BAIXO
Bahia	Riachão das Neves	292620	0,33	0,51	-0,831777	BAIXO
Minas Gerais	Paraguaçu	314720	0,33	0,51	-0,831899	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Nova Alvorada do Sul	500600	0,33	0,51	-0,8320211	BAIXO
Maranhão	Pio XII	210870	0,33	0,51	-0,8320821	BAIXO
Goiás	Acreúna	520013	0,33	0,51	-0,8322041	BAIXO
Paraná	Colorado	410590	0,33	0,49	-0,8333023	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Bataguassu	500190	0,33	0,48	-0,8334853	BAIXO
Paraná	Cambará	410360	0,33	0,48	-0,8336684	BAIXO
Rio Grande do Sul	Nova Petrópolis	431320	0,33	0,48	-0,8337904	BAIXO
Ceará	Barreira	230195	0,33	0,48	-0,8338514	BAIXO
São Paulo	Santa Gertrudes	354670	0,33	0,47	-0,8340954	BAIXO
Paraná	Santo Antônio do Sudoeste	412440	0,33	0,47	-0,8342175	BAIXO
Paraná	Cruzeiro do Oeste	410660	0,33	0,47	-0,8343395	BAIXO
Alagoas	Matriz de Camaragibe	270510	0,33	0,47	-0,8344005	BAIXO
Espírito Santo	Pinheiros	320410	0,33	0,46	-0,8344615	BAIXO
Alagoas	Viçosa	270940	0,33	0,46	-0,8345225	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Mato Grosso do Sul	Ribas do Rio Pardo	500710	0,33	0,46	-0,8345225	BAIXO
Minas Gerais	Paraopeba	314740	0,33	0,46	-0,8346446	BAIXO
São Paulo	Valparaíso	355630	0,33	0,46	-0,8347666	BAIXO
Paraná	Santa Terezinha de Itaipu	412405	0,33	0,46	-0,8348276	BAIXO
Bahia	Conde	290860	0,33	0,45	-0,8350106	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Jardim	500500	0,33	0,45	-0,8350716	BAIXO
Pernambuco	Ilha de Itamaracá	260760	0,33	0,45	-0,8351327	BAIXO
Paraná	Ortigueira	411730	0,33	0,45	-0,8351936	BAIXO
Bahia	Castro Alves	290730	0,33	0,45	-0,8352547	BAIXO
Paraná	Ubiratã	412800	0,33	0,45	-0,8353156	BAIXO
Pará	Ponta de Pedras	150570	0,33	0,44	-0,8355597	BAIXO
Alagoas	Satuba	270890	0,33	0,44	-0,8355597	BAIXO
Alagoas	Limoeiro de Anadia	270420	0,33	0,44	-0,8357428	BAIXO
Amazonas	Jutaí	130230	0,33	0,44	-0,8357428	BAIXO
Bahia	Cândido Sales	290670	0,33	0,44	-0,8358037	BAIXO
Bahia	Anagé	290120	0,33	0,44	-0,8359868	BAIXO
Minas Gerais	Jacutinga	313490	0,33	0,44	-0,8360478	BAIXO
Minas Gerais	Campos Gerais	311160	0,33	0,43	-0,8365969	BAIXO
Bahia	Ibotirama	291320	0,33	0,42	-0,83678	BAIXO
Rio Grande do Sul	Três Passos	432190	0,33	0,42	-0,83678	BAIXO
Pernambuco	Água Preta	260040	0,33	0,42	-0,836902	BAIXO
Maranhão	São Bernardo	211060	0,33	0,41	-0,837329	BAIXO
Goiás	Alexânia	520030	0,33	0,41	-0,8373901	BAIXO
São Paulo	Juquitiba	352620	0,33	0,41	-0,8376951	BAIXO
Rio de Janeiro	Iguaba Grande	330187	0,33	0,40	-0,8381222	BAIXO
Rio de Janeiro	Bom Jardim	330050	0,33	0,40	-0,8382442	BAIXO
Bahia	Ruy Barbosa	292720	0,33	0,39	-0,8383662	BAIXO
Minas Gerais	Prata	315280	0,33	0,39	-0,8384272	BAIXO
São Paulo	Morro Agudo	353190	0,33	0,39	-0,8386103	BAIXO
Paraná	Goioerê	410860	0,33	0,38	-0,8389153	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
São Paulo	Iguape	352030	0,33	0,38	-0,8390374	BAIXO
Espírito Santo	Alegre	320020	0,33	0,38	-0,8390374	BAIXO
Bahia	Maracás	292050	0,33	0,38	-0,8390374	BAIXO
Piauí	Cocal	220270	0,33	0,38	-0,8390984	BAIXO
Pernambuco	Itapissuma	260775	0,33	0,38	-0,8392814	BAIXO
Ceará	Cruz	230425	0,33	0,37	-0,8394644	BAIXO
Santa Catarina	Sombrio	421770	0,33	0,37	-0,8396475	BAIXO
Pernambuco	Trindade	261560	0,33	0,37	-0,8398305	BAIXO
Pernambuco	Glória do Goitá	260610	0,33	0,37	-0,8398915	BAIXO
Santa Catarina	Itapoá	420845	0,33	0,36	-0,8401356	BAIXO
Ceará	Lavras da Mangabeira	230750	0,33	0,36	-0,8401356	BAIXO
Maranhão	Vitória do Mearim	211290	0,33	0,36	-0,8401356	BAIXO
Alagoas	São Luís do Quitunde	270850	0,33	0,36	-0,8401965	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Chapadão do Sul	500295	0,33	0,36	-0,8402576	BAIXO
São Paulo	Guararapes	351820	0,33	0,36	-0,8403186	BAIXO
Paraná	Bandeirantes	410240	0,33	0,36	-0,8404406	BAIXO
Minas Gerais	Carangola	311330	0,33	0,36	-0,8404406	BAIXO
Bahia	Itapicuru	291650	0,33	0,35	-0,8406847	BAIXO
Goiás	Nerópolis	521450	0,33	0,35	-0,8408677	BAIXO
Rio Grande do Norte	Nísia Floresta	240820	0,33	0,35	-0,8408677	BAIXO
São Paulo	São Miguel Arcanjo	355020	0,33	0,35	-0,8409287	BAIXO
Ceará	Nova Russas	230930	0,33	0,35	-0,8409287	BAIXO
Minas Gerais	Guanhães	312800	0,33	0,34	-0,8410507	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Caarapó	500240	0,33	0,34	-0,8411117	BAIXO
Maranhão	Pindaré-Mirim	210850	0,33	0,34	-0,8412338	BAIXO
Alagoas	São Sebastião	270880	0,33	0,34	-0,8412948	BAIXO
Paraná	Guaíra	410880	0,33	0,34	-0,8414778	BAIXO
Bahia	Capim Grosso	290687	0,33	0,33	-0,8415998	BAIXO
São Paulo	Pitangueiras	353950	0,33	0,33	-0,8418439	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Bahia	Itiúba	291700	0,33	0,33	-0,8419659	BAIXO
Pará	Mãe do Rio	150405	0,33	0,32	-0,8422099	BAIXO
Pernambuco	São José do Belmonte	261350	0,33	0,32	-0,842454	BAIXO
Pernambuco	Itambé	260765	0,33	0,32	-0,842515	BAIXO
São Paulo	Ilhabela	352040	0,33	0,32	-0,842515	BAIXO
Rio de Janeiro	Bom Jesus do Itabapoana	330060	0,33	0,32	-0,842637	BAIXO
Rio Grande do Norte	Apodi	240100	0,33	0,31	-0,8429421	BAIXO
Pará	Igarapé-Açu	150320	0,33	0,31	-0,8429421	BAIXO
Minas Gerais	Sarzedo	316553	0,33	0,30	-0,8434302	BAIXO
Rio Grande do Norte	Santa Cruz	241120	0,33	0,30	-0,8436132	BAIXO
Pernambuco	Bom Jardim	260220	0,33	0,30	-0,8436742	BAIXO
Bahia	Cansanção	290680	0,33	0,30	-0,8436742	BAIXO
Bahia	Jeremoabo	291810	0,33	0,30	-0,8437352	BAIXO
São Paulo	Iperó	352100	0,33	0,29	-0,8439183	BAIXO
Bahia	Sento Sé	293020	0,33	0,29	-0,8439793	BAIXO
Pernambuco	Bonito	260230	0,33	0,28	-0,8444064	BAIXO
Rio Grande do Sul	Eldorado do Sul	430676	0,33	0,28	-0,8445284	BAIXO
Minas Gerais	Boa Esperança	310710	0,33	0,28	-0,8446504	BAIXO
Pernambuco	Barreiros	260140	0,33	0,28	-0,8447724	BAIXO
Minas Gerais	Brumadinho	310900	0,33	0,27	-0,8450165	BAIXO
Bahia	São Francisco do Conde	292920	0,33	0,27	-0,8450775	BAIXO
Rio Grande do Norte	Currais Novos	240310	0,33	0,27	-0,8451995	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Amambai	500060	0,33	0,27	-0,8452605	BAIXO
Rio Grande do Sul	Gramado	430910	0,33	0,27	-0,8453215	BAIXO
São Paulo	Paraguaçu Paulista	353550	0,33	0,26	-0,8454435	BAIXO
Pernambuco	Santa Maria da Boa Vista	261260	0,33	0,26	-0,8456876	BAIXO
Bahia	Livramento de Nossa Senhora	291950	0,33	0,25	-0,8460537	BAIXO
Paraná	Marialva	411480	0,33	0,25	-0,8461147	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Paraíba	Mamanguape	250890	0,33	0,25	-0,8462977	BAIXO
Goiás	Itaberaí	521040	0,33	0,25	-0,8462977	BAIXO
Pará	Salinópolis	150620	0,33	0,25	-0,8463587	BAIXO
Bahia	Vera Cruz	293320	0,33	0,25	-0,8464198	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Maracaju	500540	0,33	0,25	-0,8464198	BAIXO
Maranhão	Presidente Dutra	210910	0,33	0,25	-0,8464807	BAIXO
Rio de Janeiro	Paraty	330380	0,33	0,25	-0,8464807	BAIXO
São Paulo	Rio Grande da Serra	354410	0,33	0,25	-0,8464807	BAIXO
São Paulo	Dracena	351440	0,33	0,24	-0,8465418	BAIXO
Ceará	Itarema	230655	0,33	0,24	-0,8465418	BAIXO
Piauí	Campo Maior	220220	0,33	0,24	-0,8466638	BAIXO
Paraná	Cornélio Procopio	410640	0,33	0,24	-0,8466638	BAIXO
Paraná	Paçandu	411750	0,33	0,24	-0,8466638	BAIXO
Rio de Janeiro	Casimiro de Abreu	330130	0,33	0,24	-0,8467248	BAIXO
Paraná	Campina Grande do Sul	410400	0,33	0,23	-0,8472129	BAIXO
Pernambuco	Brejo da Madre de Deus	260260	0,33	0,23	-0,8473959	BAIXO
Bahia	Tucano	293190	0,33	0,23	-0,8474569	BAIXO
Goiás	Quirinópolis	521850	0,33	0,22	-0,847762	BAIXO
São Paulo	Capivari	351040	0,33	0,22	-0,847762	BAIXO
São Paulo	Vargem Grande Paulista	355645	0,33	0,22	-0,847884	BAIXO
Bahia	Barra	290270	0,33	0,22	-0,848006	BAIXO
Minas Gerais	Lagoa da Prata	313720	0,33	0,22	-0,848067	BAIXO
Paraná	Ibiporã	410980	0,33	0,22	-0,848128	BAIXO
Santa Catarina	Tijucas	421800	0,33	0,22	-0,848128	BAIXO
Minas Gerais	Bom Despacho	310740	0,33	0,21	-0,8481891	BAIXO
São Paulo	São José do Rio Pardo	354970	0,33	0,21	-0,8482501	BAIXO
Minas Gerais	Campo Belo	311120	0,33	0,21	-0,8483111	BAIXO
Maranhão	Tutóia	211250	0,33	0,21	-0,8485551	BAIXO
Ceará	São Gonçalo do Amarante	231240	0,33	0,21	-0,8486772	BAIXO
São Paulo	Piedade	353780	0,33	0,20	-0,8487381	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Rio de Janeiro	Guapimirim	330185	0,33	0,20	-0,8487381	BAIXO
Rio Grande do Sul	Taquara	432120	0,33	0,20	-0,8487381	BAIXO
Paraná	Medianeira	411580	0,33	0,20	-0,8487381	BAIXO
Bahia	Caetité	290520	0,33	0,20	-0,8487992	BAIXO
São Paulo	Olímpia	353390	0,33	0,20	-0,8488602	BAIXO
Rio Grande do Sul	São Borja	431800	0,33	0,19	-0,8497143	BAIXO
São Paulo	Cosmópolis	351280	0,33	0,18	-0,8500194	BAIXO
Ceará	Tauá	231330	0,33	0,18	-0,8500194	BAIXO
São Paulo	Mongaguá	353110	0,33	0,18	-0,8501414	BAIXO
São Paulo	Mirassol	353030	0,33	0,18	-0,8503245	BAIXO
São Paulo	Monte Mor	353180	0,33	0,17	-0,8505075	BAIXO
Bahia	Itaberaba	291470	0,33	0,17	-0,8505685	BAIXO
Ceará	Acaraú	230020	0,33	0,17	-0,8506295	BAIXO
Bahia	Itapetinga	291640	0,33	0,17	-0,8506905	BAIXO
São Paulo	Embu-Guaçu	351510	0,33	0,17	-0,8508735	BAIXO
Minas Gerais	Cataguases	311530	0,33	0,16	-0,8509956	BAIXO
Minas Gerais	Formiga	312610	0,33	0,16	-0,8509956	BAIXO
Pará	Capanema	150220	0,33	0,16	-0,8513007	BAIXO
Minas Gerais	Janaúba	313510	0,33	0,16	-0,8513616	BAIXO
Bahia	Dias d'Ávila	291005	0,33	0,16	-0,8514227	BAIXO
Goiás	Goianira	520880	0,33	0,15	-0,8514836	BAIXO
Goiás	Santo Antônio do Descoberto	521975	0,33	0,15	-0,8514836	BAIXO
São Paulo	Jaboticabal	352430	0,33	0,15	-0,8514836	BAIXO
Santa Catarina	Gaspar	420590	0,33	0,15	-0,8515447	BAIXO
Bahia	Brumado	290460	0,33	0,15	-0,8517277	BAIXO
Ceará	Aracati	230110	0,33	0,15	-0,8518497	BAIXO
Paraná	Telêmaco Borba	412710	0,33	0,15	-0,8518497	BAIXO
Paraná	Rolândia	412240	0,33	0,15	-0,8518497	BAIXO
São Paulo	Pirassununga	353930	0,33	0,15	-0,8519108	BAIXO
Rio Grande do Sul	Esteio	430770	0,33	0,15	-0,8519717	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Santa Catarina	Biguaçu	420230	0,33	0,14	-0,8520328	BAIXO
Rio de Janeiro	Três Rios	330600	0,33	0,14	-0,8521548	BAIXO
São Paulo	São Roque	355060	0,33	0,14	-0,8522768	BAIXO
Ceará	Eusébio	230428	0,33	0,14	-0,8523378	BAIXO
São Paulo	Matão	352930	0,33	0,14	-0,8524598	BAIXO
Rio Grande do Norte	Macaíba	240710	0,33	0,14	-0,8525209	BAIXO
Paraíba	Bayeux	250180	0,33	0,13	-0,8527649	BAIXO
Bahia	Serrinha	293050	0,33	0,13	-0,8527649	BAIXO
Minas Gerais	Esmeraldas	312410	0,33	0,13	-0,8528259	BAIXO
Pernambuco	Gravatá	260640	0,33	0,13	-0,8528869	BAIXO
Paraná	Paranavaí	411840	0,33	0,12	-0,853314	BAIXO
Minas Gerais	Patrocínio	314810	0,33	0,12	-0,8534361	BAIXO
Sergipe	São Cristóvão	280670	0,33	0,12	-0,8535581	BAIXO
São Paulo	Caçapava	350850	0,33	0,12	-0,853619	BAIXO
Paraná	Francisco Beltrão	410840	0,33	0,11	-0,8536801	BAIXO
Minas Gerais	Itaúna	313380	0,33	0,11	-0,8537411	BAIXO
Sergipe	Itabaiana	280290	0,33	0,11	-0,8540462	BAIXO
Goiás	Novo Gama	521523	0,33	0,11	-0,8541071	BAIXO
São Paulo	Ourinhos	353470	0,33	0,10	-0,8542292	BAIXO
Paraná	Cambé	410370	0,33	0,10	-0,8542902	BAIXO
Goiás	Itumbiara	521150	0,33	0,10	-0,8542902	BAIXO
Pernambuco	São Lourenço da Mata	261370	0,33	0,10	-0,8544732	BAIXO
Rio de Janeiro	São Pedro da Aldeia	330520	0,33	0,10	-0,8544732	BAIXO
São Paulo	Itanhaém	352210	0,33	0,10	-0,8545342	BAIXO
São Paulo	Ribeirão Pires	354330	0,33	0,09	-0,8548393	BAIXO
Espírito Santo	São Mateus	320490	0,33	0,09	-0,8550223	BAIXO
Espírito Santo	Guarapari	320240	0,33	0,09	-0,8550833	BAIXO
Mato Grosso do Sul	Três Lagoas	500830	0,33	0,08	-0,8553274	BAIXO
Minas Gerais	Varginha	317070	0,33	0,08	-0,8555104	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
Santa Catarina	Balneário Camboriú	420200	0,33	0,08	-0,8555714	BAIXO
São Paulo	Franco da Rocha	351640	0,33	0,08	-0,8557544	BAIXO
Paraná	Paranaguá	411820	0,33	0,07	-0,8558765	BAIXO
Paraná	Fazenda Rio Grande	410765	0,33	0,07	-0,8558765	BAIXO
São Paulo	Mogi Guaçu	353070	0,33	0,07	-0,8559985	BAIXO
São Paulo	Santana de Parnaíba	354730	0,33	0,07	-0,8559985	BAIXO
São Paulo	Itapecerica da Serra	352220	0,33	0,07	-0,8562425	BAIXO
São Paulo	Francisco Morato	351630	0,33	0,07	-0,8562425	BAIXO
Santa Catarina	Lages	420930	0,33	0,07	-0,8562425	BAIXO
Espírito Santo	Linhares	320320	0,33	0,07	-0,8563036	BAIXO
Rio de Janeiro	Barra Mansa	330040	0,33	0,07	-0,8563645	BAIXO
São Paulo	Ferraz de Vasconcelos	351570	0,33	0,06	-0,8565476	BAIXO
Minas Gerais	Ibirité	312980	0,33	0,06	-0,8565476	BAIXO
Goiás	Valparaíso de Goiás	522185	0,33	0,06	-0,8569137	BAIXO
Goiás	Luziânia	521250	0,33	0,05	-0,8570357	BAIXO
Goiás	Águas Lindas de Goiás	520025	0,33	0,05	-0,8572797	BAIXO
Rio de Janeiro	Magé	330250	0,33	0,05	-0,8572797	BAIXO
Minas Gerais	Santa Luzia	315780	0,33	0,05	-0,8572797	BAIXO
Minas Gerais	Divinópolis	312230	0,33	0,05	-0,8573408	BAIXO
São Paulo	Hortolândia	351907	0,33	0,05	-0,8574018	BAIXO
São Paulo	Jacareí	352440	0,33	0,04	-0,8575238	BAIXO
São Paulo	Indaiatuba	352050	0,33	0,04	-0,8575848	BAIXO
Santa Catarina	São José	421660	0,33	0,04	-0,8577068	BAIXO
Rio Grande do Sul	Santa Maria	431690	0,33	0,04	-0,8578289	BAIXO
São Paulo	Guarujá	351870	0,33	0,04	-0,8578898	BAIXO
São Paulo	Limeira	352690	0,33	0,04	-0,8578898	BAIXO
São Paulo	Suzano	355250	0,33	0,04	-0,8579509	BAIXO
São Paulo	Taubaté	355410	0,33	0,04	-0,8580119	BAIXO
São Paulo	Praia Grande	354100	0,33	0,03	-0,8581949	BAIXO
Espírito Santo	Vitória	320530	0,33	0,03	-0,8581949	BAIXO

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2022 a 2024

Estrato	Índice composto	Casos	Incidência
Muito intenso	13,21 ----- 22,62	95,67 ----- 162	215,12 ----- 348,75
Intenso	5,87 ----- 13,21	50,33 ----- 95,67	84,53 ----- 215,12
Alto	2,21 ----- 5,87	25 ----- 50,33	35,86 ----- 84,53
Médio	0,09 ----- 2,21	7,33 ----- 25	11,18 ----- 35,86
Baixo	-0,86 ----- 0,09	0,33 ----- 7,33	0,01 ----- 11,18

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO	MÉDIA DE CASOS	MÉDIA DE INCIDÊNCIA	ÍNDICE COMPOSTO	ESTRATO
São Paulo	Carapicuíba	351060	0,33	0,03	-0,8583779	BAIXO
São Paulo	Santos	354850	0,33	0,03	-0,8584999	BAIXO
São Paulo	Jundiaí	352590	0,33	0,03	-0,858561	BAIXO
Paraíba	Campina Grande	250400	0,33	0,03	-0,858561	BAIXO
Pará	Ananindeua	150080	0,33	0,02	-0,858683	BAIXO
Espírito Santo	Vila Velha	320520	0,33	0,02	-0,858683	BAIXO
Pernambuco	Jaboatão dos Guararapes	260790	0,33	0,02	-0,858988	BAIXO
Santa Catarina	Joinville	420910	0,33	0,02	-0,858988	BAIXO
Minas Gerais	Uberlândia	317020	0,33	0,02	-0,8591101	BAIXO
Rio Grande do Norte	Natal	240810	0,33	0,01	-0,8591711	BAIXO