



Ministério da Saúde  
Secretaria de Atenção Primária à Saúde  
Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária  
Coordenação-Geral de Saúde da Família e Comunidade  
Coordenação de Apoio à Imunização e Monitoramento das Coberturas Vacinais na Atenção Primária

**NOTA INFORMATIVA Nº 1/2025-CIMVAC/CGESCO/DESCO/SAPS/MS**

**1. ASSUNTO**

1.1. Esta nota informativa tem por objetivo fornecer orientações sobre a correta inserção de dados de doses aplicadas das vacinas contra covid-19 no sistema de informação e-SUS APS.

**2. ANÁLISE**

2.1. O informe “Estratégia de vacinação contra a covid-19 – 2ª edição, 2024” (0045630138) aborda atualizações e recomendações sobre as vacinas covid-19 em uso no Brasil;

2.2. De acordo com a 2ª edição do informe, as vacinas em uso no Brasil são:

2.3. Vacina covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) – indicada para menores de 5 anos, idosos (60 anos ou mais), gestantes e grupo especial a partir de 5 anos;

2.4. Vacina covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) – indicada para menores de 5 anos, idosos, gestantes e grupo especial a partir de 5 anos; e,

2.5. Vacina covid-19-recombinante, Serum/Zalika – indicada para idosos e grupo especial a partir de 12 anos.

2.6. As doses aplicadas em crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e idosos devem ser registradas na estratégia “rotina”. A vacinação dos grupos prioritários deverá ser registrada como estratégia “especial”.

2.7. Os grupos prioritários a serem vacinados na estratégia “especial” são: pessoas vivendo em instituições de longa permanência; pessoas imunocomprometidas; indígenas vivendo em terra indígena; indígenas vivendo fora da terra indígena; ribeirinhos; quilombolas; puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidade; pessoas privadas de liberdade; funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas; e pessoas em situação de rua.

2.8. O registro de dados de aplicação da vacina realizada nas Unidades de Atenção Primária à Saúde deve ser realizado no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), na Coleta de Dados Simplificada (CDS), ou nos sistemas próprios ou de terceiros integrados à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), seguindo o modelo computacional de Registro de Imunobiológico Aplicado (RIA) vigente.

**3. REGISTRO NO E-SUS APS DAS DOSES DE VACINA CONTRA COVID-19**

**3.1. Registro via PEC da estratégia e-SUS APS:**

Após inserir o cidadão na lista de atendimentos para vacinação e direcionar para a página de atendimento de vacinação, localize o imunobiológico e a dose apropriados de acordo com as recomendações aplicáveis ao cidadão. O imunobiológico e a dose poderão ser localizados por meio de duas abas:

a) Aba de Calendário vacinal

No calendário vacinal, expanda a seção “Doses/imunobiológicos/vacinas para COVID-19 | COV19” clicando sobre ela (Figura 1). Em seguida, observe os cards que exibem as vacinas e doses disponíveis (Figura 2).

**Figura 1: Exibição das vacinas de Covid-19 (fechada)**

## Vacinação

Para imprimir todos os registros salvos em atendimentos anteriores, clique em "Imprimir caderneta de vacinação".  
Para imprimir os registros realizados neste atendimento, selecione a opção "Imprimir atendimento ao finalizar".

**Calendário vacinal da criança** **Outras doses e imunobiológicos**

Mostrar calendário nacional completo

▼ Doses/imunobiológicos/vacinas para COVID - 19 | COV19



BCG **ÚNICA**  
Ao nascer

Hepatite B **DOSE**  
Ao nascer

Pentavalente **1ª DOSE**  
2 meses **2ª DOSE**  
4 meses **3ª DOSE**  
6 meses

**Figura 2: Exibição das vacinas de Covid-19 (aberta)**

**Calendário vacinal da criança** **Outras doses e imunobiológicos**

Mostrar calendário nacional completo

▲ Doses/imunobiológicos/vacinas para COVID - 19 | COV19

Pfizer - Comirnaty Bivalente **1ª DOSE** **2ª DOSE** **3ª DOSE** **REFORÇO**

Pfizer - Comirnaty Pediátrica **1ª DOSE** **2ª DOSE** **3ª DOSE** **DOSE**

Pfizer - Comirnaty Pediátrica menor de 5 anos **1ª DOSE**  
6 meses **2ª DOSE**  
7 meses **3ª DOSE**  
9 meses **DOSE**

Sinovac - Coronavac **1ª DOSE** **2ª DOSE** **3ª DOSE** **1º REFORÇO** **2º REFORÇO**

Sinovac/Butantan - Coronavac **1ª DOSE** **2ª DOSE** **3ª DOSE** **1º REFORÇO** **2º REFORÇO**

Moderna - Spikevax **1ª DOSE** **2ª DOSE** **3ª DOSE** **DOSE**

Serum/Zalika **1ª DOSE** **2ª DOSE** **3ª DOSE** **DOSE**

Pfizer - Comirnaty **1ª DOSE** **2ª DOSE** **3ª DOSE** **DOSE**


Após a expansão da página que exibe os cards com os nomes e doses das vacinas contra a covid-19, selecione o card correspondente à vacina aplicada no cidadão, garantindo que a escolha seja compatível com a vacina e dose

administrada.

**Atenção:** Como os cards listam todos os tipos de imunobiológicos utilizados contra a covid-19, é fundamental verificar cuidadosamente a escolha para evitar erros no registro.

Na janela que se abrirá, clique em “Aplicar” para registrar a dose recomendada e aplicada no momento (Figura 3).

**Figura 3: Aba de preenchimento de vacinas de covid-19**



Após clicar em aplicar no imunobiológico selecionado, a janela ‘Aplicação de Imunobiológico’ será exibida (Figura 4) e o registro dos campos se dará da seguinte forma:

**Estratégia:** selecione “Rotina” ou “Especial”, de acordo com a estratégia adotada para o cidadão.

**Grupo de atendimento:** escolha o grupo ao qual o cidadão pertence, de acordo com a estratégia adotada.

**Aprazamento da próxima dose:** confira se a data apresentada está adequada, e corrija se necessário.

**Lote/Fabricante:** selecione um lote pré-existente ou cadastre o lote da vacina aplicada.

**Via de administração e Local de administração:** preencha de acordo com os utilizados no ato de vacinação.

**Observações:** escreva qualquer evento ou informação que julgue importante registrar sobre a vacina aplicada.


Por último, clique em “Salvar”.

**Figura 4: Modelo de preenchimento da aba de vacinas de covid-19, conforme lote e fabricante**

Uma vez confirmado o registro, no sistema será mostrado o campo preenchido com a dose aplicada e, se necessário, a data de aprazamento da próxima dose a ser aplicada (Figura 5). Uma vez confirmado o registro, no

sistema será mostrado o campo preenchido com a dose aplicada e, se necessário, a data de aprazamento da próxima dose a ser aplicada (Figura 5).

**Figura 5: Registro salvo de vacina de Covid-19 no calendário vacinal**



b) Aba de "outras doses e imunobiológicos"


Na página de atendimento de vacinação, clique na aba “outras doses e imunobiológicos” (Figura 6).

**Figura 6: Seleção da aba “outras doses e imunobiológicos” .**



Em seguida, clique em “aplicar” para selecionar o imunobiológico e dose (Figura 7).

**Figura 7: Seleção “Aplicar” dentro aba “outras doses e imunobiológicos”**



Após clicar em aplicar a janela ‘Aplicação de Imunobiológico’ será exibida (Figura 8) e o registro dos campos se dará da seguinte forma:

**Imunobiológico:** Selecione o imunobiológico aplicado no cidadão.

**Estratégia:** selecione “Rotina” ou “Especial”, de acordo com a estratégia adotada para o cidadão.

**Grupo de atendimento:** escolha o grupo ao qual o cidadão pertence, de acordo com a estratégia adotada.

**Aprazamento da próxima dose:** confira se a data apresentada está adequada, e corrija se necessário.

**Lote/Fabricante:** selecione um lote pré-existente ou cadastre o lote da vacina aplicada.

**Via de administração e Local de administração:** preencha de acordo com os utilizados no ato de vacinação.

**Observações:** escreva qualquer evento ou informação que julgue importante registrar sobre a vacinação aplicada.

Por último, clique em “Salvar”.

**Figura 8: Modelo de preenchimento do quadro “Aplicação de imunobiológico” da aba “outras doses e imunobiológicos”**

Aplicação de imunobiológico

Imunobiológico \*

COVID-19 SERUM/ZALIKA - Vacina COVID-19-recombinante

Estratégia \*

02 - ESPECIAL

Grupo de atendimento \*

IMUNOCOMPROMETIDOS

Dose \*

D2REV

Aprazamento da próxima dose

24/02/2025 D2REV será aprazada para 24 de fevereiro de 2025

Lote/Fabricante

Serum2233

Fabricante

SERUM-INDIA

Lotefabricante

Cadastrar novo lote

Lotefabricante

Lote \*

Serum2233

Fabricante

SERUM-INDIA

Data de validade \*

26/12/2025

Via de Administração \*

INTRAMUSCULAR

Local de aplicação \*

DELTOÍDE ESQUERDO

Observações

0/300 caracteres

Cancelar Salvar

Uma vez salvo o registro, no sistema será mostrado o imunobiológico e dose aplicada e, se necessário, é possível editar, excluir, aprazar ou transcrever (Figura 9).

**Figura 9: Registro salvo de vacina de covid-19 na aba “outras doses e imunobiológicos”**

## COVID-19 SERUM/ZALIKA 1<sup>a</sup> DOSE

Vacina COVID-19-recombinante,Serum/Zalika

Dose aplicada em 24/12/2024

PEC



Transcrição de caderneta

Aprazar

Para finalizar o registro no sistema, seja pela aba “calendário vacinal” ou pela aba “outras doses e imunobiológicos”, role a página até o final e clique em “Finalizar atendimento vacinação” (Figura 10).

**Figura 10: Encerramento do registro após aplicação de vacinas de covid-19**

Finalização do atendimento

Desfecho do atendimento \*

Liberar cidadão

Manter cidadão na lista de atendimentos

Agendar consulta

Rascunho salvo automaticamente às 15:37

Imprimir atendimento ao finalizar

### 3.2 Registro via CDS da Estratégia e-SUS APS:

Primeiramente, adicione uma ficha de vacinação (Figura 11).

**Figura 11: Adição de ficha de vacinação.**

**Ficha de vacinação**

CNS do profissional

Mostrar registros enviados / recebidos  
 Mostrar registros em rascunho

CNES: 0000002

Data da aplicação  CNS do profissional  CBO  CNES  INE

Nenhum item encontrado com o critério selecionado.

←

Após a adição, selecione “data de aplicação” (Figura 12).

**Figura 12: Seleção da data de aplicação.**

**Ficha de vacinação**

Compatível com a FV / e-SUS APS v.3.2.0

CNS do profissional \*  CBO \*  CNES \*  INE \*  Data \*

Vacinações individualizadas \*

CPF / CNS do cidadão	Data de nascimento	Sexo	Turno
Nenhum item encontrado.			

←

Informe os dados individuais e do atendimento que são de preenchimento obrigatório: turno, CPF/CNS do cidadão, data de nascimento, sexo e local de atendimento, conforme campos exibidos na figura 13:

**Figura 13: Dados individuais e de atendimento.**

- Vacinações individualizadas

Turno \*

 Manhã  Tarde  Noite

Nº do prontuário

CPF / CNS do cidadão \*

Data de nascimento \*

Sexo \*

Local de atendimento \*

Viajante

Situação

 Gestante  Puérpera

Em seguida, preencha os campos referentes à vacinação, conforme abaixo:

**Imunobiológico:** Selecione o imunobiológico aplicado.

**Estratégia:** selecione “**Rotina**” ou “**Especial**”, de acordo com a estratégia adotada para o cidadão.

**Grupo de atendimento:** escolha o grupo ao qual o cidadão pertence, de acordo com a estratégia adotada.

**Dose:** Selecione a dose aplicada.

**Lote e fabricante:** selecione um lote pré-existente ou cadastre o lote da vacina aplicada.

Ao final, clique em confirmar caso todas as informações inseridas estejam corretas (Figura 14).

**Figura 14: Preenchimento de informações de lote e fabricante para registro de aplicação do imunobiológico.**


Vacinação \*

Imunobiológico *	Estratégia	Grupo de atendimento *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dose	Lote *	Fabricante *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Após confirmar, clique em “Finalizar registros” caso não haja mais fichas de vacinação a serem adicionadas (Figura 15).

**Figura 15: Finalização do preenchimento de informações de aplicação do imunobiológico**

## Ficha de vacinação



Esta ficha está em rascunho. Utilize o botão "Finalizar registros" para que a ficha registrada possa ser enviada.

Compatível com a FV / e-SUS APS v.3.2.0

CNS do profissional *	CBO *	CNES *	INE *	Data *
702 [REDACTED] 248	223505	0000002	202 [REDACTED]	26/12/2024

Vacinações individualizadas \*

CPF / CNS do cidadão	Data de nascimento	Sexo	Turno
[REDACTED]	15/11/2022	Feminino	Manhã

**Finalizar registros**

### 3.3 Registro via aplicativo e-SUS Vacinação:

Inicie nova vacinação clicando no sinal “+” (positivo) localizado no canto inferior direito da tela, e depois informe o local de atendimento entre as opções disponíveis (Figura 16).

**Figura 16: Campo de seleção do local de atendimento**



Iniciar nova vacinação

Todos os campos são obrigatórios.

Local de atendimento

- Domicilio
- Escola / creche
- Instituicao / abrigo

Nenhum imunobiológico cadastrado no momento. Adicione todos os imunobiológicos que serão utilizados na vacinação.

Em seguida, clique em “Imunobiológico e estratégia +” e preencha os campos obrigatórios da seguinte forma (Figuras 17, 18 e 19):

**Imunobiológico:** Selecione o imunobiológico aplicado.

**Fabricante e lote:** Preencha de acordo com as informações do frasco.

**Estratégia:** selecione “**Rotina**” ou “**Especial**”, de acordo com a estratégia adotada para o cidadão

**Figura 17: Campos de preenchimento sobre imunobiológico e estratégia - parte 1.**

## Imunobiológico e Estratégia X

Todos os campos são obrigatórios.

 Imunobiológico ▼

 Fabricante 0/60

 Lote 0/30

 Estratégia

Salvar e cadastrar outro

Salvar

**Figura 18: Campos de preenchimento sobre imunobiológico e estratégia - parte 2**

## Imunobiológico e Estratégia X

Todos os campos são obrigatórios.

 Imunobiológico ▼

 Vacina COVID-19 PFIZER -  
COMIRNATY PEDIÁTRICA MENOR  
DE 5 ANOS, RNAm

 COVID-19 SERUM/ZALIKA Vacina  
COVID-19-recombinante,Serum/  
Zalika

 COVID-19 SINOVAC -  
CORONAVAC Vacina COVID-19

0/30

 Estratégia

**Figura 19: Modelo de campo de preenchimento sobre imunobiológico e estratégia finalizado - parte 3**

## Imunobiológico e Estratégia ×

Todos os campos são obrigatórios.

Imunobiológico	COVID-19 SERUM/z	<span style="float: right;">×</span>
Fabricante	Instituto Serum	<span style="float: right;">×</span>
Lote	informação do frasco	<span style="float: right;">×</span>
Estratégia	Rotina	<span style="float: right;">×</span>

Após salvar os dados do imunobiológico e estratégia, é exibida a tela para preenchimento dos dados do cidadão (CPF/CNS, data de nascimento, sexo) (Figura 20).

**Figura 20: Campos de preenchimento dos dados do cidadão**

<span style="float: left;">← Registrar aplicação</span> <span style="float: right;">ⓘ</span>	
<b>Domicílio</b>	
<span style="float: left;">📅</span>	Data 23/12/2024 <span style="float: right;">?</span>
<span style="float: left;">📄</span>	CPF/CNS do cidadão 125.████████-04 <span style="float: right;">×</span>
<span style="float: left;">📅</span>	Data de nascimento 18/10/1960 <span style="float: right;">×</span>
<span style="float: left;">⚥</span>	Sexo
<input type="radio"/>	Feminino
<input checked="" type="radio"/>	Masculino
<input type="radio"/>	Indeterminado
Sem definição de sexo feminino ou masculino, devido a condições médicas, genéticas ou hormonais.	

Em seguida, para dose e grupo de atendimento, preencha da seguinte forma (Figura 21):

**Dose:** Selecione a dose aplicada.

**Grupo de atendimento:** escolha o grupo ao qual o cidadão pertence, de acordo com a estratégia adotada.

**Figura 21: Campos de preenchimento dos dados do cidadão, dose e grupo de atendimento**

Registrar aplicação

Domicílio

Viajante  
Opcional

Dose de imunobiológico  
Acesse os imunobiológicos que serão aplicados neste cidadão e escolha a dose.

COVID-19 SERUM/ZALIK  
12345  
D RE

Grupo de atendimento  
Faixa etária

#### 4. CONCLUSÃO

4.1 As orientações contidas nesta nota informativa visam apoiar o trabalho de registro de vacinação dos profissionais da atenção primária à saúde.

4.2 Mantenha o sistema atualizado em sua última versão para garantir que os recursos mais atuais estejam disponíveis.

4.3 Para maiores informações acerca do registro da Estratégia e-SUS APS e maior detalhamento dos fluxos descritos, orienta-se consultar o manual, disponível em: [https://saps-ms.github.io/Manual-eSUS\\_APS/](https://saps-ms.github.io/Manual-eSUS_APS/).

4.4 Para dúvidas e suporte da Estratégia e-SUS APS, entre em contato pelo link: <https://esusaps.freshdesk.com/support/login>

4.5 As normas e diretrizes sobre as indicações e recomendações da vacina contra covid-19 no Brasil estão na Estratégia de vacinação contra a Covid-19 - 2024 - 2ª edição (0045630138), disponíveis em <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-2024-2a-edicao/view>, e no Guia Rápido de Vacinação contra a Covid-19 (0045684656), disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/2024/guia-rapido-de-vacinacao-contra-a-covid-19.pdf/view>

#### 5. REFERÊNCIAS

5.1 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Manual e-SUS APS. 2024. Disponível em: <[https://saps-ms.github.io/Manual-eSUS\\_APS/docs/Apoio%20a%20Implanta%C3%A7%C3%A3o](https://saps-ms.github.io/Manual-eSUS_APS/docs/Apoio%20a%20Implanta%C3%A7%C3%A3o)>. Acesso em: 02 dez. 2024.

5.2 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Estratégia de vacinação contra a covid-19.2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/publicacoes/estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19-2024/view>



Documento assinado eletronicamente por **Flávia Kelli Alvarenga Pinto, Coordenador(a) de Apoio à Imunização e Monitoramento das Coberturas Vacinais na Atenção Primária**, em 23/01/2025, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Evellin Bezerra da Silva, Diretor(a) do Departamento Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária**, em 23/01/2025, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vinícius de Araújo Oliveira, Coordenador(a)-Geral de Inovação e Aceleração Digital da Atenção Primária substituto(a)**, em 29/01/2025, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.saude.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0045623447** e o código CRC **42FFFF70**.

Brasília, 21 de janeiro de 2025.

**Referência:** Processo nº 25000.008966/2025-82

SEI nº 0045623447

Coordenação de Apoio à Imunização e Monitoramento das Coberturas Vacinais na Atenção Primária - CIMVAC  
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900  
Site - saude.gov.br

# ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

2<sup>a</sup> edição



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente  
Departamento do Programa Nacional de Imunizações

# ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO **CONTRA** **A COVID-19**

*2<sup>a</sup> edição*

Brasília DF 2024





Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons – Atribuição  
– Não Comercial – Compartilhamento pela mesma licença 4.0 Internacional.  
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.

A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser acessada, na íntegra, na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde: bvsms.saude.gov.br.

Tiragem: 2ª edição – 2024 – versão eletrônica preliminar

*Elaboração, distribuição e informações:*

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente

Departamento do Programa Nacional de Imunizações

Coordenação-Geral de Incorporação Científica  
e Imunização

SRTVN, Quadra 701, Via W5 Norte, lote D, Edifício PO 700, 6.º andar

CEP: 70719-040 – Brasília/DF

E-mail: pni@saude.gov.br

Site: www.saude.gov.br

*Ministra da Saúde:*

Nísia Verônica Trindade Lima

*Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente:*

Ethel Leonor Noia Maciel

*Edição-geral:*

Eder Gatti Fernandes – DPNI/SVSA

Ana Catarina Melo Araújo – Cgici/DPNI/SVSA

*Organização:*

Ana Catarina de Melo Araújo – Cgici/DPNI/SVSA

Ana Karolina Barreto Berselli Marinho – CGICI/DPNI/SVSA

Brielly Rios de Sousa Mendes – CGGI/DPNI/SVSA

Bruna Battaglia de Medeiros – DPNI/SVSA

Cibelle Mendes Cabral – CGFAM/DPNI/SVSA

Daniela Sant'Ana de Aquino – Cgici/DPNI/SVSA

Débora Reis de Araújo – Cgici/DPNI/SVSA

Elder Marcos de Moraes – NGI/DPNI/SVSA

Flávia Luiza Nogueira Pires – SVSA

Jadher Percio – CGFAM/DPNI/SVSA

Josineia Leite de Oliveira – CGGI/DPNI/SVSA

Karina Brito da Costa – CGGI/DPNI/SVSA

Karla Calvette Costa – CGGI/DPNI/SVSA

Krishna Mara Rodrigues Freire – Cgici/DPNI/SVSA

Paulo Henrique Santos Andrade – CGFAM/DPNI/SVSA

Roberta Mendes Abreu Silva – CGFAM/DPNI/SVSA

Soniery Almeida Maciel – Cgici/DPNI/SVSA

Thaynara Kerinlline de Alencar Faustino – CGGI/DPNI/SVSA

Thayssa Neiva da Fonseca Victer – CGGI/DPNI/SVSA

Tiago Mendonça de Oliveira – NGI/DPNI/SVSA

*Editoria técnico-científica:*

Antonio Ygor Modesto de Oliveira – CGEVSA/Daevs/SVSA

*Revisão:*

Yana Palankof – CGEVSA/Daevs/SVSA

## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	8
2. VACINAS COVID-19 EM USO NO BRASIL.....	9
2.1 Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) .....	9
2.2 Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) .....	9
2.3 Vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika .....	9
3. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 COMO ROTINA NO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO .....	10
3.1 Vacinação contra a covid-19 para crianças menores de 5 anos – rotina.....	10
3.1.1 Público elegível .....	10
3.1.2 Meta de vacinação.....	10
3.1.3 Esquema vacinal recomendado .....	10
3.1.3.1 Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) .....	10
3.1.3.2 Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) .....	11
3.2 Vacinação contra a covid-19 para idosos – rotina .....	12
3.2.1 Público elegível .....	12
3.2.2 Meta de vacinação.....	12
3.2.3 Vacinas e especificações técnicas.....	12
3.2.4 Esquema vacinal recomendado .....	12
3.3 Vacinação contra a covid-19 para gestantes – rotina .....	13
3.3.1 Público elegível .....	13
3.3.2 Meta de vacinação.....	13
3.3.3 Vacinas e especificações técnicas.....	13
3.3.4 Esquema vacinal recomendado .....	13
4. VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA OS GRUPOS ESPECIAIS .....	13
4.1 Público elegível .....	13
4.2 Meta de vacinação.....	14
4.3 Esquema vacinal recomendado para pessoas que fazem parte do grupo especial .....	14
5. ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE – MICROPLANEJAMENTO NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 .....	16
6. REDE DE FRIO .....	17
6.1 Especificações técnicas.....	17
6.2 Desvio de qualidade .....	18
7. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS .....	19
8. FLUXO DE DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNOBIOLÓGICOS .....	19
9. ORIENTAÇÕES GERAIS .....	19

9.1	Farmacovigilância .....	19
9.1.1	Precauções e contraindicações .....	21
9.2	Administração simultânea com outras vacinas, medicamentos ou imunobiológicos .....	23
9.3	Revacinação de pacientes após transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH)....	23
9.4	Monitoramento da segurança .....	24
10.	REGISTRO E INFORMAÇÕES DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19	26
10.1	Registro das doses aplicadas .....	26
10.2	Materiais complementares para orientação sobre o registro vacinal .....	26
10.3	Registro da movimentação dos imunobiológicos nos estabelecimentos de saúde.....	27
10.4	Disseminação dos registros de doses aplicadas e painel Vacinação do Calendário Nacional	27
	REFERÊNCIAS .....	29
	APÊNDICE 1 .....	32
	Descrição dos grupos para a vacinação especial contra a covid-19.....	32
	APÊNDICE 2 .....	38
	Vacinas e especificações técnicas .....	38
	População com idade entre 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias .....	38
	População com idade entre 5 e 11 anos .....	39
	População a partir de 12 anos de idade .....	40
	APÊNDICE 3 .....	42
	Esquema de vacinação nos casos de intercambialidade para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias .....	42
	APÊNDICE 4 .....	47

## 1. INTRODUÇÃO

Há evidências substanciais que apoiam a atualização na composição das vacinas covid-19 na medida em que a evolução genética e antigênica da proteína *spike* continua se distanciando do vírus original<sup>1</sup>. O objetivo da atualização da composição antigênica dos imunizantes contra a covid-19 é melhorar a resposta imunológica induzida pelas vacinas às variantes circulantes do vírus, especialmente em idosos e imunocomprometidos<sup>2</sup>.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a vacinação periódica com vacinas atualizadas conforme as populações de alta prioridade, com considerações especiais para: idosos, adultos com comorbidades ou obesidade grave, pessoas imunocomprometidas, gestantes e profissionais de saúde. O benefício da vacinação de crianças e adolescentes deve ser considerado com base na carga de doença, relação custo-efetividade e outras prioridades programáticas de cada país<sup>3</sup>. Em setembro de 2024<sup>4</sup>, o grupo consultivo estratégico em imunizações da OMS (*Strategic Advisory Group of Experts – SAGE*) reforçou que os países continuem seguindo o roteiro proposto para a vacinação contra a covid-19<sup>3</sup>.

Além disso, um esquema simplificado de dose única para a imunização primária deve ser usado para a maioria das vacinas contra a covid-19 a fim de melhorar a aceitação e a adesão da vacinação e conferir proteção adequada quando a maioria das pessoas já teve pelo menos uma infecção anterior pelo SARS-CoV-2<sup>3</sup>.

As vacinas recomendadas deverão ser atualizadas conforme a vigilância e a identificação de novas variantes. A Anvisa publicou a RDC nº 905, de 18 de setembro de 2024, que dispõe sobre a composição das vacinas covid-19 a serem utilizadas no Brasil<sup>5</sup>. As vacinas destinadas a serem comercializadas ou utilizadas deverão estar em conformidade com a composição recomendada pela OMS. A última especificação das variantes que devem constar da composição das vacinas covid-19 autorizadas para comercialização ou utilização no País está publicada na Instrução Normativa – IN nº 316, de 18 de setembro de 2024<sup>6</sup>.

Dados atualizados sobre a vigilância da covid-19 no Brasil estão disponíveis nos links <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19/publicacoes-tecnicas/informes> e <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/covid-19><sup>7</sup>.

A partir da publicação deste informe, a vacina covid-19 passará a compor o Calendário Nacional de Vacinação para idosos com 60 anos ou mais de idade e para as gestantes. Para os demais grupos será considerada a vacinação especial contra a covid-19 (Quadro 1).

O objetivo deste informe é trazer as principais atualizações e recomendações sobre as vacinas covid-19 em uso no Brasil. Caso outras versões atualizadas destas vacinas sejam licenciadas e estejam disponíveis pelo PNI, notas técnicas ou informativos serão publicados contendo as informações necessárias para a operacionalização do imunizante.

**Quadro 1.** Grupos para a vacinação de rotina no Calendário Nacional de Vacinação e grupos para a vacinação especial contra a covid-19

Calendário Nacional de Vacinação	Vacinação especial
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade</li> <li>○ Pessoas de 60 anos ou mais de idade</li> <li>○ Gestantes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pessoas vivendo em instituições de longa permanência</li> <li>○ Pessoas imunocomprometidas</li> <li>○ Indígenas vivendo em terra Indígena</li> <li>○ Indígenas vivendo fora da terra Indígena</li> <li>○ Ribeirinhos</li> <li>○ Quilombolas</li> <li>○ Puérperas</li> <li>○ Trabalhadores da saúde</li> <li>○ Pessoas com deficiência permanente</li> <li>○ Pessoas com comorbidades</li> <li>○ Pessoas privadas de liberdade</li> <li>○ Funcionários do sistema de privação de liberdade</li> <li>○ Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas</li> <li>○ Pessoas em situação de rua</li> </ul>

Fonte: DPNI.

Nota: o Apêndice 1 apresenta as definições detalhadas dos grupos para vacinação especial contra a covid-19.

## 2. VACINAS COVID-19 EM USO NO BRASIL

### 2.1 Vacina covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)

A vacina contém RNA mensageiro (RNAm) de cadeia simples, com estrutura Cap-5', produzida utilizando transcrição *in vitro* em um sistema livre de células a partir dos moldes correspondentes de DNA, que codifica a proteína S (*spike*) do vírus SARS-CoV-2<sup>8</sup>.

### 2.2 Vacina covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty)

A vacina é composta de RNA mensageiro (RNAm) de cadeia simples, envolvido em nanopartículas lipídicas, com estrutura altamente purificada, produzida usando transcrição *in vitro* sem células a partir dos modelos de DNA correspondentes, codificando a proteína S (*spike*) do SARS-CoV-2<sup>9</sup>.

### 2.3 Vacina covid-19-recombinante, Serum/Zalika

A vacina contém proteína S (*spike*) do SARS-CoV-2 associada ao adjuvante Matrix-M produzida por tecnologia de DNA recombinante.

A vacina mostrou ser bem tolerada e eficaz, com um perfil de segurança adequado em pessoas com 12 anos de idade ou mais<sup>10</sup>.

### **3. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 COMO ROTINA NO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO**

#### **3.1 Vacinação contra a covid-19 para crianças menores de 5 anos – rotina**

As vacinas covid-19 estão recomendadas para crianças e fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação desde 1º de janeiro de 2024 (Nota Técnica nº 118/2023 – CGICI/DPNI/SVSA/MS)<sup>11</sup>. Para especificações técnicas da vacina, Apêndice 2.

##### **3.1.1 Público elegível**

Toda a **população entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias** não vacinada ou com esquema vacinal incompleto, de acordo com a faixa etária, para vacinação de rotina no Calendário Nacional de Vacinação Infantil.

##### **3.1.2 Meta de vacinação**

O objetivo principal da vacinação é reduzir casos graves e óbitos pela covid-19. Por isso, é fundamental alcançar elevadas e homogêneas coberturas vacinais para todos os grupos com indicação. O DPNI definiu a **meta de 90%** para crianças entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Serão consideradas para fins de cálculo de indicador de cobertura vacinal as doses administradas em crianças de 6 meses a menores de 1 ano de idade divididas pelo número de nascidos vivos do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc).

##### **3.1.3 Esquema vacinal recomendado**

###### **3.1.3.1 Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)**

- Crianças não vacinadas ou que nunca receberam alguma dose de vacinas Covid-19 deverão receber **duas doses** da vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax). O esquema primário deverá ser com o mesmo imunizante (Quadro 2).
- Crianças com esquema incompleto de vacinas covid-19 originais (vacinas CoronaVac ou Pfizer pediátrica) deverão completar o esquema com a vacina disponível (ver esquemas recomendados no Apêndice 3).
- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias **imunocomprometidas** que nunca se vacinaram deverão receber o esquema primário de **três doses** da vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax). O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de quatro semanas, e entre a segunda e a terceira dose, oito semanas.
- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade **com comorbidades** que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber **uma dose anual** da vacina atualizada.

- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade **imunocomprometidas** que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber **duas doses** da vacina atualizada, com intervalo mínimo de seis meses entre as doses.

**Quadro 2.** Recomendações da vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax), de acordo com a idade e o histórico de vacinação prévia para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias sem vacinação prévia

Idade(s)	Dose	Intervalo entre as doses
<b>Crianças de 6 meses a 4 anos de idade, SEM VACINAÇÃO PRÉVIA.</b>	<b>Duas doses</b> de 0,25 mL cada, administradas por via intramuscular.*	Administrar a segunda dose quatro semanas após a primeira dose.

Fonte: modificado de Anvisa. <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2024/anvisa-aprova-registro-da-vacina-spikevax-monovalente>.

\*Não utilizar o frasco-ampola de dose única para administrar um volume parcial de 0,25 mL.

### 3.1.3.2 Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty)

- Crianças não vacinadas ou que nunca receberam alguma dose de vacinas covid-19 deverão receber **três doses** da vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty). O esquema primário deverá ser com o mesmo imunizante (Quadro 3).
- Crianças com esquema incompleto de vacinas covid-19 originais (vacinas CoronaVac ou Pfizer pediátrica) deverão completar o esquema com a vacina disponível (ver esquemas recomendados no Apêndice 2).
- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias **imunocomprometidas** que nunca se vacinaram deverão receber o esquema primário de **três doses** da vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty). O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de quatro semanas, e entre a segunda e a terceira dose, oito semanas.
- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade **com comorbidades** que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber **uma dose anual** da vacina atualizada.
- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade **imunocomprometidas** que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber **duas doses** da vacina atualizada, com intervalo mínimo de seis meses entre as doses.

**Quadro 3.** Recomendações da vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty), de acordo com a idade e o histórico de vacinação prévia para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias sem vacinação prévia

Idade(s)	Dose	Intervalo entre as doses
<b>Crianças de 6 meses a 4 anos de idade, SEM VACINAÇÃO PRÉVIA.</b>	<b>Três doses</b> de 0,2 mL cada, administradas por via intramuscular.	Administrar a segunda dose quatro semanas após a primeira dose. Administrar a terceira dose oito semanas após a segunda dose.

Fonte: adaptado das informações presentes na bula da vacina Comirnaty®, Pfizer: [https://www.pfizer.com.br/files/Comirnaty\\_Profissional\\_de\\_Saude\\_69.pdf](https://www.pfizer.com.br/files/Comirnaty_Profissional_de_Saude_69.pdf)



- Os esquemas primários deverão ser feitos priorizando o uso do mesmo imunizante do início de esquema (esquemas homólogos).
- Crianças de **6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias** de idade que **não completaram o esquema primário** dentro desse período, ao completarem 5 anos de idade serão considerados vacinados e terão seu esquema encerrado se tiver pelo menos uma dose.

### 3.2 Vacinação contra a covid-19 para idosos – rotina

#### 3.2.1 Público elegível

Será considerada toda a **população a partir de 60 anos de idade**, de acordo com a faixa etária, para vacinação de rotina no Calendário Nacional de Vacinação do Idoso.

#### 3.2.2 Meta de vacinação

O objetivo principal da vacinação é reduzir casos graves e óbitos pela covid-19. Por isso, é fundamental alcançar elevadas e homogêneas coberturas vacinais para todos os grupos com indicação. O DPNI definiu a **meta de 90%** para pessoas a partir de 60 anos de idade. Serão consideradas para fins de cálculo de indicador de cobertura vacinal as doses administradas em todas as pessoas a partir de 60 anos, por faixa etária divididas pelo número de pessoas com 60 anos e mais, segundo o censo do IBGE.

#### 3.2.3 Vacinas e especificações técnicas

Para a população a partir de 60 anos de idade estão disponíveis três vacinas contra a covid-19: 1) vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax), 2) vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) e 3) vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika.

As vacinas serão ofertadas conforme as especificações de cada imunobiológico e sua disponibilidade no PNI. Vide Apêndice 2 para detalhes das especificações técnicas.

#### 3.2.4 Esquema vacinal recomendado

Para a população a partir de 60 anos de idade a recomendação é o recebimento de **uma dose** a cada seis meses, independentemente da quantidade de doses prévias recebidas.

### **3.3 Vacinação contra a covid-19 para gestantes – rotina**

#### **3.3.1 Público elegível**

Serão consideradas todas as **gestantes**, de acordo com a faixa etária, para vacinação de rotina no Calendário Nacional de Vacinação da Gestante. A vacinação contra a covid-19 durante a gravidez tem sido recomendada amplamente para prevenir doença grave e mortes nessa população<sup>16</sup>. Adicionalmente, os bebês têm risco de complicações associadas à doença, incluindo insuficiência respiratória e outras complicações graves, logo a transferência de anticorpos (IgG) maternos para o feto é um benefício adicional da vacinação de gestantes<sup>14</sup>. Para as gestantes não haverá exigência quanto à comprovação da situação gestacional, sendo suficiente para a vacinação que a própria mulher relate sua gravidez.

#### **3.3.2 Meta de vacinação**

O DPNI definiu a **meta de 90% para gestantes**. Serão consideradas para fins de cálculo de indicador de cobertura vacinal as doses administradas divididas pelo número de nascidos vivos do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivo (Sinasc).

#### **3.3.3 Vacinas e especificações técnicas**

Para gestantes com idade inferior a 12 anos estão disponíveis duas vacinas contra a covid-19: 1) vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) e 2) vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty).

Para gestantes com idade a partir de 12 anos estão disponíveis três vacinas contra a covid-19: 1) vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax), 2) vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) e 3) vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika.

As vacinas serão ofertadas conforme as especificações de cada imunobiológico e sua disponibilidade no PNI. Vide Apêndice 2 para detalhes das especificações técnicas.

#### **3.3.4 Esquema vacinal recomendado**

Para as gestantes a recomendação é o recebimento de **uma dose** em qualquer momento da gestação e em cada gestação, independentemente da quantidade de doses prévias recebidas.

## **4. VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA OS GRUPOS ESPECIAIS**

### **4.1 Público elegível**

São considerados para vacinação especial contra a covid-19 pessoas com 5 anos de idade ou mais e com maior vulnerabilidade (ex.: acesso insuficiente ao serviço de saúde) ou condição que aumenta o risco para as formas graves da doença. Por isso, essas populações têm indicação de dose anual (ou a cada seis meses, dependendo do grupo), independentemente do número de doses prévias de vacinas covid-19. Para fins de registro da dose nos sistemas de informação do público elegível consultar o Apêndice 4.

O Quadro 4 traz a composição dos grupos para a vacinação especial contra a covid-19. No Apêndice 1, os grupos são descritos com mais detalhes.

#### Quadro 4. Grupos para a vacinação especial contra a covid-19 – Brasil

Grupos para a vacinação especial
Pessoas vivendo em instituições de longa permanência
Pessoas imunocomprometidas
Indígenas vivendo em terra indígena
Indígenas vivendo fora da terra indígena
Ribeirinhos
Quilombolas
Puérperas
Trabalhadores da saúde
Pessoas com deficiência permanente
Pessoas com comorbidades
Pessoas privadas de liberdade
Funcionários do sistema de privação de liberdade
Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas
Pessoas em situação de rua

Fonte: DPNI.

Nota: o Apêndice 1 apresenta as definições detalhadas dos grupos para vacinação especial contra a covid-19. Apêndice 4 – informações para auxiliar no registro de vacinação contra a covid-19.

#### 4.2 Meta de vacinação

O objetivo principal da vacinação dos grupos especiais é reduzir casos graves e óbitos por covid-19. Considerando a indisponibilidade de denominadores para os referidos grupos, não é possível definir meta de cobertura vacinal, por isso serão disponibilizados os dados de doses aplicadas (Nota Técnica nº 101/2024 – DPNI/SVSA/MS)<sup>12</sup>.

#### 4.3 Esquema vacinal recomendado para pessoas que fazem parte do grupo especial

##### • PESSOAS DOS GRUPOS ESPECIAIS DE 5 a 11 ANOS DE IDADE:

Pessoas dos grupos especiais, exceto imunocomprometidos, independentemente do recebimento ou não de doses prévias de qualquer vacina covid-19, deverão receber **UMA DOSE** da vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty), ou da vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax), com o volume da dose e a formulação recomendadas para a idade (para especificações técnicas da vacina, *vide* Apêndice 2).

##### • PESSOAS DOS GRUPOS ESPECIAIS A PARTIR DE 12 ANOS DE IDADE

Pessoas dos grupos especiais, exceto imunocomprometidos, independentemente do recebimento ou não de doses prévias de qualquer vacina covid-19, deverão receber **UMA DOSE** da vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty), ou da vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax), ou da vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika (para especificações técnicas da vacina, *vide* Apêndice 2).

- A vacinação dos **GRUPOS ESPECIAIS** para covid-19 deverá ser realizada em **qualquer sala de vacina** da rede pública e **NÃO** precisará de validação médica ou externa.



Crianças a partir de 5 anos de idade que **NÃO** fazem parte dos grupos especiais e nunca foram vacinadas (nenhuma dose de vacinas covid-19) poderão receber **UMA DOSE** de vacina covid-19 disponível e recomendada para a faixa etária.

- **PESSOAS IMUNOCOMPROMETIDAS A PARTIR DE 5 ANOS DE IDADE**

- Pessoas com idade entre 5 e 11 anos de idade, imunocomprometidas, que **nunca se vacinaram** deverão receber o esquema primário de **TRÊS DOSES** da vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) ou da vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax). O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de quatro semanas, e entre a segunda e a terceira dose, oito semanas.
- Pessoas a partir de 12 anos de idade, adolescentes e adultos imunocomprometidos que **nunca se vacinaram** deverão receber o esquema primário de **TRÊS DOSES** da vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty), ou da vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax), ou da vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de quatro semanas, e entre a segunda e a terceira dose, oito semanas.
- Pessoas imunocomprometidas que estão com o **esquema de vacinação incompleto** deverão completar o esquema de **TRÊS DOSES** com o imunizante disponível e a dose para a idade. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de quatro semanas, e entre a segunda e a terceira dose, oito semanas. Para comprovar o *status* de **imunocomprometido**, será possível a apresentação de medicamentos em uso ou resultados de exames ou receitas médicas ou relatórios/declarações médicas ou qualquer outro documento que evidencie a situação do indivíduo (Apêndice 1).
- Pessoas imunocomprometidas que estão com o **esquema de vacinação completo** deverão receber **DUAS DOSES** de vacinas covid-19 com intervalo de seis meses entre as doses.

#### 4.4 Intercambialidade

A continuidade do esquema vacinal pode ser feita com vacinas covid-19 de fabricantes diferentes (esquema heterólogo) nas seguintes situações:

- indisponibilidade ou descontinuidade da vacina utilizada inicialmente;
- contraindicação da vacina covid-19 utilizada em dose anterior.

Nos casos em que não é possível a utilização do mesmo imunizante para completar o esquema primário, orienta-se seguir a recomendação demonstrada no quadro do Apêndice 3.



O esquema primário de pessoas imunocomprometidas ou em situação de revacinação (transplante de células-tronco hematopoiéticas) é de **TRÊS DOSES** da vacina covid-19 disponível e recomendada para a faixa etária. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de quatro semanas, e entre a segunda e a terceira dose, oito semanas.

### 5. ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE – MICROPLANEJAMENTO NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

A vacinação contra a covid-19 exige uma abordagem estratégica que considere as particularidades de cada região. Nesse sentido, em 2023 o Ministério da Saúde implementou o Microplanejamento, uma metodologia que visa otimizar a operacionalização das estratégias de vacinação no País.

Esse método visa sistematizar os processos de trabalho, considerando as especificidades sociodemográficas, econômicas e culturais de cada localidade, fortalecendo a descentralização e a participação dos profissionais de saúde dos diferentes níveis de atenção em busca de aumentar a adesão à vacinação e reduzir desigualdades em saúde.

O Ministério da Saúde disponibilizou em seu site oficial o **Manual de Microplanejamento**, destinado a orientar as ações dos profissionais de saúde que trabalham com imunização.



Para a execução das etapas do Microplanejamento, o Ministério da Saúde orienta a utilização do **Caderno de microplanejamento para as atividades de vacinação de alta qualidade**.



## 6. REDE DE FRIO

Para garantir a qualidade das vacinas em todas as etapas da cadeia de frio é fundamental seguir rigorosamente as especificações técnicas de conservação recomendadas pelos fabricantes, conforme detalhadas na bula aprovada pela Anvisa.

### 6.1 Especificações técnicas

As vacinas possuem especificações técnicas que variam de acordo com o imunobiológico e sua apresentação. Essas informações estão detalhadas no Quadro 5, com base nas bulas aprovadas pela Anvisa.

**Quadro 5.** Especificações técnicas das vacinas covid-19

Especificações de segurança	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)	Vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika
Apresentação	Frasco-ampola multidose, tampa cinza; tampa azul (vacina diluída); tampa laranja (vacina não diluída); tampa vinho.	Frasco-ampola multidose.	Frasco-ampola multidose.
Temperatura e tempo de transporte	-90°C -60°C e +2°C a +8°C: não tem limite de tempo para transporte.	Frasco-ampola 2°C a 8°C: até 36 horas. Frasco-ampola -50°C a -15°C: não tem limite de tempo para transporte.	+2°C a +8°C: não tem limite de tempo para transporte informado pelo fabricante.
Prazo de validade e temperatura de conservação	Frasco-ampola fechado: 18 meses à temperatura entre -90°C e -60°C, protegido da luz.  Dentro do prazo de validade, após a retirada do freezer, o frasco-ampola fechado pode ser armazenado entre 2°C e 8°C, protegido da luz.  Uma vez descongelada, a vacina não deve ser congelada novamente.	Dentro do prazo de validade, após a retirada do freezer, pode ser armazenado entre 2°C e 8°C, protegido da luz, por no máximo trinta dias.  Não há limitação de tempo de transporte entre 2°C e 8°C.  Uma vez descongelada, a vacina não deve ser congelada novamente.	Frasco-ampola fechado: 12 meses sob refrigeração (entre 2°C e 8°C), protegido da luz. Não congelar. Não agitar.

Especificações de segurança	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)	Vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika
	O frasco-ampola fechado pode ser armazenado entre 8°C e 30°C por até 12 horas após ser retirado da temperatura de 2°C e 8°C.		
Prazo de validade e temperatura de conservação após aberto	Após aberto, válido por 12 horas entre 2°C e 25°C.	Frasco-ampola multidose: 19 horas após aberto entre 2°C e 25°C.	Pode ser utilizada em até 12 horas após abertura, desde que mantida em condições assépticas e sob temperatura de 2°C a 8°C, ou seis horas à temperatura máxima de 25°C.

Fontes: bula da vacina Covid-19, Pfizer, Comirnaty®; bula da vacina Covid-19-RNAm, Spikevax; bula da vacina Covid-19 (recombinante), Serum/Zalika.

## 6.2 Desvio de qualidade

Alterações da temperatura de conservação podem comprometer a potência imunogênica da vacina, bem como as características verificadas e certificadas pelo laboratório produtor em determinadas condições de conservação: temperatura, prazo de validade, umidade, luz e outras.

Em caso de excursão de temperatura durante o armazenamento ou o transporte, a ocorrência deverá ser notificada à instância da rede de frio superior por meio de ferramenta apropriadas.

Quando, em âmbito estadual, não for possível avaliar a excursão de temperatura e houver necessidade de envio da ocorrência para avaliação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), deve-se preencher o Formulário de ocorrência de excursão de temperatura – Coordenação-Geral de Gestão de Insumos (FOET – CGGI).

As queixas técnicas relacionadas às vacinas ou aos produtos para saúde (seringa e/ou agulha), ou seja, o afastamento dos parâmetros de qualidade de um produto ou processo, ou irregularidades de empresas deverão ser registradas no Sistema de Notificação em Vigilância Sanitária (Notivisa).

Os formulários para notificação estão disponíveis para acesso por meio do link <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/rede-de-frio/formularios-e-sistemas-de-registro>



## 7. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

O gerenciamento e o manejo dos resíduos resultantes das atividades de vacinação devem estar em conformidade com as definições estabelecidas na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 222, de 28 de março de 2018<sup>13,14</sup>, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências, e na Resolução do Conama nº 358, de 29 de abril de 2005<sup>15</sup>, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS). Cada serviço de saúde deve possuir seu Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRSS), mantendo esse material disponível no local de trabalho e os profissionais capacitados para o manejo e o descarte correto.

As orientações para a elaboração do PGRSS estão disponíveis na página da rede de frio do Ministério da Saúde por meio do link: <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/rede-de-frio/publicacoes>.



## 8. FLUXO DE DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNOBIOLÓGICOS

- As solicitações de envio de doses das vacinas covid-19 devem ser inseridas no Sistema de Insumos Estratégicos (Sies) conforme a necessidade de cada estado. As solicitações podem ser realizadas a qualquer tempo, considerando o público elegível na estratégia por faixa etária.
- Os pedidos são analisados considerando-se as doses distribuídas à entidade solicitante, o público-alvo e o estoque disponível no momento da autorização. Cabe ressaltar que as solicitações devem ser realizadas com tempo hábil para a logística de entrega, e que os envios urgentes devem ser excepcionais.
- Os estados e o Distrito Federal podem monitorar a situação dos pedidos no Sies por meio da funcionalidade Consulta > Pedidos Emitidos.

## 9. ORIENTAÇÕES GERAIS

### 9.1 Farmacovigilância

As vacinas covid-19 em uso no Brasil passaram por rigorosos processos de avaliação de segurança e eficácia antes de serem aprovadas para a população. Acompanhadas de monitoramento contínuo por meio de sistemas de farmacovigilância, essas vacinas têm se mostrado seguras e essenciais para o controle da pandemia e a prevenção de casos graves. No Quadro 6 há informações sobre cada uma das três vacinas atualmente utilizadas no Brasil, abordando suas tecnologias, perfis de segurança e principais considerações para garantir a proteção da população.

**Quadro 6.** Especificações gerais sobre a segurança das vacinas covid-19 em uso no Brasil

Especificações de segurança	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)	Vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika
Considerações gerais	Plataforma não replicante e não integradora		
Manifestações locais	Dor local, vermelhidão e edema.	Dor local, vermelhidão, edema e linfadenopatia leves e moderados. Mais intensos na segunda dose.	Dor local, fadiga, dor de cabeça, mialgia, calafrios e artralgia.
Manifestações sistêmicas	Fadiga, cefaleia, mialgia, artralgia, tremores, diarreia, febre, náuseas e vômitos.	Fadiga, sonolência, perda de apetite, cefaleia, mialgia e calafrios. Mais intensos na segunda dose.	Reações relacionadas à ansiedade, incluindo reações vasovagais (síncope), hiperventilação ou reações relacionadas ao estresse associado à vacinação como uma resposta psicogênica à injeção com agulha.
Eventos adversos de interesse especial	<p>Miocardite e pericardite são eventos raros e mais frequentes em homens de 12 a 39 anos, embora também ocorram em mulheres. Estender o intervalo entre as doses para oito semanas pode reduzir o risco de miocardite e pericardite associado à vacinação.</p> <p>Não há evidências que sustentem a relação de causalidade da Síndrome de Guillain Barré (SGB), encefalomielite disseminada aguda e mielite transversa com a aplicação desta vacina.</p>	<p>Miocardite e pericardite são eventos raros e mais frequentes em homens entre 12 e 39 anos, embora também ocorram em mulheres. Estes episódios têm início em média sete dias após a segunda dose, com dor precordial, dispneia e palpação. Entretanto, crianças mais jovens podem apresentar sintomas inespecíficos como: irritabilidade, vômitos, inapetência, taquipneia ou letargia. Estender o intervalo entre as doses para oito semanas pode reduzir o risco de miocardite e pericardite associado à vacinação.</p> <p>Foram relatadas reações de hipersensibilidade, incluindo anafilaxia, como em todas as vacinas injetáveis.</p>	<p>Há um risco aumentado de miocardite e pericardite leve (desenvolvem-se no máximo em até 14 dias após a vacinação). O risco após uma terceira dose ainda não foi estudado.</p> <p>Foram relatadas reações de hipersensibilidade, incluindo anafilaxia, como em todas as vacinas injetáveis.</p>

Fonte: bula da vacina Covid-19, Pfizer, Comirnaty®; bula da vacina Covid-19-RNAm, Spikevax; bula da vacina Covid-19 (recombinante), Serum/Zalika.

É fundamental destacar que diversas infecções virais, incluindo o próprio SARS-CoV-2, estão associadas à ocorrência de miocardite e pericardite com maior frequência do que os casos observados após a vacinação. Dessa forma, não se pode caracterizar esses eventos como especificamente relacionados à imunização com a vacina Covid-19 de RNAm. Além disso, o excipiente polietilenoglicol (PEG), presente nessas vacinas, foi inicialmente considerado um potencial causador de reações graves de hipersensibilidade. No entanto, estudos posteriores mostraram que essas reações graves não foram observadas em indivíduos com alergia conhecida ou provável ao PEG<sup>13,14</sup>.

No que diz respeito a eventos neurológicos graves, as evidências apontam que a incidência desses eventos foi significativamente maior em indivíduos que testaram positivo para SARS-CoV-2 em comparação com os vacinados contra a covid-19, independentemente do tipo de vacina ou do número de doses recebidas. Até o momento, as evidências disponíveis não são conclusivas sobre uma associação causal entre a exposição à vacina e os eventos adversos neurológicos, reforçando a necessidade de mais estudos e da farmacovigilância para esclarecimentos<sup>15</sup>.

### 9.1.1 Precauções e contraindicações

As vacinas covid-19 são contraindicadas a indivíduos com histórico conhecido de reação alérgica grave a qualquer componente da vacina<sup>16, 17, 18</sup>. As precauções relacionadas a essa vacina incluem:

- **Pessoa com histórico de reações alérgicas:** pessoas com histórico de anafilaxia a outras vacinas ou medicamentos injetáveis não têm contraindicação absoluta à vacinação contra covid-19, mas devem ser observadas por trinta minutos após a aplicação. É essencial realizar uma triagem pré-vacinação para todos os indivíduos, e mesmo aqueles sem histórico de anafilaxia devem ser monitorados por pelo menos 15 minutos após a vacinação, com tratamento e supervisão médica disponíveis para lidar com possíveis reações anafiláticas. Uma dose adicional de um determinado fabricante da vacina não deve ser administrada àqueles que tiveram anafilaxia após uma dose anterior deste fabricante<sup>16, 17, 18</sup>.
- **Pessoa com histórico de trombocitopenia e perturbações da coagulação:** assim como acontece com outras injeções, a vacina deve ser administrada com precaução em indivíduos com trombocitopenia, distúrbios de coagulação, como hemofilia, ou que estejam em terapia anticoagulante, pois, assim como em outras injeções intramusculares, existe o risco de hemorragias ou hematomas após a aplicação intramuscular nesses casos<sup>17</sup>.
- **Pessoa com infecção pelo SARS-CoV-2:** pessoas com covid-19 confirmada por PCR não devem ser vacinadas até que tenham se recuperado da infecção aguda. Pessoas com história de infecção prévia podem ser vacinadas normalmente. O intervalo de pelo menos quatro semanas entre a infecção e a vacinação deve ser considerado nesses casos.
- **Pessoa com outra infecção aguda:** a vacinação deve ser adiada em indivíduos com doença febril aguda (temperatura corporal acima de 38,5 °C) visando não confundir os sintomas da infecção com eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização (Esavi)<sup>16, 18</sup>.

- **Mulher grávida/gravidez:** o uso de vacinas RNAm é recomendado para gestantes em qualquer período da gestação. Por haver uma limitação nos dados disponíveis sobre a utilização da vacina covid-19 (recombinante) em mulheres grávidas, a administração desta vacina deve ser realizada apenas quando os potenciais benefícios superarem quaisquer potenciais riscos para mãe e para o feto.
- **Mulher amamentando/amamentação:** após a vacinação com as vacinas de RNAm, esta estrutura não entra no núcleo da célula, sendo degradado rapidamente após a injeção. É biológica e clinicamente improvável que a vacinação represente um risco para o lactante. Estudos mostram que os anticorpos produzidos pela vacina são encontrados no leite materno, o que pode ajudar a proteger os lactantes contra infecções pelo SARS-CoV-2. Quanto à vacina recombinante, não se tem conhecimento se ela é excretada no leite humano, portanto a administração desta vacina deve ser realizada apenas quando os potenciais benefícios superarem quaisquer potenciais riscos para o bebê<sup>16</sup>.
- **Miocardite/pericardite:** trata-se de eventos adversos raros associados às vacinas Covid-19 RNAm, com maior risco observado em homens entre 18 e 24 anos, principalmente após a segunda dose. Para reduzir esse risco, o PNI adotou uma estratégia de vacinação de dose única para grupos especiais acima de 5 anos e para crianças ( $\geq 6$  meses e  $< 5$  anos) que já concluíram um esquema primário com outras vacinas. Além disso, crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias não vacinadas ou que nunca receberam alguma dose de vacina covid-19 deverão receber duas doses para o esquema vacinal primário. Embora a maioria dos casos de miocardite/pericardite se recupere sem complicações graves, é fundamental que os vacinados sejam orientados a procurar atendimento médico imediato se desenvolverem sintomas como dor no peito de início agudo e persistente, falta de ar ou palpitações nos primeiros dias após a vacinação<sup>16</sup>. É importante destacar que outras causas de miocardite/pericardite, incluindo a infecção pelo SARS-CoV-2 e outros agentes virais, são responsáveis pela maioria dos casos em todo o mundo. Indivíduos que desenvolveram miocardite/pericardite após uma dose da vacina Covid-19 RNAm não devem receber doses adicionais de qualquer vacina contra a covid-19, a menos que seja recomendado após criteriosa avaliação médica do benefício-risco da vacinação.
- **Reações associadas à ansiedade:** reações relacionadas à ansiedade, como desmaios (reações vasovagais), hiperventilação ou ansiedade, podem ocorrer em algumas pessoas durante a vacinação como resposta ao ato da injeção. É importante adotar precauções para prevenir lesões decorrentes de desmaios. Os profissionais de saúde devem estar atentos para identificar e manejar a situação conforme as recomendações vigentes para a vacinação segura<sup>16, 18</sup>.
- **Exacerbações da síndrome de transudação capilar (STC):** a exacerbação da STC foi notificada raramente nos primeiros dias após a vacinação com Spikevax (original). É essencial que os profissionais de saúde estejam atentos aos sinais e aos sintomas da STC (hipotensão, hipoalbuminemia, edema e hemoconcentração) para o reconhecimento e o tratamento imediatos. No entanto, é importante ressaltar que há diversas outras causas para essa condição, e uma avaliação criteriosa de causalidade é necessária antes de

associar o evento à vacina. Em indivíduos com histórico de STC, o planejamento da vacinação deve ser realizado em colaboração com especialistas médicos qualificados<sup>18</sup>.

- **Para doação de sangue:** de acordo com a Anvisa, os candidatos elegíveis à doação de sangue que tiverem sido vacinados contra a covid-19 devem ser considerados inaptos pelo período de sete dias após a vacinação se as vacinas forem RNAm ou vetor viral<sup>19</sup>.

## 9.2 Administração simultânea com outras vacinas, medicamentos ou imunobiológicos

As vacinas covid-19 podem ser administradas simultaneamente ou a qualquer momento antes ou depois de outras vacinas para adultos, adolescentes e crianças, incluindo vacinas atenuadas e inativadas, excetuando-se a vacina contra a dengue. A mesma orientação se aplica à imunização materna para vacinas recomendadas durante a gravidez.

Quando administradas simultaneamente, as vacinas devem ser injetadas em locais separados, preferencialmente em extremidades diferentes.

## 9.3 Revacinação de pacientes após transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH)

O transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) é um procedimento terapêutico com o objetivo de reconstruir o órgão hematopoiético. Estudos têm demonstrado que os transplantados de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) perdem a imunidade protetora no pós-transplante. Esses indivíduos devem ter seu esquema vacinal refeito<sup>20, 21</sup>.

O esquema deve ser iniciado preferencialmente após seis meses do TCTH. Porém, a depender da situação epidemiológica local, a vacinação poderá ser realizada a partir de três meses pós-transplante<sup>22,23</sup>. O esquema preconizado para a revacinação de TCTH quanto ao número de doses e intervalos é de três doses da vacina covid-19, conforme o Quadro 7.

**Quadro 7.** Revacinação após o transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH)

Vacina	Esquema primário	Intervalo mínimo	Registro nos sistemas de informação
<b>Vacina covid-19 disponível e recomendada para a faixa etária</b>	D1, D2 e D3	Quatro semanas após a D1 e oito semanas após a D2	1 <sup>ª</sup> dose revacinação (D1 REV) 2 <sup>ª</sup> dose revacinação (D2 REV) 3 <sup>ª</sup> dose revacinação (D3 REV)

Fonte: DPNI/SVSA/MS.

## 9.4 Monitoramento da segurança

O monitoramento da segurança da vacinação contra a covid-19 é essencial no âmbito da farmacovigilância de vacinas, assegurando que eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização (Esavi) sejam detectados, investigados e avaliados de forma eficaz. Nesse processo, os profissionais de saúde desempenham um papel fundamental, pois são responsáveis por identificar, notificar e colaborar na investigação e na avaliação de qualquer problema relacionado à vacinação.

Além disso, esses profissionais são fundamentais para compreender e comunicar os riscos potenciais de maneira clara e objetiva, promovendo a confiança da população e ajudando a prevenir complicações futuras. No Brasil, a atuação ativa e coordenada dos profissionais de saúde contribui diretamente para a segurança e a eficácia do PNI, reforçando a importância da vacinação como medida de saúde pública. Mais informações sobre a operação do sistema de farmacovigilância de vacinas podem ser encontradas no Quadro 8.

**Quadro 8.** Orientações para o monitoramento da segurança da vacinação contra a covid-19 no Brasil

**Orientações para o monitoramento da segurança da vacinação contra a covid-19 no Brasil**

**1. O que devo notificar e investigar?**

- Todos os Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (Esavi) graves, raros e/ou inesperados (fora do padrão ou não encontrados em bula) ocorridos em até trinta dias após a vacinação, independentemente da relação causal entre a vacina e o evento (Portaria de Consolidação nº 4/2027 – Anexo 1 do Anexo V).
- Conglomerados (dois ou mais casos de Esavi relacionados a uma exposição comum) ou surtos (aumento da incidência de casos de Esavi acima do esperado), caracterizados como eventos de saúde pública (Portaria de Consolidação nº 4/2027 – Anexo 1 do Anexo V).
- Erros de imunização que podem aumentar o risco para ocorrência de Esavi (NT nº 29/2024 – CGFAM/DPNI/SVSA/MS).

**2. Onde devo notificar o caso?**

- Qualquer profissional de saúde, dos serviços públicos ou privados, pode fazer o registro da notificação/investigação no Sistema de Informações e-SUS Notifica (Módulo Esavi), disponível em <https://notifica.saude.gov.br>.

**3. Onde posso encontrar mais orientações sobre a investigação dos Esavi?**

- A quarta versão do *Manual de Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV)*, termo atualizado para Esavi em 2022, serve como uma ferramenta essencial para profissionais e tomadores de decisões em saúde pública com o objetivo de fortalecer a farmacovigilância de vacinas no Brasil. O manual padroniza definições de casos, facilitando o reconhecimento e a notificação de Esavi, especialmente os graves e inesperados, e contribui para o monitoramento e a avaliação da segurança da vacinação no País.

[https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vacinacao-imunizacao-pni/manual\\_eventos\\_adversos\\_pos\\_vacinacao\\_4ed\\_atualizada.pdf<sup>24</sup>](https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vacinacao-imunizacao-pni/manual_eventos_adversos_pos_vacinacao_4ed_atualizada.pdf).

**4. Onde posso me capacitar para detectar, notificar, investigar, avaliar, comunicar e prevenir a ocorrência de Esavi?**

- O curso de qualificação profissional “Vigilância de Esavi com ênfase na notificação e na investigação”, incluindo o uso do e-SUS Notifica, é uma iniciativa do Ministério da Saúde. Desenvolvido pela Coordenação-Geral de Farmacovigilância (CGFAM) do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), em parceria com a Fiocruz, a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o curso é oferecido na modalidade de Educação a Distância (EaD).

[https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/47006<sup>25</sup>](https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/47006).

**5. Onde posso encontrar mais informações confiáveis sobre a segurança das vacinas?**

- No sítio eletrônico do “Saúde com Ciência” você vai encontrar diversos artigos contendo mitos e verdades sobre a vacinação, incluindo o desmascaramento de informações disseminadas nas redes sociais.

[https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-com-ciencia<sup>26</sup>](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-com-ciencia)

## Orientações para o monitoramento da segurança da vacinação contra a covid-19 no Brasil

- Também nos boletins epidemiológicos e nos informes técnicos disponibilizados na página oficial do Ministério da saúde, que trata dos Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (<https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/esavi/monitoramento-dos-eventos><sup>27</sup>).

Fonte: DPNI/SVSA/MS.

## 10. REGISTRO E INFORMAÇÕES DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

### 10.1 Registro das doses aplicadas

O registro de doses aplicadas deverá ser feito no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), no eSUS APS ou em sistema próprio ou proprietário que envia dados à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).

Para o registro são necessários 1) **Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) do cidadão** que procurar os estabelecimentos de saúde para receber a vacinação; 2) o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do estabelecimento de saúde onde a vacinação está acontecendo e 3) o CNES do profissional de saúde que está vacinando.



Ressalta-se que todas as unidades de saúde devem estar cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), conforme a Portaria nº 1.883, de 4 de novembro de 2018, e que todo trabalhador de saúde deve estar cadastrado nesse sistema em relação ao estabelecimento de saúde.

As doses aplicadas em **crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e idosos (60 anos ou mais)** devem ser registradas na estratégia “rotina”. A vacinação dos grupos prioritários deverá ser registrada como estratégia “especial”.

Sobre o registro de doses aplicadas nos grupos prioritários ou especiais, o Apêndice 4 traz a sugestão de preenchimento das variáveis de Grupos para a Vacinação Especial, Motivo de Indicação CID-10, Descrição do CID-10 e Especialidade.

### 10.2 Materiais complementares para orientação sobre o registro vacinal

Seguem dispostos no Quadro 9 materiais complementares para auxílio e suporte a toda equipe de vacinação dos municípios.

**Quadro 9.** Materiais complementares

QR Code	Material complementar
	Informações em Saúde: e-SUS AB – Registro de vacinas
	Manual e-SUS APS
	e-SUS Vacinação (aplicativo)

Fonte: DPNI/SVSA/MS.

### **10.3 Registro da movimentação dos imunobiológicos nos estabelecimentos de saúde**

**A movimentação de imunobiológicos na sala de vacina – entrada e saída** – será realizada exclusivamente no SI-PNI (<https://si-pni.saude.gov.br/#/login>) e deverá ser atualizada toda vez que houver recebimento de vacina ou quando houver saída pelos seguintes motivos: transferência de doses, quebra do frasco, falta de energia elétrica, falha de equipamento, validade vencida, procedimento inadequado, falha de transporte, indisponibilidade ou perda por orientação regulatória, visando controlar os estoques no município e no estabelecimento de saúde, possibilitando o planejamento e a logística de distribuição das vacinas. Os procedimentos operacionais estão descritos no *Manual de operação* do sistema disponível no Menu Ajuda do sistema.

### **10.4 Disseminação dos registros de doses aplicadas e painel Vacinação do Calendário Nacional**

**As informações devem ser acompanhadas diariamente** com o objetivo de monitorar oportunamente o avanço da vacinação, bem como auxiliar na correção de possíveis erros de registro.



A visualização e a exportação das informações são realizadas por meio da plataforma LocalizaSUS, no guia Vacinação do Calendário Nacional, disponível em <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/demas>. Tendo em vista que as informações sobre residência do usuário estão relacionadas ao cadastro individual no Cadweb/Cadsus, torna-se fundamental a intensificação do trabalho para a atualização dos cadastros individuais no âmbito local. Os dados vacinais serão apresentados por local de residência do usuário e por local de ocorrência da aplicação da vacina.

## REFERÊNCIAS

1. XIA, S.; JIAO, F.; WANG, L. *et al.* SARS-CoV-2 Omicron XBB Subvariants Exhibit Enhanced Fusogenicity and Substantial Immune Evasion in Elderly Population, but High Sensitivity to Pan-Coronavirus Fusion Inhibitors. *Journal of Medical Virology*. 2023; 95 (3):e28641. doi:10.1002/jmv.28641. Acesso em: 28 outubro 2024.
2. WHO. Technical Advisory Group on COVID-19 Vaccine Composition (TAG-CO-VAC). Statement on the antigen composition of COVID-19 vaccines. <https://www.who.int/news/item/26-04-2024-statement-on-the-antigen-composition-of-covid-19-vaccines>. Acesso em: 28 outubro 2024.
3. WHO. Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE). Roadmap for prioritizing uses of COVID-19 vaccines. <https://www.who.int/publications/item/WHO-2019-nCoV-Vaccines-SAGE-Prioritization-2023.1>. Acesso em: 28 outubro 2024.
4. WHO. Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE). Highlights from the Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization 23-26 September 2024. <https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/>. Acesso em: 28 outubro 2024.
5. BRASIL. Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Diretoria Colegiada. RESOLUÇÃO RDC Nº 905, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024. <https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-905-de-18-de-setembro-de-2024-585390856>. Acesso em: 28 outubro 2024.
6. BRASIL. Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Diretoria Colegiada. INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 316, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024. <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-in-n-316-de-18-de-setembro-de-2024-585391926>. Acesso em: 28 outubro 2024.
7. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA). Informe SE 45 de 2024 | Vigilância das Síndromes Gripais Influenza, covid-19 e outros vírus respiratórios de importância em saúde pública | Edição ampliada. Link de acesso: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19/publicacoes-tecnicas/informes>
8. ADIUM S.A. SPIKEVAX (vacina COVID-19): suspensão injetável 0,1 mg/ml. Produzido por: Rovi Pharma Industrial Services S.A., Madri, Espanha, ou Catalent Indiana, LLC, Bloomington, Estados Unidos da América. Importado e registrado por: Adium S.A., Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, 3400, Pindamonhangaba - SP, CNPJ nº 55.980.684/0001-27. Registro MS nº 1.2214.0131. Venda sob prescrição médica. Aprovado pela ANVISA em 06 março de 2024. Acesso em: 28 outubro 2024.
9. PFIZER. Comirnaty® Bivalente BA.1: vacina COVID-19 bivalente (Original + Ômicron B.1.1.529). Aprovado para uso emergencial pela ANVISA em 28 fev. 2023. Registro MS nº 1.2214.0131. Acesso em: 28 outubro 2024.
10. ZALIKA FARMACÊUTICA LTDA. Vacina COVID-19 (recombinante): bula profissional. Produzido por: SerumInstituteofIndiaPvt. Ltd., Pune – Índia. Contagem: ZalikaFarmacêuticaLtda, 2024. Acesso em: 28 outubro 2024.
11. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento do Programa Nacional de Imunizações. Coordenação-Geral de Incorporação Científica e Imunização. NT 118/2023-CGICI/DPNI/SVSA/MS. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/notas-tecnicas/nota-tecnica-no-118-2023-cgici-dpni-svsa-ms/view#:~:text=Trata%2Dse%20da%20incorpora%C3%A7%C3%A3o%20das,01%20de%20janeiro%20de%202024.&text=SEI!,-Banco%20de%20Pre%C3%A7os>. Acesso em: 28 outubro 2024.

12. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento do Programa Nacional de Imunizações. NT nº 101/2024- DPNI/SVSA/MS. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2024/nota-tecnica-no-101-2024-dpni-svsa-ms/view>. Acesso em: 28 outubro 2024.
13. BUONINFANTE, A.; ANDEWEG, A.; GENOV, G.; CAVALERI M. Myocarditis associated with COVID-19 vaccination. *NPJ Vaccines*. 2024 Jun 28;9(1):122. doi: 10.1038/s41541-024-00893-1. PMID: 38942751; PMCID: PMC11213864.
14. PICARD M., et al. Safety of COVID-19 vaccination in patients with polyethyleneglycol allergy: A case series. *J Allergy Clin Immunol Pract*. 2022 Feb;10(2):620-625.e1. doi: 10.1016/j.jaip.2021.11.021. Epub 2021 Dec 20. PMID: 34949564; PMCID: PMC8685412.
15. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde. Serviço de Produção de Evidências para Apoio à Tomada de Decisão. Revisão rápida sobre a incidência de eventos neurológicos associados às vacinas contra a COVID-19. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Documento interno não publicado.
16. ZALIKA FARMACÊUTICA LTDA. Vacina COVID-19 (recombinante): bula profissional. Produzido por: Serum Institute of India Pvt. Ltd., Pune – Índia. Contagem: Zalika Farmacêutica Ltda, 2024.
17. PFIZER. Comirnaty® Bivalente BA.1: vacina COVID-19 bivalente (Original + Ômicron B.1.1.529). Aprovado para uso emergencial pela ANVISA em 28 fev. 2023. Registro MS nº 1.2214.0131.
18. ADIUM S.A. SPIKEVAX (vacina COVID-19): suspensão injetável 0,1 mg/ml. Produzido por: Rovi Pharma Industrial Services S.A., Madri, Espanha, ou Catalent Indiana, LLC, Bloomington, Estados Unidos da América. Importado e registrado por: Adium S.A., Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, 3400, Pindamonhangaba - SP, CNPJ nº 55.980.684/0001-27. Registro MS nº 1.2214.0131. Venda sob prescrição médica. Aprovado pela ANVISA em 06 mar. 2024.
19. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Nota Técnica nº 12/2021/SEI/GSTCO/DIRE1/ANVISA. Orientação sobre inaptação temporária para doação de sangue de candidatos que foram submetidos à vacinação contra a Covid-19 e outras recomendações. Processo nº 25351.902684/2021-60. Brasília, 03 fev. 2021.
20. REDJOUL, R.; et al. Antibody response after second BNT162b2 dose in allogeneic HSCT recipients. *The Lancet*. Vol 398 July 24, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34270933/>. Acesso em: 09 set 2024.
21. MACHADO, C.M. Revaccination program post-hematopoietic stem cell transplantation and covid-19 vaccine: current challenges. *Journal of bone marrow transplantation and cellular therapy*. DOI:10.46765/2675374X.2021v2n2p93. Disponível em: <https://www.jbmtct.com.br/seer/index.php/jbmtct/article/view/93>. Acesso em: 09 set 2024.
22. AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY. ASH-ASTCT COVID-19 Vaccination for HCT and CAR T Cell Recipients: Frequently Asked Questions. Disponível em: <https://www.hematology.org/covid-19/ash-astct-covid-19-vaccination-for-hct-and-car-t-cell-recipients>. 2022. Acesso em: 09 set 2024.
23. CDC. Center for Disease Control and Prevention. Considerations for COVID-19 revaccination. <https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/interim-considerations-us.html#table-02>. Acesso em: 09 set 2024.
24. BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis. Manual de vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação/ Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis. – 4. ed. atual. – Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: [https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vacinacao-imunizacao-pni/manual\\_eventos\\_adversos\\_pos\\_vacinacao\\_4ed\\_atualizada.pdf](https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vacinacao-imunizacao-pni/manual_eventos_adversos_pos_vacinacao_4ed_atualizada.pdf)
25. BRASIL. UMA-SUS Cursos. Qualificação: Vigilância ESAVI: ênfase na notificação, investigação e no uso do e-SUS Notifica. Disponível em: <https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/47006>

26. BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde com Ciência. Disponível em:  
<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-com-ciencia>.
27. BRASIL. Boletins Epidemiológicos e Informes Técnicos. Disponível em:  
<https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/esavi/monitoramento-dos-eventos>

# APÊNDICES

## APÊNDICE 1

### Descrição dos grupos para a vacinação especial contra a covid-19

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e residência de idosos (ILPI e RI) e seus trabalhadores**

Serão consideradas as pessoas que residem em instituições de longa permanência para idosos (ILPI) (casas de repouso, asilos ou abrigos) ou em residência inclusiva (RI) (moradia para jovens e adultos com deficiência oferecida pelo Serviço de Acolhimento Institucional). No ato da vacinação deve ser considerada a deficiência autodeclarada. Orienta-se a vacinação no local, contemplando também os trabalhadores dessas instituições.

- Pessoas imunocomprometidas a partir de 5 anos de idade**

Para comprovar as situações previstas no Quadro A1 será possível a apresentação de medicamentos em uso ou resultados de exames ou receitas médicas ou relatórios/declarações médicas ou qualquer outro documento que evidencie a situação do imunocomprometimento do indivíduo. O Quadro A1 apresenta a definição de imunocomprometido para a finalidade deste informe.

#### Quadro A1. Definição de indivíduos imunocomprometidos ou em condição de imunossupressão

Definição de indivíduos imunocomprometidos ou em condição de imunossupressão
Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea.
Pessoas vivendo com HIV (PVHIV).
Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses $\geq 20$ mg/dia de prednisona, ou equivalente, por $\geq 14$ dias. Crianças: doses de prednisona, ou equivalente, $\geq 2$ mg/kg/dia por mais de 14 dias até 10 kg.
Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão.
Pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias).
Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise ou outras terapias substitutivas.
Pacientes oncológicos que realizam ou realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico e estão em acompanhamento.
Pessoas com neoplasias hematológicas.

Fonte: elaborado com base no *Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais*. 6<sup>a</sup> ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

- **Indígenas**

Serão considerados para vacinação os povos indígenas vivendo ou não em terras indígenas com idade a partir de 5 anos atendidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Sasisus). São ainda considerados os povos indígenas que residem em terras e agrupamentos não homologados e indígenas vivendo fora das terras indígenas em conformidade com uma decisão do Supremo Tribunal Federal por meio da análise da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 709. A vacinação será realizada em conformidade com a organização dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) nos diferentes municípios. Os indígenas que, porventura, não forem vacinados em sua terra e/ou comunidade (em ações extramuros) poderão buscar a vacinação em qualquer unidade de saúde.

- **Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas**

Serão considerados os povos que residem em comunidades tradicionais ribeirinhas e os povos quilombolas com idade a partir de 5 anos, independentemente de residirem ou não em territórios ribeirinhos ou quilombolas, ou da fase do processo de certificação ou titulação do território, mediante declaração de pertencimento étnico, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal por meio da análise da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 742. A vacinação deverá ser realizada por meio de estratégias específicas a serem planejadas no âmbito municipal. As pessoas que, porventura, não forem vacinadas nas comunidades ribeirinhas e quilombolas (em ações extramuros) deverão comparecer às unidades básicas de saúde para vacinação. Para os ribeirinhos deve-se considerar a zona de moradia/autodeclaração ou comprovante de residência para aqueles que o possuem.

- **Puérperas**

Consideram-se mulheres em puerpério todas as mulheres no período até 45 dias após o parto. No momento da vacinação estas deverão apresentar documento que comprove o puerpério (certidão de nascimento ou outro documento da criança, cartão da gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros).

- **Trabalhadores de saúde**

Consideram-se trabalhadores da saúde a serem vacinados os indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde, ou seja, que atuam em estabelecimentos de serviços de saúde, como hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais. Dentre eles estão profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulância, gestores e outros. Além desses, são considerados ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares, como os que atuam em programas ou serviços de atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, doulas/parteiras, estagiários ou residentes das profissões das áreas de saúde que estão atuando nos serviços de saúde bem como familiares diretamente responsáveis pelo cuidado de indivíduos gravemente enfermos ou com deficiência permanente que impossibilite o autocuidado (não estão inclusos todos os contatos domiciliares desses indivíduos, apenas o familiar diretamente responsável pelo cuidado). Também será ofertada vacinação aos estudantes da área da saúde que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde.

- **Pessoas com deficiência permanente**

Considera-se pessoa com deficiência permanente aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A condição “deficiência permanente” para a finalidade deste documento será autodeclarada. Este grupo inclui pessoas com:

- ✓ limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas;
- ✓ indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo;
- ✓ indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos;
- ✓ indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar etc.

- **População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, crianças, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas**

Serão consideradas as pessoas a partir de 12 anos de idade internadas em estabelecimentos educacionais (medidas socioeducativas) ou em estabelecimentos de privação de liberdade. Serão considerados também para vacinação os policiais penais e demais funcionários, com exceção dos trabalhadores de saúde. O planejamento e a operacionalização da vacinação nos estabelecimentos educacionais ou penais deverão ser articulados com as secretarias estaduais e municipais de saúde e as secretarias estaduais de justiça (secretarias estaduais de segurança pública ou correlatos) conforme a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (Pnaisp).

- **Pessoas com comorbidades**

O Quadro A2 apresenta as comorbidades consideradas para a vacinação contra a covid-19 para grupos especiais. **Não é necessária a prescrição médica ou um relatório médico detalhando a patologia e solicitando a vacinação. O acesso à vacinação deve ser facilitado. A vacinação pode acontecer mediante a apresentação de qualquer documento que demonstre ou traga informações sobre a patologia:** receita médica com medicamentos específicos aos agravos (ex.: hipoglicemiantes orais, anti-hipertensivos etc.), documento de marcação de consulta, qualquer atestado ou laudo médico, resultados de exames, resumo de alta hospitalar, entre outros. A indicação da vacinação pode ser feita também por meio da avaliação da enfermagem no momento da vacinação (ex.: cálculo do IMC ou identificação de fístula arteriovenosa para hemodiálise).

**Quadro A2.** Comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a covid-19

Grupo de comorbidades	Descrição
<i>Diabetes mellitus</i>	Qualquer indivíduo com diabetes.
Pneumopatias crônicas graves	Indivíduos com pneumopatias graves, incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos ou internação prévia por crise asmática ou uso de doses altas de corticoide inalatório e de um segundo medicamento de controle no ano anterior).
Hipertensão arterial resistente (HAR)	Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos.
Hipertensão arterial estágio 3	PA sistólica $\geq$ 180 mmHg e/ou diastólica $\geq$ 110 mmHg, independentemente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA).
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo	PA sistólica entre 140 e 179 mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109 mmHg na presença de lesão em órgão-alvo.
Insuficiência cardíaca (IC)	IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada, em estágios B, C ou D, independentemente da classe funcional da New York Heart Association.
Cor pulmonale e hipertensão pulmonar	Cor pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária.
Cardiopatia hipertensiva	Hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo.
Síndromes coronarianas crônicas	Angina pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós-infarto agudo do miocárdio e outras.
Valvopatias	Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide e outras).
Miocardiopatias e pericardiopatias	Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática.
Doenças da aorta, dos grandes vasos e fistulas arteriovenosas	Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos.

Grupo de comorbidades	Descrição
Arritmias cardíacas	Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e <i>flutter</i> atriais e outras).
Cardiopatias congênitas em adultos	Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas, insuficiência cardíaca, arritmias, comprometimento miocárdico.
Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados	Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardiodesfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência).
Doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares	Doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, ataque isquêmico transitório, demência vascular), doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla e condições similares, doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular, deficiência neurológica grave.
Doença renal crônica	Doença renal crônica, estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m <sup>2</sup> ) e/ou síndrome nefrótica.
Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves	Doença falciforme, talassemia maior e esferocitose.
Obesidade mórbida	Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40.
Síndrome de Down e outras trissomias	Trissomia do cromossomo 21 e outras trissomias.
Doença hepática crônica	Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C.

Fonte: DPNI/SVSA/MS.

- Crianças menores de 5 anos de idade com comorbidades e imunocomprometidas**

Com a finalidade de nortear quais as crianças menores de 5 anos de idade com comorbidades e imunocomprometidas são elegíveis para receber dose(s) anual(is) de vacinas covid-19, segue o quadro abaixo:

**Quadro A3.** Comorbidades e imunocomprometidos menores de 5 anos de idade

<b>Crianças com comorbidades</b>
Doença pulmonar crônica (incluindo asma grave, fibrose cística, displasia broncopulmonar e discinesia ciliar)
Doenças cardiovasculares
Doença renal crônica
Doença hepática crônica
Desordens neurológicas e distrofias musculares
Asplenia ou disfunção esplênica, incluindo esferocitose, doença falciforme, talassemia major
Doenças autoimunes
Prematuridade
Anomalias de vias aéreas
Síndrome de Down e outras síndromes genéticas bem definidas
<i>Diabetes mellitus</i> tipo 1
Obesidade (Score-Z acima de +2)
<b>Crianças imunocomprometidas</b>
Transplantadas de células tronco hematopoiéticas (TCTH)
Transplantadas de órgãos sólidos
Em tratamento de câncer
Crianças vivendo com HIV/aids ou expostas ao vírus HIV
Crianças com Erros Inatos da Imunidade (EII)
Crianças em uso de drogas imunossupressoras (incluindo metotrexate, azatioprina, 6-mercaptopurina, micofenolato, assim como corticosteroides, imunobiológicos e agentes alvo para doenças auto-imunes)

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria. Ofício 0352022, publicado em 29 de novembro de 2022.

## APÊNDICE 2

### Vacinas e especificações técnicas

#### População com idade entre 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias

As vacinas covid-19 dos seguintes fabricantes estão disponíveis pelo PNI para a população pediátrica neste momento: 1) vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) e 2), vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty). As vacinas serão ofertadas conforme as especificações de cada imunobiológico e sua disponibilidade no PNI.

**Quadro A4.** Especificações técnicas das vacinas covid-19 recomendadas para a imunização de crianças na faixa etária de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias

Especificações	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica para menores de 5 anos
Registro	1.2214.0131	1.2110.0481
Apresentação		
Indicação	População de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias	População de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias
Forma farmacêutica	Suspensão injetável	Suspensão injetável
Via de administração	Intramuscular	Intramuscular
Volume da dose	0,25 mL	0,2 mL da vacina diluída
Composição por dose	Cada dose de 0,25 mL contém: vacina covid-19 (25 mcg); excipientes: ...q.s.p.  Excipientes: hidroxietil oxoundeciloxiexilamina octanoato de heptadecan-9-ila, colesterol, levoalfafosfatidilcolina distearoila, metoxipolietilenoglicol de dimeristato de glicerila, trometamol, cloridrato de trometamol, ácido acético, acetato de sódio tri-hidratado, sacarose e água para injetáveis.	Cada dose de 0,2 mL contém: vacina covid-19.3 mcg;  Excipientes: ...q.s.p.  Excipientes: di-hexildecanoato de di-hexilaminobutanol, ditetradecilmetoxipolietilenoglicolac etamida, levoalfafosfatidilcolina distearoila, colesterol, trometamina, cloridrato de trometamina, sacarose, água para injetáveis.

Fontes: bula da vacina Covid-19-RNAm, Spikevax; bula da vacina Covid-19, Pfizer, Comirnaty®.

## População com idade entre 5 e 11 anos

Estão recomendadas para a população pediátrica entre 5 e 11 anos de idade e disponíveis neste momento duas vacinas contra a covid-19: 1) vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) e 2) vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty).

Para a população a partir de 12 anos de idade estão disponíveis três vacinas contra a covid-19: 1) vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax), 2) vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) e 3) vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika.

As vacinas serão ofertadas conforme as especificações de cada imunobiológico e sua disponibilidade no PNI.

**Quadro A5.** Especificações técnicas das vacinas covid-19 recomendadas para a imunização da população com idades entre 5 e 11 anos

Especificações	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)	Vacina Covid-19- RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica
Registro	1.2214.0131	1.2110.0481
Apresentação	 <p>spikevax® JN1 Global.com. 0.1 mg/ml dispersion for injection COVID-19 mRNA Vaccine Multidose vial IM 2.5 mL</p>	 <p>COMIRNATY 10 mcg Omicron XBB.1.5 sterile concentrate Do not dilute 10 doses after dilution Discard time:</p>
Indicação	População entre 5 e 11 anos	População entre 5 e 11 anos
Forma farmacêutica	Suspensão injetável	Suspensão injetável
Via de administração	Intramuscular	Intramuscular
Volume da dose	0,25 mL	0,2 mL (tampa laranja), ou 0,3 mL (tampa azul)
Composição por dose	<p>Cada dose de 0,25 ml contém: vacina covid-19; excipientes: ...q.s.p.</p> <p>Excipientes: hidroxietil oxoundeciloxiexilamina octanoato de heptadecan-9-ila, colesterol, levoalfafosfatidilcolina distearoila, metoxipolietilenoglicol de dimeristato de glicerila, trometamol, cloridrato de trometamol, ácido acético, acetato de sódio tri-hidratado, sacarose e água para injetáveis.</p>	<p>Cada dose de 0,2 mL ou 0,3 mL contém: vacina covid-19.</p> <p>Excipientes: ...q.s.p.</p> <p>Excipientes: di-hexildecanoato de di-hexilaminobutanol, ditetradecilmetoxipolietilenoglicolacetamida, levoalfafosfatidilcolina distearoila, colesterol, trometamina, cloridrato de trometamina, sacarose, água para injetáveis.</p>

Fontes: Bula da vacina covid-19-RNAm, Spikevax; Bula da vacina COVID-19, Pfizer, Comirnaty®.

## População a partir de 12 anos de idade

Estão recomendadas para as gestantes menores de 12 anos de idade e disponíveis neste momento duas vacinas contra a covid-19: 1) vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) e 2) vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty).

Para as gestantes a partir de 12 anos de idade estão disponíveis três vacinas contra a covid-19: 1) vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax), 2) vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) e 3) vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika.

As vacinas serão ofertadas conforme as especificações de cada imunobiológico e sua disponibilidade no PNI.

**Quadro A6.** Especificações técnicas das vacinas covid-19 recomendadas para a imunização da população a partir de 12 anos de idade

Especificações	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)	Vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika
Registro	1.2110.0481	1.2214.0131	1.8575.0001
Apresentação			
Indicação	População a partir de 12 anos	População a partir de 12 anos	População a partir de 12 anos
Forma farmacêutica	Suspensão injetável	Suspensão injetável	Suspensão injetável
Via de administração	Intramuscular	Intramuscular	Intramuscular
Volume da dose	0,3 mL	0,5 mL	0,5 mL
Composição por dose	Cada dose de 0,3 mL contém: vacina covid-19 (30 mcg). Excipientes: ...q.s.p. Excipientes: di-hexildecanoato de di-hexilaminobutanol, ditetradecilmetoxipolieti lenoglicolacetamida, levoalfafosfatidilcolina distearoila, colesterol, trometamina, cloridrato	Cada dose de 0,5 mL contém: vacina covid-19 (50 mcg); Excipientes: ...q.s.p. Excipientes: hidroxietil oxoundeciloxiexilamina octanoato de heptadecan-9-ila, colesterol, levoalfafosfatidilcolina distearoila, metoxipolietlenoglicol	Cada dose de 0,5 mL contém: vacina covid-19 recombinante 5 mcg. Excipientes: hidrogenofostafo dissódico heptahidratado dihidrogenofostato de sódio monohidratado, cloreto de sódio e polissorbato 80 e água para injeção.

Especificações	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)	Vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika
	de trometamina, sacarose, água para injetáveis.	de dimeristato de glicerila, trometamol, cloridrato de trometamol, ácido acético, acetato de sódio tri-hidratado, sacarose e água para injetáveis.	

Fontes: bula da vacina Covid-19, Pfizer, Comirnaty®; bula da vacina Covid-19-RNAm, Spikevax; bula da vacina Covid-19 (recombinante), Serum/Zalika.

## APÊNDICE 3

### Esquema de vacinação nos casos de intercambialidade para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias

- Se somente uma dose da vacina Pfizer.

Quadro A7. Esquema de vacinação nos casos de intercambialidade, se somente uma dose da vacina Pfizer

Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se uma dose da Pfizer pediátrica	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) <b>Registro: 2ª dose (D2)</b>	D1 para D2: quatro semanas	Modelo informacional: RIA-Rotina (RIA-R)
	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 2ª dose (D2)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 3ª dose (D3)</b>		
	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 2ª dose (D2)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	D2 para D3: oito semanas	Estratégia: rotina
	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 2ª dose (D2)</b>		

- Se duas doses da vacina Pfizer.

**Quadro A8.** Esquema de vacinação nos casos de intercambialidade, se somente 2 doses da vacina Pfizer

Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se duas doses da Pfizer pediátrica	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 2ª dose (D2)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	D1 para D2: quatro semanas	Modelo informacional: RIA-Rotina (RIA-R)
	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 2ª dose (D2)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 3ª dose (D3)</b>	D2 para D3: oito semanas	Estratégia: rotina

- Se somente uma dose da vacina CoronaVac.

**Quadro A9.** Esquema de vacinação nos casos de intercambialidade, se somente uma dose da vacina CoronaVac

Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se uma dose da CoronaVac	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) <b>Registro: 2ª dose (D2)</b>	D1 para D2: quatro semanas	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R)
	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 2ª dose (D2)</b>		
	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	D2 para D3: oito semanas	Estratégia: rotina
	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>		

- Se duas doses da vacina CoronaVac.

**Quadro A10.** Esquema de vacinação nos casos de intercambialidade, se somente duas doses da vacina CoronaVac

Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3		Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se duas doses da CoronaVac	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) <b>Registro: 2ª dose (D2)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>		D1 para D2: 4 semanas	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R)
	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) <b>Registro: 2ª dose (D2)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 1ª dose (D1)</b>		D2 para D3: 8 semanas	Estratégia: Rotina

- Se somente uma dose da vacina Moderna.

**Quadro A11.** Esquema de vacinação nos casos de intercambialidade, se somente uma dose da vacina Moderna

Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se uma dose da Moderna	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) <b>Registro: 1<sup>ª</sup> dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) <b>Registro: 2<sup>ª</sup> dose (D2)</b>	-	D1 para D2: quatro semanas	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R)
	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) <b>Registro: 1<sup>ª</sup> dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 1<sup>ª</sup> dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 2<sup>ª</sup> dose (D2)</b>	D1 para D2: quatro semanas	
	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) <b>Registro: 1<sup>ª</sup> dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos <b>Registro: 1<sup>ª</sup> dose (D1)</b>	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) <b>Registro: 2<sup>ª</sup> dose (D2)</b>	D2 para D3: oito semanas	Estratégia: rotina

## APÊNDICE 4

**Quadro A12.** Grupos para vacinação especial

Grupos para vacinação especial	Motivo de indicação CID-10	Descrição do CID-10	Especialidade
Pessoas vivendo em instituições de longa permanência			
Pessoas imunocomprometidas			
Indígenas vivendo em terra indígena			
Indígenas vivendo fora da terra indígena			
Ribeirinhos			
Quilombolas			
Puérperas			
Trabalhadores da saúde			
Pessoas com deficiência permanente			
Pessoas com comorbidades			
Pessoas privadas de liberdade			
Funcionários do sistema de privação de liberdade			
Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas			
Pessoas em situação de rua	Z258	Necessidade de imunização contra outras doenças virais únicas especificadas	Enfermeiro

Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde  
[bvsms.saude.gov.br](http://bvsms.saude.gov.br)



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE

Governo  
Federal



# Guia Rápido de Vacinação contra a Covid-19

## VACINAÇÃO DE ROTINA

⚠ Priorizar o uso do mesmo imunizante do início de esquema.



### Crianças

Entre 6 meses a menores de 5 anos



Vacina Covid-19-RNAm, Moderna Spikevax



Dose de 0,25 mL cada  
Via intramuscular



DOSES



INTERVALOS  
1<sup>a</sup> — 4 SEMANAS — 2<sup>a</sup>



Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer Comirnaty

TAMPA VINHO



Dose de 0,2 mL cada, vacina diluída  
Via intramuscular



DOSES



INTERVALOS  
1<sup>a</sup> — 4 SEMANAS — 2<sup>a</sup> — 8 SEMANAS — 3<sup>a</sup>



### Idosos

60 anos ou mais



Vacina Covid-19-RNAm Moderna Spikevax



Dose de 0,5 mL cada  
Via intramuscular



Vacina Covid-19-recombinante Serum/Zalika



Dose de 0,5 mL cada  
Via intramuscular



### Gestantes

Em qualquer período da gestação.

➡ 1(UMA) DOSE A CADA GESTAÇÃO

A Vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika é recomendada somente para a população a partir de 12 anos de idade.



Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer Comirnaty

TAMPA AZUL



Dose de 0,3 mL cada  
Via intramuscular



Vacina Covid-19-recombinante Serum/Zalika



Dose de 0,5 mL cada  
Via intramuscular

Dose de 0,25 mL cada para menores de 12 anos

As doses aplicadas devem ser registradas em um dos sistemas de informação, que enviem os dados para a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)



Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

OU



e-SUS APS PEC  
Prontuário Eletrônico do Cidadão

OU



e-SUS APS CDS  
Coleta de Dados Simplificada

OU



Sistemas de informação próprios ou terceiros



### Regra de entrada de doses aplicadas nos sistemas de informação

Público da Vacina	Código da Estratégia de Vacinação	Descrição do CID-10
Crianças (6 meses a menores de 5 anos), Gestante, Idosos	1 - Rotina	—
Grupos prioritários	2 - Especial	Z258

# VACINAÇÃO ESPECIAL



## Grupos Especiais



### Vacina Covid-19-RNAm Moderna Spikevax



Dose de 0,5 mL cada  
Via intramuscular

Dose de 0,25 mL cada para menores de 12 anos



### Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer Comirnaty TAMPA AZUL



Dose de 0,3 mL cada  
Via intramuscular



Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer Comirnaty (TAMPA AZUL) é recomendada somente para a população pediátrica entre 5 e 11 anos de idade.



### Vacina Covid-19-recombinante Serum/Zalika



Dose de 0,5 mL cada  
Via intramuscular



A Vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika é recomendada somente para a população a partir de 12 anos de idade.

## GRUPOS ESPECIAIS

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores
- Pessoas imunocomprometidas
- Indígenas vivendo em terra Indígena
- Indígenas vivendo fora da terra Indígena
- Ribeirinhos
- Quilombolas
- Puérperas (se não vacinadas durante a gestação)
- Trabalhadores da saúde
- Pessoas com deficiência permanente
- Pessoas com comorbidades
- Pessoas privadas de liberdade
- Funcionários do sistema de privação de liberdade
- Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas
- Pessoas em situação de rua



## Pessoas imunocomprometidas a partir de 6 meses de idade



### Vacina Covid-19-RNAm Moderna Spikevax



Dose de 0,5 mL cada  
Via intramuscular

Dose de 0,25 mL cada para menores de 12 anos



### Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer Comirnaty TAMPA VINHO



Dose de 0,2 mL cada, vacina diluída  
Via intramuscular



### Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer Comirnaty TAMPA AZUL



Dose de 0,3 mL cada  
Via intramuscular

## ESQUEMA PRIMÁRIO



## VACINAÇÃO PERIÓDICA



Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer Comirnaty (TAMPA VINHO) é recomendada somente para a população pediátrica menor de 5 anos de idade.

Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer Comirnaty (TAMPA AZUL) é recomendada somente para a população pediátrica entre 5 e 11 anos de idade.

A Vacina Covid-19-recombinante, Serum/Zalika é recomendada somente para a população a partir de 12 anos de idade.



## População geral entre de 5 e 59 anos de idade (sem vacinação prévia)



BAIXE AGORA A PUBLICAÇÃO ESTRATÉGIA DE  
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 - 2<sup>a</sup> EDIÇÃO

[bit.ly/covid192edicao](http://bit.ly/covid192edicao)



1 (UMA) DOSE

Imunizante disponível e recomendado para a faixa etária.



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO