


# CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO 2026

## Vacinas da Criança (0 a 9 anos, 11 meses e 29 dias)

**Vacinar é a melhor forma de proteger a criança contra doenças graves.**

Ao nascer, a criança recebe da equipe de saúde o seu Cartão de Vacinas e começa sua própria vacinação, adquirindo uma proteção mais duradoura.

Vacinas em dia são a principal proteção contra doenças graves e, nos primeiros 1000 dias de vida, desde ainda no útero materno, são essenciais para toda a vida. Este Calendário indica as vacinas de cada fase.



IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
Ao nascer	hepatite B	1 dose	hepatite B, hepatite D
	BCG	1 dose	formas graves e disseminadas da tuberculose e, também, com efeito protetor contra a hanseníase
2 meses	penta (DTP+ Hib+HB)	1ª dose	difteria, tétano, coqueluche, infecções pelo <i>H. influenzae</i> tipo b, hepatite B
	poliomielite inativada VIP	1ª dose	poliomielite (paralisia infantil)
	pneumocócica 10-valente	1ª dose	doenças pneumocócicas invasivas pelos sorogrupos contidos na vacina
	rotavírus humano	1ª dose	gastroenterite viral (diarréia, vômito) <sup>1</sup>
3 meses	meningocócica C	1ª dose	doenças meningocócicas (meningite, encefalite, meningoencefalite) pelo meningococo tipo C

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
4 meses	penta (DTP+ Hib+HB)	2ª dose	difteria, tétano, coqueluche, infecções pelo <i>H. influenzae</i> tipo b, hepatite B
	poliomielite inativada VIP	2ª dose	poliomielite (paralisia infantil)
	pneumocócica 10-valente	2ª dose	doenças pneumocócicas invasivas pelos sorogrupos contidos na vacina
	rotavírus humano	2ª dose	gastroenterite viral (diarréia, vômito) <sup>1</sup>
5 meses	meningocócica C	2ª dose	doenças meningocócicas (meningite, encefalite, meningoencefalite) pelo meningococo tipo C
6 meses	penta (DTP+ Hib+HB)	3ª dose	difteria, tétano, coqueluche, infecções pelo <i>H. influenzae</i> tipo b, hepatite B
	poliomielite inativada VIP	3ª dose	poliomielite (paralisia infantil)
	influenza trivalente	1ª dose	influenza (gripe) <sup>2</sup>
	covid-19	1ª dose	formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2 <sup>3</sup>
6 a 8 meses	febre amarela	1 dose, em casos excepcionais	febre amarela <sup>4</sup>
7 meses	covid-19	2ª dose	formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2 <sup>3</sup>
9 meses	covid-19	3ª dose	formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2 <sup>3</sup>
	febre amarela	1 dose	febre amarela <sup>4</sup>

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
12 meses	pneumocócica 10-valente	1 dose de reforço	doenças pneumocócicas invasivas pelos sorogrupos contidos na vacina
	meningocócica ACWY	1 dose	doenças meningocócicas (meningite, encefalite, meningoencefalite) por meningococos do tipo A, C, W, Y
	tríplice viral SCR	1ª dose	sarampo, caxumba, rubéola, síndrome da rubéola congênita (futuramente, na gravidez)
15 meses	DTP	1ª dose reforço	difteria, tétano, coqueluche
	poliomielite inativada VIP	1 dose reforço	poliomielite (paralisia infantil)
	tríplice viral SCR	2ª dose	sarampo, caxumba, rubéola e síndrome da rubéola congênita (futuramente, na gravidez)
	varicela	1ª dose	varicela (catapora) <sup>5</sup>
	hepatite A	1 dose	hepatite A
4 anos	DTP	2ª dose reforço	difteria, tétano, coqueluche <sup>6</sup>
	febre amarela	1 dose de reforço	febre amarela <sup>4</sup>
	varicela	2ª dose	varicela (catapora) <sup>5</sup>
5 anos (somente indígena, sem histórico vacinal com pneumo conjugada)	pneumocócica 23-valente	1 dose	doenças pneumocócicas invasivas pelos sorogrupos contidos na vacina <sup>7</sup>
A partir de 7 anos (todas as idades)	dT	3 doses (conforme histórico vacinal)	difteria, tétano <sup>8</sup>
9 a 14 anos	HPV4	1 dose	infecções causadas pelo papilomavírus humano <sup>9</sup>

<sup>1</sup> **Atenção aos prazos.** A 1ª dose deve ser aplicada **entre 1 mês 15 dias e 11 meses 29 dias de idade**; a 2ª dose **entre 3 meses 15 dias e 23 meses 29 dias de idade**; intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Caso a 1ª dose não seja recebida no período indicado, **perde-se a oportunidade de vacinação contra o rotavírus.**

<sup>2</sup> Crianças de 6 meses a menores de 6 anos devem ser vacinadas todo ano. Quem vai receber a vacina pela primeira vez deve tomar 2 doses com 30 dias de intervalo. As que já tomaram em anos anteriores recebem apenas 1 dose por ano.

<sup>3</sup> Recomenda-se 2 doses (aos 6 e 7 meses, vacina Spikevax) ou 3 doses (aos 6, 7 e 9 meses, vacina Comirnaty). Criança sem esquema completo até 9 meses de idade, vacinar até 4 anos 11 meses 29 dias, com intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª e 2ª dose e 8 semanas entre 2ª e 3ª dose. Para imunocomprometidos, 3 doses + doses periódicas de 6/6 meses até 4 anos 11 meses 29 dias de idade.

<sup>4</sup> A vacina de febre amarela pode ser recomendada para a idade de 6 a 8 meses quando há alto risco de contrair a doença e não é possível adiar a vacinação. Isso vale para quem vive ou vai viajar para áreas com transmissão ativa, sempre após avaliação do serviço de saúde. E diante desse risco, todas as crianças devem manter a situação vacinal atualizada. No caso de viagem, a vacina deve ser tomada pelo menos 10 dias antes, tempo necessário à proteção.

<sup>5</sup> Em casos de indisponibilidade da vacina varicela monovalente, a vacina tetraviral poderá ser utilizada.

<sup>6</sup> Recomenda-se 1 dose de reforço com dT a cada 10 anos após a última dose DTP, antecipando para 5 anos em caso de exposição ao risco de tétano ou difteria.

<sup>7</sup> Uma segunda dose deve ser administrada com intervalo de 5 anos após a 1ª dose.

<sup>8</sup> A vacina dT é recomendada a partir de 7 anos, para complementação de esquemas em atraso ou reforços.

<sup>9</sup> O papilomavírus humano causa verrugas anogenitais, nos lábios, língua, garganta, masculino e feminino, relacionadas ao desenvolvimento de câncer em colo de útero, vulva, vagina, ânus, pênis, boca e orofaringe.

